



John Adams
Library.



IN THE CUSTODY OF THE
BOSTON PUBLIC LIBRARY.



SHELF N^o

★ ADAMS

151.11

J. Miegler
John Adams
IOHANNIS
SCHRÖDERI,

DOCT. MEDICI,
NEC NON REIPUBLICÆ
MOENIO-FRANCOFURTANÆ

Physici Ordinarij,

PHARMACOPŒIA
MEDICO-CHYMICA.

SIVE,

THESAURVS PHARMACOLOGICVS.

*Quo composita quaque celebriora; hinc Mineralia, Vegetabilia & Animalia
Chymico-Medicè describuntur, atque insuper Principia Physicè
Hermetico Hippocraticæ candidè exhibentur.*

OPVS

Non minus utile Physicis, quàm Medicis :

EDITIONE QVARTA, plurimis in locis auctum, ac emendatum.

LVGDVNI,

Sumpt. PHILIPPI BORDE, LAVRENTII ARNAVD,
& CLAVDII RIGA VD.

M. DC. LVI.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

Francis
Morton
Sum Ex Libris

ADAMS 151.11



MAGNIFICIS
NOBILISSIMIS, AMPLISSIMIS,
Consultissimis, & Prudentissimis, DD.

PRÆTORI, CONSVLIBVS
AC SENATORIBVS
INCLYTÆ IMPERIALIS
Reipublicæ Francofurtanæ.

*Dnn. ac Fautoribus meis honorandis, Salutem
& Observantiam.*

DEVS ELOHIM, *Viri Magnifici, Nobilissimi, Am-
plissimi, Consultissimi, Prudentissimi*, rei quidem
nullius indiguit, quæ ad perfectionem suam fa-
cere quoquo modo posset: nihilominus pro li-
berrimo suo beneplacito sui existere voluit spe-
culum visibile, quo inuisibilis sua *Dei omnis & Nostri*, (Rom. I.) i.e.
Essentia ac potentia visibiliter patescerent, hisque cognitus ce-
lebraretur, adeoque lætaretur. Speculum id *Natura* est, siue
Mundus vniuersus, & in hoc præcipuè *Homo*, velut vniuersi-
tatis complementum. Nimirum hoc speculum *DEI* eminent-
tissimum

E P I S T O L A

tissimum, peculiariterque Spiritu ELOHIM inflatus est, electus sc. ante omnia in Filio dilecto, vt esset sanctus, perfectionisque capax supernaturalis. Quare vt *Triunus* est IEHOVA: ita *Naturam* & euidentissimè *humanam* *triunam* existere voluit: *Spiritum*, quem insitum vulgo vocant; *Corpus*, quod eius subiectum; & *animam* quæ veluti ignis vtrumque illud actuat, animat, vitalique flamma perfundit. Idem IEHOVA, vt *potentissimus* instructus, imò ipsamet potentia est operosissima: ita etiam *Naturæ*, maximèque *homini facultates* inditas voluit operosas, easque ad imaginem diuinam tum *internas*, tum *externas*. Prioribus res quæque sefemet respicit, atque actutum accefferes incipit, *Spiritus anima* accensus *subiectum* sibi generat, & ordinat, (in *Natura corpus* vocatum:) Hinc procedunt subinde radij aliorum seruitio destinati, fonsque potentiarum *externarum*. Posterioribus igitur his res quæque res extra sepositas concernit, harum seruitio prona, magis, minus, prout res cognatæ inuicem, tum quoque prout rerum conditio, cultusque exegerit. Idem IEHOVA vt *affectibus* affici dicitur, *voluptate* scil. vel *dolore* & *tristitia*: Ita pro re nata *Naturæ* & euidentissimè *homini affectus* indidit, quibus tum delectatus stimuletur, tum molestatus deterreatur. Cæterum vt *bonus* IEHOVA in se est, imo ter optimus maximus, adeoque *Essentiam* optimam possidet, *potentiam* optimè administrat, & hinc *affectu* optimo fruitur, id est, *Voluptate* ineffabili: Simili modo *Naturam* & pro re nata *humanam* optimam voluit, optimam scil. dispositionem *principiorum Essentialium*, optimam *facultatem* inditarum administrationem, & hinc *affectum* optimum, videlicet *id est* seu *voluptatem*. En finis *Naturæ* propositus *felicitas* scil. siue *summum* illud *Bonum* mundanum.

D E D I C A T O R I A.

danum, Cœlestis illius summi Boni antitypus & speculum. Huius ergo vt gradus certi sunt : ita & illius, atque idcirco *Naturam* & præ aliis *humanam* I E H O V A existere voluit perfectam quidem, verum in gradu non statim ac origine supremo, sed initiali, è quo subinde cultura accedente ad ^{animi} ascenderet, perindè scilicet vti & ipsemet I E H O V A, licet in se omnino immutabilis ; attamen ex Natura creata, huiusque conformitate ac obedientia voluptatem capessere constituit. Voluit autem I E H O V A omnia hæc, prout ipsemet liberrimus existit, cum libera hominis voluntate & arbitrio, ad bonum tamen inclinante. Quare vt propositum hoc D E I consisteret, oportuit Mundum, cum non esset produci ; cum esset, conseruari ; cum deprauatus, redintegrari. Hinc *Creatio*, eaque q. continuata *Generatio* : hinc & *Conseruatio* seu *Gubernatio* : hinc demum corruptionis *restauratio* ; ceu media ad felicitatem dictam collimantia. Et hæc omnia eò auidius D E V S expetit, quo cunctorum administrationem legitimam non solum lege innata scriptaque cauet, sed & ministris visibilibus coërcet & gubernat. Ministri hi præcipuè sunt *Magistratus Dei* propterea dictus, & hinc vel solo hoc nomine arcte obligatus voluntati diuinæ studere, felicitatemque D E O propositam mascule promouere. Quare cum *Sanitas* non minima Felicitatis dictæ portio sit ; nec postrema *Magistratus* functio erit, de illa ipsa esse sollicitum & idcirco de *Medicina* rite adhibenda. Nimirum Medicina administrata legitimè sanitatis tutela ; peruerse, eiusdem ruina. Hinc digna olim reputata Medicina, quæ à Regibus ipsis, aliisque Magistratibus, virisque celeberrimis addisceretur, excoleretur, propagaretur ; digna quæ honoribus,

Gra: Norton 2. lib

E P I S T O L A

ribus , priuilegiis & immunitatibus donaretur , digna quæ non nisi testimonio publico dignis repertis committeretur exercenda. Duobus autem præcipuè exercitatio hæc nititur , directione scilicet & elaboratione. Directionem dico , qua media sanitatis præscribuntur ; Elaborationem , qua eadem elaborantur & administrantur. In vtraque non possum non extollere , *Viri Magnifici , Nobilissimi , Amplissimi , necnon Consultissimi* , prouidam vestram curam , quippe quæ ad prius non admittitis , nisi publico testimonio comprobatos ; ad posterius , non nisi vestro examine exploratos , & utrosque non nisi stipulata manu Iuræue Iurando vobis deuinctos. Verum enimvero : vt hostis vitæ *Diabolus* haud quicquam intermittit , quod tum ad molestandum , tum ad abrumpendum fatum videtur : ita citra Prouidentiam vestram prohi dolor ! gliscant agit , quorum inscitiâ , ne dicam malitiâ vitæ ciuium non opinantium impune derogetur. Choræam in his ducunt *Iudæi* , vtpotè quibus *subiectum* ad id aptius inuenire vix licuit (*Keckerm. in Polit*) His enim regulis suis occultis permistum nouit *Gottm* id est , *Christianos* impunè & citra homicidij notam , adeoque citra conscientiam interimere. Hos notatos comperit , vt nauo malitiæ forma scilicet deformi , (quæ nota malitiæ à Natura ipsa impressa :) ita quoque fronte impudica , garrula Suada , mendacique lingua , mediis dicto scopo aptissimis , adeo quidem , vt quoque malitiæ , inscitiæ , ruditatique per examen conuicti & eapropter per *Senatus consultum* Medicina abacti , nihilominus calleant animos fascinare , leges eludere , libertatémque captare , de corio *Christianorum* , grandiloquis loquaculis nimis credulorum , impunè ludendi.

Miseret

DEDICATORIA.

Miseret me , quoties cernere datur , datur autem sapissimè , Recepta , quæ vocant , inepta , heterogenea , ne dicam noxia , incautis præscripta. Miseret , quoties audire contingit , contingit autem & hoc frequenter , affectus scilicet leues , præter rei veritatem persuaderi periculosos , idque vt credulorum bursa emulgeatur , medicasterque audiat magnus. Miseret , quoties causam morbi , specièmq; ridiculè audio enarratam. Sed cur miseret ? Mundus vult decipi ; decipiatur. Vestræ interim vti curæ est , *Viri Prudentissimi , prudentiâ vestrâ incautis succurrere , stolidis consulere , insciis præesse , imprudentibus prouidere* : ita Medicorum vestrorum & hinc mei quoque officij de abusu hoc Medicinæ *vestram Prudentiam* ad grauiora retractam , submonere. Quod non minus expeto in bonam partem suscipi , quam spero probatum vobis iri , si hoc operis , itidem ad legitimum Medicinæ exercitium collimantis , ad imitationem Pharmacopœiæ Augustanæ & Noribergensis *nomine vestro* diuulgem. Continet nimirum celeberrima quamplurima , à Medicis vestris , quos celebriores quouis tempore aluisse studetis , profecta , & idcirco vobis solis meritò consecranda. Continet quamplurima quibus officinæ vestræ , quarum non minimam curam geritis , & hinc instructissimas possidetis , præ aliis cluent. His accedit vester in me fauor , quod annis retro abhinc aliquot peregrinum ciuitate donastis , in Medicorum numerum adoptastis , priuilegiis frui dedistis , aliâque fauoris indicia in me cumulastis sufficientissimè. Eodem igitur fauore fretus confido , hanc meam gratitudinis tesseram , æquamente iri susceptum , qua vltiori vestro fauori me commendando , sanaque consilia Reipublicæ ruinam arcentia tem-

b poribus

EPISTOLA DEDICATORIA.

poribus hisce ruinam minitantibus cordetenus precor.
Francofurti ad Moenum è Musæo, ipsis Nundinis autumnalibus, Anno 1641.

Magnif.^{x.} Ampl.^{is.} & Prud.^{x.} V.^{x.}

Observantissimus

IOHANNES SCHRÖDERVS, D.



EXIMIIS



*EXIMIIS, DOCTRINA PRÆSTANTIBVS,
artisq̃ue Pharmaceuticæ peritissimis VIRIS*

Dn. Iohan - Casparo Sparrn.

Dn. Iohanni Salzudeln.

Dn. Iohanni Giasern.

Dn. Iacobo Holzapffeln.

Dn. Mathiæ Banßen.

*Inclytæ Reip. Imperialis Francofurtanæ Pharmacopœis maximè indu-
striis, Amicis suis ac respectiue Affinib. dilectis.*

Iohann. Schröder, D. eiusdem Reip. Archiater. S. P.



*Rodit iam partus Pharmacopœiæ meæ se-
cundus, quem eò alacrius maturavi, quòd co-
gnoui partum priorem audivissime fuisse susce-
ptum, adeo, ut Exemplaria intra biennium non solum
omnino sint distracta, sed & adhuc undique crebro per-
quirantur, partusque secundi editio sollicitè urgeatur.
Quare ne desim perquirentibus, gratificerque partum
secundum urgentibus, auctiorem hunc modo commu-
nico, syllabisque diuersis ac synopsi breuissima adorna-
tum. Vobis autem Viri eximij ac peritissimi eundem
quod consecrem, causæ me impulerunt variæ. 1. Favor
vester, quem hætenus à vobis expertus sum, nimirum
hunc non possum non reponere reciprocum. 2. Candor,*

quo velea , qua pro arcanis vendita fuerunt , contri-
buiſtis. Hinc gratitudinis teſſeram dare fas fuit. 3. Sti-
mulus , quo ad opus hoc tum divulgandum authores
gnavi extitiftis , ac poſtmodum partum hunc ſecundum
monitis veſtris , litterisque ea de re hinc inde ad vos
transmiſſis urgere non deſtitiftis. His ſcil. non parere
inhumanum duxi. Prætereo peritiam & dexteritatem
veſtram ſingularem , qua Officinas præ alijs celeberr-
mas , chymicisque medicamentis inſtructiſſimas voue-
tis , adeoque Momorum obtreſtationi occurrere polle-
tis. Conſecro igitur Vobis partum hunc ſecundum, quem
animo beneuoliori ſuſceptum ſpero , quod ſciam partum
priorem admodum arrifſiſſe. His valette. Dabam è
Muſeo Francofurti , nundinis vernis , Anno 1644.

VIRO



VIRO CLARISSIMO ET EXCELLENTISSIMO, D.D.
IOHANNI SCHROEDERO,

Med. D. & Reip. Franckofurtensis ad Mœnum Medico
ordinario, Cognato suo dilectissimo,

P H A R M A C O P O E I A M
M E D I C O - C H Y M I C A M

Tertium edenti

Congratulatur

IOHANNES BARCEHAVSEN, I. V. D.
Consiliarius Lippiacus.



VO S Patria & Sophia studium commune, Schrödere,

Et sanguinis cognatio coniunxerat :

Diuersum studium iam separat, & fabricauit

Apollo te Medicum bonum & Botanicum :

Nam quas herbarum virtutes Thessalus olim.

Chiron suo labore magno repperit,

Quasque Dioscorides doctissimus, Hippocraté'sque.

Acutus, & Galenus expertissimus

Excoluere suo studio, atque Egyptius Hermes

Extraxit acriore diligentia,

Quasque Teophrastus gelidis in Teutonis oris

Resuscitauit maximis laboribus,

Hæc, cognate, tuo complecteris omnia libra,

Tuæque mentis expolis acumine.

Sed me legiferi spacioſa volumina iuris

Mea manu Fortuna inſit voluere.


Hinc alma miſerum me pacis neſcia turba.

Ferè indies (eheu) vexat, atterit, enecat.

Principum in Excelsis aulis quàm turpiter alter

Me criminatur, atque mox vult perditum :

*Alter me laudat , scriptis & voce celebrat
 Meum laborem , meque seruatum cupit.
 Hæc ferenda mihi sors est : nam multat uterque
 Pro honore , maximo me onere grauisimo.
 Cunctorum tibi conciliat decus atque fauorem
 Phæbus , sibi que collocat proximum.
 Gratulor ergo Tibi , Phæbi doctissima proles
 Et ego meam sortem feram placidissimè,
 Atque tuum librum si carpit Zoilus ore
 Suo maligno , Tum feras quoque placidè,
 Nam cum carpit & , non est onus hoc , sed honos est,
 Et magnares est ab optimis laudarier.*



FOssile , Planta , Animal , quî sint adhibenda fugandis
 Morbis , fasciculo , Docte Schrödere , doces.
 Namque Metallifera hæc quicquid producit alitque
 Quicquid & abscondit terra benigna , refers.
 Atque adeò luces noctesque laboribus vrges,
 Tradas quæ populo , quæ bona grata Deo,
 Maeste ergo , maeste ægri perge iuuare salutem :
 Gratus es hinc ægris : gratus es hinc Medicis.

Sic gratulatur

PETRVS DE SPINA, Doct.
 Phys. Ord. Reip. FF.

AN tandem prodit tua, mi SCROEDERE, tot annis
 Optata à tantis, PHARMACOPOEA, viris?
 An tandem prodit, qua trux Libitina tenetur,
 Qua leuiore Charon cogitur irerate?
 O bene! in humano stabulantia corpore monstra
 Nunc digito poterunt liberiore premi.
 Nunc quod Arabs, Graius, Gallusque, Iber atque Latinus
 Continet, hoc uni vis tuo inesse libro,
 Perge Machaonia modo sic prodesse palastra,
 Æternum nomen phœbus Apollo dicat.

Cl.Dn. Affini suo gratulabundus deproperabat.

LVD OV. VON HORNIGK, V. Iuris, Med. & Phil.
 D. simulq; Com. Pal. Cas. & Phys. Ordinar. Francof.

Excellentissimo Viro, Medico Experientissimo,
 D. D. IOHANNI SCHROEDERO,
 Amico & Fautori magno.

Ecce! Machonias quicunque fideliter artes
 Exercet, studiis amplificatque suis:
 Ille mihi gemino condignus honore videtur,
 Lauream cui duplex impediaturque caput.
 Hoc, Schrödere, facis! Nostram tu perficis artem,
 Vsu, tu scriptis condecorasque bonis.
 Ergo mihi geminis venerandus honoribus exis,
 Cum duplicique tuus laude triumphus erit.
 Perge nouis partam scriptis extendere famam!
 Non amat ignauos gloria magna viros.
 Præmia sunt gnauis, & certa laboribus. Hæc te,
 Vt celebri clarus laude ferare, iuuent.

Fallor?

Fallor? an ut Medicis jam proderit vsibus, auctam

Sic reddet famam, quem dabis, ille liber.

Egregius labor iste tuus? Tu dignus es autor


Quem Medicus, quem nunc Pharmacopœus amet.

Francofurti in Nundinis Autumnal. M. D C. X L I.

Noui & elegantis operis Editionem,
cum affectu, congratulabatur

IOH. PETRVS LOTICHIVS, D. Med.

Acad. Marpurg. Prof. P. L.



Encomium Medicinæ Sacrum.

DEus ipse, ait Sirachus,
Medicum creavit; axe
Medicina traxit ortum:
Nebulæque, non honestus
Sapiensque tenuit illam.
Macrocosmus iste totus
Medica officina lo v æ est,
Chymica officina mundi
Polydædala officina est.
Medicina nota Adamo,
Fuit, idque teste Mose,
Quia nomina ipse cunctis
Dedit aptarebus. atque
Medicum fuisse Moſen
Tibi testis arbor, à qua
Aqua amara facta dulcis,
Locus ipse Mara testis.
Medicos suæ Iosephum
Habuisse constat aulæ.
Salomonidique Regi
Medicina nota tota.
Medicina tota nota.

Animantia ille cuncta,
Vegetabilesque plantas
Bene novit, annotavit,
Meminitque cuncta ad unguem,
Docuitque cuncta ad hilum.
Medicum fuisse Elisam
Sale facta aqua salubres:
Colocynthides agrestes,
Colocynthides amara
Quia dulcuere, Elise
Tibi testis est farina.
Medicum fuisse Esaiam
Palatha illa testis; vlcus
Quia sanat Ezechia.
Medicum fuisse Paulum
Tibi testis ipse Paulus;
Stomacho hicce languenti
Modico mero medetur.
Medicum fuisse Lucam
Tibi testis iste Paulus:
Genius comes Tobia
Medicus fuit Raphaël,

Oculos patris Tobie
 Quia felle piscis ungit
 Medicatur atque corde &
 Fugat hepate Asmodaum.
 Nihil honore maius
 Sacra prodidere quicquam;
 Nihil hoc honore maius
 Quoque continent profana:
 Medicum quod Israëlīs
 Vocat ipse se IEHOVA:
 Medicum quod haudque IESVS
 Dubitat vocare sese.
 Nihil hoc honore maius

Sacra prodidere quicquam;
 Nihil hoc honore maius
 Quoque continent profana.
 Tibi gratulor proinde,
 Mihi gaudeo, quod edis
 Lepidum novum huncce librum,
 Medicum novum huncce librum,
 Chymicum novum huncce librum, ô!
 Cerebellulum Minervæ es,
 Et es osculum Suade,
 Es Apollinisque mysta!
 Tibi gratulor proinde,
 Mihi gaudeo, Ioannes.



EPIGRAMMA AD EVNDEM.

Fossilia & plantas, animalia, denique cuncta
 Vsu pro Medico digeris & Chymico.
 Ut studij immensi est infinitique laboris:
 Sic opus immensæ hoc utilitatis erit.

ita censeo, ita auguror

IOANNES SEBASTIANVS BLOSIUS,
 Philos. & Med. D. Reip. Vlm. Poliat. & P. P.



AD EXCELLENTISSIMUM AUTOREM,
Amicum plurimum honorandum.


TROCHAICI.

Dædale Scrutator indefesse rerum plurium,
 Millies formantis ac versantis ætus Scenicos
 Artis, Orbis cui ministrat cuncta totus larguer,

*Morbidis salubritatem quod afferas mortalibus ;
 Vnicum quem clamat esse civium gratissimum
 Pergamus cum Co , suos post maximos Antistites,
 Quem simul suo cupit tenere contubernio
 Africa gens Maura terra , non medentium ultima,
 Et simul suo gregi adscribit Senex Aegyptius,
 Quemque Teuto , Gallus . Anglus cum Trionis septima
 Subdito , certante voto , deperibant , Finnone.*

*Docte Vir , Schrödere , quem non tangit incantatio
 Seculi abhorrentis illa , Trismegistus quæ senex,
 Quæ vel accuratior recentium ætas addidit
 Spagyrum , eruditiori dissecandi pharmaca
 Arte , mactæperge , non de more proletarij
 Ordinis medentium , Soli Taricho , carnibus
 Postprocul mensam abijci iussis , petentes pascier,
 Et bonam artem qui ligant cum circinationibus
 Obfite subscudibus rote molari polline
 Cumque crateis valisæis , farri condisque alueis.
 Hoc enim nisu accipis Viri Sophi præconium ;
 Hoc adempto persirepis cœu naufraga navis leue
 Undiquaque aplustre , cantilena Salgamarum es.*

ANTON. BOXBARTERVS, Doct.
 Phyl. Ord. Vlm.




E St locus in pratis , quæ se Tithonia coniux
 Mane nouo roteis explicuit radiis.
 Atque ubi se multum Scarabæa propago recepit
 Ludere ad apricum Solis , ab axe , iubar.
 Lusus erat varius , viridi nec inutilis herbæ,
 Quæ tolet hoc semper crescere inulti loco.
 Huc etiã horrifero sese Phlegæontis ab Antro
 (Credere quis posset ?) Turba ministra cauit.
 Prima hæc Gorgoneis Aleclo infecta venenis
 Venit , Typhæone quam comitata fuit.

Tertia non segnis venit properantibus alis
 Dira *Megara* graui congeminata malo.
 Ventosæ incipiunt subito crepitacula linguæ
 Exerere, & de se non nisi magna loqui.
 Gloria prima fuit *furiarum*, & Gloria summa,
 De vitiis magnum tollere laudis opus.
 Quomodo *Myriadas morborum* eduxerit Orco
 Quælibet, inque homines fuderit omne malum:
Pestiferam hæc iactat *tabem*, immedicabile damnum.
Hydropem dirum hæc, horriferaque *febrim*.
 Horrifera *febrim*, qui morbus ab orbe creato
 Corpus in humanum sæuior vsque furit.
 His & *Erysipelas*, *Phagedæna*, *Elephantiasisque*.
 Atque *dysenteria* fluxus, & *hexis* atrox.
Arthritis, raptæque *Epilepsia* Mentis, & horror
 Cordis, *pleuritis*, *cæliacusque* dolor.
 Cuncta hæc *Eumenidum* diffusa è pyxide damna
 Humanum incipiunt sollicitare genus.
 Gloria quam vana hæc, iactantiaque imbroba multos
 Strinxerit, inferni lurida turba probant.
 Et *phlegethontæ* gaudent his dotibus vndæ:
 Gaudete, in nihilum gaudia vestra cadent.
 Ille *Berilleo* tandem miserabile *Tauo*.
Mugiat, *Eumenidum* cui fera dona placent.
 Tandem ubi iam morbos alios, & plura malorum,
 Pergebant *Furia* commemorare truces.
 Ecce, nouus subito per apertas *sibilus* auras,
 Per nemus & virides spontè susurrat agros.
 Anne *volucris* erat? sed cur *fera cornua* frontem,
 Armabant? *Taurus* non erat, *ales* erat.
 Num tibi *ceruinæ* sunt *cornua* cognita frontis?
 Hoc etiam huic cernis *cornua acuta* modo.
 Hoc monstro viso, *Furias* stupor omnis habebat,
 Corripuit celerem per nemus omne fugam.
Cervus at elatus naturæ viribus audax
 Cœleste aggreditur nobilis *Artis* opus.
 Humanæ vt constant illustria commoda vitæ,

Corpus & vt possit mensque valere diu.
Pharmaca componit grata, & Medicamina Diuis.
 Et quibus è Mundo damna fugare queat.
 Corporis è latebris Pestem depellere tentant?
 Protinus è venis pestile virus abit.
 Sic age, sic *Schrædere* tibi hinc noménque decúsque
 Crescit, & æternùm fama superstes erit.
 Et verè inceptas *volitare per ora virorum*,
 Portitor & stygius pauper inópsque iacet!

Hoc honoris & amoris ergò votum accinit
 IOHANN. TILMANNVS. D. &
 Med. Prof. Ord. Marpug.



AD DOCTISSIMVM VIRVM,

Dn. IOHANNEM SCHROEDERVVM,
 Medicinæ Doctorem, fratris filium.

Ingenij profers dotes, ostendis & artem,
Herbarum Vires tradere quando studes.
Dumque Metallorum naturas ordine tractas,
Abdita quæ multis multa patere facis.
Hinc poterunt rectè varios sanare dolores,
Hinc herbas morbis rectè adhibere scient.
Hoc Agnate modo clarissime perge, sequentur
Perdulces fructus, præmia, fama, decus.
Non inhonorus eris, non deficiente crumenâ
Afiduâ passim dote celebris eris.

GEORGIUS SCHROEDERVS, Reip. Salis-
 Vffenianæ Consul, Authoris Patruus.



EXscriptis SCHOEDERE tuis, cùm vidit Apollo
Ingenij dotes, mentis miratus acumen,
Dixit, ea æternâ iubeo dignissima cedro;
Quicquid enim occuluere alii, hoc ipsum omne reuelat.
Naturæque aperit mirâ breuitate recessus,
Conclusumque tenet recto rerum ordine iunctim,
Quicquid habent Arabum clarissima lumina, Crinas,
Almanfor, Mesues, Auicenna, Salemnia, Zocha,
Quicquid & Hippocrates, Mithridates, quicquid & Hermes,
Quicquid & Eûclides, quid Chiron, quidque Machaon,
Quicquid & Hartmannus, quicquid Sennertus acutus,
Crollius, ac alii Chymico splendore corusci,
Quorum indefessos est admirata labores,
Hoc nostro fœcunda parens Germania seclo,
Quicquid habent, inquit, sparsim, congeffit in vnum,
Atque suas Lachesi leges indagine mentis
Solerti sanxit, pulsâ formidine fati:
Hæc fando, æterno dirauit marmore nomen.
Ergo mihi viuas nostræ pars altera vitæ
Faucibus ex orci quam tu, SCHROEDERE, reduxti,
Viue tibi que tuis, tutumque vireſce per orbem!

*Merita gratitudinis & amoris monumentum posuit
Mæno Francofurti,*

IOANNES GVILIELMVS HOCHSTATT,
D. Physic. Ord. ibidem.



Ad clarissimum & Doctissimum

Dn. IOHANNEM SCHROEDERVM

Medicinæ Doct. præstantissimum, denuò
suam Pharmacopœiam edentem

Anagrammata tria.

I.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΡΟΪΔΕΡΟΣ.

Αναγραμματικῶς :

Δω' τοῖς χῆς ἔρρωσ.

ΝΑΙ σε τον ἱατρον πολυδριαν, ΣΧΡΟΪΔΕΡΕ, εἶναι
Σὺ τὸδε μαρτυρεῖ, βίβλιν ἀπεκείως

Ἄνθων γὰρ, ῥόζων, καὶ κάρπων, καὶ μεταλλων

Ἰατροῖς φαίνει φάρμακα πάντα σοφίης.

ΔΗΝ ἔν' ΝΟΪΣ ἘΡΡΩΣΟΧΟΪΣ, καὶ δ' ὀπτοχῆ αἰέν,

Ὅππως ἰατρὸς ἀδελφῇ ἀνδρα δύνη.

II.

Iohannes Schröderus Vflenienfis Medicinæ Doctör.

A N A T P.

Chare doctis medicis, anne venis? Visu? odore flores.

CHARE vir, & DOCTIS MEDICIS celeberrime Doctör,
ANNE VENIS clarus Martis & artis ope?

Mars medicum te coluit quondam: at nobilis ars nunc

Te laudis titulo nobiliore beat.

Idque opus hoc medicum probat: En VNIS Ne peritè

Omnia, quæ medicis sunt meditanda viris?

Hinc celebris medicus meritò nunc plaudis & audis,

Et scripti FLORES huius ODOR E tui.

III.

Iohannes Schröderus Vflenianus Medicinæ Doctör.

Αναγρ.

En es sicut rosa odora, nunc in medica flores: indue.

EN de rosis dum scribis, atque floribus,

Schrôdere Doctör, cæteris,

ES litteratis omnibus SICVT ROSA.

ODORA in horto florido.

ET

ET NVNC IN arte MEDICA vbique nomine

FLORES tuo clarissimo.

Sic perge libros scribere, & sic IN DVE

Scriptis tuis doctissimis,

Celebre nomen atque talem gloriam,

Quæ apud futuros posteros

Florebit & tibi virebit splendide,

Dum terra picta gramine

Virebit, atque floribus vernalibus

Ornabit hortos fertiles.

*Ioh. Loosherus Florimontanus Pastor Vfleniensis & Superintendens
Generalis in Comitatu Lippiaco F.*

Herbis; non verbis, Medicorum, est pelleri morbos.

Verbis; non herbis, stolidorum est, credere corpus

Curandum! ergo abeant, abeant procul atque faceessant,

Et vetulæ, & lamix & varium genus impostorum.

Vanidicum, indoctum, quos pro medicamine verba

Protulisse iuuat, credo, Cacodæmone fretos,

Aut Erebi furiis comitatos, pelleri morbos

Garminibus Circes tentantes, murmure cantus

Theſſalici, orantes Erebonque Hecatenque Chaontaqu:

Absint, longè absint, procul hinc; procul inde faceessant!

Herbis; non verbis curantur corporis artus:

Herbis; non verbis fiunt medicamina vitæ:

Herbis; non verbis fiunt unguenta salutis:

Herbis; non verbis redeunt in corpora vires,

Ergo hinc longè abeant, procul hinc; procul inde faceessant.

Verbis; non herbis qui curant corporis artus:

Verbis; non herbis querunt medicamina vitæ:

Verbis; non herbis faciunt unguenta salutis:

Verbis; non herbis reparant in pristina vires.

Ergo tuis cessent verbis Medicaſter Apella!

Clamor ſus Stentor! ceſſet ſurioſus Agyrtes!

Herbis; non verbis cunctis propino ſalutem!

M. Antonius Iſterus, Gymnaſ. Francof. P. t. Pr. Prim.

IOANNES SCHRODERVS
Medicinæ Doctor.

ERIS COVS, SIC ORNANTE DEO IN RE MEDICA.

ALter ERIS Schrôdere COVS, SIC nomina reddunt,
Scripta probant ORNANTE DEO (quæ gloria maior
Esse potest?) TE IN RE MEDICA. Concertet hirundo
Cygno, aut hædus equo, si conentur tua scripta
Rodere Liuvor edax, Momusue asinus, sua norint
Crimina fœda prius; quid enim concertet hirundo
Cygnis, aut facere tremulis forte artubus hædus
Confimile in cursu poterit quam fortis equi vis?

*Pharmacopœam Medico-Chymicam Excellentissimi &
Experientissimi Viri Dn. D. Schrôderi anagram-
mate hoc extemporaneo condecorare lubens &
meritò volui Francof 8(18) Septemb. Anno 1641.*

BALTHASAR STVTENIVS Med. Bilsfeld.

Non nobis solum nati sumus (optimus inter
Romanos Cicero monuit) sed vindicat orius
Patria mox nostris partem, partemque Parentes,
Partem fidus amor quos nobis iunxit, Amici.
Et velut in terris quæ progignuntur, ad usum
Proveniunt hominum; sic magnus Conditor orbis.
Ob genus humanum mortales condidit ipsos,
Alter ut ulterius posset releuare labores.
Quò nos ergo parens ducit natura, sequamur
Omnibus officiis mutuò prodesse, hominumque
Inter nos homines studium, nunc artibus ipsis,
Nunc operâ, nostrisque bonis vincere parati.

de off. l. i.

*Hoc monitum observans , Clarissimus arte medendi
Schroëderus , verbis , factis , scriptisque saluti
Prospicit agrorum : testatur id optima praxis ,
Testatur medicum , quod nobis arte volumen
Conscriptum dederat magnâ : nunc auctius ipsum
Cum videat lucem , meritò latamur , & illi
Qui dedit , immensas pro tanto munere grates
Solvimus , atque suam multos producat ad annos
Nestoris , optamus vitam , quo premia digna
Accipiat studio , multùmque salubria dictans ,
Pluribus auxilium præstet , vel præbeat Orbi
Exemplum , mutuo potius vigiletur ut agris
Consensu , in partes quàm diuellamur iniquè.*

f.

IOANN. PFAVTZ D.



d

CHARA

QVI IN PHARMACOPŒIA

Medico-Chymica occurrunt.

+	Crucibulum,	Tigillum.
⊗	Cuprum.	
Δ	Destillare.	
W	Dies.	
○	Drachma.	
≡	Ferrum.	
āāā	Gemini.	
ā an	Hora.	
♂	Igris.	
▽	Iupiter.	
∇	Leo.	
∇	Libra.	
↑	Libr.	
⋯	Luna.	
♂	Mars.	
♀	Mercurius.	
∞	Mercurius sublimatus.	
∞	Mercurius precipitatus.	
∞	Mensis.	
⊙	Nitrum.	
B.	Oleum.	
MB	Oppositisio.	
VB	Pisces.	
C.	Plumbum.	
☿	Pulvis.	
♂	Precipitare.	
♂	Quadratus.	
♂	Quinta Essentia.	
♂	Retorta.	
♂	Sal Armoniacum.	
♂	Sal cor aure,	
C.C.	Sal Gemma.	

[illegible]

Sal Nitrum.
Saturnus.
Scorpius.
Sextilis.
Sol.
Spiritus
Spiritus Vini.
Stannum.
Stratum super stratum.
Sublimare.
Sulphur.

⊙	Talcum.
h	Tartarus.
w	Taurus.
*	Terra.
⊙	Trigonus.
h Sp.	Venus.
V	Vinum.
z	Virgo.
SSS.	Virid. Aris.
u	Vitriolum.
⊕	Vrina.

X
♀
♂
▽
△
♀
V.
my
⊕
⊖
□





Extraict du Priuilege du Roy.

L OVIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE:
 A nos Amez & Feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement,
 Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Senéchaux, Preuots,
 leurs Lieutenans, & à tous autres de nos Iusticiers & Officiers qu'il appartiendra,
 Salut. Nostre cher & bien-amié PIERRE RIGAYD, Marchand Libraire en nostre
 bonne Ville de Lyon, nous a fait remonstrer, qu'il desireroit faire imprimer vn Liure
 intitulé *Pharmacopœia Medico-chymica Iohannis Schrôderi*, cy-deuant imprimé
 en Allemagne; mais il craint que d'autres ne le voulussent pareillement imprimer,
 ce qui luy causeroit vne perte notable, attendu les grands frais qu'il a faits: Il nous a
 tres-humblement fait supplier luy vouloir accorder sur ce nos lettres; A ces causes,
 desirant fauorablement traiter l'exposant, nous luy auons permis & accordé par ces
 presentes, d'imprimer, faire imprimer, vendre & distribuer en tous les lieux de
 nostre obeyssance ledit Liure, en telle marge & caractere, & autant de fois que bon
 luy semblera durant l'espace de sept ans entiers & accomplis, à compter du iour
 qu'il sera acheué d'imprimer; pendant lequel temps, nous faisons tres-expresses
 defences à tous Imprimeurs & Libraires, & autres personnes de quelque qualité &
 condition qu'ils soient, de faire imprimer, vendre & distribuer, ny mesmes faire venir
 des pays estrangers aucuns du susdit Liure, sous pretexte de correction, augmentatiô,
 changement de tiltre, volume, caractere & faulx marque, ou autrement, sans le
 consentement de l'exposant, ou ses ayans cause, à peine de trois mille liures
 d'amende payable par chacun des contreuenans, & applicables vn tiers à Nous,
 vn tiers à l'Hostel Dieu de Paris, & l'autre audit exposant, de confiscation des
 exemplaires contrefaits, avec tous despens, dommages & interests: à condition qu'il
 sera mis deux exemplaires dudit Liure dans nostre Bibliotheque, & vn en celle de
 nostre tres-cher & feal le Sieur Seguier Cheualier Chancelier de France, auant
 que de les exposer en vente, à peine de nullité des presentes. Du contenu desquelles
 nous vous mandons, & voulons que vous fassiez iouyr plainement & paisiblement
 ledit RIGAYD, ou ceux qui auront son droit, sans souffrir qu'il leur soit fait ou
 donné aucun empeschement. Voulons aussi qu'en mettant à la fin, ou au commen-
 cement dudit Liure vn extraict des presentes, elles soient tenuës pour signifiées, &
 que foy y soit adioustée. Mandons au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce re-
 quis de faire pour l'exécution des, presentes tous exploits necessaires, sans demander
 autre permission: car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le dixhuitième iour de
 Decembre, l'an de grace, mil six cens quarante-sept, & de nostre regne le cinquième,

Par le ROY en son Conseil,

Signé CONRART.

*Les Exemplaires ont esté
 fournis, comme dessus.*

Acheué d'imprimer pour la premiere fois,
 le 30. Septembre, 1648.


INDEX

INDEX CAPITVM.

LIBER I.

DE

ISACOGÆ.

- | | | | | |
|---------|---|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Cap. I. |  | Harmacopœiæ | 21. | 4. Materia. |
| | | Definitio ac | 22. | 5. Tempus & Locus. |
| | | distributio. | 23. | <i>Rer. Colligendarum.</i> 1. Tempus |
| 2. | | <i>Obiectum.</i> Res | | intern. |
| | | Medicamentales natiuæ. | 24. | Extern. Vniuersalius se- |
| 3. | | Res Medicamentales præpa- | | cundum Qualitates |
| | | ratæ. | | primas. |
| 4. | | <i>Rerum Natiuarum producendarū</i> | 25. | Particularius secundum |
| | | 1. Modi. | | influentias. |
| 5. | | 2. Principia Essentialia. | 26. | 2. Modus. |
| | | 6. 3. Causa efficiens interna. | 27. | <i>Rer. Afferuandarum</i> 1. Tempus. |
| 7. | | Extern. Qualitates primæ. | 28. | 2. Locus. |
| 8. | | Salinæ Facultates. | 29. | 3. Adaptatio. |
| 9. | | Influentiæ stellarum. | 30. | <i>Rer. Vfurpandarum</i> 1. Vires. |
| 10. | | Proprietates particulares. | 31. | 2. Modus Vtendi. |
| 11. | | 4. Materia. | 32. | 3. Formulæ. |
| 12. | | 5. Tempus | 33. | 4. Dosis. |
| 13. | | 6. Locus. | 34. | <i>Rer. Dignoscendarum</i> Signa: In- |
| 14. | | <i>Rer. præparandarum</i> 1. Modi. | | hærentes Qualitates Sensiles |
| 15. | | 2. Principia Chymica. | | & Figura. |
| 16. | | 3. Efficiens interna. | 35. | Ætas, Duratio & sexus. |
| 17. | | Extern. Qualitates primæ | 36. | Antecedent. |
| | | & præcipue Calor. | 37. | Consequent. |
| 18. | | Facult. Salinæ. | 38. | Similitudo. |
| 19. | | Instrumenta | 39. | Inuestigatio; qualitatum ma- |
| 20. | | Fornacæ | | nifestarum. |

INDEX CAPITVM.

40. Occultarum.

LIB. II.

DE

OFFICINA.

1. Officinę definitio ac distributio.

2. *Simplicia* i. *Mineral*: *Terra*.

3. *Aquæ*.

4. *Lapides*.

5. *Metalla*.

6. *Salia*.

7. *Sulphurea*.

8. 2. *Vegetab. Aromata*.

9. *Cortices*.

10. *Flores*.

11. *Folia* s. *Herbæ*

12. *Fructus*.

13. *Fungi*.

14. *Ligna & Visca*.

15. *Radices*.

16. *Semina*.

17. *Succi*.

18. *Olea & Balsama*.

19. *Resinæ*.

20. *Gummi Resinæ*.

21. *Gummi*.

22. 3. *Animal. integra*.

23. *Partes Carnosæ*.

24. *Membranosæ*.

25. *Cornua*.

26. *Ossa*.

27. *Crustacea* s. *Testacea*.

28. *Lapilli*.

29. *Lac & Serum*.

30. *Fella*.

31. *Medullæ*.

32. *Pinguedines*.

33. *Sanguis*.

34. *Seua*.

35. *Stercora & Vrinæ*.

36. *Vngues Vngulę & Coagula*.

37. *Preparat. Aceta*.

38. *Aquæ destill.*

39. *Aq. Mixtæ*

40. *Balsami odoriferi*.

41. *Stillatitij*.

42. *Boli*.

43. *Calces*.

44. *Cataplasmata*.

45. *Clysteres*.

46. *Condita*.

47. *Confectiones*.

48. *Conseruæ*.

49. *Decocta*.

50. *Eclechma. Loch. Linctus*.

51. *Electuaria*.

52. *Elixiria*.

53. *Emplastra*.

54. *Emulsiones*.

55. *Errhina*.

56. *Epithemata*.

57. *Extracta*.

58. *Farinæ*.

59. *Feculæ*.

60. *Flores*.

61. *Gargarismi. Diaclysmi Dentifricia*.

62. *Gelatinæ*.

63. *Infusiones. Vina medicata. Clareta*.

64. *Iulebi. Moreti*.

65. *Lapides*.

INDEX CAPITVM.

- 66. Liqueores.
- 67. Magisteria.
- 68. Masticatoria.
- 69. Morfelli. Rotulæ.
- 70. Olea stillaritia.
- 71. Expressa.
- 72. Infolata, cocta, &c.
- 73. Pilulæ.
- 74. Potiones.
- 75. Poma Ambræ.
- 76. Præparata.
- 77. Pulueres. Species.
- 78. Sacculi.
- 79. Salia.
- 80. Saponos.
- 81. Spiritus.
- 82. Succ.
- 83. Suppositoria, Pessi.
- 84. Syrupi, Mella, Rob.
- 85. Tincturæ.
- 86. Trochisci.
- 87. Balsami inunctoriij, Lini-
menta, Vnguenta.

LIB. III.

DE

MINERALOGIA.

- 1. Mineralogia.
- 2. Terræ.
- 3. Aquæ.
- 4. Lapides in genere.
- 5. Preciosi: Gemmæ.
- 6. Corallia.
- 7. Margaritæ.
- 8. Minus preciosi.
- 9. Metalla 1. Aurum.

- 10. Argentum.
- 11. Ferrum.
- 12. Cuprum.
- 13. Plumbum.
- 14. Stannum.
- 15. *Metallis finitima*: Mercurius.
- 16. Cinnabaris.
- 17. Antimonium.
- 18. *Metallis incrementa naturalia*.
- 19. Artificialia.
- 20. Salia in genere.
- 21. Commune.
- 22. Gemmæ & Indum.
- 23. Nitrum.
- 24. Alumen.
- 25. Ammoniacum.
- 26. Vitriolum.
- 27. *Sulphurea*: Arsenicum.
- 28. Sulphur.
- 29. Bitumen ac Ambra grysea.
- 30. Succinum.
- 31. Sperma Ceti.
- 32. Asphaltus, Naphtha Petro-
læum, Ol. Terræ.
- 33. Carbo petræ & Gagates.

LIB. IV.

DE

PHYTOLOGIA.

Classis I. De Alterantibus primariis.

- 1. Abies.
- 2. Abrotanum.
- 3. Absynthium Vulg.
- 4. Pontic.
- 5. Acacia vera.
- 6. Germanic.

7. Ace

INDEX CAPITVM.

- | | |
|--|---|
| <p>7. Acetosa.
 8. Acetofella.
 9. Acorus verus
 10. adulterinus
 11. Adiantum
 12. aureum
 13. Agallochum
 14. Ageratum
 15. Agnus castus
 16. Agrimonia
 17. Alehimilla
 18. Alkekengi.
 19. Allium
 20. Alfine.
 21. Althæa.
 22. Amaranthus
 23. Ammi
 24. Amomum
 25. Amygdalæ
 26. Anacardium
 27. Angallis terrestris
 28. aquatica
 29. Anethum
 30. Angelica.
 31. Anisum.
 32. Anserina.
 33. Anthora.
 34. Antirrhinum.
 35. Apium.
 36. Aquilegia.
 37. Aristolochia longa & rot.
 38. Armoracia.
 39. Arnica.
 40. Artemisia.
 41. Arum.
 42. Asparagus.
 43. Atriplex.</p> | <p>44. Avena.
 45. Aurantia malus.
 46. Auricula muri.
 B.
 47. Balani myreplicæ.
 48. Balsamus.
 49. Bardana major.
 50. minor
 51. Basilicum.
 52. Behen album; rubrum.
 53. Bellis.
 54. Berberis.
 55. Beta
 56. Betonica.
 57. Betula.
 58. Bistorta.
 59. Bombax.
 60. Borrago.
 61. Branca vrsina.
 62. Brassica.
 63. Buglossa.
 64. Bursa pastoris.
 65. Buxus.
 66. Calamus aromaticus.
 67. Calamintha.
 68. Calcatrippa.
 69. Caltha.
 70. Cannabis.
 71. Cappares.
 72. Caprifolium.
 73. Cardamomum.
 74. Cardiacæ.
 75. Carduus benedictus.
 76. Carduus Mariæ.
 77. Carlina.
 78. Carum.
 79. Caryophyllus hortens.</p> |
|--|---|

INDEX CAPITVM

80. Caryophyllata.
 81. Caryophyllata.
 82. Castanea.
 83. Centaurium minus.
 84. Cepa.
 85. Cereſus.
 86. Cærefolium.
 87. Chamædrys.
 88. Chemæpitys.
 89. Chamomilla.
 90. Chelidonium maius.
 91. minus.
 92. Chermes.
 93. Cheiri
 94. China
 95. Cicer
 96. Cichoreum
 97. Cicutæ
 98. Cinamomum
 99. Citrus
 100. Citrullus
 101. Cochlearia
 102. Golubrinum lignum
 103. Contrayerua
 104. Conſolida media
 105. Corallina
 106. Coriandrum
 107. Cornus
 108. Corylus
 109. Coſtus
 110. Crocus
 111. Cubebæ
 112. Cucumer
 113. Cucurbita
 114. Cuminum
 115. Cupreſſus arbor
 116. Cupreſſus herba

117. Curcuma
 118. Cuſcuta
 119. Cyanus
 120. Cyclamen
 121. Cynogloſſa
 122. Cynofbatus
 123. Cyperus
 124. Cydonia malus
 125. Daucus
 126. Diſtamnus creticus
 127. Diſſacus
 128. Doronicum
 129. Ebenus
 130. Ebulus
 131. Endiuia
 132. Epatica nobilis
 133. Epatica ſtellata
 134. Equiſetum
 135. Eruca
 136. Eringium
 137. Eryſimum
 138. Eupatorium
 139. Euſſragia
 140. Faba
 141. Fabaria
 142. Ficus
 143. Filipendula
 144. Filix
 145. Fæniculum
 146. Fœnugræcum
 147. Fragaria
 148. Fraxinus
 149. Fraxinella
 150. Fumaria
 151. Fumaria bulbosa
 152. Galanga.
 153. Galega

c

154. Gallium

INDEX CAPITVM.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 154. Gallium | 191. Liliū conuallium |
| 155. Genista | 192. Limonium |
| 156. Gentiana | 193. Linaria |
| 157. Geranium | 194. Linum |
| 158. Glycyrrhiza | 195. Lotus |
| 159. Gramen | 196. Lupulus |
| 160. Granata | 197. Majorana |
| 161. Guajacum | 198. Melabathrum |
| 162. Hedera terrestr. | 199. Malua |
| 163. Arborea | 200. Malua arborea |
| 164. Helenium | 201. Mandragoras |
| 165. Herniaria | 202. Marrubium |
| 166. Hispidula | 203. Marum |
| 167. Hordeum | 204. Matricaria |
| 168. Horminum | 205. Matrisylua |
| 169. Hyoscyamus | 206. Melilotus |
| 170. Hypericum | 207. Melissa |
| 171. Hislopis | 208. Melo |
| 172. Iacea | 209. Mentha |
| 173. Iasminum | 210. M. Sarracenica |
| 174. Imperatoria | 211. Mercurialis |
| 175. Iris nostras | 212. Mespilus |
| 176. Florent. Illyric. | 213. Meum |
| 177. Iuglans | 214. Milium |
| 178. Iujuba | 215. Milium Solis |
| 179. Iuniperus | 216. Millefolium |
| 180. Lactuca | 217. Momordica |
| 181. Lagopus | 218. Morus |
| 182. Lapathum | 219. Moschata |
| 183. Larix | 220. Muscus |
| 184. Laurus | 221. Muscus terrestris |
| 185. Lens palustris | 222. Myrtillus |
| 186. Lentiscus | 223. Myrthus |
| 187. Leuisticum | 224. Napus |
| 188. Lichen | 225. Nasturtium aquaticum |
| 189. Ligustrum | 226. Horrense |
| 190. Liliū | 227. Nepeta |

INDEX CAPITVM.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 228. Nephriticum lignum | 265. Prunella |
| 229. Nicotiana | 266. Prunus |
| 230. Nigella | 267. Ptarmica |
| 231. Nummularia | 268. Pulegium |
| 232. Nymphæa | 269. Pulmonaria |
| 233. Olea | 270. Pyrethrum |
| 234. Ononis | 271. Pyrola |
| 235. Origanum | 272. Pyrus |
| 236. Palma | 273. Quercus |
| 237. Papaver Satium | 274. Quinquefolium |
| 238. Erraticum | 275. Raphanus |
| 239. Parietaria | 276. Marinus |
| 240. Paris herba | 277. Rapum |
| 241. Pastinaca | 278. Rhodia radix |
| 242. Sylvestris | 279. Lignum |
| 243. Persol. | 280. Rhaponticum vulgare |
| 244. Persica malus | 281. Verum |
| 245. Persicaria | 282. Rhus |
| 246. Petasites | 283. Ribes |
| 247. Petroselinum | 284. Rosa |
| 248. Montanum | 285. Rorella |
| 249. Macedonicum | 286. Rosmarinus |
| 250. Peucedanum | 287. Rubia |
| 251. Pimpinella | 288. Rubus |
| 252. Pinastr | 289. Idæus |
| 253. Pinus | 290. Ruscus |
| 254. Piper | 291. Ruta hortensis |
| 255. Pistacia | 292. Muraria |
| 256. Plantago | 293. Sabina |
| 257. Pæonia | 294. Salix |
| 258. Polygonum | 295. Salvia |
| 259. Polygonatum | 296. Sambucus |
| 260. Pomus | 297. Sanguisorba |
| 261. Populus | 298. Sanicula |
| 262. Porrum | 299. Santalum |
| 263. Portulaca | 300. Santonicum |
| 264. Primula veris | 301. Saponaria |

INDEX CAPITVM

302. Sarfa parilla
 303. Sassafras
 304. Satureia
 305. Satyrium
 306. Saxifragia
 307. Scabiosa
 308. Schœnantum
 309. Scolopendrium verum
 310. vulgare
 311. Scordium
 312. Scorzonera
 313. Scrophularia
 314. Scylla
 315. Sebesten
 316. Secale
 317. Sedum
 318. Senecium
 319. Serpillum
 320. Sesamum
 321. Sefeli massiliot.
 322. officinarum
 323. creticum
 324. Sideritis
 325. Siliqua
 326. Sinapi
 327. Sifarum
 328. Solanum
 328. Sorbus
 329. Spica
 330. Celtica
 331. Indica.
 332. Spinachia
 333. Staphisagria
 334. Stœchas arab.
 335. citrina
 336. Succisa
 337. Symphytum

338. Tamariscus
 339. Tanacetum
 340. Taraxacum
 341. Thlaspi
 342. Teucrium
 343. Thymus
 344. Thymiana
 345. Tilia
 346. Tormentilla
 347. Trichomanes
 348. Trifolium
 349. Triticum
 350. Tussilago
 351. Valeriana
 352. Verbascum
 353. Verbena
 354. Vermicularis
 355. Veronica.
 356. Victoralis
 357. Vinca peruinca
 358. Vincetoxicum
 359. Viola purpurea
 360. Vitis
 361. Virga aurea
 362. aurea consolida
 363. Vlmaria
 364. Vrtica
 365. mortua
 366. Zedoaria
 367. Zinziber

*Classis secunda de Alterantibus
secundarius.*

368. Acerum
 369. Gummi ammoniacum
 370. Anime
 371. Arabicum

372. Asa

INDEX CAPITVM.

372. Asa foetida
 373. Balsamum verum
 374. de Tolu
 375. Indicum
 376. Pbedellium
 377. Benzoin
 378. Camphora
 379. Cancanum
 380. Caranna
 381. Colophonina
 382. Copal
 383. Elemi
 384. Fuligo
 385. Gribanum
 386. Hypocystis
 387. Lacca
 388. Ladanum
 389. Liquid.ambra
 390. Lycium
 391. Mastiche
 392. Myrrha
 393. Omphacium
 394. Opium
 395. Opoponax
 396. Pissalphaltos
 397. Pix
 398. Resina Terebinthina
 399. Vulgaris s. Laricis
 400. Saccharum
 401. Sagapenum
 402. Sanguis Draconis
 403. Sarcocolla
 404. Succolata
 405. Storax calamita
 406. Storax liquidus
 407. Tacamahaca
 408. Tartarus

402. Thus
 410. Tragacantha
 411. Tubera ceruina
 411. Vinum

Classis 3. de Purgantibus primariis.

412. Agaricus
 413. Asarum
 414. Bryonia
 415. Carthamus
 416. Cassia
 417. Cataputia minor
 418. Colocynthis
 419. Ebulus
 420. Elleborus niger
 421. Elleborus albus
 422. Epithymum.
 423. Esula
 424. Frangula
 425. Gratiola
 426. Hermodactylus
 427. Jalapa
 428. Mechoacanna
 429. Mezereum
 430. Myrobalani
 431. Polypodium
 432. Psyllium
 433. Rhabbarbarum
 434. Ricinus
 435. Ricinus Americus
 436. Senna
 437. Staphis agria
 438. Soldanella
 439. Spina infectoria
 440. Turpethum
 441. Tamarindi

INDEX CAPITVM

Classis 4. de Purgantibus secundariis.

- 442. Aloë
- 443. Elaterium
- 444. Euphorbium
- 445. Ghitta Iemou
- 446. Manna
- 447. Opoponax
- 448. Scammonium

L I B. V.

1. Classis de Animalibus perfe- ctioribus.

- 1. Agnus
- 2. Alce
- 3. Aper
- 4. Asinus
- 5. Bos. Taurus. Vacca
- 6. Bubalus
- 7. Bufo
- 8. Canis
- 9. Caper
- 10. Capra alpina
- 11. Capra-Cerua orient.
- 12. Occident.
- 13. Capreolus
- 14. Castor
- 15. Catus
- 16. Catus Zibetinus
- 17. Ceruus
- 18. Cochlea
- 19. Cuniculus
- 20. Elephantus
- 21. Equus
- 22. Erinaceus
- 23. Homo
- 24. Lepus

- 25. Lupus
- 26. Lynx
- 27. Moschius
- 28. Mulus
- 29. Mus. mus araneus: alpinus. maj.
- 30. Ovis
- 31. Ranunculus viridis
- 32. Rhinoceros
- 33. Serpens
- 34. Sus
- 35. Talpa
- 36. Taxus
- 37. Vipera
- 38. Vitulus
- 39. Vnicornu
- 40. Vrsus
- 41. Vulpes

2. Classis de Avibus.

- 42. Accipiter
- 43. Alauda
- 44. Alcedo
- 45. Anas
- 46. Anser
- 47. Ardea
- 48. Ciconia
- 49. Columba
- 50. Cornix
- 51. Corvus
- 52. Coturnix
- 53. Cuculus
- 54. Ficedula
- 55. Gallus
- 56. Grus
- 57. Hirundo
- 58. Mylus
- 59. Motacilla

INDEX CAPITVM

- 60. Noctua
- 61. Olor.
- 62. Palumbus
- 63. Parus
- 64. Passer. Passer troglotites
- 65. Pauo
- 66. Perdix
- 67. Pica
- 68. Struthio
- 69. Turtur
- 70. Vpupa
- 71. Vultur

3. *Classis de Piscib.*

- 72. Anguilla
- 73. Barbo
- 74. Blatta bizantia
- 75. Cancer
- 76. Carpio
- 77. Cetus & Manati
- 78. Concha
- 79. Dentalium, Entalium
- 80. Halec
- 81. Huso
- 82. Lucius
- 83. Mater perlarum
- 84. Mustela
- 85. Ostrea
- 86. Perca
- 87. Rana
- 88. Sepia
- 89. Sturio

- 90. Testudo
- 91. Thymallus
- 92. Tinca
- 93. Trutta

4. *Classis de infectis.*

- 94. Apis
- 95. Araneus
- 96. Aselli
- 97. Bombyx
- 98. Cantharides
- 99. Cicada
- 100. Cicindula
- 101. Cimex
- 102. Eruca
- 103. Formica
- 104. Gryllus
- 105. Hirudo
- 106. Lacertus
- 107. Locusta
- 108. Lumbrici terrest.
- 109. Intestinorum
- 110. Musca
- 111. Pediculus
- 112. Ricinus
- 113. Salamandra
- 114. Scarabæus sc. Pilularis Vnctuosus
- 115. Sericum
- 116. Scorpio
- 117. Tereedo.

TEVTSCHÉ



TEVTSCH E REGISTER
DER MINERALIEN,
KRÆVTER VND TIER, DARINN
DIE ERSTE ZAHL DAS BVCH,
die ander das Blatt zeiger.



Al	5. 723	Andt	5. 713
Aalraup	5. 728	Angelickevurtz	4. 451
Abbiß, Teuffels	Abb.	Angurien	4. 463
4. 584		Anis	4. 456
Ackervurtz	4. 449	S. Anthonikraut	4. 558
Adermenig	4. 451	Apffelbaum	4. 556
Adex	5. 485	Apostemkraut	4. 576
Adlerstein	3. 296	Arabisch gummi	4. 603
Ageley	4. 459	vvolriechend Asand	4. 608
Agermenig	4. 451	Asche (Fisch)	5. 730
Aglaster	5. 722	Aspen	4. 556
Agrest	4. 617	Asurblau	3. 302
Agstein	3. 437	Atter, Otter	5. 709
Alabasterstein	3. 296	Attich	4. 499. 560
Alantvurtz	4. 513	Atzel	5. 722
Alaun	3. 411	Augentrost	4. 503
Albkraut	4. 502	Vuild Aurin	4. 566
Albschoß	3. 303		
Alcë	4. 578		
Aloës holtz	4. 450		
Alraun	4. 529	Bachbung	4. 455
Ambar	3. 436	Bachstein	3. 305
Ameiß	5. 486	Bachsteltze	5. 720
Ammeyßamen	4. 454	Baldrian	4. 590
Gummi Ammoniac	3. 601	Balsam	4. 532. 466. 464. 588
vvider Ampster	4. 518	Costen Balsam	4. 535
Andorn, yveißer Andorn	4. 529	Leber Balsam	4. 449
		Balsam	

B.

Teutsche Register,

Balsam Affel	4 53	Bissen	4. 515
Balsambaum	4. 464	Bienstein	3. 204
Bär	5. 711	Birnisch	4. 583
Barbe, Barine.	5. 723	Bingelkraut	4. 533
Bärwurtz	4 54	Bodenkraut	4. 594
Basilien	4. 465	Buchbaum	4. 467
Bathengel	4. 479	Birnbaum	4. 61
Grots-Bathengel	4. 587	Birnvein	4. 560
Vuasser Bathenig	4. 571	Bisamthier	5. 703
Barch	5. 667	Bisam	5. 704
Baumel	4. 545	Bismuntz	4. 583
Baumvoll.	4. 68	Boborellen	4. 452
Bayrensenff	4. 586	Bochspeterlein	4. 551
Bayvrofen	4. 529	Bonen	4. 502
Beerenklayv	4. 469	Blackfisch, Blackküttel	5. 730
Beerlap	4. 538	Blasenstein	3. 301
Iohans-Beerlein	4. 572	Blatwurtz	4. 588
Bervvurtz	4. 469. 534	Bley	3. 333
Beyfusz	4. 460	Blindschleich.	5. 727
Beinbruch	3. 304	Blutkraut	4. 555
Beinholtz	4. 524	Blurstein	3. 301
Beinvvell	3. 304. 4. 541. 584	Bockenvvurtz	4. 482
Indianisch Beinuuell	4. 541	Bocksdorn	4. 505
Benedictwurtz, Bened. Kraut	4. 477	Borretich	4. 468
Benigrosen	4. 554	Bracken distel	4. 501
Bergblavv	3. 297	Brackenhaupt	4. 458
Bernstein	3. 437	Brandlattich	4. 589
Bersich	5. 728	Braunwurtz	4. 576
Bertram	4. 560	grosse heisse Brennessel	4. 567
Betonien	4. 467	Bromen, Brombeer	4. 567
VVeiss Betonien	4. 557	Bruchwurtz	4. 451. 549
Vnser Frauen Bettestroch	4. 551	Brunellen	4. 558
Bette-VVantzen	5. 480	Brunnenkraut	4. 524
Bezoarstein	5. 682	Brunnenkreß	4. 539
Bibernel	5. 551	Brustbeerlein	4. 377
Vvelf. h. Bibernel	4. 572	Bubenkraut	4. 522
Biberthier	5. 684	Buchampffer, v. Sanklee	
Bienen	5. 731	Buchsbaum	4. 471
Bienhartz	5. 734	Buffel	5. 678
Bienlaug	4. 531	Burtzel	4. 557
			f Calmus

Teutsche Register,

C.

Calmus	4. 449
Vvolkriechend Calmus	4. 471
Canel	4. 484
Cappern	4. 473
Cardamœmlein	4. 474
Cardobenedict	4. 475
Carneol	3. 284
Cassien	4. 558
Castanien	4. 477
Chamillen	4. 480
Cypress (Kraut)	4. 493
Cypressbaum	ibid.
Citronbaum	4. 485
Citruli. Angurien	4. 486
Colmarkkraut	4. 455
Coloquint	4. 641
Corallen	2. 283
Corallen mooss	4. 488
Coriander	ibid.
Schvvartz Coriander	4. 542
Cornerbaum	4. 488
Costvvurtz	4. 490
Crysolihrt.	3. 281
Crystall	3. 299
Cubeben	4. 492
Cucumern	ibid.

D.

Dachs	5. 709
Dattelbaum	4. 545
Daube	5. 715
Holtz Daube	5. 720
Daubenkraut	4. 590
Daubenkropff, Daubenkœrbel.	4. 506
Dengrass	4. 555
Dill	4. 456

Griechisch Diptam

Raden Distel	4. 547
Viche Distel	4. 726
Dollkraut	4. 515
Donnerbart	4. 577
Doonerkraut	4. 503
Dorant	4. 458
Dosten	4. 546
VVasserdosten	4. 549
Drachenbl.	4. 656
Dreyfaltigkeitblum	4. 517
Durchvvach	4. 549

E.

Ebenholtz	4. 509
Eber	5. 673. 708
Ebervvurtz	4. 475
Egelkraut	4. 542
Egester	5. 722
Egochs	5. 488
Ehrenpreis	4. 592
Eibisch	4. 446
Eichbaum	4. 561
Einbeer	4. 547
Einhorn	5. 711
Gegraben Einhorn	3. 308
Eisen	3. 299
Eisenhart, Eisenk. Eisenreich	4. 590
Eisvogel, Eisengart	5. 713
Elend	5. 673
Elephant	5. 689
Elephanten Laufs	4. 455
Endivien	4. 499
Endt	5. 713
Engelsuefs	4. 573
Entzain.	4. 509
Ephevv	4. 513
Eppich	ibid.
BergEppich	4. 550

Garten

Teutsche Register,

GartenEppich	4. 550	Fichtenbaum	4. 444
SteinEppich	4. 551	Filtzkraut	4. 494
VVasserEppich	4. 459	Fischleim	5. 728
Erd	3. 272	Flachs	4. 526
Bolus Erd, Sigil. Erd	ibid.	VVilderFlachs	ibid.
Erbschvurtz	4. 433	Flachs-Dotter	4. 578
Erdapffel	4. 498	Flenkenkraut	4. 508
Erdbeelkraut	4. 510	Fliege	5. 492
ErdEpherv.	4. 512	Iohannis-Fliege	5. 736
Erdgall	4. 478	Spanisch-Fliege	5. 735
Erdrauch	4. 511	Flœhkraut	4. 559
Erndrosen	4. 529	Flor-amor	4. 453
Ervvachs	4. 574	Flußsteine	3. 305
Erdvvurm	5. 490	Fore, Forelle	5. 731
Eschern, Eschbaum	4. 506	Frantzosen-Holtz	4. 517
Eschervurtz	ibid.	Fravvendistel	4. 475
Esel	5. 675	Fravvenhaar	4. 450
Eselgen	5. 734	Fravvenmüntz	4. 532
Essig	600	Freisamkraut	4. 517
Nacht-Eule	5. 720	Friesenvvürmle	5. 736
		Frischling	5. 674
		Frosch.	5. 728. 706
		Fuchs	5. 476. 712
		Fünfflat, Fünfffingerkraut	4. 561

F.

Fahrn, Fahrnkraut	4. 504		
Faseln	4. 502		
Faulbaum	4. 566		
Feberkraut	4. 530		
Federvveifs	3. 296		
Feigbonen	4. 502		
Feigenbaum	4. 504		
Feigvartvvurtz	4. 481		
Großs-Feigvartvvurtz	4. 574		
Feldheu	5. 721		
Feldmagfam	4. 544		
Fenchel	4. 504		
Savv-Fenchel	4. 551		
Fenugreck	4. 505		
Ferberbaum	4. 564		
Ferberræthe, Ferbervurtz	4. 567		
Feyverstein	3. 305		

G.

Galgan	4. 507
VVilder-Galgan	4. 496
Galmey	3. 298
Gamanderlein	4. 479
Gans	5. 714
Gænsblümlein	4. 463
Ganskraut	4. 508
Gauchheil	4. 455
Garbe	4. 535
Gartenheil v. Stabvvurtz	
Gartenpappeln	4. 529
Geelsuchtvvurtz	4. 494
Geyer.	5. 722

Teutsche Register,

Geistevvurtz	4. 66	Grundvvurtz	4. 522
Geiss	5. 680	Grundholz	3. 592
Geissblat	4. 473. 596	Grundtreb, Grundman.	4. 512
Geibvvurtz	4. 493	Guckker, Guckgaug	5. 716
Gembs	5. 681	Guckgugs klee	4. 448
Gembsevvurtz	4. 498	Gulden Cünnel	4. 486
Genfel	4. 557	Gulden VVundkraut	4. 590
Genferich.	4. 457	Gundtreb	4. 512
Gulden Genferich, i.e. Sinavv.		Gürtelkraut.	4. 538
Genst, Genster	4. 508		
Gentar	4. 437		
Gentkraut, v. Stabvvurtz.			
Gerste	4. 509	Haarstrang	4. 551
Gichtkraut	ibid.	Habern	4. 462
Gichtrosen	4. 554	Habich	5. 713
Gichtheil.	4. 458	Hagenbutte, Hainhecke	4. 495
Gichtvvurtz	4. 486	Hammel	5. 705
Gilgen	4. 525	Han	5. 717
Blavv-Gilgen	4. 518	Hanenfuss	4. 563
VVasser-Gilgen	4. 542	Hannkraut, Hannkam	4. 526
Gierlin, Gœrlin	4. 580	Hanff	4. 473
Girtvvurtz, v. Stabvv.		Hæring	5. 726
Glasckraut	4. 547	Harnkraut	4. 514
Gleer	3. 391	Hartzbaum	4. 552
Gliedkraut	4. 580	Hartriegel	4. 524
Goldt	3. 310	Hartvvurtz	4. 494
Goldtvvürtmlein	5. 736	Hase	5. 700
Gortheil	4. 558	Hasenpappel	4. 528
Gottes Gnad	4. 509	Haselstaude	4. 490
Granat	4. 511	Haselvvurtz	4. 555
Granatstein	3. 281	Hausen, Hausblasen	5. 727
Grass, Queckengrass	4. 518	Hauvvurtz	4. 577
VVeggrass	4. 555	Kleinhauszvvurtz	4. 592
Grassblümlein	4. 466	Havvheichel	4. 544
Grensch v. Genferich.		Hecht	5. 727
Griessholtz	4. 540	Hederich	4. 501
Griessstein	3. 282	Heidelbeer	4. 538
Grimmenvasser.	2. 118	Heil Giff	4. 458
Grundkraut.	4. 576. 578	Heilvvurtz	4. 588
Grindmagen.	4. 546	Heiligholtz	4. 515
		Heil	

H.

Tenſche Register,

Heil Geiſtvurtz	4. 456	Ingher	4. 599
Herbſtroſen	4. 129	Tenſche Ingher	4. 460
Hertzblümlein	4. 500	Iſop, Iſpen	4. 516
Hertzſeyvd	ib. d.	Ioannisbeerlein	4. 564
Hertzgeſpan	4. 475	Ioannisbrodt	4. 580
Hertzvurtz	4. 534. 543	Ioannis Günel	4. 462. 538
Hevviſchreck	5. 190. 736	Iohanniskraut	4. 516
Hiacynth	3. 282	Iudenkirſchen.	4. 452
Hirs	4. 514	Iudenpech	3. 440
Meethirs	4. 530	Iudenſtein	3. 301
Himmelbrand	4. 590		
Himmelgall	4. 551		
Himmelschliffel	4. 557		
Himmelschvvertel	4. 518		
Hirſch	4. 685		
Hirſchmanglot	4. 560		
Hirſchpeterlein	4. 550		
Hirſch-Zung	4. 575		
Hirtentaſche (Seckel)	4. 470		
Hochel	5. 690		
Holder, Hollunder	4. 492. 571		
Hollvurtz	4. 459		
Falſch Hollvurtz	4. 507		
Honigblum	4. 531		
Hopffen	4. 527		
Hufflattich	4. 589		
Hund	5. 679		
Hundsfloh	5. 494		
Hundskopff, v. Dorant			
Hunds-Zung	4. 495		
Hünerbiß, Hünerdarm	4. 453		
Hünerkoll	4. 578		

I.

Ichtächs.	5. 736		
Ie lenger ie lieber	4. 480. 515		
Igel	5. 690		
Immen	5. 731		
Indianiſch blat	4. 528. 541		

K.

Käfer, Kadden	5. 496
Kalb	5. 711
Kalbsnafs, v. Dorant.	
Kalckſtein	3. 297
Kamelſhevv, Kamelsſtroh	4. 576
Karp	5. 724
Kartendiſtel	4. 447
vveilz Kattenpuluer	3. 426
Katze	5. 685
Katzenfußs.	4. 512
Katzenkraut	4. 544
Kautz	5. 720
Kertzenkraut	4. 590
Vnholdenkertzen	ibid.
Kellershalß	4. 570
Kieſſling	3. 305
Kirſchen	4. 478
Klapperſtein	3. 296
Klapperroſen	4. 502
Klee, Gartenklee	4. 527
Haſenklee, Haſenpfœrlein	4. 521
Honigklee, Steinklee, Edlerſteink	

Teutsche Register,

Knabenkraut	4.503.	570	Lamb	5.673
Knoblauch	4.452		Lafurstein	13.302
Lachen Knoblauch	4.575		Lattich	4.521
Knodenkraut	4.576		Laubfrosch.	5.706
Kobold	3.390		Lauch	4.557
Kolkraut	4.469		Lauendel	4.581
Rœmisch-Kohl	4.466		Laus	5.492
Kœnigsblum	4.552		Lænskraut	4.583
Kœnigskertze	4.583		Læuskrautsamen	4.577
Kron	4.577		Leberblümlein, Edelleberkraut, Gul-	
Kornblum	4.494		den Leberkraut	4.496
Kornrose	4.545		Leberkraut, kteinleberkraut	4.524
Keuschlamb	4.451		Sternleberkraut	4.497
Korbel	4.479		Leberkletten	4.451
Daubenkorbel	4.504		Leindotter	4.578
Kraye	5.716		Leinkraut	4.526
Krametbaum	4.520		Lendenkraut	4.522
Kranich	5.718		Lerch	5.713
Krebs	5.723		Lerchenbaum	4.522
Kreid	3.275		Lerchenschvvam	4.554
Kreurtvvurtz	4.576		Levvenfuß	4.452. 538
Kræte	5.678		Liebstæckel	4.523
Schildkræte	5.527		Limonien	4.525
Küchern	4.482		Lindenbaum	4.587
Kuckugk	5.716		VVasser Linsen	4.525
Kuh	5.676		Lœffelkraut	4.530
Kümmel	4.193		Leberbaum	4.524
Roskümmel	4.580		Luchs	5.703
Schvvartzkümmel	4.542		Luchsstein	3.302
Feldkümmel , Matkü.	VVeiskü.		Lungenkraut	4.559
4.476				
Künge , Künglen	5.688		M.	
Künglein	4.642			
Künigundkraut	4.502		Magistrantz	4.518
Kupffer	3.330		Magnetstein	3.303
Kupffervasser	3.350		Magfamen	4.545
Kürbs	4.492		Mandeln	4.454
			Mangolt	4.466
L.			VVildermangolt	4.522.560
Lachenknoblauch	4.571		Manstrevv	4.501
			Vnsen	

Teutsche Register,

Vnser Frayvenmantel	4. 452	Muckenkraut	4. 549
Marcafith	3. 390	Muckenpulver	3. 390
Marmelftein	3. 303	Münchskopff	4. 586
Maftixbaum	4. 523	Mundleim	5. 724
Maftich Gummi	4. 615	Mundholtz	4. 524
Maferan	4. 527	Müntz	4. 532
Mafslieben	4. 465	Mufcatnufs , Muscarbluth	4. 536
Mariendiftel	4. 475	Mufcheln	5. 725
Marienmüntz	4. 533	Oftermufcheln	5. 728
Maulbeerbaum	4. 535	Murmelhier	5. 704
Maulefel	5. 704	Mutterkraut	4. 530. 531
Maulvvurff	5. 709	Muttervvurtz	4. 460. 534
Maurrauten	4. 569		
Maus	5. 704		

N.

Schaumaus	5. 709	Nachfchatten	4. 581
Maufdorn	4. 568	Nagelkraut	4. 463
Maufcerhleim	4. 463	Nardenkraut	4. 542
Megerkraut	4. 508	Celtifch-Nard	4. 582
Meienblümlein	4. 465. 719. 525	Natter	5. 709
Meieran	4. 529	Nattervvurtz	4. 468
Meife	5. 720	Klein Natterkraut	4. 542
Meiftervvurtz	4. 518	Nelcken, Mutternelcken	4. 477
Meyvvurm	4. 494	Negelblümlein	4. 476
Meliffen	4. 531	Negel Veieln	4. 482
Melonen	ibid.	Negenkrafft	4. 550
Melte, Milte, Molte	4. 461	Neffel	4. 597
Mengelvurtz	4. 522	Neffelkœnig	5. 724
Mensch	5. 690	Neunheil	4. 538
Meter , Metram	4. 530	Nicht, Gravnicht, Augennicht	3. 394
Miltzkraut	4. 569	Niefsvurtz	4. 500. 561
Myrrhen	4. 570	Nufsbauum	4. 519
Myrrenbaum	4. 538		
Mohrenkummel	4. 497		
Mohrenvvurtz	4. 548		
VVaffermorellen	4. 460		
Mol, Molch	5. 488. 492		
Mon	4. 545		
Moofs	4. 537		
Moofskraut	4. 524		
Meermoofs	4. 488		

O.

Ochergeel	3. 275
Ochs	5. 676
Ochfenzung	4. 470
Odermenig	4. 451
Oelbaum, Oliuenbauum	4. 543

Oelmagen

Teutsche Register,

Oelmagen	4. 545	Pflaumen, Prunellen	4. 558
Olm	5. 492	Pimpernißstein	4. 553
Orant	4. 708	Pyren	5. 487
Osternucey	4. 49	Poley	4. 559
Osternuscheln	5. 728	VVildpol y	4. 578
Ostutz.	4. 479	Pomerantzbaum	4. 462
		Pßillienkraut	4. 571

P.

Pappeln. Käfz Pappeln.	4. 528
Pappelbaum, Populbaum	4. 556
Paradißholtz	4. 449
Paradißkærner	4. 474. 511
Pech	4. 575
Pesselfbeeren	4. 465
Perlen	3. 293
Perlen Mutter	5. 728
Pestilenzzwurtz	4. 550
Peterlein	4. 458. 551
Bergpeterlein	4. 550
Hirtchpeterlein.	ibid.
Steinpeterlein	4. 551. 552
Peterfilg.	4. 510
VVildpeterfilg	ibid.
S. Pettekraut	4. 517
S. Petersthißel.	4. 557
Pfaff nblatt	4. 586
Pfaffenpint	4. 460
Pfankuchenkraut	4. 532
Pfayv, Pagelun	5. 721
Pfeben	4. 531
Pfeffer	4. 549. 553
Mauspfeffer	4. 577. 583
VVasserpfeffer	4. 549
Pfennigkraut	4. 542
Pferd.	5. 689
Pferdschvantz	4. 500
Pfersichbaum	4. 549
Pfingstrosen	4. 554
Pfimmenkraut.	4. 508

Q.

Quapp	5. 727
Queckengrass	4. 513
Quecksilber	3. 340
Quecksteltze	5. 720
Quendel	4. 578
VVelscher Quendel	4. 587
Quittenbaum	4. 496

R.

Raab, Rapp	5. 716
Ratze, Ratte	5. 704
Rattenpulver	3. 351
Raucken	4. 500
Raup	5. 481
Rauten, VVeinrauten	4. 506. 568
Steinrauten, Mayvrauten	4. 507. 569
VVilderauten, v. Erdrauch	
Retrich	4. 562
Mæretich	ibid.
VVildmæretich	4. 455
Rhabarhar	4. 571
Rhapontic	5. 563. 564
Rebhun	5. 721
Regenvurm	5. 487
Rehbock	5. 683
Rehgras	4. 512
Reyer	5. 714
Rheinblumen	4. 584
Rheinfarn	4. 586

Reinvveiden

Teutsche Register,

Reinveiden	4. 524	Saturey	ibid.
Rhinocer	5. 706	Saurach, Saurdorn	4. 466
Rindsaugvvurtz	4. 515	Saurampffer	4. 448
Ringelblum	4. 472	Savv, V Vildefavv	5. 674
Rittersporn	ibid.	Savvbon	4. 515
Rodiserholz	4. 563	Savvbrot	4. 495
Rogke	4. 577	Savvkraut	4. 581
Rosen	4. 495. 565	Seeblum	4. 543
V Vilderosen	4. 494	S. haaff	5. 673
Rosinvvurtz	4. 563	Schafflein	5. 734
Rosenlein	4. 593	Schaffgaibe, Schaffripp	4. 535
Rosshub	4. 589	Schaffienhevv	4. 498
Rosmarin	4. 566	Schavlachbeer	4. 481
Rosfschvvantz	4. 500	Scharley	4. 515
Rost	4. 615	Scheisvvurtz	4. 668
Rœtelstein	3. 275	Sceelvurtz	4. 481
Rothgüntzel	4. 588	Schierling	4. 484
Rothlauffkraut	4. 509	Schildkrœte	5. 730
Ruben	4. 548. 563	Schlaaffkuntz, Schlaaffapffel	4. 495
Steckruben	4. 540	Schlaaffkraut	4. 480. 515
Rubin	3. 283	Schlang	5. 706
Rubrechtskraut	4. 509	Schlangenkraut	4. 542
Ruhrvvurtz	4. 588	Schlangenmord	4. 575
Rupffertvvasser	3. 414	Schleye	4. 731
		Schlehendorn	4. 447
		Schlingbaum	4. 564
		Schlüsselblumen	4. 557. 668
		Schmeervvurtz	4. 557. 584
		Schnecken	5. 688
		Schneekœnig	5. 725
		Schnepffe	5. 717
		Schofsstein	3. 303
		Schœter	5. 493
		Schvvalb	5. 719
		Schvvalbenvvurtz	4. 481. 593
		Schvvamstein	3. 305
		Schvvan	5. 720
		Schvvartzvvurtz	4. 584
		Schvvabelvvurtz	4. 551
		Schvvefel	3. 429

S.

g. Schvverrel

Teutsche Register,

Thymseid	4. 562	VVeinstock	4. 595
Tormentill	4. 588	VVeinstein	4. 631
Tragant	4. 633	VVeinrauten	4. 568
Turbith	4. 578	VVeyrauch	4. 632
Turteldaub	5. 722	VVeifsbley	3. 338

V.

Veielkraut, Violen	4. 573	VVeitze	4. 555
Gelb-Veieln	4. 480	VVeitze	4. 589
Veielreben	4. 518	VVeidblatt	4. 535
Veielvvurtz	ibid.	VVermuth	4. 444
Venushaar	4. 450. 568	VVidehopff	5. 722
Verfich	4. 466	Gulden-V Viderthon	4. 450
Vnnützesorge	4. 517	VVidertodt	4. 589
Vogelkraut	4. 453. 455	Guldenvvidertodt	4. 450
Vogelsneft	4. 547	Meervvinden	4. 576

VV.

VVachtel	5. 716	VVintergrün	4. 300. 461. 560
VValdmeistert	4. 500	VVinterkœnig.	5. 725
VValdstroh	4. 508	VVinterrosen	4. 529
VValfisch	5. 725	VVissmuth	3. 411
VValroth	3. 440	VVvolffsbeer	4. 541
VValdtvvinde	4. 473	VVvolffsmilch	4. 675
VValvvirtz	4. 584	VVvolgemuth	4. 546
VVandlause, VVantzen	5. 740	VVvolverlein	4. 460
VVasser	3. 276	VVüllkraut	4. 590
VVasserbungen	4. 455	VVunderbaum	4. 572
VVassermerck	4. 458	VVundkraut	4. 503. 542
VVacholder	4. 520	Heiligvvundkraut	ibid.
VVegtritt	4. 555	Heidnischvvundkraut	4. 596
VVegetich	3. 554	Indianischvvundkraut	4. 541
VVegetrafs	4. 555	VVurmkraut	4. 586
VVegetvart	4. 483	VVurmsamen	4. 573
VVeidasche	3. 405	VVüstling	5. 717
VVeiden	4. 570	VVüterich	4. 484
VVeihe	5. 719		
VVein	4. 634		

Z.

Zahnvvurtz	4. 560
Zaungilg	4. 473
Zaunkœnig, Zaunschlepfflein.	4. 717
Zaunrübe	4. 557
Zeitlosen	4. 465
Zibeth	

Teutsche Register ;

Zibeth-Katze	5. 685	Zinober	3. 359
Zidvvanfamen	4. 573	Zirnet	4. 579
Ziegenbock, Ziege	5. 680	Zitrvar	4. 587
Ziefer-Erbsen, v. Küchern	482	Zucker	4. 653
Ziegeunerkrant	4. 515	Zuckervvurtz	4. 580
Zimmat	4. 485	Zvvibel	4. 478
Zin	3. 338	Zuyver	4. 598



PHARMACO



P H A R M A C O P O E I A E,

M E D I C O - C H Y M I C A E,

L I B E R I.

D E I S A G O G E.

C A P V T I.

De Definitione ac distributione Pharmacologiae.



PHARMACOPOEIA est descriptio rerum medicamentorum ad bene medicandū. Seu est doctrina medicamentorum; adeoque & Pharmacologia eodem sensu dicitur.

N. *Medici officium tribus nritur mediis, remediis medicè dictis: alimentariis, chirurgicis, ac pharmaceuticis: Illa*

suppeditat Culina, ista Chirurgia, hac Pharmacologia.

Obiectum pharmacologiae est res naturalis medicinalis. Descriptio est eiusdem rei pharmacologica *Constitutio, Vsurpatio* atque *Signatio*.

De his agerur generaliter in *Isagoge lib. 1.* In *Officina lib. 2.* Specialiter, in *Minerologia lib. 3.* *Phytologia lib. 4.* ac *Zoologia lib. 5.*

C A P. I I.

De Rebus medicinalibus natiuis.

Isagoge est pars Pharmacologiae, quae agit de rebus naturalibus medicinalibus in genere.

N. *Res naturalis non opponitur artifi-*

ciali, sed supranaturali.

Res naturalis medicinalis est res quaecumque ad medicandum adaptabilis, siue figuram ea obtineat nativam, id

A

est

est naturâ inditam, siue elaborationem aliquam officinalem sustinuerit; illæ communiter veniunt nomine *simplicium*, *materialium*, *natiuorum*; hæc *preparatorum*. Vtramque seriem generiorem videre licet *lib. 2.* Verum enimvero, quia in vtriusque nomina plurima occurrunt, quæ vel minus vulgaria, vel æquiuoca, vel vni alicui classi minimè subiungi queunt, operæ precium duxi, pharmacopœias tyronibus synopsi breui inferuire & vtrarumque nomina alphabetica serie exhibere.

Sunt itaque Natiuorum Nomina generalia.

A.

Acetum. Acetum in genere liquorem quemcunque acidum notare potest, vnde nonnullis spiritus & li & simil. acetum dicuntur: Veruntamen in Officinis liquorem solum acidum denotat, ex potentis succis factum, & κατ' ἐξῆς ex vino seu uvis. Et hoc recipiendum est quoties aceti simpliciter fit mentio. N. *Aceta infusione parata. Vide in lib. 2.*

Acini sunt granula minutiora siue per se crescant, vt acini, i. e. baccae sambuci, siue aliis inclusa, vt acini vuarum, quin & ipsas vuas integras sonant.

Adeps idem quod pinguedo, generatiterque tam axungiam quam seuum denotat, vsitatus tamen pro axungia vsurpatur, atque absolute pro adipe suo. *Vide lib. 2.*

Alabastri, sunt folia illa viridia herbacea, quæ flores sepiunt. In Mineralogia, Alabaſter seu alabaſtrites lapidem certum denotat.

Anthetæ, i. e. summitates seu cacumina in florum medietate capillamentis incumbentia.

Apices, idem quod antheræ.

Aqua quid sit nemini ignotum est. Pharmacopœiam subit, tum natiua, tum præparata. *Vide lib. 2. & 3.*

Arbor, est planta linea frutice grandior, *Baum.*

Aroma, Γευμήριζ. *Vide lib. 1. 2.*

Arilli, idem quod acini seu lapilli in fructibus.

Axungia est pinguedo seuo mollior, idemque cum adipe. *Schmer, Schmaltz.*

B.

Bacca. Beeren. Vocantur fructus quicunque paruo-rotundi.

Bitumen, est genus è mineralibus. *Vide lib. 2.*

C.

Cacumen. Cacumina sunt idem quod summitates.

Calyx. Calyces sunt oculi siue gemmæ, florum prodromi. Vt oculi populi arboris: vel est folliculus quo flos primum, mox seminis fortis clauditur.

Capillamenta sunt filamenta illa tenuia in florum medietate surgentia.

Capita in Zoologia quid sint, notum est, in phytologia rotunda illa seminum, aut florum receptacula referunt, vt caput papaueris, &c.

Capreoli, sunt ligamenta contorta, quibus plantæ nonnullæ dotatae sunt, vt aliis sese annectant.

Caro in γένησις vox notissima est, in γυτολογία substantiam illam molliorem fructuum succulentorum notat, quam alias pulpam vocamus; vt pulpa seu caro cassiæ, caro prunorum.

Caulis, est truncus herbæ inter ramos & radicem.

Caudex, idem est in arboribus & frutibus, quod caulis in herbis.

Coma in Phytologia idem quod summitates sonat.

Cor, idem quod medulla vegetabilium.

Cornu. Cornua non nisi in zoologia locum habent. Vid. lib. 2.

Cortex, est tegumentum ceu cutis vegetabilium. Vide lib. 2.

Corymbi, i.e. summitates.

Cyma. Cyma sunt teneri cauliculi Iuli, die *Sprossen*.

E.

Echinus est quidquid numerosa congerie aculeorum stipatur, siue tegmen, siue caput, siue cacumen fuerit.

F.

Fibra, i.e. filamenta siue villi 1. sunt veluti stamina rebus nonnullis intexta, v.g. arboribus, foliis, &c. 2. Sunt capillamenta extrinsecus adnascencia, e.g. radicibus & similibus. *Die Harlein an den VVurtzeln.*

Flores. Florum nomen æquiucum est, locumque habet tum inter natiua tum inter præparata. Vid. lib. 2.

Folium. Folia in phytologia notissima sunt, in Mineralogia sunt folia (○ & ∪), i.e. (○ & ∪) in tenuissimas laminas reducta.

Folliculus est theca tenuis, quæ granum vel semen continet inuolutum.

Fructus sunt grandiores illi ac succulenti plantarum fetus seminum receptacula. Vt poma, pyra, pruna, &c.

Frutex est planta naturæ, inter herbas ac arbores, mediæ; ad ligneam tamen naturam quam proximè accedens.

Fungus est excrementum arboribus fruticibusve quibusdam adnascens, vel immediatè è terra prodiens.

G.

Gemma in Mineralogia sunt lapides preciosi: in Phytologia, gemmæ idem denotant quod oculi.

Geniculum est internodatio quarundam plantarum.

Granum in natiuis femina sonat mi-

nutiora, siue rotunda ea sint, siue alius aliquius figuræ. Sic sunt grana piperis, hordei, tritici.

Gummi, Gummi: liquor est concretus ex arboribus diffusus. Vid. l. 2.

N. *Gummi vox est indeclinabile sit, placuit tamen in plurali efferre gummata, &c.*

H.

Herba est planta frutice minor: seu est quod à radice foliatum, sine caudice provenit, sæpiusque semen in caule fert. In praxi tamen, pro foliis folis vt plurimum, vsurpatur, e.g. R. Herb. ceterach, id est folia.

I.

Inba est arundinacea coma effusa, qualis in milio est.

Iulus. Iuli sunt folia primum erumpentia, *die erste Schæßling oder Bletter.* Strictè notat Iuglandis arboris flores longiusculos, cum foliis prioribus apparentes. *Die Drateln oder Nussblut.*

L.

Lacryma est humor è plantis tum sponte effluens (siue is concresecat, v. gr. in oleum, resinam, gummi, siue non) tum facta incisione, erumpens.

Lanugo in Phytologia, sunt filamenta tenella, cuticulæ extimæ instar pilorum seu lanæ adnascencia, v. gr. in verbasco.

Lapides in singulis tribus mundi regnis locum sibi vendicant. In Mineralogia. Vide libro 3. In Phytologia, cortices duriores, nucleum includentes quandoque lapides referunt. In Zoologia manet significatio mineralogica, calculosque exhibet in animalibus repositos.

A 2

Lignum

Lignum. Vid. l. 2.

Loculamenta sunt seminum inuoluta, quæ veluti parvæ capsulæ: ea occludunt.

Locustæ, idem quod oculi, in Zoologia autem certa animalcula referunt.

M.

Matrix in phytologia idem est quod medulla aut cor.

Medulla in Mineralogia partem molliusculam denotat, quæ in faxis nonnumquam reperitur. German. *Steinmarck*. In Phytologia mediam cuiuslibet partem molliorem ac præstantiorem refert, quam & Cor matricemue appellant. In Zoologia adipem significat in ossium medietate contentam; vel molliorem illam substantiam, quæ in spina ac cranio est.

Minera est terra siue materia ex qua mineralia & maximè metallica fiunt. Sic minera ☉ is, & ☿ ij.

Mineralia. Vid. l. 3.

Muscus est excrementum herbaceum instar lanuginis corticibus arborum, vel ossibus aëri expositis adnascens. Dicitur & Vinea: interdum tamen certis plantis attribuitur. Vid. lib. 4.

N.

Nucleus est semen nucibus vel fructibus inclusum.

Nux fructus quosdam denotat cortice lapideo nucleum occludentes.

O.

Oculi, sunt florum prodromi, inque flores explicabiles.

Olea, sunt pinguedines fluidæ. Vide in præparat. Nam omnia ferè præparata sunt.

Ossa Zoologicè notissima sunt, phytologicè ossiculi vocabulum imponitur lapideis corticibus qui nucleos circumdant.

P.

Pediculus, petiolus est, quo folium, fructus aut flos dependet.

Pinguedo idem est quod adeps, interdum tamen generalius sumitur, ut omnia pinguia comprehendat.

Planta est vegetabile integrum, siue arborem velis, siue fruticem, siue herbam.

Pulpa est caro seu substantia fructuum succulenta, inter corticem ac nucleum comprehensa, v. gr. pomorum, ceraforum & simil. referturque ad præparata.

R.

Radix est infima pars plantæ, terræ infixæ.

Ramus est velut brachium plantæ.

Resina in classe natiuorum, est concreta lacryma certarum arborum, naturæ oleagineæ, ut Terebinthina, &c. In præparatorum classe quid sit. Vide infra.

S.

Salia, quid sint. Vid. cap. 3. & l. 2. c. 79.

Semen in Officina minutiores plantarum fructus denotat, ex quibus simile nasci potest.

Senum est pinguedo duriuscula, sumiturque à solis quadrupedibus cornutis.

Spica, Spicæ sunt summitates in longum deductæ, ut spica lauendulæ.

Stercus est excrementum animalium per anum excretum.

Stipes est pars plantæ inter radicem & ramos, idemque quod caulis.

Stipula folia sunt culmum ambientia.

Succus, Vid. in præparatis.

Summitates, sunt cacuminula herbarum, dicunturque de herbis foliorum minutiorum. Vt absinthij, Rutæ.

Surculus est, quod ex ramis simplex oritur, estque velut germen quoddam ex ipso trunco vel caudice productum.

T.

Terra. Terræ & in natiis locum habent.

bent, & in præparatis; natiuarum seriem. Vid. l. 2. c. 3. Tertæ significationem in præparatis. Vid. c. seq.

Testa, ouorum cortex externus appellatur.

Turio. Turiones sunt teneritates summitatum ipsarum arborum, quæ singulis annis crescunt.

V.

Vene sunt quæ in plantarum foliis apparent, fibræ, in ramulos diuisæ.

Villi. Vide fibræ.

Viscum (aliis viscus) est frutex peculiaris

in arborum quarundam ramis enatus, semper virens.

Umbellæ sunt summitates plantarum sinuosæ, instar nidi auis formatæ.

Vngues sunt extremitates corneæ digitorum. In Phytologia, Vnguiculi interdum idem sunt quod alabastrum.

Vngula. Vngulæ sunt cornea tegumenta, quibus pedes nonnullorum animalium conteguntur.

Vrina. Vid. l. 2. c. 5.

Vsnea idem quod muscus ossibus vel arboribus adnascens.

C A P. III.

De Rebus medicinalibus præparatis.

Præparatorum nomina generalia sunt.

A.

A *Cetapræparata*. Vid. lib. 2.

Alcohol significat puluerem subtilissimum ac inpalabilem, interdum S. vini rectificatissimum.

Amalgama est mixtura metalli cum ♀ vivo. Vid. l. 3.

Amuletum idem est quod Periamma.

Anacollemma ἀνακόλλημα (ἐπὶ τῆς κολλῆς à glutino sic dictum) glutinamentum in genere significat, in praxi autem medica propriè medicamentum dicitur, quod fronti applicatur, ut sanguinis fluxum ad nares vel oculos interceptat: Fit ferè semper forma cataplasmatum, de quo lib. 2.

Apochema ἀποχέω. Vid. Decoctum.

Apophlegmatismus est medicamentum pollens facultate pituitam è cerebro eliciendi, perque os excernendi. Fit forma

Gargarismi, Masticatorij & Vnguenti. Vid. l. 2.

Aqua destillata seu stillatitia est lymphæ destillatione elicita, constans ex parte aquea & spirituosa, ita tamen ut propius ad naturam aqueam accedat. Vid. lib. 2.

N. Aquarum stillatitiarum nomine veniunt (quamvis minus accuratè) nonnulli spiritus, ut ex mineral. **R**, **F** & simil. Ex vegetabilibus omnes ferè aquæ compositæ. Vid. ibid. l. 2.

N. II. Imponitur itidem singularibus quibusdam præparationibus, ut sunt **V** benedicta, &c. vide infusionem **δ** ij.

Arcanum Theophrasto est Quinta rei essentia summè exaltata, seu ut ait idem: Est virtus rei millecupla exaltatione emendata. Quatuor enim in primis arcana iactitat. 1. Arcanum primæ materiæ. 2. Lapidis philosophorum. 3. ♀ ij. vitæ. 4. Tincturæ. Lib. 5. Archidox.

N. Arcanum aliis est Extractum

in specie sic dictum.

B.

Bacilli nomen imponitur medicamentis figurâ bacillorum, i. e. tereti formatis; vt *bacilli fumales*, *bacilli pectorales*.

Balani, *Balanoidi* idem sonant quod *glandes* seu *suppositoria*.

Balneum propriè totius corporis lotio est, fitque vel liquore naturali, v. gr. aquâ dulci, thermis, vel artificiali. Non rarò tamen & pro lotionè partium solummodò inferiorum sumitur, quas *infessus* & *femicupia* vulgò vocant.

Balsamus vel *Balsamum*. *Balsami* vocabulum pluribus in Officina vsurpatur significationibus. (1.) Denotat genus quoddam *odoramenti* crassiusculi instar vnguenti, vel linimenti. Et hæc significatio vicitatissima est. E. g. *Balsamus rosarum*, *Apoplecticus* & simil. (2.) Solent quoque ex gummi, resinisque cum spiritu Vini *liquores distillari*, qui extrinsecus illinuntur, balsamique nomine veniunt; vt *balsamus neruinus*, *sciaticus* & simil. (3.) *Inunctorum liquorem* significat, eumque oleo crassiore, linimento liquidiorè: *Balsamum* nos *inunctorium* appellabimus. Vide lib. 2. de vnguentis. (4.) *Balsami* nomen sibi vindicarunt *Salia fusa & liquata*. vt *Balsamus* &c. Tandem (5.) sunt *singulares* quædam *preparationes*, quibus balsami nomen imponunt; vt *balsamus* ☩s, sanguinis humani. De quibus sigillatim suo loco.

Bolus medicamentum est consistentia magis duriuscula quam *Electuarium*, sic dictum quod bucca capiatur.

C.

Calx propriè dicitur quod calcinan-

do vel in alcool conuersum, vt *calx* ☉ is ☿ na, &c. vel saltem friabile factum est, vt C.C. & simil.

Caput mortuum est residua illa materia crassa ac sicca quæ in distillationibus, præcipuè mineralium remanet, communissimè autem remanentiam ☿ li notat.

Cataplasma. Medicamentum est topicum pultis consistentia.

Cauterium à viribus sic dicitur, quod cutem carnemque subiectam adurat, siue id fiat igne actuali, v. gr. ferro candenti; siue potenciali, i. e. medicamentis. Possunt autem cauterisantia formulis fieri variis, nempe forma lapidum, vide libro 2. Spirituum, v. gr. olei ☿ ij butyracei; lixiuiorum, v. g. ☿ cineribus samentorum.

Cementum est pulvis, cuius ope calcinatio cementatoria peragitur.

Cerorum vel ceratum à cera sic dictum, Medicamentum est topicum, inter Emplastrum ac vnguentum consistentiæ mediæ: seu, est Emplastrum molliusculum Vid. l. 2.

Cinis est pulvis ille griseus ex combustionè rerum crematiliū residuus. Constatque ex sale (qui elixiuari potest) atque terra mortua.

Claretum Vinum est aromatum infusione imprægnatum atque cum sacharo dulcoratum. Dicitur alias vinum seu potus Hippocraticus.

Clyster, *Clysis*, *Enema*, Medicamentum liquidum est quod ano vel vtero per Siphonem intruditur. Vid. lib. 2.

Collationes oris *Σπαρμόματα*, sunt liquores medicamentosi, qui in ore continentur, beneficioque linguæ hinc inde agitantur.

Collyrium medicamentum est, quod oculis immittitur, siue liquidum id sit, siue

siue solidum. Liquida veniunt ferè titulo aquarum, tum quoque vnguenti : Sicca puluerem vel Trochiscorum ; Hos nomine peculiari *Sief* appellant.

Colophonia est pars resinarum crassior ex harum destillationibus coctionibusque residua. Vid. lib. 4.

Condita dicuntur quæ conditura, i.e. condiendo facta sunt *eingemachte Sachen*. Vid. lib. 2.

Confecta, id est sacharo obducta & incrustata, eodemque sensu dicuntur & confectiones. Vid. lib. 2.

N. I. *Confectionis nomen datum est & speciebus nonnullis cum sacharo mixtis: unde confectiones aromaticæ, &c. dici solent. Verum præst. & nomine specierum eas nominare.*

N. II. *Est & Confectio Hamech, id est Electuarium.*

Conserua sunt medicamenta ex floribus, foliis, radicibus, cum sacharo conquassatis, facta. Vulgo *Zucker*, ut conserua rosarum *Rosenzucker*.

Corrosiuum idem est quod causticum. Vide *Cauterium*.

Crocus est calx puluerea ad croceum vergens colorem, paratur autem vel ex ♂io, vel ♂te, vel ♀re.

Cucupha est Cataputium medicamentis cephalicis repletum. Vid. l. 2. *Sacculus*.

D.

Decoctum : Decocta sunt brodia liquida, constantia ex conueniente liquore, viribus medicamentosis, interueniente debita coctione, imprægnato. In specie autem dicitur de potionibus intrinsecus assumendis, ex decocto brodio paratis, quas alias *σποζέματα* vocant.

Diaclysmæ, i.e. Collutio oris. Vid. de Gargarismis, lib. 2.

Dentifricium medicamentum est dentibus, vel gingiuis fricandis destinatum, siue id liquor sit. Vid. l. 2. de Gargarism. siue linimentum, siue puluis. Vid. lib. 2. suis locis.

Dropax Δρόπαξ, Picatio (πρόσχυσις) medicamentum est emplasticum cuti fortiter adharens, sic dictum à pice qua sola olim reliqua ingredientia suscipiebantur. Vid. l. 2. Empl.

E.

Eclegma est medicamentum internum, pulmonibus dicatum syrupo crassius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur. Dicitur & Linctus, Lambile, Loch, Lohoh.

Electuarium est medicamentum syrupo & eclegmate crassius, constans ex medicamentis durioribus puluerisatis, melli, syrupo, sacharo syrupisato, vel alij alicui conuenienti liquori melligeno, (id est mellis consistentiæ) accuratè mixtis.

N. *Sunt & nonnulla species hoc nomine insignita, scil. quia olim (ut nonnulli volunt) cum saccharo in Electuarij formam redigebantur. Sic dicitur Electuarium Ducis, El. de gemmis, &c. Verum quia mos ille aboleuit, præstat Specierum nomen usurpare.*

Eleosaccharum nihil est aliud quàm oleum destillatum cum saccharo mixtum. E.gr. olei ℥j. sacchar. ʒj. vel circiter.

Elixyr est species tincturarum, quas Elixiris nomine appellare placuit. Ut Elixyr proprietatis, Elix. vitæ, &c.

Embrosion, ἐμβροσις, irrigatio, instillatio, stillicidium, Fomentationis genus

est , cum liquor fomentans stillatim seu guttatim in partem fomentandam funditur.

Emplastrum est topicum medicamentum notissimum. Germ. *Pflaster*.

*Emulsi*o medicamentum est liquidum lacteum, i.e. lac mentiens. Vid. lib. 2.

Epithema est medicamentum liquidum parti alicui imponendum. Vid. lib. 2.

Errhina sunt medicamenta, quæ naribus immittuntur, adeoque & ptarmica comprehendunt. Specialiùs tamen plerunque sumitur errhinum, quatenus pituitam sine sternutatione prolicit. Vid. lib. 2.

Essentia. Essentiæ vocabulum significat accuratè loquendo balsamicam rei partem à crassiori separatam. Quare cum exactissima rei separatio beneficio extractionis peragatur, fit vt pars illa balsamica à crassiore corpore extracta Essentia κατ' ἐξοχήν dicatur, alias à modo fiendi Extractum.

N. I. Nonnunquam attribuitur quoque Essentia vocabulum succis expressis ac spissatis. Verum præstaret hos proprio suo nomine, quò minus confusio oriatur, nominare.

N. II. Sunt & qui Eleosacchara Essentias vocant sed abusive.

Extractum Essentia rei est vi liquoris alicuius, è corpore crassiore separata & ad consistentiam iustam inspissata. Vid. lib. 2.

N. I. *Extractum* quoque generaliter nonnunquam sumitur, vt & succos sub se comprehendat non secus ac Essentia.

F.

Farina est pulvis molendo contritus.

Fecula sunt pulueres in certis vegetabilium expressionibus subsidentes. Vid. lib. 2.

Flores in præparatis quid sint. Vid. lib. 2.

Frontale, Epithema denotat, fronti applicandum.

G.

Galreda. Succus est inspissatus viscosus, lucidus, fitque plerunque ex coctis partibus animalium cartilaginosis, v.g. ex pedibus vituli, &c. *Galrey*.

Gelatina ferè idem est cum Galreda, nisi quod generaliùs vsurpetur, & pro quocunque succo pellucido lento glutinosoque sumatur, qui tamen inprimis fieri consuevit ex succis fructuum. E.gr. pomorū, &c. vt Gelatina Cytonicrū, CC.

Gargarismus, liquorem denotat, quo os faucesque gargarifando colluuntur. Vide lib. 2.

Glandes idem sunt cum suppositoriis.

Gummi in classe præparatorum, nihil aliud est, quam extractum resinofum. Vid. lib. 2.

H

Holippe sunt placentulæ ex infusione medicamentali farinæque triticeæ, addito insuper tantillo sacchari, subactæ.

I.

Infusum. Infusio est liquor qualitativus medicamentosis, sola maceratione imprægnatus. Parum itaque differt à decocto, quippe quod huic coquendo accedit, accedenteque interdum maceratione, id ferè illi, sola maceratione. Vsiatiùs ramen de potionibus dicitur ac inprimis de quibusdam purgantibus ex Vino, cereuisia vel simili liquore, dictatione paratis. Vid. lib. 2.

Iuleb, nomen Persicum est, idemque sonat quod potio dulcis. Arabibus vox Iulebi à syrupis non distinguitur. Notratibus autem Iulebi seu Iulapia, (Græc. ζυλάπια) potiones sunt in praxi vsitatissimæ syrupis dilutiores, constantque ex liquoribus clarioribus, saccharo vel syrupo conuenienti ad gratū sapore, dulcoratis.

Lapis

T.

Lapis. Lapidis nomen nonnullis imponitur medicamentis quæ ad duritiem lapideam vel terrestrem excocta sunt. Vid. de lib. 2.

Lapis vegetabilis Medicamenti species est constans ex sole, Tinctura, oleoque ad duritiem ferè lapidis excoctis. Vid. lib. 2.

Laudanum dicitur de solo medicamento ex opio confecto, idque vocant Laudanum opiatum. De quo vid. lib. 4.

Linctus, i.e. Eclegma.

Linimentum medicamentum est topicum pingue, oleo crassius, vnguento liquidius, corporis illinitioni dicatum. Vid. 2. lib. Vng.

Liquor quamvis de quolibet humore dici possit, in specie tamen humorem denotat per deliquium paratum, quem oleum aliàs, nonnunquam Balsamum dicere solent.

N. Nonnunquam & pro distillato liquore usurpatur. E.g. liquor cranij, liquor C.C. liquor seu spiritus L. Guaiaçi.

Lohob, i.e. Eclegma.

Lotio fumitur pro balneo. Lauantur itidem nonnulla simplicia, vt Terræ, Metalla, & sim. de quibus speciatim.

Longo sunt idem quod Morfuli.

M.

Magisterium. Magisterij nomen diuersimodè usurpatur. I. Datur pulueribus solutione ac præcipitatione paratis, vt Mag. C.C. Corallorum. II. Tribuitur resinis seu extractis resinosis, vt sunt magisterium scammonij, Ialappæ, &c. Accuratè tamen loquendo magisterium vocari volunt, vbi nonnihil menstrui cum essentia extracta coniunctum mansit.

Malagma idem maioribus sonat quod cataplasma.

Martini panis. Marcipanis, Mazapa-

nis, Pasta regia, Panis dulciarius, sunt plantæ ex amygdalis dulcibus excort. & sacharo (quod fumitur duplum, triplum, nonnunquam ana) accedente aqua rosarum subactæ & pistæ.

N. Addipossunt & alia. E.g. nucis pini, pistacia, anellana, cortices citri conditi, aromata & simil.

Marmelata est Gelatina contoniorum. Vid. lib. 2.

Massa ex officina pistoria ad pharmaceuticam translata est, denotatque subactam illam materiam tum pastæ regię, tum pillulis inde formandis destinatam.

Masticatorium est medicamentum apophlegmatizans, quod in ore detentum dentibusque masticatum pituitam liquat, èque cerebro ad palatum deriuat. Vide lib. 2.

Mel. Mellis nomen Pharmacopœis nonnunquam denotat succum simplicem ad mellis consistentiam inspissatum, melque sapore æmulantem. Sic conuenit cum sapa siue Rohob; vt Mel passulatum, Iuniperinum. Vid. lib. 2. Nonnunquam refert syrupum cum melle paratum. Vid. lib. 2. de syrupis.

Menstruum, dicitur liquor, qui ad Tincturas extrahendas adhibetur, de quo vid. lib. 2. tit. de Extractis.

Mixtura generaliter de quibuscunque mixtis dici potest, in praxi tamen medica usurpatur communiter pro Electuario, quod ex tempore misceri solet. Sic dicitur F. Mixtura, i.e. Electuarium. Vide lib. 2. de Electuariis.

Morfuli seu Morfelli, Tabulæ: medicamenta sunt quadrata vt plurimum, parata ex pulueribus & similibus sacharo soluto susceptis, superque tabulam ligneam, lapideam cupreamue effusis vt consolidentur.

Moretus mulierculis nostratibus vſitatiffimum potionis genus eſt, quod parari faciunt, vbi præſumptio imprægnationis adeſt, perſuaſum nimirum ſibi habent, falſam imprægnationem eo exturbari, veram corroborari. Vid. lib. 2.

N.

Nafale idem quod Errhinum.

Nafcale idem eſt quod Peſſus.

O.

Odoramenta ſunt medicamenta odoris gratia adhibenda. Odorem ſiue per ſe habent ſiue accedente incenſione. Fiunt autem formularum variarum. Sine accenſione quæ in vſum veniunt, ſiunt ſerè forma puluerum, ſacculorum, linimentorum, baſamorum, maſſarum odoratarum (quas poma ambræ vocant) aquarum, ſaponum, & ſimil. Accedente accenſione vel liquefactione quæ odorem halant, parantur vſitatiùs forma puluerum, trochiſcorum, candelarum & bacillorum maſſarumue fumalium.

Oleum proprie liquor eſt pinguis, baſamo tenuior.

N. I. *Nonnunquam tamen Baſamo craſſior eſt, vt oleum aniſi, nucisſtæ expreſſ.*

N. II. *Imponitur quoque olei nomen quamuis minus accuratè, nonnullis ſpirituofis liquoribus, vel deſtillatione peractis: ſic dicitur oleum ☉ li, ☉ is, & ſimil. Vid. ſpiritus, vel per deliquium diſſolutis, vt oleum ☿ i. vid. liquor.*

Opiatum, Confectio opiata: Hoc nominis Electuariis nonnullis (quamuis minus aptè) imponitur, non quòd neceſſariò opium contineant, ſed quod medicamenti veterum quæ opium continent, conſiſtentia reſpondeant.

Oxyrrhodynon (ab ὀξύς ῥόδον & ὀδύνη, ſic dictum) medicamentum in genere ſonat ex aceto roſiſque factum ad dolorem leniendum. Præctici vero relictæ hac

ſignificatione generali, ſoli capiti, fronti, collouie id dicunt, atque ex olei roſar. part. iij. aceti part. j. concinnarunt, noſtrates loco olei roſar. ſumunt & alia. E. gr. violaceum, papau. myrtin. de Nymph.

P.

Pandaleum medicamentum eſt internum à rotulis morſuliſue non ſola forma differens: ſitque quando materia medicamentofa ſacharo ſoluto ſuſcepta in pyxidem effunditur, vt inibi indureſcat.

Pasta regia. Vide Martius panis.

Pastilli idem quod Trochiſci.

Peſſi: Peſſaria (Barbaris naſcalia) ſunt medicamenta ſolida, vteri collo intrudenda.

Periamma, Periapton, Amuletum, Xenechton. Medicamentum eſt quod de collo ſuſpenſum morbum atcere creditur, ac præcipuè peſtem.

Phlegma liquor eſt deſtillatus aquoſus ſpirituofus liquori contradiftinctus. Vid. aq. deſtillata.

Phanigmus mitior ac lenior eſt ſinapiſmus ſcil. qui ſolam cutem rubificat.

Pilula, i. e. parua pilæ, ſunt medicamenta rotunda deglutioni apta.

Pineatum ſeu Pineolatum fit ex pineis, ſacharo & aqua roſarum, admodum ſcil. quo Diamygdalatum ſeu Marcius panis ex amygdalis ſacharo & ▼ roſarum fieri ſolet.

Pomum ambræ, odoramenti genus eſt, ex medicamentiſ odoriferis in maſſam redactis.

Potio in genere liquorem denotat potulentum, in praxi autem ſerè de purgante potu intelligitur. Vid. l. 2.

Preparata, i. e. præparatione (ſpecialiter ſic dicta) elaborata: vt C. C. præparatum. Vid. lib. 2.

Puluis

Pulvis. Pulveris nomen etſi generali-
ter munitiſſima quæque denotet, quo-
cunque modo facta: attamen communi-
ter pulveriſatis hoc nomen imponitur,
ſive ſimplicia illa ſint, ſive composita.
Inter compositos autem pulveres, ſunt
qui ſpecies vocantur, ſunt & qui Trageæ.
Præſtaret tamen omnes pulveres compo-
ſitos, ad differentiam ſimplicium, ſpecies
nominare.

Q.

Quinta eſſentia propriè ſpiritum de-
notat, & deſtillatum ex ſuccis fermenta-
tione exaltatis. De quo in ſpirituum claſ-
ſe. l. 2.

R.

Reſina eſt ſubſtantia oleagiноſa na-
turæ, ſive in forma molliori illa ſit, ſive
in duriori. Sunt autem Reſinæ vel na-
tiuæ: de quibus lib. 4. vel extractione
Chymica paratæ. Vt Reſina Diagrydij
& ſimil. De quibus in Extractis l. 2. ac
l. 4.

Rob, Rohob, Sapa, eſt ſuccus fructuum,
ad mellis, conſistentiam vt plurimum
per ſe, interdum quoque cum ſaccharo
inſpiſſatus. Priores ſimplices appellare
licet, dabunturque l. 2. de ſuccis. Poſte-
riores, compositos, danturque l. 2. ſub Sy-
rupis.

Rotulæ, ſunt Tabulæ orbiculorum in-
ſtar, conſtantes ex medicamentis ſuſce-
ptis: ſaccharo inconueniente & liquore
ſoluto, inque orbiculos ſupra tabulam ef-
fuſo.

S.

Sacculus medicamentofus fomento-
rum genus eſt, conſtans ex conuenien-
tibus medicamentis ſiccis, ſacculo inſu-
tis.

N. Eſt & ſacculus odoriferus, id eſt
odoriferis completus, vt naribus admonea-
tur.

Sal accuratè loquendo eſt ſubſtantia
in aqua ſolubilis, concreſcibilis ſeu cry-
ſtalliſabilis. Communiter tamen dicun-
tur & ſalia (ſed minus aprè,) lapides vel
metalla nonnulla acido liquore corroſa,
atque iterum coagulata; Vt Sal corallo-
rum, Sal Ni & ſimil.

Sapa idem quod Roob κατ' ἐξοχὴν au-
tem dicitur de muſto inſpiſſato & ad ter-
tias cocto.

Saponea i. e. linctus ex amygdalis.

Sief i. e. Collyrium ſiccum, vid. l. 2.

Sinapiſmus eſt cataplaſma, vel maſſa,
vim habens cotiruborem, vel ardorem,
veſicaſue inducendi: adeoque continet
ſub ſe phænigmm & veſicatoria.

Smegma odoratum, Sapo odoratus, ſit ex
ſapone (Veneto inprimis) cui pulveres
odorati conuenientes immiſcentur, ac
impaſtando cum V fragrantia, v. g. roſatum
ſubiguntur. Vid. l. 2.

Sparadrapus eſt Linteum Emplaſtro
ad ignem fluenti immerſum, extenſum
& refrigeratum. Dicitur & tela empla-
ſtica.

Species dicuntur in Officinis ſimpli-
cia (ingredientia) pro compositis inde
conſciendis coordinata. Sic dicuntur
Species Theriacæ i. e. ex quibus theriaca
compilatur, ſic ſunt & Species decocto-
rum vſualium. Præ reliquis tamen hoc
nomen ſibi vendicant pulueres nonnul-
li, tum aromatici tum cathartici. For-
ſan, quia ordinati fuerunt olim, vt inde
conſicerentur electuaria, morſuli vel
rotulæ. Sic ſunt Species aromatic. roſat.
Species Diaturbith cum Rhabbarbaro,
&c.

Spiritus eſt liquor deſtillatus naturæ
magis ſpirituosa, non ſecus ac è contra
aquæ deſtillatæ magis ad naturam aquæ
ſimplicis accedunt.

N. *Spiritus* nomen abuſuè ſibi ven-
dicarunt.

dicarunt quoque olea nonnulla subtiliora, ut spiritus Terebinthina & simil.

Stymma est spissamentum seu crassamentum rerum, (Horum rerumque aliarum) quod remanet dum in oleis macerata exprimuntur.

Succus. Succus qui in officinis vocatur, expressiones sunt, seu expressæ essentia, aquæ naturæ, i. e. aquæ permiscibiles, *auszgepreste Saftte.*

N. *Solis vegetabilibus competit, vide suo loco lib. 2.*

Suffitus, suffumigium, *Opizua* est Vapor suaue olens, ex re fragrant accensa vel carbonibus viuis coniecta excitatus. Variarum autem res suffumigans potest fieri formularum: puluerum, candelarum, bacillorum, trochiscorum, &c.

Suppositorium est medicamentum solidum, teres ac pyramidale, instar digiti, intrusioni in anum destinatum.

Syrupus est liquor medicamentosis qualitatibus imprægnatus, additoque saccharo aut melle, ad mellis consistentiam excoctus.

T.

Tabula vid. morfuli.

Tartarus, terrestre sal est. Vid. l. 4.

Terra mortua, est terra ex elixiuatio neresidua, omnibus facultatibus efficacibus destituta.

Tinctura vox diuersimodè vsurpatur, vsitatissimè tamen potissimam rei partem denotat, sub colore certo infusionis beneficio, extractam, siue cum menstruo adhuc coniuncta illa sit (quæ vulgatissima est significatio) siue ab eodem separata; quo sensu Extractum communiter effertur.

N. *Sumitur quoque nonnunquam Tinctura pro Essentia rei ulterius elaborata. Vide Tincturas* § 4, *quas tamen Tincturas magisteriales appellare commodius est.*

Tragea, *Tragma*, *bellaria*, est pulvis introallumendus, ex speciebus & simil. pulueribus simplicibus, cum saccharo confectisve ad saporem gratum commixtis, vide l. 2. sub puluer. & spec.

Trochiscus, *Trochisci* sunt species seu pulueres mucilagine, e.g. tragacanthæ, altheæ & simil. vt eò melius ad tempus durare possint, suscepti, incorporati, inque orbiculos paruos formati. *Trochisci* sublinguales, i. e. qui sub lingua detinentur vt dissoluantur & per guttur in pulmones defluant.

V.

Vinum medicatum, *Vina* medicata sunt infusiones in vino factæ, vid. l. 2.

Vnguentum est medicamentum topicum pingue linimento durius, emplastro mollius, Germ. *Salb.*

C A P. I V.

De Speciebus productionum natiuarum.

Descriptio rei medicinalis pharmacologica, est enotatio constitutionis, vsurpationis ac signationis (quantum scil. hæ spectant ad bene medicandum:)

Constitutio est rei medicinalis productio, collectio & asseruatio.

Productio est quâ res fit. Est igitur productionis descriptio, deductio specierum & circumstantiarum ad productionem requisita

requisitarum, (in quantum, sc. faciunt ad pharmacologicam rei productionem.)

Estque rerum tum *Natiuarum*, tum *Preparatarum*.

Natiuarum productio primæua est creatio, cui subinde successerunt tum generatio, quasi generatio, nutritio, q. nutritio; tum operationes seu motus vtriusque illis subiuncti: quales in Vegetabilium productione, soli cultura, satio, insitio, amputatio; in animalium, conceptio, natiuitas, educatio, &c.

N. Species productionis nativæ, uti & harum circumstantiæ imprimis ac primariò ad physicam pertinent: attamen quia intentioni pharmacologica non parum inserviunt, breuiter eas delibare libet. Itaque

Creatio est ortus rerum naturalium ex nihilo, i.e. quo rerum principia informia primùm ex nihilo condita, blando motu externo in lucem seu vitam emerferunt, inque membra sese extendere, adeoque curriculum destinatum absoluerunt, iussa, i.e. apta reddita sunt.

N. In creatione macrocosmi superuenit Terra aqua, i.e. liquido sicco informi & vacuo blandus motus spiritus Elohim, superficiæ aquarum incubantis, cuius scilicet auxilio, accedente benedictione diuina, lux seu vita fuit introducta. In Vegetabilium ac Animalium creatione principia materialia in macrocosmi generatorio ceu internebris ac abyssò (orco Hippocratis, nocte Orphei) sopita, coagulataque motu matricis, vel si manus spiritus eiusdem Elohim, sic iubente Creatore, in lucem seu vitam (diem Orphei) prodierunt; excepto solo homine, qui peculiariter ex adamæ vapore fecundata fuit conditus, seorsumque spiraculo vitæ afflatus.

Generatio est ortus rerum naturalium ex semine, i.e. quo principia rerum (quæ

proximè in semine existunt) ex præexistente materia parantur, ac subinde motu matricis in actum, secundum speciem suam emergunt. Membra itaque Generationis sunt, tum seminis præparatio, tum eiusdem emissio. Et hic modus oriendi proprius est rebus natiuis primariis, videlicet vegetabilibus & animalibus horumque membris genuinis.

N. Generatio est rerum innovatio; nimirum res postquam curriculum suum absoluerint, vel in eodem interrupta fuerint, reuertuntur paulatim in naturam primordialem chaoticam, unde postmodum ab aliis depromptæ tum in materiam seminalem, tum nutritiuam adoptantur, adeoque aliarum rerum dominio subiectæ peregrinantur. Et hæc est rerum vicissitudo, toties à maioribus decantata.

Macrocosmus in se consideratus quia perenni duratione durat, à renouatione generatoria excensatur, adeoque semine destitutus est, quo noua eius fiat productio: nihilominus tamen laudabile quoddam exhibet peritoma, lacti in animalibus respondens, quod infundit in generatorium suum, globum scilicet hunc inferiorem, liberis suis nutrimentum suffecturus. Vegetabilium ac Animalium species, quia Individuorum nouorum successione conservari destinate sunt, semina noua requirunt seu si manus seminales rationes. Hæc vel manifestè per speciem propagantur, unde exurgit generatio vniuoca: vel citra manifestam rationem seminale producantur, unde generatio æquinoca.

Nutritio est productio rei genitæ ex nutrimento, i.e. quares genita suffectione elaborati nutrimentici curriculum destinatum peragit. Membra eius sunt tum Materię nutritiue elaboratio, tum suffectio seu assimilatio. Competit itidem solis rebus primariis,

N. Nutritio est rerum progressio: Nimirum rei cuique naturali curriculum certum destinatum est, quod ab ortu ad *in* auge-
scendo & inde ad interitum descendendo
habet peragendum. Peractio hac fit benefi-
cio materia nutritiva, unde subrogatur,
quod actui vitali deperit, simulac accedit,
quod ad *in* res augeat. Materia illa,
quia respectu rei nutricanda uniuersalior,
impurior, indigestior existit, elaboratur
subinde vi illius nutritiva, huiusque mini-
stris, i.e. depuratur ab heterogeneis, euehi-
tur ad maturitatem, adeoque indolem rei
nutricanda induit. Rem exemplis declara-
bimus. Vegetabilium & animalium nutritio
notissima est. Ex utraque itaque non diffi-
cile crit & Macrocosmi nutritione metiri.
Materia qua Macrocosmus nutritur sunt
ipsamet vegetabilia & animalia in chaos
seu principia sua redacta, seu, si mauis, sunt
res particulares quaecunque. Videlicet ha,
ut e macrocosmo nutriuntur, ita vicissim
eidem nutrimentum exhibent, adeoque om-
nia per circulum quasi volutantur. Modus
hic est: Res defunctae progredique nescien-
tes resoluntur, digerunturque quodam-
modo in globo inferiori ceu macrocosmi
ventriculo; hinc sequestratur quod matu-
rius est, inque aërem ceu mesaraicis attol-
liuntur, vltiori subiiciendus digestioni.
Inde ad Q ceu macrocosmi Epar rapitur,
concoctionem secundam subiturum. Ex
Q ad vltiores deducitur elaborationes. Ni-
mirum pars utilior ad solem rapitur ceu
macrocosmi officinam vitalem cordi micro-
cosmico respondentem. Inibi vi lucida seu si
mauis vitali facultate perfusa sub spe-
cie macularum facularumue exprimitur,
vniuersitatiue communicatur, adeoque
cui libet membro vniuersitatis surrogatur
vnde viuatur, atque nutriatur. Reliquum ceu
peristoma quod redundat, deorsum vergit,
inferiorique globo communicatur, ubi par-

tim nutrimentum rebus exhibet, partim
impragnatum astralibus influentiis in se-
minales rationes rerum particularium mi-
grat, idque vi facultatum productuarum,
i.e. generatarum, nutritiarum, fermenta-
tuarum, quibus globus hic inferior vi
benedictionis diuina perfusus est. Et hac
nutritio videtur macrocosmica, qua non
minus ac animalium & vegetabilium ex-
crementa sua exhibet. In terra remanent
crassiora, ibidem ceu in prima digestionis
officina sequestrata; in aëre ceu mesaraicis
secernuntur liquidiora, unde pluuia, nix
& sim. viscosiora, unde mucilago illa de-
cidens (Sternschofz) &c. Luna separat
excrementa tum crassiora, qua detrudit ad
maculosum sui locum, ceu macrocosmi
vesicam biliariam in Epate sitam; tum
liquidiora exhibet, eaque ad globum infe-
riorem, & potissimum ad mare ceu renes &
vesicam vrinariam transmittit, ut inibi vi
sua salina ac acri generationem globi in-
ferioris promoueant. Mira hac scio non-
que videbuntur, quibus rerum analogia
fuerit peregrina: Verum nullus dubito, quin
diligenti scrutatione omnia futura sint per-
spicua, sin minus; quisque suo sensu ab-
undet. Nec enim hac sunt, super quibus
proderit litem tantopere mouisse, utpote
qua citra salutis iacturam sciri ignorari-
ue non nequeunt. Id quod ut de his, ita &
de aliis eiusdem farina quamplurimis
moneo, quae inter modernos tanto tamen astru-
agitantur, ut vel legis diuinae respectus
postponatur, fame proximi detrahatur, sa-
nitati propria noceatur, lectorique legendi
fastidium procreetur.

Quasi generatio est ortus rerum natu-
ralium secundariorum, ex materia quasi
semine, i.e. quo principia rerum in pri-
mariarum productione redundantia, in
speciem aliam, secundariam, scil. transmu-
tantur.

Quasi

Quasi *Nutritio* est, qua eadem illa materia successivè maturefcit.

N. Rerum secundariorum productio paulo secus sese habet quam primaria-rum. Fiunt enim non per generationem, qua seminale principium in membra di-versa secernitur, neque per nutritionem, qua membra insinuatione ac assimilatio-ne nutrimenti secundum dimensiones au-gescunt, sed per solam alterationem, ap-positionem, accretionem. Nimirum Ex-crementa qua in nutritione primariorum suppetunt, vel alterantur levi saltem al-teratione, condensatione, mixtione, & simil. vel concursu ac conspiratione cau-sarum aliarum transmutantur. Sic fiunt meteora aquea separatione vaporum aqueorum, qui condensati sub forma plu-

via, nivis grandinis decidunt: Sic fiunt me-teora ignea, separatione scil. materie in-flammabilis, qualem refert in inferioribus nitrum, sulphur, aurum, sclopetans, & sim. Sic fit & mucilago illa viscosa instar stellæ cadentis decedens (Sternschosch.) His an-numeranda, & mineralia, è quibus tamen nonnulla, in formam transplantantur, quæ etiam cum primariis certare videntur. In regno vegetabili, hac ratione suppetunt, succi exudantes, lacryma, melligo florum, resina, gummi, quin & fungi. In anima-libus, Urina, sudor, lacryma, stercora, zi-bettum, moschus, salia, arenule, calculi, & sim.

Et hi modi sunt principales produ-ctionum natiuarum ad quos reliqui ceu ministri referri facilè possunt.

CAP. V.

De Principiis Essentialibus rerum natiuarum.

Circumstantiæ ad natiuarum produ-ctionem, requisitæ præcipuè sunt; Principia constitutiva. Efficiens, Mate-ria, Tempus, & Locus.

Principia constitutiva voco quæ ipsam rem constituunt.

N. Principiorum horum consideratio du-plex est, tum quidditatiua, i. e. quoad esse suum; tum causalis, i. e. quoad causari. Prio-ri consideratione hoc capite veniunt, po-steriori cap. seq. Quidditas rei compilata est è substantiali & accidentali. Substantiale est ipsamet rei ipsis accidentali suo primum & per se substrata: Accidentale est facul-tas seu qualitas substantiæ dictæ proximè primum & per se inherens.

Principia constitutiva rerum natura-lium sunt Spiritus & Corpus, quibus ad-ditur vita ceu principium tertium.

N. Decatata sunt apud Hermeticos prin-

cipia cognitionis, Lumen scil. Natura & Gratia, de quibus data hac de principiis oc-casione parùm differere libet. Natura creator Deus ut in se bonus existit, ita & bonitatis pro arbitrio tamè & beneplacito suo com-municativus. Hinc creaturarum exordium ac bo-nitas, tum supernaturalium ac invisibilium; tum naturalium & visibilium. Utraque enim oriun-tur ex bonitate divina, scaleque sunt à Deo condite, quibus ad eum veheremur. Eapropter quoniam bonitas perfectissi-ma absolutissimaque in Deo concentrata est, adèò ut nihil boni dari possit, quod à bonitate illa alienum sit (quippe imperfe-ctum id foret) creaturarum bonitatem creatoris analogam esse oportuit. Siqui-dem ergo res cunctæ analogæ sunt ad Dei bonitatem relate, & inter se eas analo-gas esse, necessum est. Hinc liquet rerum naturalium analogiam, adiumentum esse

esse cognoscendæ naturæ non postremum, nimirum ex notiori ad ignotius per analogiam peruenire licet. En principium cognitionis, quod lumen Naturæ nonnullis cluit, cuius scilicet splendore creato, diuina accedentes institutione, (quam lumen Gratiæ vocant) in rerum penetralia penetrari potuit. Verum enim verò quia Naturæ, quæ benedictione diuina speculum creata erat purissimum, nitidissimum, pellucidissimum, maledictione euasit umbrosum, obscurum, maculosum, unde & cognitio illa obscurata & deprauata fuit adeo, ut vix quicquam solidi sine hallucinatione cognoscere liceret, ingenia nonnunquam excitauit, excitatque creator excellentiora, quorum opea cognitio illa observationibus eruatur, emendetur, adeoque innotescat: simul ac institutionem suam literis consignari fecit, quibus scilicet cognitio illa acquisita, dirigatur, examinetur, confirmetur. En Lumen Naturæ uti & Gratiæ Lumen, principia cognitionis multoties decantata: sed ad principia essentialia.

Spiritus est principium primum, instructum facultatibus peragendi curriculum sibi naturæ commissum.

Seu, Spiritus est substantia subtilissima vi creationis primum producta, ac postmodum vi benedictionis propagata, polleens facultatibus quibus curriculum secundum suam speciem peragit.

N. Spiritus hic nihil aliud est, quam principium cuiuscunque rei formale, actionum omnium scaturigo. Philosophis nonnullis dicitur $\Delta\pi\rho$, quod tamen diuersum quid esse scias, ab oleo vel spirituosâ illa ac inflammabili substantia materiali, cui itidem sulphuris nomen imponi solet.

Corpus est alterum principium, spiritus illius adaptatum subiectum, cum & in quo curriculum destinatum peragit, imbutum qualitatibus, quibus spiritus

fui facultatibus correspondeant & obediant.

N. Dicitur principium materiale, compactumque est ex liquido & arido, quæ ut in existentia primordiali sunt simplicissima, unitissimaque; ita secernuntur incrasanturque subinde in progressionem suam, ac explicantur, in liquidum, aridum, uti & in liquido aridum, (i.e. in salinam naturam.) & hæc singula in existentia propria exhiberi artificio possunt. De quibus infra. Accidentia igitur corporis essentialia sunt, liquidi, liquiditas, humiditas, aridi, ariditas, siccitas; utriusque frigiditas; salinæ naturæ sapor, vis penetrabilis, fermentabilis, &c.

Ignis (actus) est principium tertium, prioribus superueniens, stipatum calore cuius vi illa in actum traducuntur.

N. Principia duo priora uniuntur, non ut otiosa sint, sed uti Deus est actus perfectissimus, vitæque vitarum; ita & cunctas creaturas in actum collocauit, i.e. in vitam. Vitam puta non strictiore significatione solum, quæ motum vegetatiuis operationibus prodit, sed latiore, quæ rei cuiuscunque actum seu $\nu\tau\lambda\epsilon\gamma\epsilon\alpha\upsilon$ refert, etiam si obscurior illa, minusque conspicua sit; qualis in stellis, metallis & sim. Sunt itaque in rebus naturalibus vitalibus ac $\nu\alpha\tau' \epsilon\gamma\epsilon\alpha\upsilon$ in rebus primariis, Spiritus, Corpus & Vita, quæ adeo arte in statu vitali unita sunt, ut difficulter inuicem distinguere queant. Res exemplo ignis ardentis quodammodo illustrari potest, quippe hic ceu res vulgatissima ad præsentandam vitam ob omnium oculos positus videtur. Ignis ardens tria exhibet, 1. substantiam spirituosam flagrabilem, 2. corpoream aliquatenus effumabilem, spiritus scilicet illius subiectum ac denique, 3. igneam flammam: quæ tria non modo ipsum ignem flamma comprehensum referunt, sed effluuium spirant, eiusdem cum illo naturæ. Simili

milatione sese res habet in actu seu igne vitali. Adest nimirum inibi spiritus aptus natus ignē vitālē suscipere facultatesque suas pro re nata exerere. Simili sane modo, quo oleum accensum pro natura illius olei, odorem halar. Illū si insitum cuiusque spiritum, appellare libuerit, per me licet. Adest & corporea substantia, spiritus illius subiectum lychno in lampade respondens. Adest tertio & ignis seu flamma vitalis, qua duo illa viuunt. En Essentiam rei naturalis in vitā constituta, ex qua insuper effluuia procedunt, qua rebus exteris

pro re nata eunt inferuitum. Est porro ignis: dem illud, quod in creationis historia אור, i. e. lucis voce venit, quippe hæc igni essentialis est, unde & in lingua sancta אור, i. e. lux, & אור, i. e. ignis, sola puncti mutatione differunt. Sennert. hypomnem. phys. c. 3. per vitam essentialē innuere videtur, dum vitam ex Aristotele duplicē facit, Essentialē seu substantialem, à qua ut fonte, vitales actiones prodeant, & accidentalē, quæ sit operatio vitalis aut certè potentia vitales actiones exercendi: Hippocrati ignis voce venit.

CAP. VI.

De Causa Efficiente interna.

Efficiens productionis naturæ, tum interna est, tum externa.

Interna est ipsiusmet rei natura, i. e. inclinatio & facultas (actiua) qua non modo apta nata & procliuus est ad emergendum, sed & in actum emergit, vltiusque progrediendo curriculum destinatum secundum speciem suam conficit.

N. Natura habet sese instar reipublicæ, quæ ad nutū principalis sui domini, auxilio officialium ac ministrorum, administratur. Nimirū prout administratio illa peragitur, ita resultat inde cōmodum, vel damnum non solum sibi met, sed & vicinis quoque populis. Simili modo Natura est comprehensio omnigenarum facultatum, sub dominio alicuius certæ dominatricis, adhibitis facultatibus ministris, gubernata, ut inde non tantū rei propriæ perfectio redundet, sed & proximo subueniatur. Res naturales enim siquidem bone create sunt, ad imitationem creatoris bonitatis communicatiuæ esse debuerunt.

Interna est tum principalis tum ministra.

Principalis, quæ reliquis seu fundamentum existit. E. gr. facultas vitalis, stipata calore viuifico. Ministræ sunt, quæ principali adiunguntur, e. g. facultas nutritiua, generatiua, &c.

N. Vtraque est totuplex, quotuplex species creaturarum. Vniuersalis scilicet quæ vniuersitati seu macrocosmo competit, Particularis, quæ creaturis particularibus. At ais secundum Hippocratē, vnum est in omnibus & omnia in vno, atque ita Natura vniuersalis & particularis in omnibus & singulis erunt. Resp. Sunt utique, sed diuersimodè: videlicet, Natura vniuersalis præest particularibus naturis in macrocosmica administratione, easque seu materiā sibi subiectam dispensat. In particularibus autem eadem particularium creaturarum naturis seu materiā subest, iisque gubernatur, dirigitur, dispensatur. Vice versa de naturis particularibus indica.

C A P. VII.

De Qualitatibus primis seu Elementalibus.

Causæ efficientes externæ sunt, quæ extrinsecus accedentes internis opem ferunt.

Suntque tum *primaria*, tum *secundaria*.

Primaria est ipsamet natura seu operatrix sagacissima, cuiuslibet rei naturali de debitis mediis prospiciens, seu si mauis, est ipsemet *Iehoua Elohim* per naturam, i.e. naturales leges omnia sapientissimè prudentissimèque dirigens & gubernans.

Secundaria sunt media ad productionem quoquo modo facientia.

Hæc etsi varia dari possint, quippe, quæcunque ad efficientiam rei faciunt, eis accensentur: adeoque & instrumenta rustica, & sim. attamen excellunt hic qualitates facultatesve naturales, 1. Elementales, 2. salinæ, 3. occultæ.

N. *Res naturalis* uti extrinsecus ortum adeptæ est, & per hunc, naturam internam, quæ apta nata est in lucem seu vitam emergere, æconomiam mundanam administratura: ita quoque aliunde opus habet, quo natura illa interna in actum deducatur. Etsi autem omnia à Deo dependeant; tamen quia is ipse media sibi ordinauit ordinaria (quæ collectim Naturam vocamus) iis hoc loco intentos esse oportet. Sunt itaque qualitates seu facultates naturales, pro triplici dato principio triplices, Spirituales (formales) corporæ (materiales, & modales) priuatiuæ vel vitales. Spirituales sunt quæ parti spirituali primò ac per se accepta ferenda sunt, quales sunt proprietates

cuiuslibet creatura indita. Corporeæ sunt quæ materiali parti per se inherere uti.

1. liquiditas & ariditas, 2. *Sûrapsis Hippocratica*, quam acumen dicere licet, nos salinam facultatem appellabimus. Modales sunt, quæ cum modo existendi sunt coniunctæ, ut frigiditas quæ competit principiis constitutis in priuatione & quiete; & caliditas, quæ propria est principiis in actu seu motu constitutis. Verum enimvero placet adhibuisse ordinem datum, quæ facultates ad productionem facientes triplici classi includimus. Elementalium, salinarum & occultarum.

Singulæ hæc tum *uniuersaliores* sunt, i.e. in macrocosmo collocatæ vel *particulariores*, i.e. in rebus particularibus determinatæ.

Elementales qualitates, quas primas communiter dicunt, sunt calor, frigiditas, humiditas, siccitas.

Calor facit ad productionem naturalem, quatenus causam internam frigore condensatam, materiæque ad frigiditatem propendenti immixtam adeoque quieti deditam, suscitatur, fouet: frigiditas, caloris æstum moderatur: humidum, humori interno sese insinuat, adeoque humidum ariditate victum liberat, nutrit, &c. ariditas, liquiditatem terminat, humorique admixtum simul nutrit.

N. Calor macrocosmicus partim est insitus & radicalis, partim influens. Nimirum macrocosmus sese habet instar animalis, quod calido tum innato, tum influente calefit. Innatum calidum toti uniuersitati inditum est, quippe æquè latè patet calor

calor ac ipse ignis vitalis cuius Achates est fidelissimus. Eapropter cum totus macrocosmus actuali suo igne perfusus sit, nec calore eum esse destitutum, necesse est. Hinc Hippocrates in principio lib. de carnib. Calidi pars maxima, inquit, cum omnia perturbata essent, in supremum ambitum secessit, quod veteres videntur athera appellasse: altera pars locū infimum sortita, terra quidē appellatur, frigida, sicca, multasque motiones habens, & in qua multum sanē calidi inest. Tertia vero pars mediū aëris locum nata est, calidum quid existens. Quarta pars terre proximem locum obtinens, humidissima & crassissima, &c. Verum quid opus est pluribus calorem hunc terræ demonstrare? Etenim, præterquam quod scimus, terram ante creatas stellas, (quibus alias calor acceptus refertur) ut caloris germinasse, calor sese exerit sensibiliter non modo in scaptenfulis ac cuniculis subterraneis, sed & in puteis profundis; quinimò fontana, quæ brumali tempore scaturit scilicet quo terræ superficies frigore nitet, calorem vaporibus balantibus manifestò probat. Addo quod nec verisimile videatur, calorem stellarum, absque vi magnetica, quæ calidum interra, ceu magnetem trahentem præsupponit, in terra profundiora penetrare.

Calor influens macrocosmicus diffunditur ex astris, & præcipuè ex Sole: hinc & ex ♄, ♀ asterismisque igneis & aëreis, quinimò & ex stellis quibusdam fixis calidam naturam fortitis.

N. Sol ad macrocosmum sese habet, uti ad animal ipsum cor. Videlicet sedes est, ubi Natura residens fixit vitam, ex qua velut ex scaturigine, spiritus suos vitales, & cum his calorem, macrocosmo, rebusque hinc particularibus elargitur, adeoque mediis illis calidum macrocosmi insitum,

suscitat, fouet, nutrit; particularium itidem vitam caloremque sustentat. Fundit Sol calorem, inquit auctor Ecclesiasticus c. 39. sicut clibanus. Et hinc est, quod Chama à calore Hebræis Sol dictus sit. Sole porro calidiores statuuntur ♂ & ♄, ille intensius; hic benignus: reliqui è contra frigidiores habentur, non simpliciter, sed ad solem collati. Caterum augmentari calorem contingit, ubi radij congregantur, reflectuntur, roborantur. Congregantur radij si dissipatio denegetur: reflectuntur, si rectè in corpus solidum inciderint: multiplicantur & roborantur, si in fortitudinibus stella calorem radiantes extiterint.

Calor particularis est qui à re particulari procedit. Talis est in animalibus calor matricis, calor gallinæ ovis incubantis, &c.

Humiditas etsi itidem per totam vniuersitatem sit diffusa, inque certos confluxus inferius hicce collecta, vnde eleuari vapores sat copiosi eleuantur, inque pluuiam, rorem, niuem, imbrem, & sim. condensantur, subindeque delabuntur; attamen in confesso est apud Astronomos, præterquam quod certæ constellationes dictorum meteororū generationem iuuant, esse quoque stellas, humiditati radiandæ, consecratas, quales ♄, ♀, ♄ asterismique aquei, stellæque nonnullæ fixæ, hyades, arcturus, &c. & hinc augmentatur humiditas eadem ratione, qua de calore dictum: adde quod Luna prout accreuerit & decreuerit, humiditatem quoque largius vel copiosius radiat.

Humiditas particularis est quæ in rebus particularibus deprehenditur, eaque determinata: Hæ crei producendæ tanto conducibilior est, quanto res inter se similiores fuerint.

Frigiditatem influere censentur è planetis

neris (& ♀, vtraque moderatè, hinc & N sed intensissime: Ex astris signa præcipè terrea.

Siccitatem radiant è planetis ☉, ♂, ♀, ex astris, Signa terrea & ignea.

C A P. VIII.

De Salinis facultatibus.

Vis salina facit ad productionem naturam, quatenus humiditatem diætā acuit, efficaciorē ac penetrantiorē reddit, crassitiem incidit, fermentationem iuuat, &c. adde quod & in nutrimentum facessat, &c.

N. *Per vim salinam non solum intellige falsedinem, sed quamcunque facultatem primis potentiorē, quas Hippocrates salibus accenset, plurimāsque esse docet. In homine, inquit, lib. de prisc. medic. text. 30. inest & amarum, & salsum, & dulce, & acidum, & acerbum, & inspidum, aliæque sexcenta, quæ procopia & viribus, varias habent facultates.*

Salina hæc facultas *uniuersalior* refidet potissimum in globo inferiori, ceu generatorio macrocosmico, adeoque immixta est aquæ & terræ. Aquam salina scaterē facultatē, qui negat, adeat mare, caloriue exponat aquas simplices, meteoricasue, vt exhalent. Et ex hoc fundamento populi maritimi, vt in Normandia non citra iucunditatem obseruauī, terram salina facultate per maris fluxum imprægnatam fodere, eaque agros imprægnare solent. Terram facultatibus il-

lis imprægnatam esse tradit Hippocrates, lib. 4. de humorib. t. 4. Terra, inquit, in se varias & innumeras facultates habet. Idem edocet elixiuatio salis nitri; cui SS. Scriptura adstipulatur, innuens, quod sulphure & sale adurentibus vniuersam terram comburat Deus, quo minus fructum ferre habilis fiat, Deut. 29.

Particularior est in singulis rebus particularibus. Et hinc res particulares aptæ sunt aliarum productionem promouere, maximè si mutua similitudo affinitasque inter vtrasque intercedat. Oportet autem salinam hanc facultatem compede suo, quo vi mixtionis ligata erat, prius vi dissolutionis, esse liberatam. E. gr. putrefactione, incineratione, &c. Et hac ratione agricolis vñtatissimum comperimus, agros stercoribus vt pote sale imprægnatis, impinguare. Quinimò videre licet quibusdam in locis, myricas, fruticetas vel & syluas comburi, inque terram hanc cinere fecundatam semina conseri, vt idipsum admodum vñtatim vidi in Suecia & Finlandia, regionibus scilicet nemorosis, &c.

CAP. IX.

De influentiis Stellarum.

Non parum conferunt & proprietates, i.e. facultates specialiores ad natiuorum scil. productionem accelerandam, retardandam, facilitandam, transplantandam, adeoque ad vires rerum intendendas, imminuendas, transplantandas. In his excellunt Sympathiæ & Antipathiæ: illis res promouentur: his, retardantur.

Utæque sunt tum *macrocosmica*, seu *uniuersales*, tum *particulares*.

Macrocosmica sunt quibus ipse macrocosmus res particulares respicit, i.e. productionem promouet, impedit vel quoquo modo mutat.

Particulares sunt, quibus res particulares rem sibi sympathicam iuuant, antipathicam debilitant.

Proprietates macrocosmicæ toti macrocosmo & consequenter globo inferiori sunt inditæ, qua ratione terram hanc aptiorem plantis his cernimus, aliâ aliis: verum hoc loco considerabimus solum, quæ globo superiori, & in hoc stellis acceptæ feruntur, peculiarique nomine influentiæ dicuntur.

Influentiæ stellarum sunt effluuia peculiaribus facultatibus prædita, quibus res sibi familiares (si robustæ & in vigore stellæ fuerint) roborant, prosperant, promouent; è contra res sibi contrarias debilitant, deprauant, impediunt.

N. *Familiaritas stellarum cum sublunariis ex mente Platonis & Paracelsi, inter stellas singulas & singula sublunarium genera constituenda quidem foret; videlicet, stellas singulas, singulis sublunariis speciebus præesse volunt, & hisdem peculiariter influentias suas influere.* Plat. in Tim. Paracelsi. l. 3. Philosoph. tr. 4. Verum cum singularum specierum stellas cognoscere impossibile sit, viam plerique sequuntur aliam, certâque classes maiorum imitatione faciunt, ad quas cœu fontes generales sublunaria quæque referunt. Classes has tum secundum planetas disponunt, tum secundum stellas fixas, maxime secundum asterismos Zodiaci. Rectius tamen meo iudicio fecissent, si stellas singulas singulis facultatibus præfecissent, adeoque pro facultatum varietate, & varietates stellarum numerassent; uniuersaliores, particulariores, &c. E. hac via non rebus singulis, singule stelle, sed uni eisdemque rei, prout facultatibus ea dotata est, ita & varie stelle forent consideranda. E. gr. Solem facultate cordis celebrarent, eaque tum uniuersaliori calefaciente, tum specialiori, ut patebit infra.

Res stellis familiares sunt primariò, quæ stellis illis immediatè subsunt; secundariò quæ per stellas amicas, i.e. planetas amicos vel asterismos horumque affectiones stellas respiciunt. V.g. Lunæ primariò subest Lunaria herba. Secundariò; cuscuta res scil. Saturnina: fabaria, ytpote res Venerea: althæa, ytpote res Mercurialis. Simili ratione Lunæ subest secundariò res tauro, cancroque subiecta. Nimirum ♈, ♀ & ♄ sunt amici Lunæ. Taurus est eiusdem exaltatio; ♋, domus. Res stellis contrariantes sunt, quæ subsunt planetis inimicis vel asterismis dissentientibus.

Influentiæ stellarum sunt tum planetarum, tum stellarum fixarum, quas ordine lustrabimus.

De influentiis Planetarum.

S O L.

Sol est Planeta beneuolus, moderatè calidus & siccus, amicus ♀ i & ♀ i, reliquis inimicus, cordis vice in macrocosmo fungens, ideoque generatorium est spirituum vitalium macrocosmi, i.e. radiorum calidorum, quibus tota vniuersitas fouetur, scaturigoque peculiarium effluuiorum, quibus peculiariter iuuat res sibi familiares, impedit sibi contrariantes.

N. *Effluuium Solis scriptura appellare videtur* מוצר הכוח שמש *Meged thebuot schemesch*, pinguedinem seu florem stillantem Solis, Deuteron. 33. vers. 14.

Res Solares sunt.

1. *E Mineralibus*: Aurum, terra foliaris, (sigillata) ☿ solare, ætites, carbunculus, chrysolithus, hyacinthus, rubinus, ambra.

2. *E Vegetabilibus*: Aromata omnia, acetosa, acetosella, althæa, borrago, buglossa, calendula, chelidonia, citraria, corona regis, crocus, dictamnus, fraxinus, gentiana, granatus, hederæ, helenium, heliotropium, hypericum, la- uendula, laurus, olea, maiorana, malua, melissa, mentha, palma, pæonia, poma aurantia, poma citria, rosmarinus, ros solis, thymus, verbenæ, vitis, xylaloe, zedoaria. Item mastiche, thus, mel, myrrha.

3. *Ex animalibus*: Ea videlicet quæ generosa & hilaria suat: vt aries, caper, equus, leo, taurus, Aues: aquila, cygnus,

coruus, gallus, vultur. *Insecta*: cantharides, scarabæus pilaris.

Res Soli contrariantes sunt res. Lunates, Saturninæ, Martiales, &c.

L V N A.

Luna est Planeta inter bonitatem & malitiam mediocris, moderatè frigidus ac humidus, amicus ♀ o, ♀ i, ♀ i & ♀ o, reliquis duobus inimicus, cerebro correspondens, adeoque sympathicus nervosis partibus ac spiritibus animalibus. Vel si mauis: Luna est generatorium humiditatis, quæ tota vniuersitas irroratur, scaturigoque peculiarium effluuiorum, quibus primariò & peculiariter afficit res sibi familiares, secundariò, res familiares ☿ o, ♀ i, ♀ i & ♀ i o, vt pote cum quibus amicitiam colit.

N. Maiorum de Luna opinio, non sine ratione cuiuspiam dubia esse posset, quippe Luna macrocosmi Epar potius presentare videtur quam cerebrum, humiditatibus siquidem macrocosmicis præesse deprehenditur, non secus ac Epar microcosmicum, humiditati microcosmica, quæ in sanguine viget. Mare macrocosmicum turgescit, fluit ac refluit ad Luna cursum, sanguis ceu mare microcosmicum, eadem ratione turgescit, attestante turgescentia sanguinis menstrui mulieris. Similiter in creaturis particularibus humiditas crudior, cum luna cremento augeri cernitur, è contra cum decremento, minui, quod idem Plinius apertè quoque testatur de sanguine humano. Morbi itidem in sanguine fundati, ad Luna cursum mouentur, crisesque suas exhibent. His addi poterit, quod substantia Luna, quia terra ac propterea terrestri nature propinquior, adeoque crassior, potius Epati substantiâ subtiliori respondet. Lacertarum quoque Epar crescere perhibetur crescente Luna, decrescere eadem decrescente. Nec est quod angescen

augescantiam ac decrescantiam cerebri ac medulla in ossibus quis obiciat, Luna incrementum decrementumque imitantes : ex humiditate enim sanguinis illas potius esse colligitur, quam spirituum animalium, id quod & de Epilepsia ad Lunam periodica, sentiendum.

Res Lunares.

I. Mineralia. Terra sigill. alba, alumen, marcasita (ea, & omnia alba ac viridia, corallia alba, crystallus, margarita, mater perlarum, succinum, camphora, sperma ceti.

II. Vegetabilia. Agnus castus, alkekengi, allium, arundo, becabunga, brassica, caulis capitatus, cæpa, chamæm. fabaria, fungi, hyssopus, lactuca, lentiscus, lilium conuallium, lilium, lunaria, mandragora, nasturtium, nymphæa, nux muschata, nux iuglans, papauer, plantago aquat. pæon. porrum, portulaca, rapa, sedum, tilia.

III. Animalia. Canis, capra castor, cerua, felis, lutra, perca, sanguis menstruus. *Aues:* anas, anser, ardea, merguli, &c. *Pisces:* aurata, cancer, carpio, cochlea, ostrea, ranæ. *Insecta:* aranea, bufo.

Res Luna contrariantes sunt res Solares Martiales.

SATVRNVS.

Saturnus est Planeta malignus, diurnus, masculinus, summè frigidus, Martis amicus, reliquis inimicus, lienis microscopico correspondens.

N. Mallem equidem Saturnum, Iouem ac Martem capiti adscribere, non ventri infimo. Etenim ut longius à terra globo distant, ita & natura sint oportet, longius à terra distatis. Et hinc quoque videtur verisimile, destinatos eos esse influentiis subtilioribus, quam quæ Epatis, Lienis ac vesicæ fellis facultatibus respondeant.

Res Saturnina.

I. Mineralia: ♂, ♀, ∞, O, marcasita, Saphyrus, magnes & omnia terrea fusca ponderosa.

II. Vegetabilia: Aconitum, agnus castus, apium, arbor fœtida, asphodelus, aster, attriplex, bursa pastoris, cannabis, capparis, cicuta, cuminum, cupressus, cuscuta, epithymum, ficus atra, filix, hyoscyamus, helleborus niger, lappa maior, mandragora, morus, muscus, myrica, opium, herba paris, pinus, polypodium, sabina, saluia, scolopendria, semperuium, sena, serpentaria, solanum, tamariscus.

III. Animalia: (Solitaria, nocturna, tristia.) Asinus, bufo, camelus, catus, formica, lepus, lupus, mulus, mus, musca, scorpio, serpens, simia, fus, talpa, vrsus, vermesque multiplices. *Aues.* Bubo, coruus, grus, noctua, pauo, struthio, vesperilio, vpupa.

I V P I T E R.

Iupiter est Planeta beneuolus, moderatè calidus, similiterque humidus, amicus præter Martem, reliquis omnibus. Epatis correspondens, huiusque facultates influentiis suis fouens.

Res Iouiales sunt.

I. Mineralia: ♄, ☿, O, Corallium, hyacinthus, iaspis viridis, saphyrus, smaragdus, Tutia.

II. Vegetabilia: Amygdalæ, auellana, berberis, borrago, buglossa, calamentha, cerasa, cornus, borylus, cynoglossa, endiuia, faba, fagus, ficus alba, fraga, fraxinus, fumaria, glycyrrhiza, hepatica nobilis, hordeum, ilex, lilium album, linum, lolium, macis, malus, mentha, morus, myrobalani, nuces, ocymum, oliua, origanum, passulæ, pinea, pistacia, rad, pæonia, populus, portulaca, prunus, prunella, pyrus, quercus, rhabarbarum, ribes.

ribes, rubia tinctorum, sedum, forbus, spica, symphytum, triticum, verbascum, viola, vitis. Huc manna, mastiche, styrax, sacharum & omnia dulcia.

III. *Animalia*: Agnus, ceruus, elephas, ouis, taurus. *Aues*: Aquila, ciconia, columba, gallina, hirundo, perdix, phasianus.

Rex Δ i contrariantes sunt res \mathcal{J} les.
MARS.

Mars est Planeta summe calidus atque siccus, amicus Veneris, inimicus reliquis, presentans ac fovens vesicam fellis microcosmicam.

Res Martiales sunt.

I. *Mineralia*: \mathcal{S} omnia rubea ignea, sulphurea: Adamas, amethystus, magnes, osteocola, sal armoniacum.

2. *Vegetabilia*: Arum, allium, aristolochia, carduus, chamæleon, cepa, cornus, ebulus, esula, euphorbium, flammula, helleborus, lathyrus, laureola, mespila, nappellus, plantago, portum, prunus, quercus, ranunculus, raphanus, resta bouis, sinapi, tormentilla, vrtica. Huc castoreum, euphorbium, scammonia & venenosa omnia.

3. *Animalia* Bellicosa, impetuoosa, potentia, biliosa, rapacia: Canis, hircus, hædus, lupus, mulus, pardus, vulpes. *Aues*. Accipiter, aquila, cornix, coruus, falco, miluius, noctua, vultur *Pisces*. Lucius, pastinaca, canis marinus, perca.

VENUS.

Venus est Planeta benevolus nocturnus, foemininus, moderatè frigidus, paulo intensius humidus, amicus, \odot , \mathcal{M} , \mathcal{J} , \mathcal{C} , inimicus \mathcal{H} o, influens in partes genitales & urinarias.

Res Venereæ sunt.

I. *Mineralia* \mathcal{F} , \mathcal{J} , Ambra, lapis ætides, berillus, chrysolithus, corallia, corneola, lapis lazuli, lapis calaminaris, sap-

phirus, smaragdus, Tutia.

2. *Vegetabilia*: Asphodelus, capillus veneris, coriandrum, cyclamen, eryngium, fabaria, faba, ficus, fragaria, hedera terrestris, iris, lilia omnis generis, melilotus, milium folis, mala punica, narcissus, nymphaea, petroselinum, pyra dulcia, rosa, santala, satyrium, serpillum, thymus, H. Trinitatis, tunica, verbena, viola, ladanum, benzoin, muscus, ambra, vt & omnis generis thymiamata.

3. *Animalia* delitiosa, lasciuia, mitia, blanda, iucunda, mansueta, &c. catulus, capra, cuniculus, hircus, stincus, taurus, vitulus. *Aues*. Aquila, columba, coruus, cygnus, gallus, hirundo, motacilla, passer, pavo, perdix, pica, turtur.

MERCURIUS.

Mercurius est Planeta mutabilis, bonus cum bonis, malus cum malis, calidus cum calidis, frigidus cum frigidis, siccus cum siccis, humidus cum humidis, amicus \mathcal{H} o, Δ i, \mathcal{F} , \mathcal{C} , inimicus \mathcal{J} & \mathcal{S} , referens pulmones, quos & influentiis suis sympathicè irradiat.

N. *Vtrumque ventri medio dicarem, præterquam enim quod Venus Mercurio sit superior, atque adeo præ \mathcal{Q} io substantia subtilioris, uterque fidelissimus solis comes est, utpote ad quem cursum suum uterque dirigit, haud longè ab eodem recedendo. Verum enimvero, cuique vt in aliis, ita & in his suum linquo arbitrium, opinionem meam saltem referens, nulli obtrudens.*

Res Mercuriales sunt.

1. *Mineralia*: \mathcal{F} , Δ , \mathcal{J} , marcasita, smaragdus.

2. *Vegetabilia*: Althæa, anisum, aquilegia, arithritica, bellis, chamemelum, corylus, cubeba, enula campana, faba, fumaria,

ia,

ria, glycyrrhiza, iugulans, iuniperus, maiorana, marrubium, mercurialis, napus, numularia, pentaphyllum, petrofelinum, petasites, pimpinella, pæonia, pulmonaria, sambucus, fatureia, scabiosa, serpentaria, serpillum, trifolium, tussilago, veronica.

3. *Animalia* ingeniosa, astuta, sagacia, ablandientia, loquacia: vt, Canis, ceruus, lepus, mula, mustela, simia, serpens, vulpes. *Aues*. Alauda, carduelis, ficedula, hirundo, merula, pica, psittacus, lusciniæ, turdus. *Insecta*. Scarabæus, vespertilio. Hûc apis, formica, gryllus, locusta.

De influentiis asterismorum.

Familiaritas quæ stellis fixis cum rebus medicamentalis intercedit, secundum numerum asterismorum in duodecim classes disponitur, quarum singulæ quatuor gradibus ad modum qualitatum primarum distinguuntur.

I. ARIES.

Aries est signum masculinum igneum, i.e. calidum & siccum, sympathicum capiti.

Grad. I. Artemisia rubra, Betonica, cichorium, consolida regalis, ebulus, mentha, persicorum malorum nuclei, petasites, serpillum, tussilago, veronica.

N. Colligit Carrichter in fine dierum canicularium post plenilunium.

Gradus. II. Asparagus, eubulus, hypericum, millefolium, plantago, pæonia.

N. Colligit Carricht. ☉ & ☽ existentibus in ☉.

Gradus III. Agaricum, cataputia, chamælea, colocynthis, esula, farsara, gentiana, ligustrum, nucista, ricinus, sambucus, farsa parilla.

N. Colligit Carricht. inter Iacobum

& Laurentium.

Gradus IV. Abrotanum, calaminta, cappares, cinamomum, helleborus albus, maiorana, marrubium, nasturtium sylvestre, rosmarinus, turbit. spica.

N. Colligit partim Aprilis, partim Septembri.

II. TAVRVS.

Taurus est signum foemininum terrestre, frigidum ac siccum, sympathicum collo, ac gutturi.

Gradus I. Betonica, ceterach, chamædrys, hederæ terrestres, liliorum alborum radix, mentha, narcissus, polypodium, rosæ, rosmarinus, valeriana, viola.

N. Emolliunt tumores faucium ac lienis.

Gradus II. Adiantum, alkekengi, aquilegia, hederæ arborea, polygonatum, quercus viscus quercinus, &c.

N. Vulneribus conferunt.

Gradus III. Anserina, buglossa, carduus Mariæ, cynoglossa, eupatorium, lappa minor, origanum, petrofelinum, quercus, quinquefolium, fanicula, scropularia, tormentilla, vinca peruinca.

NB. Vulneraria sunt.

Gradus IV. Auricula muris, bardana maior, betonica sylvest. chamæcissus maior, chelidonium maius, fraxinus, malua, pulmonaria, scabiosa, &c.

N. Antipathiam habent cum subluaribus quæ libræ ac Scorpioni subsunt; sympathiam cum his quæ Cancro ac Sagittario.

III. GEMINI.

Gemini sunt signum masculinum, aëreum, calidum & humidum, possidens humeros.

D

Gradus

Gradus I. Anisum, althea, buglossa, borrago, feniculum, hyssopus, petroselinum, prunella, ruta muraria.

Gradus II. Bardana mai. buglossa, filix, tilia alba, rapa, &c.

Gradus III. Alline, arum, macis, rumex rotunda, vrtica mortua, &c.

Gradus IV. Acetosa, chamædrys, chamamel, chelidonium, parthenium, rhab. &c.

N. *Antipathiam habent cum sublu-
naribus capricorni, sympathiam cum Li-
bra ac Aquarij.*

IV. CANCER.

Cancer est signum fœmininum, aqueum, frigidum ac humidum, sympathicum pectori, pulmonibus, costis, lieni, quorum quoque affectibus medetur.

Gradus I. Alline, brassica, carduus, fabarum flores ac fructus. Gallium, rapa, rapunculus, salvia, scrophularia.

Gradus II. Arbutus, coni abietis, pini, consolida, solanum, terebinthina, viscus.

Gradus III. Becabunga, crassula, digitalis, gnaphalium, iuncus, nasturtium, petroselinum semen, portulaca, salix, saxifraga, vermicularis.

Gradus IV. Conchæ, corallia, alba crystallus, mater perlarum, nymphæa, oculi cancri, pæonia, sedum, sperniola, vitriolum. Huc Cancer, Lepus, Serpens, &c.

N. *Antipathica sunt sublunaribus Sagittarij, sympathica Tauri ac Libræ.*

V. L E O.

Leo est signum masculinum, igneum, i.e. calidum & siccum; præfectum cordi ac stomacho.

Gradus I. Basilicum, crocus, curpressus, garzophilli, hyssopus, laundula, plantago aquatica, ros solis, soldanella, thymus.

Gradus II. Angelica sylvestris, bifolium, centaurea, galanga, gentiana, morsus diaboli.

Gradus III. Cotula fœtida, pastinaca, mentha, nasturtium hortens, pulegium, ranunculus, vrtica.

Gradus IV. Betula, buxus, genista laurus.

N. *Gradus 1.* Collig. ☉ existente in X: ☾ in ☿.

Grad. 2. In principio Maij, ante ortum Solis, vel finiente Augusto vel ☉ existente in ♄, ☿ ☾ in ♀ ante ortum Solis.

Grad. 3. Quando ☉ in ♋, ☿ ☾ in m̄ ac ultima quadratura, vel ad refrigerationem; ☉ in ♄, ☿ ☾ in ♀ versante, ante ortum Solis.

Grad. 4. ☉ in X, ☿ ☾ in ♋, vel ☉ ☿ ☾ in ♋.

V. VIRGO.

Virgo est signum fœmin. terreum, frigidum ac siccum, sympathic. Epati Intestinis ac Ventri.

Gradus I. Acetosa, acetosella, bardana, cichorea, plantago, pyrus, salvia sylvestris.

Gradus II. Beta alba, cynosbatus, mefpilus, sigillum Salomonis.

Gradus III. Aristolochia, consolida media, conyza, prunella, quercus.

Gradus IV. Carduus benedictus, centaurea min. frangula, ophioglossum, prunus sylvestris, cum omnibus suis partibus fructibus ac floribus, serpentaria, tormentilla, &c.

VII. LIBRA.

Libra est signum masculinum æreum, calidum & humidum, Renibus ac Vesicæ sympathicum.

Gradus I. Bellidis genera omnia, consolidida media, parthenium, primula veris, sium, tragopogum.

Gradus II. Alcea, althæa, anserina, chamæmel, martagon, malua, verbena, viscum, tilia.

Gradus III. Antirrhinum, artemisia corylus, ruta muraria.

Gradus IV. Alyssum, antirrhinum, alfine, chelidonium mai. mentha nigra, scabiosa, serophularia, fenecium.

VIII. SCORPIVS.

Scorpio est signum fœm. aqueum, frigidum & humidum, sympathicum partibus genitalibus.

Gradus I. Cruciata, oxycantha, forbus sylvestr.

N. *Huc pertinent omnia simplicia primi gradus ☿, si post Iunium collecta sint mense Octobris inprimis.*

Gradus II. Fraxinus, poma omnis generis, prunus, conchæ, ostrea.

Gradus III. Berberis, buxus, erua, parthenium, saponaria.

N. *Huc pertinent omnes herbæ 2. gradus ☿, collectæ ☉ in ☿ existente.*

Gradus IV. Atriplicis species omnes, beta rubra, mercurialis, narcissus, ribes.

IX. SAGITTARIVS.

Sagittarius est signum masculinum igneum, calidum & siccum, sympathicum coxis, lumbis, & sim.

Gradus I. Consolida maior, cepa, raphanus, serophularia, sesamum, tilia

flores, verbena lutea.

Gradus II. Allium, angelica sylvestr. hyoscyamus, leuisticum, salicis folia.

Gradus III. Asarum, beta rubra, chelidonium, crocus, curcuma, filix, hedera terrestris, hirundinaria, iuglans, rubia tinctorum, succisa.

Gradus IV. Antimonium, momordica, euphorbium, nasturtium, vitis alba.

X. CAPRICORNVS.

Capricornus est signum fœm. terrestre, frigidum & siccum, sympath. genibus ac nervis.

Gradus I. Calendula, cerasa nigra, enula, morus, rubus, vaccina.

Gradus II. Mora nigra, scarlea, verbasum.

Gradus III. Acorus officinarum, burfa pastoris, consolida mai. curcubita, galanga, malua hortensis, fonchi omnis generis.

Gradus IV. Helleborus, hyoscyamus, mandragora, napellus, herba paris, fabina, solanum, staphisagria.

XI. AQUARIVS.

Aquarius est signum masc. æreum, calidum & humidum, sympath. tibiis ac cruribus.

Gradus I. Angelica daucus, ficus, fraxini flores, hedera terrestr. iuglans, melilotus, fanicula, sigillum Salom. vinca peruinca.

Gradus II. Consolida regalis, cuminum, epithymum, geranium, lappa radix rhodia, ruta muraria, saluia sylu. vrtica alba.

Gradus III. Agrimonia, auricula muris, horminum, mercurialis, saxifraga, serpentaria.

Gradus IV. Asarifol. cardiaca, cicuta, mespila.

XII. PISCES.

Pisces sunt signum sc̄m. aqueum, frigidum & humidum, sympathicum pedibus.

Gradus I. Aristolechia l. caulis capit, cucurbita enula. fragus momordica, myrobalan. napus, nymphæa, portulaca, rapa.

Gradus II. Artiococus, antirrhinum, cyanus, stæchas citrin.

Gradus III. Nigella, papau. sariu. papau. erraticum, sonchus.

Gradus IV. Cicuta, hyosciamus, napellus, papau. cornutum, solanum alb.

vua inuerv. Serpens.

N. Non ignorare te volo, amice Lector, memihimet hisce iam recensitis non satisfesisse, multò minùs tibi. Recensui ut apud authores reperi, fundamenta penitiora, ut ingenuè fatear, nondum affectus. Namque signa quæ perhibent, sumpta à sapore, colore, odore, motu sequaci, figura, &c. aque dubia sunt: nec enim constat cur signa talia, familiaritatem talem indubitato arguant. Attamen, cum nullum dubium sit, quin inter res certas cœlestes, & sublunares certas, amicicia inimicitiane intercedat, series à maioribus collectas recensere placuit, si quæ tibi daretur in fundamenta penetrare. Dona nimirum Dei diuersimode imperitiuntur.

C A P. X.

De proprietatibus particularibus.

SVnt & proprietates particulares, id est in rebus particularibus fundatæ, quibus productio alterius si scilicet conspirauerint, iuuatur, sin dissenserint, impeditur, retardatur. Exempli gratia crescit feliciùs polypodium super quercu; sic cuscuta lino adnascens, feliciùs exurgit: sanicula quercuum viciniâ gaudet; vitis oleæ; orobanche inter legumina crescere auct, quæ tamen

ipsa strangulat. E contra sese mutuò offendunt, brassica & vitis, adeo ut si in agris brassica viti assita exurgit, vel vitis ipsa confestim emarcescat, vel certè sarmenta eius elanguescentiâ contabescant: sic odit & vitis corylum; quercus consita iuxta iuglandem contabescit; hedera omnibus arboribus, maximè vero viti infensa est.

CAP. XI.

De materia natiuorum.

Materia ex qua res natiuæ fiunt, sunt *semen* ac *nutrimentum*, aut his analogum quasi *semen* & *nutrimentum*.

N. *Materia in natiuorum constitutione* denotat 1. partem materialem seu corpoream, quatenus spirituali, i.e. formali opponitur. Et est pars illa corporea ex liquido & arido coagmentata, spiritualis illius partis. Subiectum vid. c. 5. In macrocosmo est corporea substantia totius vniuersitatis spiritui vniuersali substrata, crassior in terra, tenuior in aqua, magis adhuc tenuis in aëre, tenuissima in stellis. In vegetabilibus & animalibus est corporea itidem substantia spiritibus seu animabus eorum subiecta: crassiorque existit in membris his, e.gr. in ligno, ossibus, & sim. tenuior in aliis; v.gr. in medullis, cerebro, & sim. prout natura naturanti primitus fuit visum. In rebus secundariis similiter sese res habet, ubi tamen consistentiam homogeneam ferè nacta est. 2. Refert subiectum præexistens, è quo res natiua tanquam ex materia proximè præexistente fit, quo sensu Aristoteles materiam videtur descripsisse subiectum, è quo res fit primum, per se & non per accidens. Et hac ratione opponitur forma, i.e. actui seu vite, qua res producta viuit & actuatur. Est autem non mera pars materialis, sensu priori, sed subiectum ex principio materiali ac formali, seu quod idem est, ex corporeo ac spirituali compositum, tametsi spiritualis illa pars sopita quasi ac in tenebris fere deliteat, imo materialis partis vices non raro retinere videatur, præcipue in nutrimento.

Semen est materia humido-spirituosa,

(i.e. aqua ac spiritus, seu si mauis, aqua & ignis) in creaturam certam proximè ac naturâ suâ emergere determinata.

N. *Seuerino* Dano est vitale principium, in se continens spiritus mechanicos & tincturas vniuersæ anatomie propriæ speciei, quibus suum sibi fabricant corpus, colores, sapores, qualitates, magnitudines, figuras & reliquas signaturas consentaneas officiis & prædestinationibus prædictorum spirituum & rei producendæ. Exemplis res patebit: Macrocosmi materia præexistens, quæ seminis vices præsentat (strictè enim semen dici nequit) à Mose dicitur Terra infertilis & inanis, à Poëtis chaos. Huic respondet chaotica macrocosmi dispositio, è qua cœu materia prima rerum renouatio dependet. Vegetabilium ac animalium semen v. plurimum in sua specie fundatur, nonnunquam tamen in materia vniuersaliori: unde Generatio, vniuoca, æquinoca, cagastrica, iliastrica.

Nutrimentum est materia humido-spirituosa, quæ vi & facultate rei nutriendæ præparatur, subindèque alterata, mutata, determinata, membris incorporatur. Vniuersalior est initio & à natura rei nutriendæ diuersa, vnde paulatim alteratur, inque naturam rei nutriendæ transplantatur.

N. Macrocosmi nutrimentum idem illud chaos est, seu res particulares in chaotica dispositionem reductæ. Vide supra. Nutrimentum vegetabilium ac animalium per se fere innotescit. Vegetabilia nutriuntur terra succo, naturâ macrocosmici, i.e. effluuiis elementorum impregnato.

Hinc formatur benedictio divina. Deut. 33.v.13.& 14. מכונה יהות ארצו מימוצד שמים מוטל ומתהום דכצד תתה ומטומצד

&c. הכונה שמוש ומטומצד צדש ויהים: id est in benedictione Iekoua terra tua in Effluvio (ubertate communicata, Meged) cœlorum , in rose in abyſſo iacente infra. Et in effluvio vegetabili Solis , & in effluvio vegetabili Luna , & in effluvio montium , & in effluvio collium , æternum.

Animalibus tum ipſemet macrocoſmus cibis exiſſit, tum vegetabilibus, tum animalia inuicem. Vide ſuprà c. 4.

Quæſi ſemen & nutrimentum materiam exhibent rebus ſecundariis, ſuntque excrementum in nutritione rerum primariarum, à parte vtiliori (rubino Patracelſi) ſeparatum. Hoc nimirum præterquam quod facieſſit in materiam ſeminalẽ , vnde creaturæ exurgunt , quæ non rarò cum primariis dignitate certant, in nutrimentum quoque earundem vergit.

N. Res ſecundariæ ſiunt & nutriuntur ex Excrementis aqueis , terreis &

viſcoſis , ſalinis , &c. Hæc enim cum in ſubſtantiam rei primariæ abire nequeunt, ſecernuntur à parte vtiliori nutritina, inque peculiaria genera nonnunquam mutantur pro diuerſitate matricum, conſuſque cauſarum requiſitarum, diſſerentia. Varia namque ſunt Excrementa, non ſolum ratione trinorum mundi regnorum , ſed & ratione officinarum in quibus ea redundat. Nimirum, quia materia nutritina diuerſarum officinarum elaborationes, diuerſosque maturationis gradus percurrere deſtinata eſt , quorum ſinguli ſibi reſpondentia exhibent excrementa, utique diuerſitatem excrementorum oriri neceſſum eſt. Imò cum omnia in meſura , ac pondere ſint diſpoſita, ſuperabundat nonnunquam etiam nutritina illa materia , ut & hæc ratione peritima ſuppetat excrementitium. V. g. lac in animalibus, melligines reſinæ in arboribus, &c. Hinc ſiunt in macrocoſmo meteoræ & mineralia; in vegetabilibus ſucci, reſinæ, gummi, &c. in animalibus, ſtercus, vrina, lapides, arenulæ, & ſim.

C A P. X I I.

De Tempore productionum natiuarum.

TEmpus ad productionem rerum natiurarum faciens eſt, quo vigent, quorum beneficio productio perficitur, & maximè qualitates facultateſque ſub cauſa efficiente deſcriptæ.

N. Tempus eſt meſuratio curriculum quoruncunque per certa puncta. Nimirum creati quidem Deus omnia in perfectione , verum in gradu infimo, non ſummo, quippe hunc aſſidua cultura

acquirere ſubinde debebant, ab infimo ſc. gradu ſenſim ad æquũ aſcendendo. Inſuper, quia Deus naturam finitam ac temporalem, non ſempiternam ac æuum perennẽ voluit, terminũ quoque ac finem præſinire oportuit, adeoque deſcenſum ab æquũ ad interitum. Internallum igitur inter rei cuiusque ortum ac interitum, conſtituit cuiusque curriculum , diſtinctionis punctis non raris notabile. Diſtinctionis huius

funda

fundamentum est mutatio, quam res quæque in curriculo suo subire est destinata, qua scil. res modo sic, modo aliter, nunc huius, nunc alius natura ac proprietatis deprehenditur, adeoque medicationi nunc aptior, nunc ineptior.

Tempus mensuratur potissimum ad curriculum cæli, cursumque seu motum stellarum & inprimis *Solis & Lune*, ceu luminarium dictorum, tum quoque ad motum planetarum reliquorum.

N. *Et si res qualibet, eo quod curriculum peragit, mutationes diuersas subit ac memorabilibus in semet distinguitur, v. gr. etate iuuenili, virili, senili, periodica rei reuolutione, &c. attamen numeratur tempus maximè ad cursum Solis & Lune, utpote, quorum curricula sunt magis conspiciua, vniuersaliora, distinctiora; unde & esse in tempora inbentur, Gen. 1.*

Cursum *Solis* exhibet, 1. annum, 2. anni quadraturas; ver. æstatem, autumnum & hyemem, 3. menses Solares, 4. Dies & noctes, 5. partes dierum. Videlicet, tempus matutinum, antemeridianum, meridianum, pomeridianum, vespertinum, nocturnum. 6. horas.

Luna cursus exhibet 1. annum lunarem, id est menses lunares, 2. lunæ quadraturas: nouilunium, tempus crescentiæ, in quo excellit prima quadratura, plenilunium, & denique tempus decrescentiæ, vbi occurrit vltima quadratura. E dictis temporum articulis eligendi sunt, qui secum vehunt qualitates ad productionem natiuorum facientes, siue manifestiores eas velis seu vniuersaliores, siue occultiores & speciales.

Sic tempus sationi eligitur, 1. quod ad humiditatem inclinat modicam, nimi-

rum humiditate semen in terram proiectum resoluitur suscitaturque. 2. Tempus Lunæ crescentis. In hoc tamen sunt qui monent, si satio flores intendat copiosos, fieri eam debere quadratura secunda, ac præcipue tribus diebus ante plenilunium, lunaque existente in virgine; sin folia expetantur, sationem instituere iubent post nouilunium. Eadem ratio est insitionis.

Similem curam in animalium educatione rusticos habere deprehendimus: vitulos crescente ☾ natos educationi aptiores iudicant: ineptiores, qui sine ☾, i. e. in nouilunio, vel ☾ decrescente in lucem prognati fuerint.

Quinimo nec abs re erit, ad sationē id temporis eligere, quo saltem luminare alterum, (videlicet quod Planetam semini seminando familiarem, amicitia profsequitur) fuerit in fortitudinibus eiusdem illius familiaris planetæ, vel planeta ipsemet familiaris fortitudines suas obtinuerit. Vide infra c. 25.

N. Agripp. phil. l. 1. c. 12. *Individuorum singulares dotes plurimis insunt, tam mirabiles, quam in speciebus etiam à figura cælestium situque stellarum. Omne enim individuum, quando incipit esse sub determinato horoscopo, constellatione cæli, contrahit cum esse, mirabilem quandam virtutem operandi & patiendi rem mirabilem, etiam præter eam, quam habet à sua specie, cum per influxum cælestium, tum per obedientiam materie generabilium, ad animam mundi, &c. Hæc Agrippa, cui subscribunt quam plurimi alij, inter quos Michael Toxites in præfat. herbarij Carichteriani, & ex hac Poppius in præfat. sui herbarij. Quamquam plurimi sunt, inquit, qui parui momenti æstiment, loca tempora, influentiâsque obseruare, eò quod*
tempus

tempus hoc præ illo nihil prerogative obtineat : attamen probat contrarium ipsa experientia. Hinc futilitates eiusce potius censende sunt ignavorum, quam veritatis indagatorum. Quippe conuincunt nos non

modo agricole, qui arando, serendo, &c. de tempore certo solliciti sunt, sed & hortulani, qui in putandis arboribus, surculis decerpendis, inferendis, tempora sua certa observant.

C A P. XIII.

De Loco productionum natiuarum, & imprimis de Terra & Aqua.

Locus producendorum natiuorum tum locus natalis est, tum locus progressionis, i. e. ubi educantur, sustentantur, viuunt, &c.

N. Mineralia in terra gremio locum natalem tum progressionis sortita sunt. Vegetabilia terrâ in plurimum nascuntur viuuntque: pauciora aquâ; rariores vegetabilibus aliis infixâ crescunt: Animalium matrices partim sunt uteri materni, partim oua, partim his analoga loca terrena, & simil. Loca educationis sunt terra, aqua, aër.

Locus ad productionem natiuarum idoneus est, qui scatet qualitatibus, facultatibus, proprietatibus, materiaque ad productionem aptis. Excellit autem inter cætera globus inferior, i. e. Terra & Aqua, utpote non modo mineralium & vegetabilium, sed & animalium commune receptaculum.

N. Solum ad rerum productiones facit, non tantum quatenus hospitium præbet aptum ac conueniens, sed & præcipuè quatenus calore suo semen inibi ceu in matrice locutionem suscitât, humiditate sua resoluit, ut salina fermentat, proprietate peculiari amat vel odit, adeoque obtinet rationem Efficientis, materia, atque subiecti loci. Expropter prout solum naturalis est facultatibus ac succis ad rei pro-

ductionem inuandam vel retardandam facientibus, ita & ad productionem solum conueniens erit eligendum, videlicet calidum, humidum, frigidum, siccum succis idoneis dotatum, proprietatibus peculiaribus impregnatum. Nec enim ubiuis prouentus æquè felix est.

Hic segetes, illic veniunt felicius vine, Arborei fetus alibi, atque iniussarescunt

Gramina, &c.

Consideratur in solo præcipuè. 1. ubi, 2. quomodo, 3. quare. Nimirum hæc tria non modo rerum variant productionem, sed & non raro rerum productarum qualitates.

1. *Ubi*, i. e. sub qua longitudine, latitudineue sit solum locatum. Hic occurrit soli distinctio. 1. In *Zonas* illas famosas quinque, binas frigidas, binas temperatas, & vnâ torridam. 2. In *Climata*, ratione latitudinis mensurata. 3. In *regiones*, quarum cœlestis constitutio, si ad solem conferantur, ex Geographicis facile addisci poterit. Tales sunt Germania, Gallia, Italia, Hispania, India orientalis, occidentalis, &c. Nimirum singulae regiones partim iuxta sui cœli solique qualitates plantas peculiare producunt, partim iis, quas cum aliis communes habent, feliciorum infelicioresque productionem

ductionem, aliamue complexionem conciliant. Vinum Hispanicum aliud est à Gallico, Gallicanum à Germanico. Similiter & Res vnius regionis, v.g. Germaniæ non vniusmodi sunt. Sic radix ari in locis nostris frigidioribus adeo feruens ac mordax nascitur, vt os & fauces exurat, at quæ in Lydia prope Cyronem urbem, (teste Baptista Porta,) provenit, exteriori forma nostræ planè respondens, dulcis & grata esse dicitur, vt raparum instar homines in cibo sine nocummento eo vti possint. Angelicæ radix in Finlandia acutiorem sapit saporem, quàm hic nostras. Folia Senæ alia mittit Alexandria Ægypti, alia Italia. Vitriolum Vngaricum præfertur reliquis Sic variant & pro diuersitate regionum *animalia*, adeo vt non modo peculiaria sibi nonnullæ regiones vendicent, sed quæ communia sunt felicius producant educantue, imo quoque non nihil ab aliis differre faciant. Adde, quod *plantæ* vel *animalia* ex vna regione ceu patria in aliam ceu peregrinam transplantata, cum hac loci mutatione, simul naturam mutant. Vid. Ioh. Bapt. Port. in phytogn. l. 2. c. 1. 2. 3. 4.

N. Sunt qui regioni cuique data sua esse medicamenta volunt, morbis inibi grassantibus sufficientia, ideoque usum exoticorum cura necessitatem ducunt. Verum enim vero, & si prius non inficer: attamen quia vernaculorum plurimorum naturam ac vires nondum satis compertas habemus, præstat exotica exhibere, quippe experientiâ comprobata, quam vernacula experientiâ difficili expeririunda. Hisce sublatis, vernacula, utpote iisdem influentiis cum incolis affulsa, vernaculisque succis educata, exoticis præferre non dubitamus.

II. *Quomodo*, i.e. quo situ solum sit locatum: siue superficiei altitudinem spectes, qua solum refert montem, collem, planitiem, campum, vallem, & sim. siue cardines mundi, qua ratione solum sitū dicitur versus ortum, occasum, meridiem aut septentrionem: siue radios solares, unde solum fit apricum, vmbrosum, nemorosum. Videlicet horum diuersitate haud parua soli atque inibi nascentium diuersa productio ac natura suboritur. Hanc tamen diuersitatem præcipuè qualitatibus primis dimetimur, dādo montibus, locis apricis, meridionalibus, caliditatem & siccitatem; vallibus, campis, locis septentrionalibus, vmbrosis, nemorosis, frigiditatem, &c. Et hinc montibus locisque siccis prognata, sunt validiora plerunque viribus quam reliqua, minor autem quoad staturam.

N. Hippoc. l. 2. de Diæt. *Quæ ad meridiem sita (regio) ea, quæ ad septentrionem spectat calidior & siccior quod ad solem magis accedat. In his autem regionibus homines & quæ terrâ producuntur, sicciora, calidiora & validiora esse necesse est, quam quæ in contrariis. Item: per se si loca spectes, ad hunc habent se modum. Alta loca & squalentia, quæque ad meridiem spectant, campestribus aequaliter suis sunt sicciora, quod pauciores humidiates contineant.*

III. *Quale*, i.e. vtrum solum macilentum, pingueue, siccum vel humidum, arenosum & sabulosum, vel vliginosum ac limosum sit, vel & dulce, salsum, proprietatibus feminalibus & rationibus peculiariter dotatum.

De Aqua.

Aqua non minus ac terra ad productionem

tionem rerum natiuarum concurrir: præbet enim rebus inibi nascentibus tū domicilium, tum & alimentum, idque non modo quatenus terræ permixta aridam constituit, sed & quatenus seorsim collecta, terræ supernatat.

Considerari itaque iisdem poterit differentis, quibus terræ.

I. Quoad *Ubi*, idem est iudicium quod de terra. Nimirum secundum cœli regionumque differentiam non modo res ipsas, sed & rerum vires differre compe-

rimus, huiusque regionis aquis, has plantas, hæc animalia, alterius alias plantas, alia animalia esse propria.

II. Quoad *Quomodo* non magni ferè est momenti, nisi profunditatem situmque in locis montanis, planis, profundisue spectes: vel & magnitudinem seu amplitudinem aquarum consideres.

III. Quoad *Quale* Aqua est dulcis, falsa, seu marina proprietatibusque peculiaribus insignita. Hûc: aqua lacustris, palustris, limosa, & sim.

C A P. X I V.

De Præparationibus medicamentorum.

Præparatorum productio, dicitur præparatio, quæ est actio officinalis, qua medicamenta parantur.

Huius species sunt.

A.

Acuere seu *acuare*, i.e. rem fortiorem reddere, vel stimulum eidem addere. Sic acuuntur pilulæ grano 1. ac 2. Diagrydij, Trochisc. Alhandal. Gummi. de Gamandra.

Amalgamare, i.e. metalla per ☿ ij viui admixtionem calcinare. Calcinantur autem hoc modo sola metalla, excepto ♂. Vid. l. 3.

C.

Calcinare, i.e. in calcem redigere vel friabile reddere. Fitque

1. Per ignitionem	<table border="0"> <tr> <td>{ Incinerando</td> <td rowspan="2">} Hûc pertinet extinctio rei ignitæ in ∇.</td> </tr> <tr> <td>{ Reuerberando</td> </tr> </table>	{ Incinerando	} Hûc pertinet extinctio rei ignitæ in ∇.	{ Reuerberando
{ Incinerando	} Hûc pertinet extinctio rei ignitæ in ∇.			
{ Reuerberando				

2. Per corro-	<table border="0"> <tr> <td>{ Amalgamando</td> <td rowspan="5">} Hûc calcinatio per illinitionem liquoris corrosiui.</td> </tr> <tr> <td>{ Præcipitando</td> </tr> <tr> <td>{ Fumigando</td> </tr> <tr> <td>{ Vaporando</td> </tr> <tr> <td>{ Cemetando</td> </tr> </table>	{ Amalgamando	} Hûc calcinatio per illinitionem liquoris corrosiui.	{ Præcipitando	{ Fumigando	{ Vaporando	{ Cemetando
{ Amalgamando	} Hûc calcinatio per illinitionem liquoris corrosiui.						
{ Præcipitando							
{ Fumigando							
{ Vaporando							
{ Cemetando							

N. *Exempla singulorum horum modorum in metallis lib. 3. videre licet.*

Candifare. Candifari soli competit sacharo, quod in ∇ solutum, purificatum atque quadantenus inspissatum, in crystallis concrefcit, idque candifari vocat. Imponunt autem solutioni nonnumquam res medicamentales solidas, vt crystallis illis sacharatis obducantur, easque confectioibus adnumerant. Vide lib. 2. c. 47.

Commentare idem est quod stratificare, i.e. corpus metallicum (huic enim soli competit) cemento stratificatum imposito, aliquandiu igni exponere. Vid. lib. 3. in ☉. c. 9.

Circularare, i.e. liquorem in digestionem collocare, vt volatilior ac spirituosior pars continuè eleuari ac recidere possit, adeoque

adeoque quasi circulum transeat, maturiorque euadat. Huius rei gratia certa instrumenta in usu sunt, circulatoria dicta.

N. *Vices circulationis supplere potest iterata destillatio.*

Clarificare potissimum de decoctis ac succis, quæ cum crassis scateant excrementis, clarificatione, i.e. purgatione egent. Clarificationis huius præcipui modi sunt 1. per albumen oui, per digestionem, tum 3. per filtrationem. Vide *infra*.

Per albumen hoc modo peragitur. Albumen oui virgula agitur donec penitus in spumam abeat; Spuma hæc infunditur rebus clarificandis, coquuntur simul vna ac altera ebullitione, vt crassiora albumini adhærescant. Hinc separantur despumando, colandoque, & sim.

Per digestionem quæ fit clarificatio, nihil peculiare habet à digestionem, quæ crassiora feces ve ad fundum paulatim secedunt, vnde per decantationem à liquore separari possunt.

Coagulare. Coagulari dicitur in quod euaporando inspissatur.

Cohobare, i.e. liquorem. destillatum materiæ indestillatorio residuæ, iterum affundere, ac denuo destillare,

Calare, i.e. per colum traicere. Colus autem præcipuè panneus intelligitur nonnunquam quoque linteus.

Condire einmachen. Condire dicuntur quæ sacharofyrupifato, mellivæ (vt horum beneficio diutius conseruentur) calidè immerguntur, vsuique sic immerfa reponuntur. Vid. lib. 2. c. 46.

Conficere. Officinis est saccharo obducere ac incrustare. Vid. lib. 2. c. 47.

Conquassare. Conquassari dicuntur (viridia maximè) quæ pistillo grosse tunduntur & sine puluerificatione pref-

antur.

Conseruare seu conseruifare, i.e. conseruam facere.

Coquere, i.e. elixare.

Coquere in diplomata, i.e. in NB.

Cribrare, i.e. per. cribrum transmittere.

Crystallifare, i.e. in crystallinas formas reducere.

N. I. *Proprium est salium*, quibus & saccharumque addere licet. Videlicet hæc in liquore aqueo soluta, si in frigidum locum reposita fuerint, concrescunt in crystallos. Vbi nota, si nimium liquoris adsit, antequam reponantur, aliquantulum exbalandum esse.

N. II. *sc. Crystallifare est Crystallificationes repetere, donec amplius colligi nequeant.* Nimirum postquam primavice Crystalli exempti fuerint, quia reliquis in liquore scil. restantibus Crystallis liquor disproportionatus est, exhalet nonnihil, hinc reponatur, &c.

D.

Decantare, i.e. liquorem materiæ aliqui supereminentem p rinclinationem effundere. Germ. *abgießen*.

Decupelare idem est quod decantare.

Decrepitare de sale communi & similibus dicitur, quæ cum ad ignem sine fusionem calcinantur, strepitum seu crepitū edunt, Vid. de ☉.

Deliquium. Per deliquium soluere, i.e. rem soluendam in locum humidum collocare, vt per se in liquorem vertatur.

N. I. *Deliquium peragitur felicius* 1. in cella seu loco humido, 2. mense Iunio, Iulio, Augusto, quo tempore cella sunt frigidiores.

N. II. *Nonnunquam promouetur deliquium instillando humorem conuenientem.*

Dephlegmare, i.e. phlegma separare seu abstrahere, quod fit, si phlegma scorsim affegetur, destillando, sin minus, euaporando: competitque spiritibus mineralibus fixioribus, vt Spir. ☿, ☽, ☿, & sim.

Despumare, i.e. spumam demere. German. *abscheumen*.

Destillare, i.e. liquorem vi caloris attenuatum in recipiens appositum prolektare. Modi destillationis vsitatissimi sunt 1. ratione vasorum: per Alembicum, per Retortam, ac per Vesicam, 2. ratione graduum caloris; per Balneum roris seu vaporis (B) per balneum Maris (MB) per cinerem, per arenam, per ignem nudum.

Detonare, *verpüffen*. Detonari dicitur, quod cum flagratione & strepitu calcinatur. Vt Crocus Metallorum.

Digerere, i.e. blando calore fouere.

Dissoluere, i.e. accedente aliquo humore soluere Germ. *aufflösen*. Sic soluuntur salia.

N. Differt nonnullis dissolutio à liquatione, quod hac non nisi vi caloris fiat & plerunque sine accedente humore, illa affusum humorem semper requirat.

Dispensare. Dispensari dicitur compositum, dum simplicia, quæ compositum ingrediuntur, seliguntur, & pro composito inde parando adaptantur.

Dulcorare, *edulcorari*. Dulcorari dicuntur 1. calcinata sale grauida, dum V (vt plurimum calidâ) abluuntur, qua ablutione sal inibi contentum aquæ immiscetur, 2. Dicuntur dulcorari Portiones, addito saccharo, vel syrupo conuenienti.

E.

Electuarisare, i.e. Electuarium facere.

Euaporare, i.e. liquorem calori exponere, vt exhalet humiditas.

Exaltare, i.e. Rei potentiam alterando augere. Vid. fermentare.

Exacinare, i.e. acinos eximere.

Excorticare, id est, cortices detrahere.

Exhalare, idem quod euaporare.

Exprimere, i.e. premendo vel pressura elicere, siue id sola manu fiat, vt decocta exprimi solent, siue certo instrumento quod prælum dicunt.

Extrahere, i.e. beneficio debili liquoris (quem menstruum vocant) proportionalliter affusi, præcipuam rei elicere partem. Vid. l. 2. c. 57.

N. *Extrahere* s. a. i.e. *Extractionem nouis affusis menstruis reiterare*, idque toties quoties menstruum adhuc imprægnari sentitur.

F.

Fermentare *vergæhren*. Fermentari res propriè dicitur, quando euidenter in se resoluitur, rarefcit, maturatur.

N. Ratio Fermentationis hæc est, *Contraria fermentabilia confusa*, i.e. nondum sub vnum dominium ac potestatem, mixturemque exactam redacta, si aliquatenus vi caloris externi resoluta fuerint, vi potentioris facultatis alterantur, atque inde in incertam aliquam temperiem, naturamque spirituosioremeuehantur & exaltantur.

Filtrare. Filtratio fit beneficio vel chartæ bibulæ, vel panni lanei. Ex Charta fit pyramis, quæ tritorio inditur ne concidat. Hinc liquor pyramidi infunditur, vt paulatim per chartam in suppositum vasculum defluat.

Per pannum filtratio fit vel colando, de quo paulo antè, vel separando liquorem à pulueribus suis subsidentibus. Ad hoc duo itidem requiruntur vascula, alterum ex quo, alterum in quod liquor filtratur. Prius quod filtrandum continet,

continet, inclinatur ad latus, eique imponitur frustulum panni vt limbus alter extra vas dependeat: posterius supponitur, vt liquorem per panniculum paulatim defluentem suscipiat. Similem modum infra docemus oleum ab aquis separandi:

Fixare i.e. quod volatile est fixum reddere. Fit vel per se scilicet iteratis destillationibus, & sublimationibus, vel addita alia aliqua re, cuius vi fixatio perficitur.

Fumare, i.e. per fumum Mercurii vel Saturni calcinare, solorumque est metallorum.

N. *Nimirum Mercurius vasi calcinatorio orificij angustij inditus apponitur igni nudo: vt fumus exalet. Orificio imponitur Metallum calcinandum laminatum, vt fumo Mercurij transeunte friabile reddatur.*

Fundere idem in Chymia est quod liquare seu ad ignem liquefacere: proprieque de salibus ac Metallis dicitur.

G.

Granulare, i.e. in grana reducere.

I.

Imbibere, i.e. est. rem humiditate per vires potare, seu liquore rem humectare.

Impastare, i.e. miscere vt fiat instar pastæ seu massæ.

Imprægnare, idem ferè est quod imbibere.

Inaurare, i.e. folijs auri obducere. Inaurari autem etfi de alijs quoque medicamentorum formis dici possit; E.g. de Martio pane, & sim. Tamen potissimum de pilulis dicitur. quæ in Scatula (rotunda) clausa adiecto folio auri, circumagitur, donec auro illo obducantur. Germ. *vergûlden*.

Incerare, idem est quod imbibere.

Incidere. Inciduntur herbæ forcipe: duriora, vt ligna, radices duriores, cortices; cultro.

Incinerare, i.e. comburere ac in cinerem redigere.

Infundere, i.e. materiam liquori immergere.

Insolare, i.e. macerare vel ☉ lis, vel alio calore tepido.

Interpassare. Interpassari dicitur de sacculis seu fomentis siccis, idemque est quod interfuere, ne materia inclusa conglomeretur, cuius rei gratia quoque gossypio pulueres suscipi solent.

L.

Lenigare, i.e. super porphyretico lapide in tenuissimum puluerem (Alcohol) redigere.

Lauare, i.e. liquore (aquâ) ablucere, vt res purgetur ab immunditie. Lotione autem opus habent tam ex mineralibus, quam ex vegetabilibus & animalibus nonnulla. Vt patebit. l. 2.

N. *Instituitur nonnunquam lotio, vt res imbuatur qualitate aliqua.*

Limare, i.e. lima in scobem redigere, quam limaturam dicunt.

Liquare, i.e. vi caloris fluidum facere, Germ. *fließend machen, schnielsen*. Competit Metallis, salibus, pinguedinibus, & sim. interdum tamen idem est quod per deliquium dissoluere.

N. *Quomodo differat à dissolutione. Vide supra.*

M.

Macerare idem est quod digerere.

Malaxare, Malaxari dicuntur Emplastra dum in massam subiguntur, siue id manu fiat, siue pilâ vel simili instrumento.

P

Præcipitare. Præcipitari dicitur, uod in liquore solutum, incrassatumque ad fundum secedit.

E 3

N. Non

N. Nonnullis denotat totum actum calcinationis per liquores corrosivos: siue calx per se subsideat, siue exhalatione humiditatis, siue instillatione alicuius rei repercurientis. Vid. Beguinum.

Preparare pharmacopæis est rem minutissimè læuigare ac aqua aliqua cordiali imbuerè. Vid. l. 2.

N. Dicitur itidem de radicibus nonnullis, &c. quæ in aceto macerate exsiccantur, E.g. Rad. Ari.

Puluerifare, puluerare, i.e. in puluerè redigere, siue terendo. siue læuigando id fiat.

Purificare, i.e. à fordibus seu inquinamentis (crassioribus) separare: fitque lauando, clarificando, filtrando, digerendo. Vide clarificare.

Putrefacere idem est, quod digerere.

R.

Radere: schaben, fit instrumento aliquo acuto, E. g. cultello, vitro, lima, & sim. quo res rationi subiecta in rasuram redigitur.

Rectificare, i.e. denuo blando calore destillare, vt pars magis spirituosa ac volatilis eliciatur, relicto phlegmate seu parte aquosâ in fundo. Sic rectificantur aquæ stillatiæ, spiritus.

Resigare, idem est quod depurare, competitq: potissimum saccharo. Vid. l. 4. class. 4.

Reverberare, i.e. rem aliquam vi flammæ cremare, quæ infra ac supra illam ambiat.

Rotulare, i.e. Rotulas conficere, Vid. l. 2. c. 69.

S.

Salificare, i.e. Sal conficere.

Sicare idem est quod incidere.

Separare, i. e. res heterogeneas mixtas & confusas segregare. Vt acutissimum autem est separare oleum ab aqua, quod

fit i. per Tritorium angustî orificij in fundo, quod orificium aqueo liquori utpote grauiori primumque defluenti aperitur, postmodumque obturatur, oleumque restans sigillatim colligitur.

2. *Per gossypium seu lanam. Nimirum repletur vitrum angustî orificij, aqua & oleo confusis, ad summum vsque, siniturque, vt oleum supernatet. Hinc apponitur vitrum humilior, gossypiumque seu lana vtrique imponitur, vt vno termino oleum tangat, altero in vas appositum dependeat. Sic delabitur oleum per gossypium, in appositum vasculum humilior. 3. Per chartam bibulam. Nimirum transit aqua restatque oleum.*

Sigillare hermeticè, i.e. vitrum fusione claudere.

Stratificare, S. S. S. (i.e. Stratum super stratum) facere idem est ac Metallum laminatum & pulueres stratificando, alternatim struere. Nimirum primo sternendum est stratum pulueris, hinc imponenda lamina metallica, iterum puluis & sic deinceps, donec puluis stratum claudat.

N. I. Nonnunquam loco laminæ puluis Metallicus sumitur.

N. II. Beguino stratificationis vox totum calcinationis actum comprehendit, quo lamina stratificata igne friabilis reditur, quod & cementare dicunt.

Sublimare, i.e. rem volatilem siccam in sublime eleuare, vt seorsim haberi possit. Res illa eleuata vel sublimati nomine effertur, vel florum nomen adsciscit.

T.

Tabulare. i.e. Tabulas vel morsulos conficere. Vid. l. 2. c. 69.

Terere, i.e. Conterere, pila contundere.

Torrere, i. e. in patella vel sartagine ferrea

V.

ferrea igni exposita medicamenta continuè agitare, vt humiditas absumatur. Sic fit Rhabarbarum tostum.

Trochiscare, i.e. Trochiscos facere.

Vitificare, i.e. in vitrum redigere. Vid. Vitrum § ij.l. 3.

Volatilizare, i.e. Volatile reddere.

C A P. X V.

De Principiis Chymicis.

Circumstantiæ præparationis itidem, vt in natiuis productionibus sunt Principia chymica, causa Efficiens, Materia, Tempus, Locus.

Principia chymica voco, in quæ res naturalis arte chymica resoluitur, tanquam in simplicissima. (artificialia.) Suntque Oleum, Spiritus, Sal, Phlegma & Caput mortuum, &c. quorum descriptiones aliunde petere licet.

N. Nihil tritius est apud chymicos quam sua asserere principia, ☉, ☿, ♀, quibus alij addunt ☿ ac phlegma; illa cherionia appellant, i.e. facultatibus efficacioribus ac insignioribus prædita; hæc relollacea, i.e. qualitatibus insignibus destituta. Verum enimvero ubi in rem exactius inquiritur, quid statuendum sit, nihil solidi fere inuenitur. Quod enim nonnulli id, quod oleosum est, sulphuris titulo nominant; quod vaporosum, mercurij; quod concretione, salis; id sagacioribus minimè satisfacit. Nam sciunt, dari & sulphureū quod nequaquam oleosum, vt ∇ vitæ, & sim. Similiter dari norunt & vaporosum, quod tamen à ♀ rio distinctū, vt phlegma in stillatitiis: quinimio quæ plurima dantur, quæ parte oleosa prorsus destituuntur, num ergo ☿ & ☿ e? Nec minorū difficultatum sunt, quæ declarandi gratia adducuntur exempla, desumpta à ligno combustili, à vegetabilium anatomia. Videlicet in primo exemplo ☿ representari volunt

butyro; ♀ m sero; Sal, Caseo. In secundo, ☿ vocant, id quod flagrat, mercurium quod fumat, Sal quod in cinere remanet. In anatomia vegetabilium manifestari aiunt, oleum i.e. ☿ aquam, i.e. ♀ m, & cinerem salè granidum. Verum, quis nescit? sero plus salis inesse, quam ipsimet caseo: fuliginem, (quæ fumus congelatus) & oleum, & sal, & aquam spirituosam in se continere: E vegetabilibus esse, quæ ne guttam olei exhibeant. Relinquuntur itaque intricata adhuc difficultates, è quibus vt nos extricemus, hanc nostram opinionem cordatis submittimus censendam. Materia præexistens rerum natiuarum, siue semen velis siue nutrimentum, est humidum quoddam spirituosum. Humidum intellige non humorem meracum, sed coagulabilem, adeoque partium terrestrium participem. Confer Gen. 1. En habes Spiritum, ignis ac sulphuris nomine, ob naturam qua ignem emulatur, nonnullis dictum, aliis formale principium: habes Aquam, habes Terram. Hæc tria in primordio rei informiter confusa quidem existunt, verum deinceps vi spiritus paulatim elaborantur, exaltantur, incrassantur, adeoque ex parte viscosam induunt consistentiam, salinâ naturâ granidum, ex parte quoque in naturam secernuntur liquidam & aridam, qualitatibus materialibus solum præditam. Salina illa natura, una cum portiuncula potiori viscosæ illius materia exaltatur sub-
indico

inde ulterius, spiritualisaturque, i.e. spiritualem maturioremque paulatim induit naturam, viribus naturæ rei correspondentibus, efficacem, idque substantiâ prout natura ordinat diuersâ, spirituosâ scil. oleosâ, & sim. En phlegma, terram mortuam, tartarum, sal & ex his spiritum vel oleum, aut aliquid his analogum. Si itaque liquidum spirituositate destitutum appellare libuerit mercurium,

est contra spiritum vel oleum sulphur, modo de re constat, de nominibus nemini bellum indicandum. Et hæc mea est de principiis Hermeticis opinio, ad cuius assertionem etsi adducere queam, quomodo sal in spiritualement naturam euehatur, Spiritus est contra in salinam naturam figatur, (e.g. inferuescentia & acescentia liquorum spirituosorum) attamen compendij studio iis supersedeo.

C A P. XVI.

De causa Efficiente seu preparante interna.

Causa efficiens præparationum itidem interna & externa dari potest, præcipuè tamen in his externa consideranda venit.

Interna est materiæ vel aptitudo, vel & facultas simul operatiua.

Aptitudo est dispositio, qua materia habilis est ad sustinendam elaborationem suscipiendamue formulam medicamenti, quæ intenditur.

Facultas est internum aliquod agens, quo nonnullæ præparationes opus habent, ut perficiantur.

N. In præparationibus officinalibus

aliæ sunt mera artificialia, ut pulverisatio, confectio, &c. aliæ cum naturalibus coniunctæ, ut fermentatio, crystallisatio, & sim. Illæ non nisi aptitudinem requirunt; hæc insuper internum agens. Aptitudo illa nisi materiam præparationi subiectam committetur, incassum præparationi res subiicitur. Modi autem præparationum ut varij sunt, ita variæ quoque dictæ aptitudines: Singuli nimirum modi singulas præsupponunt aptitudines: crystallisatio scil. sal crystallisabile, fermentatio materiam fermentabilem, destillatio, materiam humore exhalabili pregnantem, &c.

C A P. XVII.

De Qualitatibus Elementalibus & præcipue de calore.

Efficiens præparationum externa primaria est Pharmacopæus arte præparandi instructus, de quo nihil in præsentatæ nisi quod industrium diligentem & patientem eum esse oporteat.

Secundariæ sunt tum requisitæ qualitates, tum instrumenta.

Qualitates hic ut in productione naturalia considerantur, Elementales, salinæ, & proprietates peculiare. Verum cum ultimæ hæc origine eadem sint, quæ supra de descriptione illarum hic excusamur.

Inter qualitates elementales communissimus

munissimus est calor, hinc humiditas, tandem siccitas & frigiditas.

Calor facit ad calcinationem, confectionem, destillationem, digestionem, euaporationem, fermentationem, reuerberationem, sublimationem: humiditas ad dissolutionem, extractionem: frigiditas ad candificationem, crystallisationem:

Ratione *causarum* { 1. Solis,
calor est { 2. Fimi putrescentis,
 { 3. Ignis qui

siccitas ad exiccationem, trochiscationem, &c.

E qualitatibus dictis quia solus calor præ reliquis artis directorio subiicitur, eam solum hic descripsisse sufficit.

Distinguitur calor vel ratione *causarum*, quibus efficitur, vel ratione *modi adhibendi*, vel ratione *intensionis remissionis* sue.

Ratione *modorum* quibus ignis adhibetur, calor vel est:

I. *Balnei Roris seu vaporis*, i.e. qui fit beneficio vaporum, ab aqua calefcente eleuatorum, ac Vasculum cum materia ambientium. *V.*

II. *Balnei Maris seu Maria*, i.e. qui fit mediante aqua calefcente, cui Vasculum cum medicamento præparando impositum est. Hic mitis communiter censetur ac gradus primi.

III. *Cineris*, qui fit calefcentia cinerum, fortiorque intelligitur, quam præcedens, estque gradus secundi.

IV. *Arenæ*; Fit mediante arena, notatque communiter adhuc fortiorem ac gradum tertium.

V. *Ignis nudi*; Fit sine interueniente medio, accensis prunis vel lignis flagrantibus. Huc pertinent.

VI. *Circularis*. Fit igne carbonum vas ambientium.

VII. *Reuerberatorius*, quando flamma materiam vndique ambit & lambit.

VIII. *Suppressionis*, quando infra ac supra ignis adhibetur,

Ratione *intensionis vel remissionis* Calor est vel

Gradus I. Mitis ac blandus.

II. Actior ac intensior.

{ Lampadis,
{ Carbonum,
{ Flammeus, &c.

III. Fortior ac vehementior.

IV. Fortissimus.

N. I. Gradus 1. *mensuratur communiter* *N.* 2. Calore cinerum. 3. *Arenæ*. 4. *Ignis nudo*, non quod necessarium simpliciter sit gradus singulos, non nisi dictis modis administrare, quippe uno eodemque modo plures gradus peragi possunt. E.g. *NB* gradus 1. & 2. Cineribus & arena, gradus 1. 2. & 3. igne nudo, gradus omnes: sed (ut dictum supra) per calorem *NB* intelligendus est, calor in gradu i.e. mitis ac blandus; per calorem cinerum gradus 2. i.e. acrior ac intensior, &c.

N. II. Singuli gradus magnam obtinent latitudinem, quam communiter principio, medio ac fine cuiuslibet gradus circumscribunt. Verum enimvero, cui volupe fuerit plurimas caloris differentias in singulis gradibus distinguere, certo instrumento id assequi poterit, facto ad imitationem instrumenti, quod aeris calor intensior ac remissior notari à nonnullis solet; perpetuum mobile vulgò vocant, s. *uranoscopium*.

N. III. Moderamen ignis fit afflatu aeris, quem moderatur attractio per ostiola, & præcipue exspiratio per spiracula. Hinc, quanto copiosior afflatus & exspiratio permittitur, tanto fortior euadit

ignis ac calor, &c. His itaque delibatis, adhibendus est gradus caloris preparationi conueniens. Intensiore enim calore, uti medicamentū comburendo corrumpitur, ita

remissiore minus commodè tractatur. Prestat tamen in defectu caloris peccare, quam in excessu: illud quippe diuturniore igne refarciri potest, hoc neutiquam.

C A P. XVIII.

De Facultatibus fortioribus siue salinis.

Non parum utilitatis preparationibus conferunt facultates fortiores, quas salinas vocare libet, videlicet vis *acida, amara, dulcis, stiptica, corrosiua, & eiusmodi sexcenta*, quippe harum ope utimur in facilitandis fermentationibus, in peragendis corrosionibus, præcipitationibus. Quinimo earundem opera perficiuntur extractiones, digestiones & huius generis operationes aliæ.

N. Dicimus salinas 1. quia *salis naturam* referunt. 2. quia *peculiari nomine* adhuc destitute sunt. Etenim quod à saporibus nomina ferà mutuent, mutatiua illa sunt non genuina, idque fit partim similitudine operationis, qua dictæ facultates materia preparandæ sese insinuant, eamque afficiunt, non secus ac sapes linguam, spiritusque gustatiles: partim fit idem, quia sapes ferè comites habent.

Facultatum harum ratione celebrantur, *salia, tartarum vini, feces vini &*

cerenisia, sa, saccharum, fermentum panis, &c.

Hûc pertinent & *menstrua* dicta, liquores, scilicet ob facultatem hanc apti resbus infusis sese insinuare, eas penetrare, potiorēque illarum pertem elicere & imbibere; de quibus lib. 2.

Huius itidem farinæ sunt aquæ *caustica & corrosiua*, dictæ aquæ *fortes, regia*, & sim. utpote, quæ pollent vi & facultate metalla corrodendi, inque limpidum liquorem soluendi, idque non alia quam salina illa facultate.

Eiusdem quoque generis sunt *pulueres cementarii*, uti & *Mercurius viasus*, quorum facultate eadem metalia redduntur friabilia.

Hûc pertinent quoque *aceta*, aliique liquores *minerales acidi*, quorum auxilio magisteria fiunt. Verum, quia de his lib. 2. suis locis plenius agitur, sufficit hæc saltem hîc terigisse.

C A P. XIX.

De Instrumentis Pharmacopoëticis.

Instrumenta medicamentorum preparationi inseruientia varia sunt, differuntque non modo ratione officij, sed &

materia formæque inde dependentis diuersitate.

Officij ratione alia medicamentorum præpara

præparationi, alia asseruationi inferuiunt.

Materia respectu, sunt alia ex lapidibus, alia ex terris, vitris, metallis, lignis, corio, linteo, panno, &c.

Hinc Canon:

Instrumenta (maximè quibus immediatè res attingitur) quatenus variant diuersitate materiæ, eatenus faciunt quoque diuersimodè ad medicamenta aptiora ineptioraque constituenda. Ergo

I. *Vitrea* reliquis ferè omnibus soliditate atque adeo conuenientiâ præferuntur. Corrosioni quippe æquè resistunt ac penetrationi. Veruntamen quia nonnunquam minùs fortia sunt, quam vt præparationi sufficere queant, & reliquis vti cogimur.

II. *Terrea* succedunt vitreis magis minùs. Variant enim quàm maximè soliditate, raritate, durabilitate, & sim. vnde aptiora vel ineptiora quoque æstimantur. Eligenda itaque hæc pro re nata. Nostratibus probantur inprimis fictilia ex certa quadam terra Hassiæ, quam VValburgicam vocant, cui tamen, ni sit præstantior minimè cedit terræ genus in vicinia Marpurgi fossa, ex qua vrcei vsus ibidem creberrimi, formari solent.

III. *Metallina*, solida quidem sunt, vt penetrationem non admittant, attamen quia medicamentis spirituosis, acidis, acribusue qualitates suas impertire apta nata sunt, in horum præparationibus, nisi peculiariter intentioni inferuiant, euitantur.

IV. *Standum* tamen in hoc reliquis præstat, vnde quoque vesicas cupreas eo obducere solent, quo minus qualitate sua vitriolata, quæ inibi destillantur, spirituosæ, inquinent Sic inidonea quoque sunt instrumenta metallina, præpa-

rationibus Mercurij, & similibus.

Forma instrumentorum varia existit, prout illorum officium requirit, materiaque permittit. Nos vñtiora synopsi damus Suntque.

Agitaculum, ein *Agitacul*, i.e. ein *Ruehrpistill*.

Ahenum, *Kessel*.

Alembicus, *Alembic*.

Ampulla, *Krug*.

Arcula, *Eadlein*.

Capsula, gedrehere *Büchse*, darinn die *Glaser* veruuhret.

Catillus, *Rost*.

Catinus, *Capell*.

Circulatorium, *circulier-Glass*.

Huius species sunt Pelicanus, & sim.

Cochleare, *Leffel*.

Colatorium, *colus*, ein *Seib Tuch*.

Concha, *Glasschalo*.

Cornuta, *Retorta*, *Matratium*, *Retort*.

Cribrum, *Sieb*.

Crucibulum, *Schmelztiegel*, *Goldschmiedstiegel*.

Cucurbita, *Kolbe*.

Diploma, i.e. *MB*.

Excipulum, *Vorlag*, *Recipient*.

Fictile, *Hafen*.

Filtrum idem quod *colus*.

Forceps, *Zange*.

Infundibulum, *Einguss*.

Lagena, *Flasche*, *Krug*.

Lebes, *Tiegel*.

Lima, *Feile*.

Malleus, *Hammer*.

Manica Hippocratis, German. *spitziger Beutel*.

Matratium idem quod *Retorta*.

Mortarium, *Märsel*.

Olla, *oilula*, *Hafen*, *Hefelein*.

Phiola, *Phiol*.

Pila, *pistillum*, *Stesser*.

Prophyrites, *Reibstein*.

Prælum, *Presz.*Pyramis, *Engiesz, Gieszpuckel.*Pyxis, *Elischse.*Receptaculum, *Recipient, vorlag.*Retorta, *Retort.*Rudicula, *Rührsteck.*Rutabulum, *Rührhacke.*Sacculus, *Sack, Beutel.*Scatula, *Schachtel.*Separatorium, *Scheidetrichter.*Setaceum, *Haarensieb.*Spatula, *Spatel.*Tabula, *Brett, Tabulierbrett.*Tegula, *Müffel.*Torcular, i.e. prælum, *Presz.*Tritorium, *Trechter.*Vitrum, *Glasz.*Vrceus, vrceolus, *Krug, Krüglein.*

C A P. X I V.

De Fornacibus.

AD pharmacopoëtica instrumenta pertinent quoque *Fornaces.*

Fornaces seu furni sunt instrumenta operationibus quæ Δ e peraguntur, destinata, ut inibi calor coërceri gubernarique commodè possit. Suntque furni pro diuersitate officiorum, formarumque, nominibus quoque diuersis insigniti. Nimirum est *probatorius, reuerberatorius, destillatorius, anemius* seu *ventosus*. &c. Præ reliquis tamen, maximè famosæ sunt *Fornax acide* ut appellant, siue piger Henricus (*fauler Heintz.*) Item Athanor Henrici Conradi, quarum constructiones, aliàs satis innotuerunt. His non sine causa accenseri poterunt, fornacum duo genera, quarum *altera* Londini apud ingeniosissimum illum *Cornel. Drebbellium* (iam *in æzylis*) videre contigit, adeo ingeniosè coagmentatam, ut pro diuersitate ac intensione caloris, ipòte aperiretur recludereturque; artificio, me hercle sagacissimo, cuius fauore calor vnus eiusdemque tenoris continuò conseruari exactissimè poterat. Huius fornacis constructio, hoc fundamento nitebatur. Vitrum adhibitum fuit, adim-

pletum aliquota parte cuiusdam certæ materiæ, quæ apta fuit gradibus caloris intensioris attenuari ac ampliari, remissioris econtra condensari ac contrahi. Hæc itaque materia dum intensiore caloris gradu attenuaretur, ampliabatur aliquantulum, eleuabatque simul in altum bacillum, & hoc mediante in altum tollebat simul operculum, quod ostiolo fornacis interno superadditum fuit, ut calorem à prunis substratis ascendentem moderaretur.

Alteræ fornax quam diximus destillatoria est, spiritibus mineralibus dicata. Nimirum hi sine Retorta, solius illius fornacis beneficio eliciuntur. R. mineral, quod spiritum halare aptum est, iniicitur per vices super prunas per ostiolum fornacis, statim ab iniectione occludendum. Hinc fumus seu vapor vi ignis nudi eleuatur, qui in rostris longis firmiter fornacis summitati, (ut rostrum capitello inseritur) infixis, diutina mora ac frigidityte itineris condensatur in liquorem, inque appositum receptaculum delabatur. Aptæ sanè fornax spiritui ☿ is præparando, nec non & spiritui ☽ i. Reliquis autem

autem, cum sine admixtione alieni mineralis vix perfici queant, non adeo commoda; compositi enim potius quam simplices spiritus inde resultant.

CAP. XXI.

De Materia Præparatorum.

Materia præparandis medicamentis ipsæmet res naturales quæcunque existunt, siue natiuæ adhuc sint, siue artificis manu iam antea elaboratæ; imò ipsæmet *medicamenta*, strictè sic dicta, aliorum medicamentorum materia suppetunt, adeoque materiarum series coincidit cum rebus medicinalibus suprarecensitis.

N. *Materia medicamentorum* æquè latè patet ac ipsa *Natura*, resque naturales quacunque comprehendit ab vniuersali illa materia ad res particulares descendendo, adeo vt, ipsa natura vniuersalis, seu si manis, vniuersale illud *Natura* subiectum inspissatum scil. adhuc tamen

in sua vniuersalitate constitutum, industriam medici manum non auersetur. Verum nos particularibus contenti, Vniuersalis illius competitors, ad authores remittimus, qui peculiaribus tractatibus modum docuerunt, Vniuersale illud subiectum acquirendi, elaborandi, atque in naturam vniuersalis medicamenti beneficio seminis solaris transplantandi, inter quos videtur præcipuus Hermetus Trismegistus in sua Tabula smaragdina, & huius velut interpres Lullius in Testamento, quibus ex Neotericis præcipuè Dionysius Zaccharius Gallus, Sendinogius, Comes Treuisanus & similes subiungi possunt.

CAP. XXII.

De Tempore & Loco.

Tempus in præparationibus conueniens eligere, non minus ac in natiuarum productione, momenti est non parui.

Conuenientia hæc temporis spectanda itidem, tum in qualitatibus manifestioribus, tum in occultioribus influentiis

Qualitatum manifestiorum ergo id temporis eligendum quo vigent, quæ ad præparationem quoque modo faciunt. Sic eligendum tempus moderatè calido humidum; ad resolutionem, attenuatio-

nem, fermentationem, digestionem: frigidum; ad condensationem, coagulationem: humidum; ad liquationem, humectationem, destillationem: siccum; ad exiccationem,

N. Hinc monet Crollius liquationi tempus eligere, quo per antiperistasis locus liquationis subterraneus humidior fuerit, idque determinat Iunium, Iulium, Augustum. Sic inseruit tempus pluuiosum præparationi spiritus ☿ is per camp. tempus serenum seu frigidum & siccum conuenit

trochiscationi agarici, quippe trochiscos reddit candidos, quos tempus contrarium pallidos exhibet. Cerevisie fermentationem tempus moderatè calidum promouet, frigidum impedit, &c.

Occultiorum influentiam ratione præparatio peragenda vel saltem incipienda est 1. & imprimis, cum luminare (☉ aut ☽) familiare videlicet seu amicum planetæ rei scil. præparandæ sympathico (vide cap. 8.) fuerit in fortitudinibus vel dicti planetæ sympathici vel propriis

N. Luna præcipue hic spectanda.

2. Cum Planeta rei præparandæ familiaris fuerit in fortitudinibus.

E.g. Quicumque in Saturno feliciter laborare satagit, eo tempore laborem inchoet, quo ((Saturno amica) fuerit in fortitudinibus Saturni, vel quo Saturnus ipse in propriis fortitudinibus constituitur. Et hinc tabulam suam transmutationum metallicarum compilauit Paracelsus lib. 4. Archidox. magic.

De Loco.

Locus præparationis, quem Laboratorium dicimus, itidem conueniens eligendus est, calidus, humidus, siccus, perspirabilis, non perspirabilis, &c. prout res exegerit.

C A P. X X I I I.

De Collectione natiuarum, ac primum de tempore secundum ætatem & turgescientiam rerum.

Collectio rerum natiuarum est, quâ e sua productione sumuntur, i. e. qua mineralia è suis mineris fodinisque eruuntur; Vegetabilia eradicantur, decerpuntur, &c. Animalia perimuntur.

N. Non parum discriminis collectio natiuis infert, prout scil. illa decenter vel indecenter peracta fuerit.

Res colligendæ sunt solæ natiuæ: In præparatis enim à cura hac excusamur, nisi forte volupe sit laboriosarum ac diuturnarum operationum finè obseruare, eamque simili ratione, quam de natiuis habemus, metiri.

Circumstantiæ collectionis præcipuæ sunt colligendi Tempus ac Modus.

Tempus conuenientius natina colligendi colligitur à rei colligendæ aptitudine, tum à constitutione macrocosmica aptitudinem inferente.

N. Finem duplicem collectio respicit, videlicet afferuationem & usurpationem. Prioris gratia res colligenda est eo temporis fluxu, quo vigent qualitates facientes ad durabilitatem, ut sunt siccitas & caliditas, vel & moderata frigiditas, & sim. Posteriori ratione, colligi vult dum qualitates vigent, medicationi aptiores

Rei colligendæ aptitudo ab optimo suo statu dependet, siue is trutinetur ætate, siue periodicaturgescentia. E.g. animalium nonnullorum. Vtraque hæc siquidem tempus statum fere obtinuit secundum 1. 2. menses mensurabile mensis is collectionis statuitur genuinus, in quem ætas illa, turgescenciaue vigorosa inciderit.

Ætas collectioni conuenientissima censetur ætas consistentia seu maturitatis, cui succedit ætas ac crescentia, præcipue

cipue si consistentiæ appropinquat. Verum enimvero non raro spectanda quodque est rei substantia, & inde dependens aptitudo elaborandi.

Sic è *mineralibus*, optima quidem sunt metalla, quæ maturuerunt, verum tractabiliora, i.e. præparationi aptiora habentur, quæ minùs matura.

E Vegetabilibus colligendi sunt flores cum expliciti pulchritudine sua luxuriant, nec tamen marescunt, de quibus peculiariter lib. 4.

N. *Excipe paucas, quæ in gemmis colligere volunt, ut sunt Rosa, & sim.*

2. *Herba seu folia*; cum odore, colore, sapore, cacumineque superbiunt, & florescentiæ appropinquant.

N. *Herba ut plurimum cum floribus asseruantur, colligende itaque hæ erunt, quando floribus triumphant: ut Calamentum, centaurei, chamædrys, chamæpitys, daucus, fumaria, maiorana, organum, polium, pulegium, serpillum, thymus. &c.*

3. *Semina*, cum matura bene sint, siccarique ceperint, nec tamen exciderint.

4. *Fructus*, ad medicinam cum bene maturuerunt, ad asseruationem antequam omnino maturecant, ut neque omnino acerbi sint, neque ad iustam maturitatem peruenerint. Bapt. Port. in Mag.

5. *Radicum* variat collectio, Quædam quouis anni tempore excerpta hyeme effodi possunt, ut radix acetosæ, althææ, angelicæ, apri, asari, buglossæ, cyclaminis, dracunculi, cichor. &c. quas tamen præstat vere colligere

Aliæ colliguntur antequam in stolones abierint, scilicet circiter finem Martii, ut rad. acori, agrimon. alth. anon. aristoloch. ari. asparag. betonic. bistort. bryon. carlin. caryophyllat. centaur.

chelidon. vtr. Cyper. dictamn. alb. ellebor. nigr. enul. eryng. esul. farfar. filipend. filic. fœnic. gentian. gramin. physcym. imperator. Ireos, lili, mandrag. mei, nymph. orchid. pétaphyll. petasit. petrosel. maced. pimpinell. pæon. polypod. raphan. sylu. rubi, rusc. saxifrag. ligill. Salomonis. scrophular. symphyt. valerian. vincetoxic.

N. *Sunt qui præstare volunt, radices cunctas autumno colligere, ubi folia deciderint, viresque in radices recesserint: alij veris initio, priusquam in caulem ac folia eruperint: alij ubi planta in vigore ac maturitate fuerit, quippe ut integra plantæ, ita & radicem cum maturitate vigora censent, cui cõsentire videtur Dioscorides, ubi radices colligere docet incipiente foliorum defluuio. Veram præstat intueri radicem naturam, & ex hac colligendi tempus metiri. Sunt nimirum quæ maturitate lignosam adsciscunt substantiam, hæ præstat antequam matuerint eradicare: sunt e contra quæ citra mutationem dictam adolescunt, eas etiam effodere licet, postquam planta bene fuerit matura, foliaque inceperint defluere.*

Animalium vigor ratione ætatis, est cum ad viritatem seu consistentiam peruenerint: sunt tamen rariora quæ puerili ætate in usum veniunt, de quibus singulis lib. 5.

Animalia quæ periodicam turgentiam patiuntur eo ipso turgentiam tempore vigere censentur. E.g. Cervus vigoris ratione conuenientius perimitur circiter Ægidij festum, ut pote quo turgescit. Idem circiter tempus, videlicet, quod includitur duobus festis Mariæ sacris, colligi solent oua, per hyemem totam asseruari apta.

CAP. XXIV.

De colligendi tempore secundum constitutionem cæli vniuersaliorem.

MAcroscopica constitutio rerum natiuarum colligendarum spectatur, partim qualitativis vniuersalioribus seu manifestioribus, partim influentiis stellarum specialioribus seu occultioribus.

N. Qualitates generaliores spectant potissimum rei durabilitatem: influentia specialiores potissimum vires concernunt. Adde & hoc, quod prius illud tempus vniuersalius seu communius sit, plurimaque sublunaria, ne dicam cuncta, concernat. Posterius, particularius seu specialius, respiciensque solas res familiares.

Tempus colligendi natiua qualitatum vniuersalium ratione, censetur aptius, moderatè frigidum & siccum, serenumque, hinc tempus balsamicum, luna decrescens, matutinum, autumnale uti & quod Planetarum situ, frigidum ac siccum arguitur.

N. Paracels. tr. 1. Philos. pag. (mihi) 309. De diuersitate temporum, mutationibusque virium (inde) crescentium, vel decrescensium philosophari, primum scire refert, tempora anni esse diuersa & pro diuersitate temporum vires quoque rerum omnium augeri minuiue, &c. Et paulo post: Hec itaque cum sine contradictione vera sint, sequitur non semper bonum esse, argillam ac lutum, fodere lignum cadere, multo minus herbas colligere, fructus decerpere, radices eradicare, balsamos ac gummata deradere, cuncta hac peragi fas est, tempore balsamico, certis nempe, certis aspectu lune ac aliorum signorum, certaque diei hora. Ut autem constet, quamam vera illa

balsamica tempora sint, quibus vires integre conservari possint, ut munia à putrefactione, primo inter tempora anni præsum autumnus & præcipue September & October; luna decrescens & inprimis dies decrescens; tempus matutinum, quando lucefit. Etenim quemadmodum homo interdum laborat, laborandoque lassatur, debilitaturque, noctu autem post labores absolutos quæti somnoque inhiat: ita quoque omnia, radices scilicet & herbe, &c. Quippe cuncta humi nascentia operantur cum sole, quiescunt cum luna. Porro sicut homo post sufficientem somnum, sanus, fortis vigorosusque exurgit; ita & fructus vniuersi post noctem mediam (non ante nec interdum.) Exemplum præest fructus arborum; Poma si tempore decerpantur balsamico, durabiliora ac minus corruptibilia sunt secus ac aliàs: imò, singuli fructus decerpti post mediam noctem, vel saltem ante solis ortum maximè durabiles existunt. Similiter sese res habet, si id (colleccio) fiat in signis terrenis ♄, ♀, ♀, ac luna decrescens ut dictum. Nam hisce temporibus non luxuriat superflua humiditas nascentium, qua corruptionis origo, viriumque prostratio. Et hæc experiuntur quoque rustici sine errore.

Ut autem vera hæc esse experiaris, fac periculum: Nimirum decide ligni frustum de arbore terre adhuc infixæ, tempore balsamico uti dictum. Cade iidem de eadem arbore ligni frustum, eiusdem cum priorimagnitudinis, tempore scilicet contrario (videlicet in signo aliquo rēre, humido ♄, ♀, aut X,) &c. Luna crescente nouellane

novellæ, interdum, post meridiem, aut sub crepusculum vespertinum, utroque ponderato videbis frustum illud balsamico tempore decisum, multo lenius esse minusque humiditatis obtinere, quam alterum.

Eadem ratio est omnis generis lignorum. Etenim lignum quodvis tempore dicto in signis balsamicis casum, si adhibeatur adificiis, vel rei alicui materiam præbeat, nec afficitur facile teredine, nec putrescit, vermiculaturque facile, sed durabile quam diutissime est.

Lunæ cimento tua carpere pomamemento,

Hæc cum decrescit, quod carpseris omne putrescit.

Testantur & rustici, quod finus si transferatur in agros tempore nouilunij, muretur facile in vermiculos, s. cochleas, qui arrodunt radices.

C A P. X X V.

De colligendi tempore secundum influentias particulares.

TEmpus colligendi nativæ influentiarum siderearum ratione censetur aptius, quo Planeta rei colligendæ familiaris in suis fuerit fortitudinibus, idque tanto convenientius iudicatur, quanto plures fortitudines Planeta idem obtinuerit.

N.I. *Plurimi non sine causa præferunt luminare planetæ familiari amicum & precipue Lunam, utpote quæ non modo terris finitima, sed & receptaculum sit omnium cælestium influxuum. Ipsa scilicet uxor omnium stellarum fecundissi-*

ma, solis cæterorumque planetarum & stellarum radios & influxus dicitur suscipere, eosque quasi fœtum inferiori mundo edere. Et hinc præ cæteris illam observari volunt.

N.II. *Atque procedunt paulo secus, eliguntque tempus, quo sinum Zodiaci, familiare scilicet membro humano, cui res colligenda adhiberi debet, fuerit forte, i.e. præsentia alterius luminaris fortificatum, (puta si virtus rei colligendæ intendi debeat.) Et hi colligunt Pæoniam cum ♀ signum capiti sympathicum Luna Solisve præsentia forte fuerit.*

Habetur Planeta.

Fortis & fortunatus.		Debilis & infortunatus.	
Essentialiter.	1 In domo sua.	1 In domus oppositione, vel in domo plu-	3
	2 In Exaltatione sua.	4 In Exaltationis opposit. (neta mali.	4
	3 In Triplicitate sua	3 In peregrinatione, i.e. cum nulla digni-	3
	4 In Terminis suis	2 In terminis malorum. (tatē possederit.	2
	5 In Facie sua	1	
	6 In Hora sua	1	
	7 In Nonena sua	1	
N. His addunt nonnulli. Indie sua		1	5
Accidentaliter.	8 In domicilio cæli 10. & 1. - -	5 In domo 12. - - - -	4
	7. 4. 11. - -	4 - - 8. - - - -	3
	2. 6. - - -	3 - - 6. - - - -	
	9. - - -	2	
	3. - - -	1	
	9 In gaudio - - - -	1	
	10 In cursu seu motu veloci - -	2 In cursu tardo vel vacuo. -	2
	directo - -	4 - - retrogrado. - -	4
	ascendente - -	3 - - descendente. - -	3
	11 In signo eiusdem sexus - - -	2 In signo diuersi sexus. - - -	2
	i.e. cum planeta masculinus		
	fuerit in signo masculino		
	12 In gradu eiusdem sexus - - -	3 In gradu diuersi sexus. - - -	3
	13 In gradu lucido vel augmentate for-	In gradu tenebroso vel puteali. -	
	14 In aspectu ♂ cum bonis. (tunam.	5 In aspectu ♀ cum malis, vel cum re-	5
	♂ cū ☉, i.e. in corde ☉is,	5 - - trog. combustionis cum sole.	5
	* ☿ Δ. - - - -	3 - - ♀. - - - -	3
	□ cum bonis - - -	3 - - □ cum malis. - - -	3
	15 In obsessione bonorum - - -	2 In obsessione malorum. - - -	2
	16 In apogeo - - - -	1 In hypogeo. - - - -	1
	17 In ortu sibi debito, i.e. cum Planeta	2 In ortu minus debito. - - -	2
	gaudēs esse orientalis solē sequitur.		
	18 In hemisphærio correspondente	2 In hemisphærio disconueniente.	2
	19 In c. draconis, vel in huius vicinia	3 In cauda draconis. - - -	3
	20 - - - -	3 In Eclipsi. - - - -	3
	21 - - - -	3 In via combusta. - - -	3
	22 ☾ lumine aucta - - - -	3 ☾ lumine imminuta - - - -	3
	23 In mansione bona (competit soli ☾ e.	3 In mansione mala. - - - -	3

dictumque habere debilitate.

N. Non opus est omnia semper pensare, sed saltem principaliora.

Boni.

Mali

E.g. Domus \odot in Ω .

Domus \nearrow sunt \vee & m .

N.2. *Humilitas seu casus Planetarum*
est in signo opposito exaltationi. Detri-
mentum in signo opposito domui.

N.3. Planeta qui domos habent duas,
alteram sibi nocturnam, alteram diurnam
faciunt. Sic domus diurna 2c est ♀, ♀,
♂, ♀, m, ♂, m, h, ♀, nocturna domus
cuique est reliqua.

Sic Operagrans ∇ , dicitur esse in triplicitate sua.

Sic ♂ existens in X, statuitur in sua triplic. &c.

4. *Tabula Terminorum secundum Ptolomæum.*

V	♂ 6	♀ 6	♂ 8	♂ 5	h 5
Ⅴ	♀ 8	♀ 6	♂ 8	h 5	♂ 3
Ⅱ	♂	♂ 6	♀ 5	♂ 7	h 6
☿	♂ 7	♀ 6	♀ 6	♂ 7	h 4
♊	♂ 6	♀ 5	h 7	♀ 6	♂ 6
♋	♀ 7	♀ 10	♂ 4	♂ 7	h 2
♌	h 6	♀ 8	♂ 7	♀ 7	♂ 2
♍	♂ 7	♀ 4	♀ 8	♂ 5	h 6
♎	♂ 12	♀ 5	♀ 4	h 5	♂ 4
♏	♀ 7	♂ 7	♀ 8	h 4	♂ 4
♐	♀ 7	♀ 6	♂ 7	♂ 5	h 5
♑	♀ 12	♂ 4	♀ 3	♂ 9	h 2

Secundum Alkabitium.

V	♂ 6	♀ 6	♀ 8	♂ 5	h 5
Ⅴ	♀ 8	♂ 3	♀ 6	♂ 8	h 5
Ⅱ	♀ 6	h 6	♂ 6	♀ 5	♂ 7
☿	♂ 6	h 4	♀ 6	♀ 6	♂ 7
♊	♂ 6	♂ 6	♀ 5	h 7	♀ 6
♋	♀ 7	h 2	♀ 10	♂ 4	♂ 7
♌	h 6	♂ 2	♀ 8	♂ 7	♀ 7
♍	♂ 7	h 6	♀ 4	♀ 8	♂ 5
♎	♂ 10	♂ 4	♀ 5	♀ 4	h 5
♏	♀ 7	♂ 4	♂ 7	♀ 8	h 4
♐	♀ 7	h 5	♀ 6	♂ 7	♂ 5
♑	♀ 12	h 2	♂ 4	♀ 3	♂ 9

Sic termini Iovis sunt sex gradus Arietis priores. Veneris sequentes sex scil.
ad 12. Mercurij 8. sequentes, scil. à 13. ad 20. &c.

N. 1. Sol & Luna terminos quidem non
obrinent, sed similes fortitudines dicuntur
habere in duabus Zodiaci medietatibus.
☉ à principio ♉ ad finem vsque ♊,

(dicitur medietas maxima.) ☾ à principio
♊ ad finem ☿ vsque.

N. 2. Vltimi gradus cuiusque signi sunt
mali.

5. Tabula facierum.

✓	♂ 10	☉ 10	♀ 10
♂	♀ 10	☾ 10	♂ 10
II	♂ 10	♂ 10	☉ 10
☿	♀ 10	♀ 10	☾ 10
♊	♂ 10	♂ 10	♂ 10
♋	☉ 10	♀ 10	♀ 10
♌	☾ 10	♂ 10	♂ 10
♍	♂ 10	☉ 10	♀ 10
♎	♀ 10	☾ 10	♂ 10
♏	♂ 10	♂ 10	☉ 10
♐	♀ 10	♀ 10	☾ 10
♑	♂ 10	♂ 10	♂ 10

Sic ♎ sibi vendicat Leonis gradus
10. priores. ♌ 10. sequentes scil. vs-
que ad 20. ♂ sequentes ad 3. & sic
consequenter per omnia signa.

Hinc si ♎ sit in 10. gradibus prio-
ribus ♊ dicitur in facile sua esse.

6. Tabula Horarum Planetarum.

Hora diurna		H. nocturna		Diei		♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑
1	8	3	10	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
2	9	4	11	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	♔
3	10	5	12	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	♔	♕
4	11	6		♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	♔	♕	♖
5	12	7		♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	♔	♕	♖	♗
6	1	8		♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	♔	♕	♖	♗	♘
7	2	9		♎	♏	♐	♑	♒	♓	♔	♕	♖	♗	♘	♙

Numerantur horæ planetarum diurnæ
ab ortu solis ad occalum 1 2. totidemque
nocturnæ ab occasu ad ortum, adeoque
hora diurna 1 & 8 diei Saturni consecra-
tur Saturno 2 & 9 Ioui. Nimirum in su-
periori columna numerantur dies, in

priori descendente horæ diurnæ, in alte-
ra descendente, horæ nocturnæ, quibus è
regione correspondent planetæ illis horis
huius diei, in suprema columna, exhibiti,
dominantes e.g. die. ☉ hor. 4. diurna do-
minatur ☉. &c.

7. De Nouenis.


Sapientes Indi diuiferunt quodlibet signum in partes 9. quas vocauerunt nouenas, quasi nonas partes; continet igitur qualibet nouena seu nona pars gradus 3 1/2.

Tabula Nouenarum.

	I	2	3	4	5	6	7	8	9
V	♂	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	2f
8	♀	♂	♂	♂	♀	♀	♂	2f	h
II	♀	♂	♂	♀	♀	♂	2f	h	h
6	♂	♂	♀	♀	♂	2f	h	h	2f
Ω	♂	♀	♀	♂	2f	h	h	2f	♂
mp	♀	♀	♂	2f	h	h	2f	♂	♀
♄	♀	♂	2f	h	h	2f	♂	♀	♀
♅	♂	2f	h	h	2f	♂	♀	♀	♂
♆	2f	h	h	2f	♂	♀	♀	♂	♂
♇	h	h	2f	♂	♀	♀	♂	♂	♀
♈	h	2f	♂	♀	♀	♂	♂	♀	♀
♉	2f	♂	♀	♀	♂	♂	♀	♂	♂

Sic ♀ existens in ♄ nouena prima (i.e. in gradibus 1. 2. 3. & quarti gradus minuti. 30.) dicitur in sua nouena esse.

8. Domus seu Domicilia cælestia.



Domus

Domuum harum erectionem aliunde & præcipuè ex Ephemeridibus addiscere oportet.

9. Gaudere dicuntur Planetæ vel ratione suæ domus, vel ratione domiciliorum cælestium seu horoscopi. Suæ domus ratione gaudet Planeta quando est in domo suâ maximè familiari (ratione scil. temporis diurni nocturniue.) Sic gaudium H i (planetæ sc. diurni) est in ∞ , (domo H i diurna:) Z in \uparrow , J in w : Q (planetæ nocturni) in v (domo eius nocturna:) Q in Reliqui (\odot & \oslash) quia domum vnicam habent, & in ea gaudent. Quoad domos cælestes gaudet H in domo 12. Z 11. J 6. \odot 9. Q 5. Q 1. \oslash 3.

N. Sunt & alij modi gaudiorum, e. g. 1. ratione triplicitatum. Sic \odot gaudet in triplic Δ ea: sic & J quia complexionis est ignea: \oslash in ∇ : 4 & Q in Δ : H in ∇ . 2. quando Planeta est in dignitate

amici vel amica, tunc dicitur gaudere, &c.

10. Cursus Planetarum est 1. velox tardusve. 2. directus vel retrogradus. 3. ascendens vel descendens: Planeta motu velox dicitur, cum directo mouetur, quippe tunc motus eius velocior est motu medio: Tardus e contra cum secundum successionem signorum fertur, in directi sui Epicycli circumvolutione; Retrogradus cum contra signorum successionem retrovolutione sui Epicycli. Ascendens cum ab Ecliptica versus septentrionem declinat; vnde & eodem modo septentrionalis dicitur: Descendens cum ad meridiem; vnde Meridionalis dicitur. Cuius doctrina ex Ephemeridibus sumenda.

N. Sol quia caret Epicyclo, ab hac consideratione alienus est. Similiter & in \oslash , propter velocissimum motum, retrogressio non animaduertitur.

11. Natura Signi.

Signa { Masculin. diurna. v , II , S , u , \uparrow , ∞ .
sunt { Fæminin. nocturna. v , S , ny , w , \uparrow , X .

Signa { Mobilia v , S , u , p .
{ Fixa v , S , ny , ∞ .
{ Communia II , w , \uparrow , X .

12. *Natura gratuum.*R. *Tabula graduum masculinorum & foemininorum.*

V	8. m.	1. f.	6. m.	7. f.	8. m.	
U	5. f.	6. m.	6. f.	4. m.	3. f.	6. m.
Π	5. f.	11. m.	6. f.	4. m.	4. f.	
Θ	2. m.	6. f.	2. f.	11. m.	7. f.	
Ω	5. m.	3. f.	7. m.	8. f.	7. m.	
my	8. f.	4. m.	8. f.	10. m.		
⊖	5. m.	10. m.	5. m.	7. f.	3. m.	
W	4. m.	10. f.	3. m.	8. f.	5. m.	
†	3. m.	3. f.	7. m.	12. f.	6. m.	
‡	11. m.	8. f.	11. m.			
≡	5. m.	10. f.	6. m.	4. f.	2. m.	3. f.
X	10. m.	10. f.	3. m.	5. f.	2. m.	

E.g. gradus priores 8. V. sunt masculini, sequēs 1. (9. sc.) est foemininus, &c.

N. 1. Gradus masculini dicuntur quod Planetam masculinum in eis existentem fortiorē reddant: foeminini vice versa.

N. 2. Alij aliter procedunt primumq; signorum gradum masculinum faciunt, secundum, foemininum, 3. iterum masculinum & sic deinceps. Verum ratio prior qua Alkabitio adscribitur, communior est.

13. *Tabula graduum tenebroforum, lucidorum & vacuorum.*

V	ten. 3.	luc. 5.	ten. 8.	luc. 4.	Vac. 4.	luc. 5.	Vac. 1.
U	ten. 3.	luc. 4.	Vac. 5.	luc. 3.	Vac. 5.	luc. 8.	ten. 2.
Π	luc. 4.	ten. 3.	luc. 5.	Vac. 4.	luc. 6.	ten. 5.	Vac. 3.
Θ	luc. 12.	ten. 2.	Vac. 4.	fum. 2.	luc. 8.	Vac. 2.	
Ω	ten. 10.	fum. 10.	Vac. 5.	luc. 5.			
my	ten. 5.	luc. 3.	Vac. 7.	luc. 6.	fum. 6.	Vac. 5.	ten. 3.
⊖	luc. 5.	ten. 5.	luc. 8.	ten. 3.	luc. 6.	Vac. 3.	
W	ten. 3.	luc. 5.	Vac. 6.	luc. 6.	fum. 7.	Vac. 5.	ten. 3.
†	luc. 9.	ten. 3.	luc. 7.	fum. 4.	luc. 7.		
‡	ten. 7.	luc. 3.	fum. 5.	luc. 4.	ten. 3.	Vac. 3.	ten. 5.
≡	fum. 4.	luc. 5.	ten. 4.	luc. 8.	Vac. 4.	luc. 5.	
X	ten. 6.	luc. 6.	ten. 6.	luc. 4.	Vac. 3.	luc. 3.	ten. 2.

E.g. gradus priores 12. Ω. sunt tenebrofi, 10. sequentes fumosi, &c.

N. Lucidi

N. Lucidi gradus influunt pulchritudinem ac serenitatem tēporis, adeoque fortunati sunt, tenebrofi, ac fumosi contra. Vacui dicuntur, quod opera,

quæ sub eis inchoantur, vana ac irrita communiter esse solent, vel si manus, mediocres sunt inter bonitatem & malitiam.

1. Tabula graduum putealium. Azemenon Augmentantium fortunam.

♊	6	11	19	23	29		19							
♋	5	13	18	24	25	26	3	15	27	30	6	7	8	9
♌	2	12	17	26	30		11	1						
♍	12	17	23	26	30		1	3	14	15	7	9	usq̃	15
♎	6	13	15	22	23	28	2	5	7	10	19	27		28
♏	8	13	16	21	25		3	13	20	30				
♐	1	7	20	23	30		3	5	21	24				
♑	9	10	17	22	27		7	12	18	20	19	29		
♒	7	12	15	24	27	30	13	20			1	7	18	19
♓	2	7	17	24	28		13	14	20	24	26	27	28	29
♈	12	17	24	29			7	16	17	20	18	26		
♉	4	9	24	27	28		13	20						

Sic puteales gradus arietis sunt 6t9.11m9 &c. idem de Azemenis & Augment.

Puteales dicuntur, quod Planeta in eis est quasi in puteo, i.e. debilis influentiæ, quoad calorem & quoad alia opera vtilia: atque communiter quando Planetæ superiores in iisdem existunt, frigus ac humiditas seu pluuia generatur

Azemenæ, sunt gradus debilitationis corporum, &c.

14. *Aspectus Planetarum.*

Coniunctio est cum duæ stellæ in eundem coincidunt gradum.

Esse in corde solis, i.e. esse vnitum cum sole intra minuta 16.

Esse in combustionem solis, i.e. versari in intervallo quod est ultra minuta illa 16. ad gradum vsque 12. (alij ad 6.) Et hoc idem sub radiis solis esse dicunt.

15. *Obsessio.*

Obsessus Planeta dicitur cum vtrinque planetis binis clauditur, id est, cum inter duos planetas existit; ita tamen ut neuter sit in orbe seu ambitu radorum alterius. Ambitus autem radorum non omnibus æqualis est. ☉ spargit radios vtrinque ad grad. 15. i.e. antrorsum 15. & retrorsum 15. ☿ vtrinque radios mittit ad grad. 12. ♀ ad 9. ♄ ad 9. ♂ ad 8. ♁ ad 6. ♀ ad 5.

15. *Apogeeum & hypogeeum.*

Apogeeum est punctum in Epicyclis vel Eccentricis, in quo planeta collocatus, longissimè à centro terræ distat. Hypogeeum e contra, quo proximè ad terram accedit.

H

17. Ortus

17. Ortus planetarum ad solem trutinatur ; dicunturque Planetæ oriri ante solem cum ortum solis præcedunt, post solem cum post solis occasum apparere incipiunt : Hinc sunt

Planetæ { Orientales, i.e. orientali ortu
fortes ♄, ♀, ♂.
Occidentales, i.e. occid. ortu
fortes ♀, ♄ & ☿.

N. ♄, ♀ & ♂ sunt orientales à ☿ sua cum ☿ usque ad ☿. Occidentales ab ☿ ad ☿. ♀ & ♄ sunt orientales cum vesperi apparere incipiunt. ☿ est occidentalis à ☿ ad ☿, i.e. aucta lumine. orientalis ab ☿ ad ☿, i.e. diminuta lumine.

18. Hemisphærium duplex est, diurnum quod est supra Horizontem ; nocturnum quod est infra.

N. Dicitur Planeta in hemisphærio correspondere ; cum planeta diurnus est de die in hemisphærio diurno, ☿ contra

Planet. { diurni ♄, ♀, ☿.
nocturni ♂, ♄, ☿.

19. Caput & cauda Draconis, sunt

interfectiones Eclipticæ ac orbis ☿, quarum loca ex Ephemeridibus citanda sunt. Caput Drac. bonum est cum bonis, malum cum malis, estque masculinum. Cauda mala cum bonis est, bonaque cum malis, estque fœminina.

20. Via combusta est inter ☿ gr. 13. ad ♄ gr. 9.

21. Eclipsin patiuntur ☿ & ☿.

22. Mansiones tribuuntur soli ☿, earumque numero 28. adeoque mansio quælibet determinatur vigesima octava parte totius circuli, scilicet 0. 12. m. 51. sec. 25. mensuratione scilicet incepta à 1. gr. ♄, & secundum seriem signorum continuata. Hinc prima ☿ mansio est ab ♄, gr. 0. ad gr. 12. m. 51. sec. 25. mansio secunda, ad gr. 24. m. 42. sec. 52. &c. Ex his gradibus reputantur ut plurimum malæ esse influentiæ mans. 16. 18. & 26.

N. Alij mensurationem instituunt (non in sphaera nona, sed) in sphaera 8. id est, asterisusis signata.

C A P. XXVI.

De Modo colligendi.

MOdum colligendi peculiarem in colligendis natiuis nonnullis obseruari comperimus, eumque diuersum tum ratione collectionis sursum deorsumue, tum quoque ratione situs colligentis.

Ratione collectionis deprehenduntur in nonnullis diuersæ vires, pro diuersa collectione sursum deorsumue facta. Sic helleborus si colligitur, inquit Marf. Ficinus (lib. de sanir. studiosor.) siue fo-

lium deorsum trahas siue sursum, hoc subito tactu fieri creditur, ut vel deorsum vel sursum humores ducat. Sic & sambuci radix si sursum euellatur, per superiora purgat ; sin contra deorsum per fossam subitus factam trahatur, mouet aluum ; eiusdem sambuci iuli quoque si sursum, cacumen versus decerpantur, mouent vomitum ; e contra, si deorsum eosdem decerpseris, aluum laxant.

De situ colligentis ait Agrippa Phil. lib.

lib. 1. cap. 48. Collecturos herbam ♀ ni vel ♂ iubent ad orientem spectare, vel meridiem. Primum quia gaudent (♀ & ♂) esse orientales à Sole; alterum quia principalia eorum domicilia scil. ☿, ♀, ♄, signa sunt meridionalia. Similiter ♃ & ♁. Collecturi vero rem ♀ ream, ♀ lem vel ☾ rem, spectare iubentur ver-

fus occidentem, quia gaudent esse occidentales; vel contra septentrionem, quia domicilia eorum principalia, quæ sunt ☿, ♀, ☿, ♀, signa sunt septentrionalia. Sic in opere solari spectandum est contra orientem vel meridiem; quin potius, semper ad ipsum solare corpus atque lumen.

C A P. XXVII.

De Asseruatione, ac primum de tempore seu duratione asseruationis.

Asseruatio est, qua res medicamentales vsui repositæ asseruantur.

N. *Scopus asseruationis est res medicamentales vsui reseruare: Circumstantia igitur eò dirigi debent, vt quantum fieri potest, res integræ vsuique idoneæ quonvis tempore in promptu sint,*

Res asseruandæ sunt tum natiuæ tum præparatæ.

Circumstantiæ Asseruationis præcipuæ sunt *tempus, locus & modus adaptandi.*

Tempus Asseruationis, dico quamdiu res asseruari potest. Vnde Canones:

Tempus asseruationis ne sit ultra terminum durationis; Etenim quia vires cum tempore euanescent, non nisi cadauer inutile tandem relinquitur. Accidit hæc euanescentia, in aliis citius, in aliis tardius, prout res solidioris vel minus solidæ sunt substantiæ. Nimirum sunt, quarum vis facile dissipatur, harum asseruatio breuioris erit temporis: sunt e contra, quarum natura solidior, adeoque corruptioni magis resistit; earum itaque duratio erit quoque diuturnior v. g. lignorum & sim. Hinc constituitur,

I. TEMPVS SEV DV RATIO NATIVORVM.

Mineralia pleraque (exceptis sulphureis atque aqueis quibusdam) quia solidioris ac durabilioris sunt naturæ, durationis quoque diuturnioris censenda sunt.

E vegetabilibus. 1. *Flores* quamdiu odorem, colorem & saporem retinent, asseruari possunt: Vix autem, (exceptis paucis) semestrem durant, muntandi igitur annuatim. Schænanthos flores decennium durabiles aiunt.

N. *In genere de floribus notandum, eò commodius in vsum medicum illos capari quo fuerint recentiores; puta, nisi humiditas obsit, quæ ex nascentia est reliqua.*

Herbæ diutius quidem asseruari possunt, præstat tamen singulis annis mutationem instituere.

Semina quò calidiora, acriora magisque aromatica sunt, eò quoque durabiliora, ideoque pro re nata biennium ac triennium integra seruari possunt, minutiora tamen ac frigida minora singulis annis mutare fas est, seruandaque sunt diligenter, ne rancefiant.

Fructus quotannis mutandi sunt. Exo-

tici tamen duriore cortice ac crustave-
stiti, per duos tresue annos durant, v.g.
Myrobalani.

Radices parvæ, tenues, raræ, anno
quolibet mutantur, vt Afari, Asparagi &
simil. Magnæ crassâ præditæ substantia
biennium vel triennium integra ma-
nent, vt Aristolochia, bryonia, gentiana,
rheum ponticum. Triennio seruari po-
test vterque helleborus.

Cortices in annum perdurant & vl-
tra.

Gummi & resinæ durabilioris sunt
naturæ.

Animalia, horumque partes, vires suas
vegetas obtinere creduntur, quandiu in-
corrupta seruantur; id quod rancido fæ-
tore, sapore, situ atque coloris mutatione
dignosci potest. Durabiliores autem sunt
partes quæ sicciores ac solidiores: cor-
ruptibiliores, quæ molliores, & hæ sin-
gulis annis mutari solent.

II. TEMPVS SEV DV RAT IO PRÆ- PARATORVM.

Acetainfusa quotannis mutare con-
uenit, vel affuso nouo aceto infusisque
nouis materialibus renouare.

Aquæstillatitiæ phlegmaticæ singulis
annis vel mutandæ vel renouandæ sunt.
Renouationem dico, quâ aqua recentibus
plantis superfunditur, denuoque
destillatur. Aquæ spirituosæ diutius ser-
uari queunt.

Balsamica aromatica annos duos tres-
ue durabilia sunt.

Cerota vix ad annum durant.

Clyster, quia vt reliqua decocta facile
corrumpitur, nullus exstat paratus, sed
ex tempore præparatur.

Colliria sicca, cum trochiscis conue-
niunt.

Conditæ fructuum, biennium du-
rant.

Confecta, quia sacharo circum val-
lata sunt, diutius durant quam na-
turalia.

Conseruæ vnius sunt anni.

Decocta quia intra dies paucos cor-
ruptioni obnoxia sunt, nulla pro vsu
exstant, sed recenter parantur. Et huius
rei gratia species certorum decoctorum
officinis in promptu sunt v.g. decocta
pectoralia. Vide lib. 2. c. 49.

Electuaria lenitiua intra annum ferè
imbecilliora fiunt: solutiuiorum virtus
ad sesquiennium perdurat.

N. *Renodens durationem hac regulâ
includit: quo Electuaria quæuis gratiora
sunt, ea citius hebescit illorum energia ac
facultas.*

Elixir, quia spirituosum est, si benè
muniatur, quominus exhalet aliquot an-
nos seruari potest.

Emplastra vix ad sesquiannum du-
rant, quin nimis sicca euadant.

Extracta duriora in plures annos per-
durant, nec facile præter exsiccationem
quid detrimenti contrahunt

Fecula vegetabilium singulis annis
renouari queunt, integræ tamen, manet
biennium & ultra.

Flores variant pro diuersitate materiæ
vnde sublimatur.

Iulepi ex præscriptionibus recenter
parantur. Iulebus enim rosatus ac vio-
latus in consistentia Syrupi asseruantur.

Loboch sine Eclegmata quæ amygda-
las, pineas, & semina frigida rancori ob-
noxia recipiunt, vix ultra annum du-
rant, reliqua ad biennium pertingere
queunt.

Magisteria præcipitatione parata,
quia ex rebus fiunt durioribus, ideoque
nec facilè corruptibilia sunt, asseruari in
annos tres pluresue poterunt.

Morselli etsi itidem aliquandiu inte-
gri

gri manere apti sint, præstat tamen recentes adhibere, præcipuè si fortè simplicitia rancori obnoxia continuerint.

Olea expressa temperata, vt amygdalinum, sesaminum, ex pincis & sim. intus præsertim sumenda vix vltra mensis sine rancore seruantur: frigida, vnius sunt anni: calida per duos vel tres durant. Ex fructibus odoratis quæ exprimuntur, (vt è Nucista,) semestri seruari possunt.

Destillata, diutius durant. *Insolata* quotannis fere vel biennij decursu mutari solent.

Pilula tum ob duriores compagem, tum ob alioquin, quam pleræque recipiunt ad annos duos tresue pertingunt, præsertim quæ opium continent.

Preparata in specie sic dicta, quia per se durioris ac minus volatilis sunt essentia, duos tresue annos integra manent.

Pulueres præstat adhibere recentes.

Rob singulis annis mutantur.

Rotula ex tempore fere fiunt.

Salia in annos aliquot durabilia sunt præsertim crySTALLISATA.

Species aromaticæ singulis annis, vel sesquiennali periodo renouandæ sunt.

Spiritus si bene custoditi fuerint, quominus exhalarint, diu durare possunt.

Succi liquidi mutantur quotannis: Duriusculi ac inspissati diutius durant, scilicet in annos duos tres & vltra.

Syrupi simplices annuali periodo mutari volunt: Compositi ac aromatici biennali.

Tinctura in pulueribus durabiles sunt annis aliquot; tincturæ liquidæ durabiles sunt pro diuersitate menstruorum.

Trochisci & Collyria sicca annum durant vnum. Excipe qui opium continent, seminaque rancori obnoxia, nimirum illi ad sexennium vsque pertingere possunt, hi breuius sunt durationis, nec annum integri manent.

Vnguenta ad annum vel sesquiennium vt plurimum seruantur.

CAP. XXVIII.

De Loco Asseruationis.

Locus asseruationis vel *generatim* consideratur vel *speciatim*.

Generatim consideratur locus, tum ratione *domicilij*, tum *asseruatorio*, vbi scilicet natia siccantur & asseruantur.

Locus in genere eligendus est purus asseruandoque medicamento conueniens, sublimis, siccus, peruius, septentrionem meridiemque spectans. Vitandus è contralocus impurus, puluerulentus, subterraneus, vliginosus, insolatus, infumatus, &c. Custodiendæque sunt

res ne à radiis solis vrantur, neque squalore tecti vel murorum inadesiant. Quinimò, non abs re foret, in peculiari camera seu hypocausto, super scaminis ac asserribus, herbas rara stratificatione, blandi caloris beneficio siccare postmodumque vasis mundis asseruari.

Speciatim consideratum locum exhibent *vasa asseruatoria*, scilicet ampulla, arcula, capsula, fictile, lagena, olla, phiola, pyxis, sacculi, scatulae, thecae, vitra, vitra saccharina, vrcei. Hæc talia adhibere oportet, qualia rerum asseruatio exigit,

vt integræ scil, maneant, neque à vase saporem, aut qualitatem alienam contrahant.

E Mineralibus; Terra scatulis vel arculis ligneis asseruari poterunt.

Salina ligneis custodiuntur vel vitreis non metallinis, reponunturque loco sicco.

Aquea vitris vel vrceis vitreatis.

Vegetabilibus; Flores siccantur in umbra reponunturque maximè qui iucundum odorem halant, arculis ciliaceis.

Herbæ siccantur in umbra, nisi quæ scapo sunt crassiore aut foliis humidioribus ac adeo proclives ad putrefactionem; nimirum hæ calore intensiore solis scil, vel similis exiccari possunt: Vbi probè siccata fuerint, includuntur sacculis lineis vel quod melius est arculis ligneis vt à puluere rutæ sint.

Semina asseruantur loco sicco, vasculis ligneis vel vitreatis, cartisque vt eo diutius & sine impuritate perdurent inuoluuntur.

Fructus, scatulis, pyxidibus vel sportis continentur.

Radices asseruandæ sunt in aëre sicco, vt exsiccantur: Minores, rariores, & quarum vires solis vel ignis calore facile dissipari possunt, in umbra & vento exsiccandæ sunt, vt apij, fenicul, &c. Crassiores igne, sole vel vento siccantur, vt Bryon. Gentian. mandrag. rheipontic.

Corrices arculis ligneis, locoque sicco asseruantur.

Cumini ac resinæ siccæ, sicco loco atque ligneis vasis includuntur: liquidiores, vrceis.

Ex Animalibus. Animalia horumque partes sicciore in pyxidibus ligneis reponuntur, vt ossa

Adipes & medullas, vasis, vrceis, vel

figulinis vitreatis recondere conuenit, locoque frigido ac sicco asseruare.

Preparata

Aceta ac aque stillatitiæ vitreis vasis lagenisvè, locoque temperato commodè seruantur.

Balsama illa odorata pyxidibus stanneis (melius vitreis) benè occlusa seruantur: liquidiora, stillatitia simili modo seruanda sunt, quo olea stillatitia: & spiritus.

Cerata asseruantur vt emplastra.

Condita & sim. figulina potius, quam stannea vasa experunt.

Confectiones saccharo obductæ, ligneis arculis reconduntur, locoque moderatè calido ac sicco locantur.

Conseruæ, Eclegmata, Electuaria, Vasis figulinis vitreatis potius quàm stanneis asseruantur.

Emplastra ac cerata vesica aut charta quæ liquatam ceram imbiberit, obuoluuntur, atque sic arculis vel pyxidibus siccis tenetur.

Extracta vasis figulinis vel vitreis amplioris orificij, vt spatula depromi possint seruantur; vel si sicciore fuerint, vt pilulæ reponuntur.

Fecula, Flores, &c Vitris vel pro re nata seruantur.

Morfelli, vt confectiones custodiuntur

Olea infusa atque expressa in vasis vitreis vel figulinis vitreatis reponuntur. *Destillata* in vitris angustis orificij.

Pilula inuoluuntur vesica vel charta cerata, recondunturque in thecis siccis. ligneis, vel stanneis loco sicciore,

Preparata vitris custodiuntur locoque sicciore.

Rotula vt confectiones arculis ligneis seruantur, locoque sicco.

Salia vitra postulant, locumque sicciorem.

Species aromaticæ coriaceis facculis probe confutis, vel in vitreis aut ligneis vasis optimè seruantur.

Spiritus vitra benè obturat exigunt, adeoque angusti orificij, locumque temperatum vel frigidiorum.

Succi liquidi in vitris angusti orificij asseruantur, superfuso aliquantulo olei amygdalini, oliuarum, vt à situ conseruentur; inspissati succum Extra-

ctis conueniunt.

Syrupi non detinentur rectius quàm in figulinis vasis, præsertim ij qui per se accidiunt, quos omnino in vasis figulinis vitreatis parare ac detinere oportet, quippe noxam mineralem ex metallinis vasis facile eliciunt.

Trochisci in pyxidibus ligneis commodè reponuntur.

Unguenta ac Linimenta vasis figulinis partim quoque pyxidibus stanneis conclusa tenentur.

CAP. XXIX.

De Modo adaptandi ad asseruationem.

Modus adaptandi variat, prout res integra in partes dissecta, repurgata vel secus asseruari postulat, vel prout diuerso situ est collocanda aliud vexpetit, cuius auxilio à corruptione conseruetur. verbi grat. *Succi* superfunditur oleum, camphora semini lini imponitur, &c.

Flores asseruantur vt plurimum à caulibus ac foliis suis herbaceis segregati.

Herbæ seu folia si grandiora fuerint, caulibus crassioribus, seorsum à caulibus sint tenuioribus, vna cum hisdem asseruantur nec raro vna cum floribus.

Radices, alie seruantur integræ, vt aristolochia, gentiana, hermodactylus, fatyrium; &c. alie in taleolas dissectæ, vt bryonia, enula, iris, &c. Similiter adimitur nonnullis lignosa, matrix, vt feniculus, petroselinum, &c.

Fructus. E.g. Poma collocanda sunt vt pediculi deorsum, flores sursum spectent. Quinimo frumento v.g. hordei semini poma imposita diutius durant.

Carnosa animalium partes, lauantur

primum pro libito, cum vino vel decocto conuenienti, hinc exsiccantur in furno, siccataque foliis congruis, e.g. absinthij ne putrescant inuoluta asseruantur. Sic *pulmones* parantur extractâ primum aspera arteria. Sic parantur & *Epatâ*, *Lienes*, &c.

Res pingues & oleosæ lauantur in aqua, aliquoties donec puræ euaserint. Hinc lento igne liquantur, colantur, effunduntur ve super frigidam, vt fordes ad fundum secedant, vel in spumam colligantur; post reponuntur in locum frigidum quo seruantur. Sic lauantur *axungia*, *sena medulla*, &c.

N. Alij adipem solâ lotionepurgatas asseruant, lotionemque malunt ex aqua frigida, scil. hac ratione adipem non modo solidioris substantia, sed & coloris candioris manere autumant: Alij aquâ salsam lotioni adhibent, dein dulcorant & nerancescant aliquid salis pro asseruatione admiscunt: Alij vino pinguedines abluunt, quò magis abstergantur.

Membranosa partes, vt intestina secundum

cundum longitudinem secantur abluuntur (vino vel decocto conuenienti) in frusta dissecta exsiccantur (in clibano) ac seruantur, inuoluta foliis conuenientibus.

Sanguis repurgatur à sero, hinc ex-

siccatur in furno.

Fella detrahuntur à iecore præligatisque filo viis introitus & exitus, siccantur in camino suspensa.

Coagula exiccata fumo aut sole asseruantur.

C A P. XXX.

De Vsurpatione.

VSurpatio est medicamenti administratio.

Circumstantiæ quas in vsurpatione consideramus sunt: *Vires*, *Vsus* seu modus vtendi. *Formula* ac denique *Dosis* seu quantitas.

Virium ratione Medicamentum est.

Astringens πικρὸν, i.e. Oscula vasorum occludens, Talia sunt frigida, substantiæ crassæ, acerbæ, austera, &c. Opponitur aperientibus.

Adurens, pyroticum quod adurit. Suntque 1. Vesicantia. 2. Escharotica. 3. Caustica.

Alexiterium, *Alexipharmacum*, i.e. Venenis resistens, cor ac Spiritus Vitales roborans, ne venenum facile admittant.

Anodynum, i.e. dolorem leniens, siue narcoticum id sit siue paregoricum: Sæpius tamen de paregoricis dicitur.

Aperiens διασπαστικόν, i.e. vasa reserans, Talia sunt calida, (sed non vltra gr. 2.) substantiæ tenuis. Opp. σπαστικαῖς adstringentibus.

Apophlegmatizans, quod excrementa è cerebro in palatum & os detrahit, siue id masticeatur, siue gargarifetur, siue palato illinatur. Talia sunt calida, acria, vel tota substantia agentia.

Arthriticum arthriticum quod nervoso generi ac articulis familiare est.

Attenuans λεπτονικόν, i.e. crassos, viscidos, frigidos, humores incidens dissoluens. Talia sunt cal.gr. 3. substantiæ tenuis, vt mordicantia, salsa, amara, nitrosa: Opp. incrassantibus.

Attrahens ἀτρακτικόν, i.e. humores ac spiritus è corpore in superficiem alliciens. T.S. Calid. 2. 3. (4. *Vesicas vel ruborem inducunt*) tenuis substantiæ. His accense, quæ attrahunt tota substantiâ. Sic venenum attrahit venenum.

Bechicum quod leniendæ tussi comparatum. Specialiter tamen quod putum promouet.

Calfaciens quod calorem excitare potest.

Cardiacum, quod cordi familiare.

Carminatiuum, i.e. flatus discutiens. T. S. imprimis semina calida maiora dicta.

Kαθηματικόν quod fractis ossibus solidandis conuenit.

Cathareticum, quod superfluum carnem cui adhibetur absorbit, vt acria mordicantia.

Catharticum, i.e. purgans siue δρω siue κῆτω id fiat, potissimum tamen de deiectionis dicitur.

Causticum

Cauterium causticum, cauterizans Escharoticum, quod non solum in cutem, sed in carnem subiectam adurendo agit.

Cephalicum, i.e. capiti familiare.

Colagogum, quod bilem flauam purgat.

Cicatrizans ἐτερωτικόν, cicatricem inducens. T. S. quæ non solum id quod influit, sed humorem, qui in ipsa carne continetur consumunt, vt hac ratione in cutem caro mutetur. Sunt vehementer siccantia crassæ S. adstrictoria.

Κολλητικόν, i.e. glutinatorium.

Condensans πυκνωτικόν, i.e. poros cutis contrahens. T. S. aquea ac frigida debilius contrahentia seu subadstringentia, subaustera, subacerba (non adstr.) Opp. Rarefacientibus.

Confortans, confortatiuum: quod proprietate quadam partem aliquam respicit roborat & confortat.

Constringens, idem quod obstruens.

Corroborans, idem quod confortans.

Corrodens, corrosiuum, καταρρετικόν, quod excrescentem carnem tollit. T. S. Calida 4. gr. tenuis substantiæ, septicum, acri mordacia.

Deiectorium, id est, per aluum purgans.

Densans, idem quod condensans.

Detergens. Vide extergens.

Diaphoreticum est, i. idem quod sudorificum [T. S. Eadem cum diureticis] 2. idem quod discutiens.

Disentiens, resoluens est, quod flatus discutit, hinc & humores.

Diureticum quod τὸ σέρον & aquosum sanguinis ad renes & vesicam deducit; vt inde eiiciatur. T. S. cal. 3. tenuium partium, incidentia.

Εκείνω, i.e. fœtum ac secundinas eiicientia.

Eccoproticum, i.e. aluum laxans fecesque tantummodo deturbans.

Emeticum, i.e. Vomitorium.

Ἐμμηνο γινόν, menses ciens.

Emolliens μαλακτικόν: quod humores concretos ac congelatos fundit. T. S. Cal. 2. nonnihil sicca & Emplastica.

Emplasticum, i.e. glutinosum quod parti cuiuspiam illitum tenaciter adhærescit ac poros implet. T. S. Sicca ac terrea citra acrimoniam.

Emphrastica, sunt Emplastica quæ poros suo lentore obstruunt & opplent. T. S. humida, tenacia; vt olea, Opp. Emphrastico.

Εναιών est κολλητικόν, quod cruentis vulneribus adhibetur sanguinem sistendi gratia.

Epaticum, quod Epati familiariter conuenit.

Epuloticum vel *Synoloticum*, quod vlceri cicatricem inducit. Vide cicatrizes,

Erodens, idem quod corrodens.

Errhinum: quod pituitam (non è ventriculo cerebri sed) circa meninges hærentem ad nares prolicat, adeoque citra sternutationem. Talia S. Calida ac nitrosa.

Expectorans. Vide bechicum.

Extergens ἐκκαθαρτικόν, i.e. lentos & glutinosos humores cuti adhærescentes eluendo infarctuliberans. T. S. Siccantia tenuis substantiæ, nitrosa; amara.

Glutinosum, i.e. Emplasticum.

Glutinans, glutinatorium, κολλητικόν: quod agglutinat & coniungit solutas partes. T. S. quæ plus siccant quam Sarcotica, nihil detergunt; sed potius adstringunt.

Humectans; quod humidum reddit.

Hydragogum; quod serum seu aquas purgat.

Hypnoicum; quod somnum conciliat, somniferum.

Hystericum; quod vtero familiare est.

Incidens, idem est quod attenuans.

Incrassans *παχυντικόν*, i.e. tenuiores & liquidiores succos reddens crassiores. Talia S. frigida aut temperata citra acrimoniam crassæ & terreæ substantiæ. Opp. attenuantibus.

Indurans: *σκληρωτικόν* quod quasi congelat & distendit. T. S. frigida gr. 2. 3.

Lac generans, quod sanguinem probum generat, attenuat & ad mammillas deducit.

Lac imminuens, quod lactis generationem impedit.

Laxans *χαλαστικόν*, i.e. materiam que in flatus declinat tensionemque causat attenuans & discutiens. T. S. modicè calfacientia, largiùs humectantia, substantiæ tenuioris.

Lithontripoicum, quod calculum atterit & eiicit.

Maturans *πεπτικόν*, *ἐκπεπτικόν*, id est puris generationem iuuans. T. S. Temperatè calida, humida & Emplastica.

Melanugogum, i.e. atram bilem educens.

Menses mouens *ἐμμηναγωγόν*, quod stuporem infert, atque dolorem stupefaciendo lenit.

Nephriticum, quod renibus familiare est.

Nervinum, *νευρωτικόν* arthriticum quod nervoso generi conuenit.

Obstruens, i.e. oscula vasorum occludens. T. S. frigida & astringentia, substantiæ crassæ, austera, acerba.

Ophthalmicum, quod oculis conuenit.

Oticum, quod auribus familiare est.

Odontalgicum, quod dentium dolores sopit.

Paregoricum est anodynum, quod blando suo calore corporis calorem fouet, fouendoque meatus referat, laxat, emollit, discutit. T. S. temperata tenuis substantiæ.

Philtrum *φιλτρον*, quod amorem conciliare creditur.

Phlegmagogum, i. e. pituitosum humorem purgans.

Polychrestum, quod multis viribus pollet.

Psilotrum *ψιλοθρον*, i.e. depilatorium.

Ptarmicum: i.e. Sternutatorium.

Purgans: quod humores è corpore vel per os vel per anum educit,

Pus generans: Vide maturans.

Purefaciens, *Συνταλινόν*; quod acrimoniâ, &c. calori nativo insensissimum, eumque vel fugat vel eius symmetriam destruit. Talia sunt mordicantia, acria, vt ♂.

Pulmonicum: quod pulmonibus familiare est.

Rarefaciens *ἀραιωτικόν*: i.e. cutis meatus referans. T. S. calida moderatè, sicca, substantiæ tenuis.

Refrigerans: quod frigus inducit.

Repellens, *ἀποκρεστικόν*: i. e. quod humores in membra irruentes, vel nondum plane impactos repercutit. T. S. vel frigida humida, quæ meatus contrahunt, vel frigida sicca terrestria: vt austera, astringentia.

Referans, i.e. infarctu liberans.

Resoluens, i.e. discutiens, scil. per insensilem transpirationem, vel & interdum idem quod attenuans.

Sarcoticum, i.e. carnem generans. T. S. quæ extra morsum sordes vulnere detergunt, ne consolidationem impediunt,

Semen generans, quod materiam feminariam spiritu replet & flatu distendit.

Semen

Semen imminuēns, quod feminis generationem & turgescēntiam impedit.

Septicum: i.e. putrefaciens.

Siccans: quod siccitatem inducit.

Somniferum: i.e. hypnoticum.

Splenicum, siue *spleneticum*, quod lieni familiariter conuenit.

Sternutatorium, ptarmicum: quod Sternutationem mouet, ac excrementa capitis, tum ea quæ in cerebro, tū quoque quæ circa meninges hærent, expellit.

Stomachicum, quod ventriculo familiare est.

Stomaticum, quod ori conuenit.

Stupefaciens idem quod Narcoticum.

Vesicans, *Vesicatorium*, quod vesicas & pustulas excitat, extremam cuticulam tantum attollendo, (est inter *πρωτοίνα* minutissimum.) T.S. Cantharides, sinapi, fermentum, flammula, ranunculus, &c.

Vomitorium: quod per hos humores educit.

Vreticum; idem quod diureticum.

Vulnerarium *σπασμαλινόν*: quod intus assumptum, vulnere consolidationem iuuat.

CAP. XXXI.

De Modo vtendi.

Modus medicamenta adhibendi duplex est, *internus* & *externus*.

Internus est, quo medicamenta per os faucēsq; intra corpus assumuntur, perficiturque *potando*, *lingendo*, *mastigando*, *deglutiendo*.

Externus est, quo medicamenta corporis *cauitatibus* exterioribus solum immittuntur, vel *superficie* extrinsecus applicantur. Cavitates illæ sunt Os, Oculi, Nares, Aures, Vterus, Penis, Anus. Applicatio superficie tenus fit, *inungendo*, *emplassando*, *cataplassando*, *irrigando*, *lauando*, vel *impositione* alicuius rei *repida fouendo*, &c.

N. *Modum in medici amentis administrandis adhibere oportet, qui conuenit ratione loci affecti, tum ratione materiæ adhibenda.*

Locus affectus exigit modum internum, vel externum prout collocatus est introrsumve extrorsumue, adeoque aditum medicamenti exhibet. Hinc si lo-

cus affectus plane sit internus, internum adhibendi modum exigit, sin vero extrorsum sese extruserit, externa quoque medicamenta admittit. Similiter locus affectus externus, externis curatur, nonnunquam & internis.

CAPITI, internè applicantur omnis generis medicamenta interna; *potulenta* scil. *Lingibilia*, *comestibilia* ac *deglutibilia*: *Externe* 1. *per os*: apophlegmatismi, masticatoria, suffitus: 2. *Per aures*: Aquæ, Succi, Olea, suffitus ex aquis stillatitiis, decoctis, &c. vel ex pulueribus carboni impositis: 3. *Per nares*: Errhina, Ptarmica, &c. 4. *Superficie tenus*: Inunctiones, Irrigationes, lotiones, impositiones cucupharum, fomentationesque alia, suffitus.

N. *Quinimo quæ pedibus applicantur, caput maximè afficiunt, vt, lotiones, cataplasmata, inunctiones plantarum pedum.*

OCVLIS internè eadem quæ capiti conueniunt, externè immittuntur,

1 2 Collyria

Collyria, Aquæ, &c. superficietenus Inunctiones, Emplastra, Cataplasmata.

NARIUM affectibus tam interna quam externa medicamenta applicari possunt, quæ Erthini nomine communiter veniunt.

DENTIBVS: oris collutiones, pilulæ vel turundæ indita, linimenta, suffitus, pulueres, trochisci (quibus gingivæ fricantur) *Superficietenus*, maxillarum inunctiones, Emplastra, Cataplasmata, fomentationes

FAUCIBVS: Gargarismi, Fumus, Linctus, Syrupi, Trochisci sublinguales. *Extrinfecus*, Inunctiones, Cataplasmata, v.g. in angina ex nido hirundinum, adde Linimenta ex melle

THORAX SIVE PULMONES omnia interna admittunt, præcipue tamen Linctus, Trochiscos, Rotulas ac Morfellos sublinguales, Electuaria, Aquas, Syrupos, Vapores itidem ac fumum cum aëre attrahendum; *Extrinfecus*, Inunctiones, Emplastra, Cataplasmata, Sacculos, Epithemata.

CORDI: omnis generis interna medicamenta adhiberi possunt, siue per pulmones ad Cor transferantur, siue per ventriculū. Præsentissimæ vero operationis, sunt odoramenta, quibus spiritus vitales insigniter recreari comperimus

Extrinfecus adhiberi solet potissimum Epithemata, Inunctiones, &c.

Epati conuenientia itidem sunt omnia interna. *Superficietenus* applicari possunt, Inunctiones, Emplastra ac Cerota, Cataplasmata Epithemata, Sacculi.

Lieni similia adhiberi possunt, tam interna quam externa.

Renibus præter iam dicta medicamenta & lotiones infususque conueniunt, clysteresque per anum iniecti. Idem iudicium de Vesica.

Vtvero dicantur similiter omnia interna. *Extrinfecus* conuenit odortum naribus tum pudendis adhibitus, vt Iniectiones in vterum, pessi, suffitus. *Superficietenus*: Inunctiones, Emplastra Cataplasmata (quæ cautè adhibenda.) Fomenta sicca seu sacculi.

Ventriculo adhibentur omnia interna: *Superficietenus*; Inunctiones, Emplastra, Cataplasmata, Fomentationes ex pane tosto (qui vino irrigatur, calidèque imponitur) sacculi.

Intestina præter iam dicta interna ac externa medicamenta admittunt quoque, quæ per anum immittuntur, vt sunt suppositoria, Clysteres, liquoresue alij per symphonem immittendi, tum & quæ vmbilico inunguntur.

C A P. VVVII.

De Formulis medicamentorum practicis.

Formula medicamentorum practica quæ intrinfecus adhibentur sunt tum *liquidiores*; Apozemata, Emulsionnes, Infusiones, Iulapia, Potiones,

tum *paulo crassiores*; Syrupi, Eclegmata, Electuaria, Boli, tum *solidiores*; Trochisci, Pulueres, Rotulæ, Morfuli, Pilulæ, &c.

(Extrin

(Extrinfecus) quæ adhibentur sunt vel *Liquida*; Aquæ, Olea, Epithemata, Clysteres: vel *Crassiores*; Linimenta, Vnguenta: vel *Duriores*; Cerota, Emplastra, Cataplasmata, Sacculi.

N. *Quibus formulis medicamenta adhibenda sint, edocent.* (1.) *Modus vtendi* (2.) *materia adaptabilitas, quibus* (3.) *addi potest Patientis natura, quæ formulis aliis inhiat, alias auersatur.*

Modis vtendi singulis suæ correspondent formulæ. Internè, inferuiunt vsui (1.) *Potabili*: Apozemata, Aquæ, Emulsiones, Infusiones aliæque potionēs. (2.) *Lingibili*: Eclegmata siue Linctus, Syrupi, Trochisci sublinguales. (3.) *Comeſtibili seu Maſticabili*: Boli, Condita, Conferuæ, Confectiones, Martius panis, Marmoladæ, Mixturæ, id est Eleſtuaria, Rotulæ, Trageæ, &c. (4.) *Deſlutibili*: Pilulæ, Pulueres.

Externè inferuiunt quæ immittuntur cavitatibus.

I. *Ori*: Dentificia, Gargarismi, Linimenta, Masticatoria, Suffitus.

II. *Oculis*: Aquæ, Collyria Vnguenta, fomenta, cataplasmata.

III. *Naribus*: Errhina, Odoramenta, Suffitus, Nasalia.

IV. *Auribus*: Aquæ, Succi, Decocta, Olea, Vnguenta, Suffitus.

V. *Vtero*: Clysteres, Pessi, &c.

VI. *Ano*: Clysteres, aliique liquores per syringam, Suppositoria, &c.

VII. *Peni*: Clysteres, ceraceæ candela, &c.

II. *Corporis superficie applicantur.*

1. *Inungendo*: Olea, Linimenta, Vnguenta.

2. *Emplaffando*: Emplastra, Cerota, Dropaces.

3. *Cataplaſſando*: Cataplasinata, Sinapismi, Phænigmi.

4. *Irrigando*: seu humectando: Epithemata, Embrochæ.

5. *Lauando*: Aquæ, Lixiuiæ, Balnea, &c.

6. *Simpliciter tepide imponendo & fouendo*: Sacculi (Cucuphæ) animalium partes carnosæ calentes impositæ.

7. *Suffiſſendo*: Suffumigia.

CAP. XXXIII.

De Doſi medicamentorum.

DOſin Medicamentorum interno-
rum metiuntur generaliter Vires
ac Formulæ adhibendæ.

Virium ratione adhibentur.

Alterantia.

Temperatè, à ðij. ad ðij.

Gradu. 1. à ðj. ad ðj.

2. à ðſ. ad ðſ.

3. à gr. v. ad ðij.

4. à gr. iij. ad ði.

Purgantia.

1. ab ðij. vel iij. ad v. r.
vel vii. vt Syr. roſar. ſo-
lut. Violar. ſolut.

2. ab ðiij. ad v. vt mel.
roſar. ſolut. mel. viol. ſol.

3. ab ðij. ad iij. vel i v. vt
succ. roſar. & violar. (ireos
noſtr. manna) Syr. è flor. per-
ſicorum.

1. Gradu
Maſſione

2. Grad. { 1. ab $\bar{z}\beta$. vel $\bar{z}v$. ad $\bar{z}\beta$.
vel $\bar{z}ij$. vt Tamarind. cassia.
(in pulpis.)
Manf. { 2. ab $\bar{z}\beta$. ad $\bar{z}\beta$. vt semen
carthami (in infus.)
3. à $\bar{z}ij$. ad $\bar{z}vij$. vt Epith.
3. Grad. { 1. à $\bar{z}i$. ad $\bar{z}\beta$. vt mirobalani
(ad $\bar{z}v$.) polypodium.
Manf. { 2. a. $\bar{z}j$. ad $\bar{z}ij$. vt Rhabarb.
agaric. Mechoacana, Sena.
3. a. $\bar{z}\beta$. ad $\bar{z}j$. vt Aloë,
Hermodyctylus, Turbith.
Gratiola, Jalappa.
4. Grad. { 1. a. gr. X. ad $\bar{z}\beta$. vel $\bar{z}ij$. vt
Mezerium, granum gnidium,
Manf. { Asarum, Colocynthis.
2. a. gr. v. ad xv. vt Elate-
rium, cortex hellebor. nigri.
3. a. gr. iij. ad x. vt Euphorb.
Efula. \bar{z} . Scammonium.

N. *Specialiorem singulorum purgan-
tium dosin quere propriis locis.*

Formularum ratione adhibentur me-
dicamenta dosi, quæ respondet opportu-
nitati adhibitionis, obseruatis tamen, si
opus sit, facultatibus ac dosi inde depen-
dente. V. gr. quæ grata sunt & facili as-
sumptionis, maiori dosi exhiberi queunt;
perque vices reiterata assumi. Ingrata,
dosi minori, & vix ultra vicem vnam per-
suadentur.

Vtriusque ratione est communis do-
sis, qua pro vice vna adultis præscri-
buntur.

Apozemata } $\bar{z}ij\beta$. ad v.
Aquæ stillatitiæ }
Boli. $\bar{z}j$.
Clysteres adultis lib. i. præterpro-

pter, adhibentur: infantibus $\bar{z}ij$. iij. &c.
Condita pro libito sumuntur quanti-
tate Iuglandis.

Conseruæ eadem quantitate vsui ve-
niunt.

Electuaria alterantia & confortantia à
 $\bar{z}j$. ad $\bar{z}ij\beta$. vel $\bar{z}\beta$.

Lenientia a. $\bar{z}j$. ad $\bar{z}ij\beta$. Purgantia ad
 $\bar{z}j$. præterpropter.

Elixiria guttulis propinantur, vel à
 $\bar{z}\beta$. ad $\bar{z}j$. vel $\bar{z}\beta$.

Emulsiones pro potu crebro sæpius
ordinantur.

Extracta duriuscula alterantia à $\bar{z}j$. ad
 $\bar{z}\beta$. Purgantia à $\bar{z}j$. ad $\bar{z}j$.

Liquores salium & simil. resolutorum
à gut. v. ad $\bar{z}j$.

Magisteria corroborantia à $\bar{z}j$. ad $\bar{z}\beta$.
purgantia vide sigillatim.

Morfelli ad i. vel $\bar{z}ij$. &c.

Olæ stillatitiæ à gr. ij. ad gr. xv.

Pilulæ Laxatiuæ à $\bar{z}i$ ad $\bar{z}ij$. Purgan-
tes à $\bar{z}ij$ ad $\bar{z}ij\beta$.

Præparata. à $\bar{z}j$. ad $\bar{z}j$.

Pulueres & species aromat. purgan-
tes à $\bar{z}\beta$. ad $\bar{z}ij\beta$.

Salia vegetabilium à $\bar{z}j$. ad $\bar{z}j$.

Sapæ & Syrupi. ab $\bar{z}j$. ad $\bar{z}ij\beta$.

Spiritus minerales à gr. iij. ad $\bar{z}\beta$. vel
si debiliores fuerint ad $\bar{z}ij$. &c. Vegeta-
biles ad cochleare pro re nata.

Trochisci ad $\bar{z}ij\beta$.

N. *Doses has præterpropter dedi, ad-
ulto competentes: notari tamen velim pro
diuersitate ingredientium constitutione-
que assumentis, cunctas esse moderandas.
Et si specialius haberi possint, his potius
fidendum.*

C A P. XXXIV.

De Signatione in genere, ac primum de qualitatibus sensilibus & figura.

Signatio est. quæ docet modum medicamenta cognoscendi & dignoscendi.

Signa cognitionis plurima existunt: Nos præcipua damus, tribusque illa classibus includimus; Inhærentium, antecedentium, consequentium: & hæc singula in consideratione simplici, vel comparata similitudine.

In classe inhærentium excellunt. 1. Qualitates sensiles. 2. Figura. 3. Ætas & Sexus, &c.

Qualitates sensiles sunt. 1. Sapor. 2. Odor. 3. Color. 4. Qualitates tactiles. 5. Sonus.

1. Sapor.

Acer, cui subiicitur aromaticus, mordax, seu septicus siue arsenicalis.

Acerbus --- adstrictorius, ponticus, fructuum immaturorum, aluminosus.

Acidus --- acidulus, ammoniacalis.

Amarus --- absynthiacus, aloeticus, felleus, gemmeus, Salinus.

Austerus --- stypticus, adstringens, vitriolatus.

Dulcis --- pinguis, saccharinus, melleus.

Salsus --- ferofus, nitrosus.

Urtuosus.

N. Sunt qui inspidum addunt saporem, in quo humiditas insipida sentiatur, alij Vinum quoque & lactem subiungunt. Verum uti prior proprie dictus sapor non est, ita posteriores non simplices, sed compositos sapiunt saporibus. *Vineus*, austerum, dulcem & suavem: lacteus, dul-

cem, pinguem & suavem.

2. Odor.

Odorum distinctio minus perspicua est, à saporibus tamen, cum quibus magna ipsis affinitas est, nomina fere mutantur.

Gratus, εὐώδης, fragrans, bene olens

Molestus, δυσώδης, fœtens, male olens.

Gravus.

Amarus.

Acerbus.

Acidus, &c.

3. Color.

Albus, cui subiicitur candidus.

Flavus --- luteus, cereus, croceus, aureus, melleus, citrinus, fulvus, vitellinus.

Rubens --- puniceus, flammeus, sanguineus.

Purpureus --- Violaceus, gilvus, brunus.

Viridis --- prassinus, herbaceus, æruginosus, porraceus.

Caruleus --- glaucus, cæsius, gryscus, lividus, cineraceus, pallidus, pullus.

Niger --- ater.

N Color intuendus, non modo qui in superficie extrinsecus conspicitur, sed & qui intrinsecus delitescit, siue, compressione, attritione, siue modo alio conspicuus reddatur. E.g. Hyperici flores si digitis confricentur, rubrum exhibent, licet lutes intuitu crescant.

4. Qualitates tactiles.

Craffitiæ, & tenuitas seu subtilitas.

Crassum

Crassum est quod ægrè læuigatur, seu quod vix in tenues partes comminuitur. *Tenne* quod contra.

Densitas, seu *soliditas* & *raritas* seu *porositas*. *Densum*, quod poris vel exiguis vel nullis peruium est. *Rarum*, quod multis. Huc cauum.

Durities & *molities*: *Durum* quod tactui resistit; *molle*, quod cedit.

Gravitas & *leuitas*: *Grane*, quod in se coactum pondere, quam mole magis est conspicuum. *Leue*; quod laxius mole quam pondere.

Lenitas seu *lubricitas* & *ariditas*. *Lubricum* idem quod lentum & viscidum. *Aridum* contra.

Lenitas & *asperitas*. *Leue* cuius superficies est æqualis seu, in quibus omnia sunt æqualia (plana, æqualiter composita) Huc *rotundum*, *Asperum* seu *scabrum* in quo partes inæqualem situm habent, atque aliæ eminent, aliæ depressæ sunt. Huc superficies *hirsuta*, *pilosa*, *angulosa*, *lacineata* quæque, &c.

Huc pertinent & dispositiones quibus res quæque mutabiles existunt, adeoque

Combustibilis; incombustibilis

Concretilis (vt Sal) inconcretilis.

Densatilis; indensatilis,

Ductilis (vt metallum,) inductilis.

Exhalabilis (vt aqua, &c.) inexhalabilis.

Fissilis (vt venæ arteriæ, &c.) infissilis.

Flammabilis (vt pinguedo) non flammabilis.

Flexilis (vt Salix, &c.) inflexilis.

Fractilis (vt baculus, &c.) infractilis.

Friabilis (vt pumex, &c.) infriabilis.

Fusibilis (vt metalla, salia, &c.) infusibilis.

Humectabilis (vt spongia, &c.) inhumectabilis.

Liquabilis (vt Salia,) illiquabilis.

Mollificabilis (vt pix, &c.) immollificabilis.

Pressatilis (vt medulla sambuci, &c.) impressatilis.

Tractilis (vt neruus, corium, &c.)

Sonus,

Tinnitus.

Sibilus.

Sonus grauis.

Sonus obtusus.

Figura.

Figura est quæ resultat ex conformatione & configuratione, quæ res scil.

1. Bene habita, pinguis, carnosæ, succulenta, *vel e contra*, malè habita, macilentæ, strigosa, gracilis, exucca.

2. Ampla, magna, extensa, *vel e contra*, &c.

C A P. XXXV.

De Etate seu duratione & sexu.

Res naturalis quælibet, & hinc ipsa medicamenta naturæ lege vniuersali mutabilia sunt. Mutationis huius causæ etsi euidentiores sunt, quæ extrinsecus accedunt, attamen præsupponitur quo-

que intrinsecus mutabilis cuiusque natura, quæ vel in melius vel in peius mutari res destinata est, idque non modo quoad rei substantiam, sed & quoad vires. Hanc mutationem ex interna mutabili

tabilitate pullulantem determinat *etas*, quam in asseruationis doctrina durationem diximus.

Ætas crescentium non incongruè quadruplex statui potest. 1. *Initians* seu infantilis. 2. *Crescens*. Iuuenilis, adolefcens. 3. *Consistens*, virilis. 4. *decrefcens*; senilis.

N. *Ab ætate initianti augefcent* *Crescentia* ad consistentem vsque ætatem, hinc inminuuntur paulatim, descenduntque ad interitum.

Est vero ætas crescentium diuersimodè mensurabilis.

Plantarum annuarum ætas initians est tempus *germinationis*, i.e. cum germinare incipiunt: *Crescens*, est tempus *turgescentie*, i.e. cum gemmas protrudere conantur: *Consistens* est tempus *florificentie*, i. e. cum flores & fructus emit-

tunt: *Decrescens* est tempus *marcescentie*, i.e. quo folia marcescere incipiunt ac decidunt.

Plantarum non annuarum, anamaliūue ætates simili ratione pro cuiusque speciei longæuitate mensurabiles sunt.

Duratio lignum est non postremum, quo rei asseruatæ integritas vel corruptio diiudicatur. V.g. Si qua vltra durationis suæ terminum asseruata nonnulla fuerint, viribus languescentibus vel corruptis, æstinantur.

Sexus distinctio non in animalibus solū, sed & in stirpibus conspicua est: nec nominis tantum, sed & rei: *Mares* in stirpium genere magna ex parte sunt in fructiferi, *fœmina* fructum edūt, vt *Pœonia* mas, *pœonia* fœmina; *Mercurialis* mas, *mercurialis* fœmina, &c. Hinc oritur & virium distinctio, &c.

CAP. XXXVI.

De Antecedentibus.

IN classe antecedentium celebrantur; 1. *Agens*, 2. *Obiectum* agibile, 3. *Actio* ipsa, 4. *Locus*, 5. *Tempus* seu aër ambiens.

1. *Agens* (præcipuè naturale) rem motam & conuersam sibi quadantenus affimilatam arguit.

N. *Agripp.* *Philos. occ. lib. 1. cap. 15.* *Vnaquæque res mouet & conuertit ad suum simile & inclinatur ad seipsam, secundum totum posse suum, tam in proprietate, i.e. virtute occulta, quam in qualitate, i.e. virtute elementalī. Quandoque etiam in ipsa substantia sicut in sale videmus: nam quicquid diu steterit cum sale fit sal; omne enim agens cum agere cæperit, non ad inferius seipso mouet: Sed quodammodo, quoad fieri potest ad sui*

par & consentaneum: quod etiam manifestò videmus in animantibus sensibilibus, in quibus cibum non in herbam vel plantam nutritiuam virtus permutat, sed in carnem transmutat sensibilem. Quibus in rebus inest alicuius qualitatis vel proprietatis excessus, siue insit ipsis per naturam, siue quandoque etiam per artem vel casum, vt audacia in meretrice: hæ res ad talem qualitatem, passionem, virtutem maximè mouent & prouocant. Sic ignis mouet ad ignem, aqua ad aquam.

2. *Obiectum* (materia quæ agentis elaborationi subiicitur) etsi naturam suam sensim mutat, difficilimè tamen ac vix plane exiit.

K

N. *Sic*

N. *Sic stercus equi auenâ pasti, natura auenæ plane non exiuit. Lac femine post assumptum purgans, purgatricis facultatis deprehenditur; Capra lithontripcis pasta, præfertur reliquis in medicamentis lithontripcis.*

3. *Actio* (motus quo res constituitur) prout diuersa est: ita diuersam rei factæ naturam arguit. Modum siue in productione rerum spectes, siue in collectione, siue in asseruatione.

N. *E.g. Excrementa alui quia elaborationi minus fuere subiecta, quam fel, magis de natura nutrimenti participant, minus de natura ex elaboratione acquisita. Sambucus quomodo pro diuerso collectionis modo diuersis polleat facultatibus, supra diximus.*

4. *Locus* vti diuersas sortitur temperaturas; ita diuersitatem in plantis operari potest: & tantam aliquando in plantarum virtutibus mutationem causatur, vt non solum huius disciplinæ ru-

dimentis initiati sæpenumero fallantur, sed in earum virtutibus inquirendis & medici & qui non parum philosophiæ studiis nauant operam. Ioh. Bapt. Port. Mag. lib. 1. c. 16. Vide & supra c. 13.

5. *Tempus* cæleste variat rerum naturalium proprietates non modo quoad gradus, i.e. quod magis & minus, sed sæpenumero quoad species seu proprietates ipsas. E.g. Hypericum tempore debito collectum, fugat lumbricos, quod non facit, si secus decerptum sit. Hinc Canon. Qualis est constitutio stellarum, talis censetur & natura sublunarium subiectorum. Est autem constitutio stellarum vigorosa & fortunata in fortudinibus, debilis & infortunata in debilitatibus ac infortuniis. Vide supra c. 23. vt & c. 12. &c.

N. Auicen. l. 2. tr. 7. c. 5. *Planta quæ sereno ac claro aëre colliguntur, sunt meliores iis, quæ colliguntur si dispositio aeris humida ac pluuiosa fuerit.*

C A P. XXXV I I.

De Consequentibus.

IN consequentibus signa celebria sunt *Nomina, Testimonia, Effecta seu actiones & Experientia.*

Nomina rerum indagasse non parum ad rei cognitionem iuuat. Etenim, præterquàm quod nomina, rerum notæ ac imagines sunt, earumque conceptus ac figuras phantasie imprimunt, vt plurimum certis de causis imposita esse constat. Sic dictus rubinus à colore rubro, chrysolithus ab aureo. Sic lapis ostiocolus quod ossium fracturas conglutinet, nephriticus quod renum calculo suc-

currat. Sic dicitur fel terræ à sapore amaro, Glycyrrhiza à dulcedine; Glycyphron, i.e. amara dulcis à sapore vtroque quem refert. Sic nominatur Saxifragia quod calculum frangat: pulmonaria quod pulmonibus conueniat: tussilago quod tussi. Sic dicunt Germani *Fieberkyant*, febrifuga, (i.e. centaurium minus) quum febrim fuget, &c. Sic sunt lingua ceruina, lingua auis, bursa pastoris, palma christi, &c. à similitudine quam cum rebus obtinent.

N. *Præ reliquis linguis præualet lingua*

gua hebraica, nimirum primus parens quia integram rerum cognitionem possedit, imposuit nomina, rebus conuenientiora, naturamque rei exprimentia, &c.

Testimonia sunt authoritates quæ rem ore vel scriptis attestantur. Merentur hæc fidem prout à persona fide digna proueniunt.

Effecta seu actiones. Nimirum actiones rem talis naturæ esse arguunt, qualis illæ deprehenduntur, atque adeò secundum eandem illam naturam res coniecturatur actiua. Vide cap. 40. n. 4.

N. Actiones vocantur nascendi, florendi, generandi, crescendi, prolificandi, fructificandi, concoquendi, pariendique modus & quo amore se prosequantur, horreant, & se inuicem alliciant.

Experientia fontium reliquorum ceu complementum existit. Illi enim opinionem fere ingerunt, hæc certitudinem, atque adeo non inscitè rerum magistra maioribus dicta est. Experientiam puta sufficienter ac rite demonstratam. Namque uti hæc rerum magistra est: Ita quoque si minus sufficienter illa acquisita sit, fallax seductrix esse poterit. Hinc

certa in Experientiæ iudicio notandæ conditiones.

1. Experientia sit aliquoties comprobata.

2. Res in quibus sit experientia similiter sese habeant. Res dico non tantum subiectum in quo sit experientia, v. g. in homine, sed & materiale obiectum, de quo sit experientia. v. g. de herba, &c.

N. Hinc præstat experientiam fieri in & de rebus simplicioribus. v. g. In virum indagatione. 1. Non temerè fidatur experientia unica. 2. Res de quibus sit experientia, si secunda vel tertia vice ea fiat, semper sint vniusmodi disposita, non qualitatibus alienis corruptæ, nec atate vilescens, &c. 3. Subiectum in quo sit experientia, sit Corpus humanum, non caninum, vel simile. Nam in alio corpore acquisita experientia fallere in homine potest. Serpens integer ciconia cibus est, homini mors, &c. Nec & hoc prætereundum, necessum esse, corpora illa humana repetitis vicibus similiter sese habeant, eodem scil. morbo laborent, atate ac temperamentis conueniant, vel non adeo discrepent.

C A P. XXXVIII.

De Similitudine.

Dicta signa considerantur non modo in sua natura simplici, sed & quatenus deprehenduntur in rebus seu obiectis diuersis conuenire. Nimirum conuenientia signorum coniecturare facit conuenientiam signati. De simili enim idem iudicium.

Est autem conuenientia similitudo, quæ rem repræsentat, id est mentiri vide-

tur seu æmulari: siue scil. figura id fiat, quæ potissimæ hic considerationis, siue qualitatibus sensibilibus solis, siue actionibus & moribus, &c. Quinimo & antecedentium similitudinem spectasse nonnunquam iuuat.

Sic representant

Partes humanas videlicet:

Caput; Papauer, Iuglans, nux Indica,

K 2

pæconia

præoniæ folliculus, scyllæ radix, agarium (repræsentat cerebrum.) fl. lil. conuall. Umbellæ Dauci (nondum explicita.) Omnis generis nuces. Rutæ summitates (sinus cerebri referunt.) Rosâ. Flores coronas mentientes vti primula veris, lychnis coronar. Gartyophylli.

N. *Medulla sambuci, medullam spinalem refert. Grana cini; caput.*

Oculus; Grana herbæ paris, fl. Euphrasie, anthem. calthæ, hieracij argemon. anemon. scabios. &c.

Dentes; Hyoscyamus sine filiquis acini mali punici, pinei nucleï, dentaria, folia vermicularis, radix chelidoni min.

Aures; asari folia, cochleæ.

Nasum; fol. mentastri aquatici.

Oesophagum; canales allij: cæpæ, leuistici.

Guttur seu tracheam asperam; pyrola, vuularia, ceruicaria, cassia fistularis, flores periclymeni.

Diaphragma; Alchimilla.

Pulmones; pulmonaria saxosa, pulmonaria maculosa, pulmonaria quercina.

Cor; Citri fructus, anthoræ radix, alleluja, fructus anacardi.

Iecur; Lichec, fungus betulæ, quercus, Iecoraria.

Venas Iecoris aut lienis excarnatas; Summitates anethi, fœnicul. asparag. centaur. min. cærefol.

Lienem; Scolopendrium, lingua cerui, lingua auis dicta, lupinus.

Venarum vel arteriarum truncum excarnatum; absynth. arthemisia.

Ventriculum; folia cyclaminis, Zingib. galanga.

Intestina; conuoluulus, calam. arom. Cassia fistularis, lumbrici.

Vesicam; Alkekengi, nux vesicaria, colutæa, solanum.

Pudenda; Arum fabæ.

Ligamentum umbilicæ vtero infixum; nymphææ ligamenta seu caulis.

Testiculos ac genitalia; species omnes orchidum, satyrium, dracunculus, porrum, boletus ceruinus.

Vterum; pistolochia, aristolochiæ radix (radix caua) Grana actes, Sambuci, cyclamen, placenta refert.

Renes; portulaca.

Articulos; hermodactylus, (scilicet quæ genicalatâ) harundo faria pariglia.

Manum; palma christi.

Capillos; muscus arborum, capillus veneris, abrotanum.

Repræsentant humores:

Bilem flauam; Plantæ floribus vel succis flauis croceisue, vel animalia similia. Eaque vel in alimentorum numero sunt; vt Cuminum (liuidi coloris) crocus, beta, ficus, mel, &c. Vel in medicamentorum, vt aloë, senna (floribus ex pallido luteis) absynthium (aureo comarum flore) tithymali (floribus croceis.) Colocynthis (flore & fructu luteo,) ricinis (flore flauescente,) rhabarbarum, &c.

Bilem passinam; Quæ viridi & herbaceo colore prædita, vt, blitum, atriplex (herbaceis floribus.)

Bilem pallidam; bryonia (florib. pall.)

Bilem atram; Quæ floribus, foliis vel succo nigrescunt, purpureascunt, cæruleisue sunt coloris, vt: tabac (floribus masculosis) multaue leguminum genera floribus purpureis obscuris, v. gr. lens, smilax hortenensis, vicia, blitum (folio nigro) tubera, carnes ferinæ. Cicer (flore cæruleo) veronica (fl. cærul. vel pur.) borrago; buglossa, &c.

Pituitam; plantæ albifloræ, animaliaue albicolora, v. g. cucurbita (fl. candidis,) fungi

fungi albi, lactuca, caro suilla, agnina, &c. agaricum, &c.

Sanguinem; quæ rubri coloris sunt vel rubro colore tingunt, vt; Santalum rubrum, rad. china, filicis, acetosa, &c.

Mistos humores, quæ misciculis sunt vt, Iris.

Lac & sperma, quæ lactis instar sunt, vt Lactuca, fenchus, carduus lacteus, &c.

Representant animalia bruta eorumque partes, sc.

Scorpionem. Radix yerua, Cyperi.

Serpentes & Viperas. Bistorta, Coronopus sylvestris seu serpentina (radicibus constat tenuioribus contortis in angulis formam.) Scorzonera.

Herinaceum; echinati castaneæ cortices; diplaci capita. carduorum fructus.

Animalium cornua; cuminum contortis summitatibus, &c.

Representant morbos:

Calculus; omnis generis calculi (crystallus, flix, &c.) milium solis, radix faxifragiæ alb. cortices lapidei nucleorum vt & nuclei ipsi, crustacea omnia.

Exanthemata: Lentesc.

Excrecentias: Agaricum, gallæ, & reliquæ arborum excrecentiæ. Lichen

petraeus vesiculis insignitus, quæ referunt vesicas Iecori nonnunquã adnatas.

Ficus ani: Scrophularia radice nodosa.

Herniam: Perfoliata.

Hydropem: Bryoniæ radix (habet signaturam pedum hydropici.

Ictericam: Chelidonia (succo flauo) Crocus, Centaurea.

Lentigines, Lichenes, impetigines: Betulæ cortex albis interlitus maculis, Lichen arboribus innascens.

Maculas: Allium, arum, arisarum, perficaria, pulmonaria (foliis sc. maculosis.)

Polypum: Chelidoniæ minoris radix; Polypodij radix.

Scabiem: Polypodium in dorso scabritiem refert. Sabina (superficie scabra) Aselli.

Spasium: Limaces (leui occasione sese contrahunt) erinacei, lumbrici, aselli, &c.

Vomicas & abscessus: Tubercula arborum cum lacrymis inibi contentis: V. gr. lacryma seu resina nouellarum abietum è tuberculis.

Vulnera: Perforata, millefolium (quia pertusa sunt & sanguinem expressum exhibent.)

Tumores: Bardanæ tubercula, die Kletten.

CAP. XXXIX.

De Cognitione qualitatum manifestorum.

A Fontibus signationis ad species descendimus, quæ etsi dari variæ possint, quippe nunc cognoscendæ sunt ipsæmet rerum species, nunc facultatū vigor, &c. Attamen, quia Medici de indagandis viribus præcipuè solliciti sunt, ha-

rum inuestigationem potissimum aggredimur; specierum cognoscendarum cupidum et auctores remittentes, qui magna inde compilauerunt volumina. Si quatenus ex ipsis necessaria fuerint, siue ad distinguendam speciem à specie, siue ad

diudicandam rem genuinam à falsa & adulterata, suis locis breuiter indicare studebimus.

N. *Premittere hic placet: rei cuiusque qualitates sensiles, (quippe quæ ob oculos sunt,) dispositionem bonam malumque sine difficultate arguere, adeoque res bonas censerè, quarum sapor, odor, color, crassities tenuitasque, soliditas aut raritas, durities vel mollities, grauitas seu ponderositas aut leuitas, &c. secundum naturam sese habent; malas, e contra. His si signa reliqua addideris, circumstantiasque productionis, collectionis & asseruationis, consideraueris, adeoque pensitaueris, quibus causis, qua materia, quo tempore, quo loco, quo modo res. (E.g. nativæ,) tum productæ, i.e. sate, enate, educatæ, tum collectæ, tum quoque, quamdiu, quibus vasis & locis, ut & quomodo fuerint asseruatæ, his, inquam, certius de concepta bonitate decernere poteris.*

Facultates medicæ vel manifestiores sunt, vel occultiores.

Manifestiores, quas & generaliores dicere licet, siquidem generaliter sine respectu alicuius membri aut morbi considerantur, sunt, primæ dictæ & ex his dependentes secundæ. Occultiores quas & specialiores dixeris, sunt, quæ partem aliquam certam morbumue certum respiciunt.

N. *Maiores in inuestigandis solis manifestioribus ferè occupati fuerunt; recentiores ad occultiores quoque penetrare studuerunt. Fontes maiorum præcipui fuerunt.*

1. Experientia. 2. Ratio, eaque quintuplex scil. 1. sumpta à velocitate tarditateue alterationis, (v.g. calcificationis, congelationis, &c.) 2. ab odoribus. 3. à saporibus. 4. à coloribus. 5. ab operationibus & virtutibus cognitis. Vid. Auicen. l. 2.

canon. Modernorum fontes in inquirendis occultioribus sumuntur præcipuè, si signaturæ similitudine. Vide Bapt. Portam in phytognom. quem secuti sunt Quercetanus, Crollius, Nollius.

Qualitates primæ cognoscuntur.

1. *Ex Sapore: Acer vehementis caliditatis est indicium: acutus fit, cum calor ad summum superauctus est: acerbus est frigidus, siccus, & terrestris: acidus est humectior quam frigidior, fitque ubi cum austero plus humidum miscetur: amarus fit, cum calor plus, quam par sit, increbuit, ariditate & caliditate præstans, siccitate scil. terrestris: austerus fit, si acerbus paulum remittatur, estque plus frigidus quam humidus: dulcis exoritur ex temperata humiditate & caliditate; Salsus, si calor inualefcit, ob id calefacit, abrodit abstergitque: uictuosus seu pinguis, minus quam dulcis caliditate præstat, atque aërem participare videtur: insipidus seu aquens, frigida ac humida statuitur temperaturæ. Port. in Phytogn.*

N. *Duo quæ hic moneam habeo. 1. est, quod vix plurimum mixti occurrant sapes, in quibus lingua facile decipi, adeoque iudicium errare potest. 2. est, quod sapes potius qualitatum salinarum, quam elementalium primarum sint indices. V.g. Sapor amarus est naturæ salis gemmæ vel nitri, adeoque pollet facultate tergente, lumbricos fugante. Acerbus naturæ est aluminis & stipatur virtute adstringente. Acidus essentia est salis ammoniaci, adeoque celebratur facultate incidente, est tum extinguente, dissolvente, coagulante (nimirum teste Quercetano dissoluit corpora, coagulat spiritus.) Austerus naturam sapit vitrioli, eapropter qualitatis est adstrictoria, fermentatina. Salsus naturæ est salis, unde virtutis incidentis, abstergentis.*

2. *Exodo*

2. *Ex odore*: Odor saporisationem sequitur, magnaue est odoris & saporis cognatio. Hinc odor gratus bene olens vt plurimum caliditatis est indicium; *foetens*, frigiditatis ac humiditatis excrementitiæ. *Mordax*, *amarus*, caliditatis: *acerbus*, *acidus*, &c. frigiditatis. *Inolida* sunt fere quæ humida.

N. Auicenn. lib. 2. Canon. cap. 3. *Odor*, inquit, qui sentitur, si mordacitas aut declinans ad latus dulcedinis, omnes illi calidi: si aciditas mucida, lenta, & omnes illi frigiditatem (perhibent) & bene olentia plurimum calida, &c.

3. *Ex colore*: Color albus & pallidus, humidi temperamenti indicium, omnibusque in rebus color albus imbecillitatem notare solet. *Flauus*, ex calore oritur. Flores, qui luculento colore nitent, ex cibo pingui & humido proueniunt. *Bapt. Port. in phytogn.* *Rubeus*, *croceus*, &c. immodicæ siccitatis & caliditatis argumentum. *Virides* seu *porracei* coloris folia ex humiditate multa proueniunt.

N. Bapt. Port. in Phytogn. lib. 2. cap. 36. Flores recenter nati obnatiuum humorem colorationes sunt, atate prouentim verò pallidiores, decolorati & deformes: nam sicciore atate sunt. Sic Auicenn. lib. 2. can. cap. 3. Color albus in corporibus congelatis, quæ in se (habent) humiditatem, non est nisi ad substantiam frigidam, & in corporibus, quæ in se (habent) siccitatem, & diuulsio non est nisi ad substantiam calidam & niger in utrisque per contrarietatem. Etenim frigus albificat humidum & denigrat siccum, & calor denigrat humidum & album reddit siccum. Item; sunt quidam colores (tendentes) ad albedinem, & quidam eorum ad tincturam rubram & nigram. Etenim tendens ad albedinem, si est in natura in specie frigidorum, est frigidior & tendens ad

alias (rubedinem & nigredinem) minus frigidus. Et si est natura ad calidum (vergens) & res è conuerso (se habet.)

Ex tribus hisce præcedentibus primas tenet sapor, hinc odor, postea color. Auicenn.

4. *Ex qualitatibus tactilibus*. *Craffiti* signum est. 1. abundantium partium terrestrium. 2. humidarum videlicet frigore congelatarum. *Tenuitas* partium ignearum vel ærearum. *Densum* vel est exiccatum, vel frigore congelatum concretum. *Rarum* siccitatis comes. *Durities* ex sicco est & terrestri (nisi humorum repletio & intensio adsit.) *Mollities* humiditatem participat. *Crassitas* comes est densitatis. *Leuitas* raritatis. *Leuitas* ex humiditate est; *ariditas* ex siccitate. *Leuitas* ex humiditate ærea vel aquea est; *Asperitas* ex siccitate.

5. *Ex dispositione* seu *mutabilitate*, eiusque recipiendi modo facili vel difficili. E.g. Quæres recipit velocius calefactionem; calida censetur; quæ refrigerationem; frigida. Similiter quæ velocioris est congelationis, illa frigidior est, & quæ velocioris inflammationis, ea est calidior, &c.

6. *Ab Ætate*: *Iuniora* humidiora fere sunt, *vetusta*, sicciore. Item crescentia dum immatura adhuc, austeritatem acerbitatemque ferè sapiunt, & inde frigiditatem.

7. *A loco natali*, *Lacustres* plantæ temperamenti ferè sunt humidi & frigidi; quod & animalia dulci aqua degentia imitantur. *Palustres* sunt fere frigida ac siccifuscula (ob aquam & terrestrem essentiam.) *Fluminalis* sunt sicca & insigniter calida, vt quoque linguam nonnullæ exulcerent. *Marina* sunt frigida & sicca (frigida ob aquam, sicca propter sal.) *Pinguis humi* accolæ sunt calida & humida

humidæ, vel humiditate & siccitate temperatæ. *Ieiuni soli* planta calida & sicca existit. *Mediocris terra* conuictrix, tepida est & naturæ nostræ familiaris. *Are-nosi soli* planta est calida & sicca, tenuium partium. *Ancipitis vitæ* plantæ temperamenti sunt misti; Similiter & animalia ancipitis vitæ, mixti temperamenti sunt, & vt plurimum humidiora & excrementitia. *Plantæ amphibie* in locis asperginosis enatæ, sunt frigida & sicca. *Litorales* marinæ; salis naturam sapiunt, sunt ergo calidæ & sicca. *Monticola* plantæ, ex agri exilitate sicci nascuntur temperamenti & ex solis apricitate, calidi; sunt insuper partium tenuium. *Campestræ* mediocriter calidæ sunt & sicca, Plantæ in *canis locis* nascentes frigida sunt & humidæ, (ob solis absentiam & foli vlginitem.) In *collibus* nascentes temperatæ sunt. *Syluestres* domesticis sunt sicciores & frigidiores (si sint eiusdem speciei.) *Domestica* sunt mitiores & debiliores.

N. Dioscorid. in præfat. l. i. ad Areum: Magni refert, si ea loca, in quibus herba prodeunt, cliuosa & ventis exposita sint & persflata, frigidaque & aquis carentia, cum his in locis vires earum longe validiores intelligantur, cum ea contra, que in campestribus, riguis & opacis, ceterisque locis à vento silentibus nascuntur, plerumque degenerent & minus viribus valeant. Sic & Auicennal. 2. tr. 2. c. 5. Ille (planta) quarum collectionis loco sunt ventosa, vel que sunt aëri & vento exposita & sunt versus orientem soli exposita, sunt fortiores aliis.

Ad eundem sensum ait & Quercetan. l. i. defens. Herm. c. 8. Videre est simplicia vehementes Euacuationis, in montib. potius & saxosis locis, aut inter rupes vbi natiua sedes est metallicorum spirituum, quam in pingui, & fertili loco luxuriare. Quæ vt mitiora & correctiora reddantur ac syluestrem illam suam naturam exuant, in domesticos hortos traducendæ sunt & rransplantandæ

8. *Ab operationibus.* Sic *calidum* censetur, quod subtile reddit, resoluit, abstergit aperit, mollit, maturat, concoquit, incidit, attrahit, mordicat, rubefacit, adurit: &c. *Frigidum* quod repellit, incrassat, crudum facit: &c. *Siccum*, quod constringit, exprimit: *Humidum*, quod inflat, abluit, lubricat, lauigat, &c. Auicenn. l. 2. can.

N. *Facultates hæc pleraque rectius salibus acceptæ feruntur.*

9. Hisce *Experientiæ* superaddere necessum est, quæ sola, reliqua fere omnia, certitudine vincit. Obseruatis tamen conditionibus, ad experientiæ certitudinem requisitis. De quibus supra c. 37.

Qualitates secundæ cognoscuntur.

E datis qualitatibus primis: Nimirum his cognitis non possunt non innotescere & qualitates secundæ, vtpote quæ primarum proximæ pedissequæ sunt. E. gr. calidum reddit subtile, abstergit, aperit, maturat, concoquit, discutit, incidit, &c. Non parui autem hic momenti est, sapores examinare, atque secundum eos vti supra diximus, qualitates secundas demetiri.

CAP. XL.

De Inuestigatione qualitarum occultarum.

Facultates occultiores ex similitudine inprimis coniecturantur, hinc experientiâ confirmantur.

N. De facultatum occultiorum inuestigatione qui prolixius erudiri sategit, consulat *Phytognomicam* Ioh. Baptista Porta. Signaturas Crollij bâsiliæ suæ annexas: *Quercetani signaturas in libro de prisca medicina collectas, Nollii in physicis. Nos cõpendij studio, quàm breuissimis eâ regulis includimus. Et sũt.*

1. Plantæ, quæ repræsentant partem aliquam hominis, habentur eisdem salubres (puta nisi subsit venenata qualitas.) Sic capiti conueniunt capitata: *Iuglans, nux Indica, &c.* Idem sentiendum de animalibus eorumque partibus. Sic confert Lien, lien; Epar, epati, &c.

2. Plantæ quæ colore suo, &c. repræsentant humorem (in homine) eisdem conuenire coniecturantur, adaugendo si in alimentum venerint, expurgando vel corrigendo, sin in medicamenta. V. g. *Bilem flavam generant, quæ in alimenta veniunt crocei flauique coloris: crocus, beta, ficus, mel, &c.* Vide supra c. 38.

3. Quæ repræsentare videntur morbum, morbosumve habitum, ad curationem eiusdem facere statuuntur: Sic profunt sin calculo, ea quæ repræsentant lapides. E. g. milium solis, testæ ouorum, &c. Sic abolent maculas herbæ & animalia maculosa: squa-

mas, squamosa. Sic sanant perforationes corporis, i. e. vulnera herbæ scilicet perforatæ: Sic plantæ quæ gummi & resinas refudant, ad gummi & pus valent. Plantæ & animalia tumentia, tumentibus partibus profunt. Plantæ & animalia quæ caudicis fissionem & vulnera patiuntur, ad glutinanda vulnera faciunt: Quæ corticem cutemve facile abiciunt ad mundandam cutem. Vide Ioh. Bapt. Port. *Phytogn.* l. 5. & supra c. 38.

4. Plantæ & animalia qualiter in actionibus & moribus deprehenduntur taliter & in homine statuuntur operari.

N. Nimirum ut diximus c. 36. *Vnaqueque res mouet & conuertit ad suum simile. Si igitur volumus operari ad aliquam proprietatem vel virtutem, queramus animalia, vel res alias, quibus talis proprietas vel actio excellentius inest. Quid autem per actiones intelligatur, diximus cap. 37.*

Sic res steriles creditur reddere homines steriles. V. g. *Lactuca, filix, salix, fabina, &c.* Ut & animalia sterilia, mulus, &c. Sic res Salaces & fecundæ fecunditatem inferre censentur & ad venerem facere. E. gr. Passer; stincus, & cæt. Plantæ multiferæ; animaliaque multipara facere ad conceptum statuuntur, & cæt. Plantæ longæuæ perpetuoquæ virentes, vigorem homini conciliare dicuntur. Herbæ & animalia voracia, concoquendi

L facultas

facultatem hominibus præstare. V. g. lucij, lupi. Animalia quæ ingenio & docilitate valent ad hominum intelligentiam & memoriam valere. Econtra quæ indocilia, ruditatem conciliare. Animalia tristia, tristes efficere; somniculosa, somniculosos; Vigilantia vigiles; ferocia, feroces; iracunda, iracundos, &c. Bapt. Phytogn. l. 6. & 7.

5. Plantæ quæ inter se vel cum parte aliqua animalis quoad *signaturam* conueniunt, & viribus conuenire statuuntur.

N. *Configuratio*, i.e. *similitudo signatura* quæ in uno & altero deprehenditur, cœu effectus similis præsupponit similitudinem utriusque interni agentis, idque tanto euidentius, quanto signatura illa fuerit ætior. Sic coniecturantur alexipharmaca quæ C. Cerni mentiuntur, serpentesque representant, &c. idque ex hoc fundamento; quod id quod C. Cerni figuram gerit, à simili principio interno sit productum, à quo idem illud Cornu, Similitudo igitur principij coniecturare facit similitudinem virium.

Et tantum de Isagoge, &c.





P H A R M A C O P O E I A E,
 MEDICO-CHYMICÆ,
 L I B E R I I.
 D E O F F I C I N A.

C A P. I.

De Definitione & distributione Officina.



FFICINA est pars pharmacologiæ, quæ seriem rerum medicinalium secundum classes officinales describit.

N. Subiungimus classibus præparatorum composita quæque famosiore ac celebriora, utpote quæ non modo non patiuntur ad specialiores libros referri, sed & visa sunt regularum illustrationi inseruire.

Classes officinales voco quæ officinis sunt vsuales, siue extemporaneo vsui eæ destinantur, siue asseruationi vsuique futuro. Suntque classes hæ tum Natiuum, tum Præparatorum.

Natiua sunt triplicis sortis: vel enim sunt naturæ macrocosmicæ, vel vegetabilis, vel animalis.

E regno macrocosmico sunt mineralia vulgo dicta: Terræ, Aquæ, Lapides, Metallica seu mercurialia, salia, & sulphura.

Ex familia *Vegetabilium* sunt: 1. Aro-

mata, Cortices, Flores, Folia seu herbæ, Fructus, Fungi, Ligna & Visca, Radices, Semina. 2. Succi, Olea, Resinæ, Gummi-resinæ, Gummi.

Ex *animalium* profapia sunt: 1. Animalia integra; Partes carnosæ, membranosæ, Cornua, Ossa, crustacea seu testacea, Lapilli, Lac, Fella, Medullæ, Pinguedines seu axungia, Sanguis, Seuæ, Stercora, Vrina, Vngues & Vngulæ, Coagula.

Et hæc singula generatim hoc libro describuntur, subiunctâ serie suorum præparatorum.

Præparata sunt: Acera, Aquæ, Balsami Boli, Calces, Cataplasmata, Clysteres, Conditæ, Confectiones, Conseruæ, Decocta, Electuaria, Elixiria, Emplastra (Cerota) Emulsiones, Erchina, Epithemata, Extracta, Farinæ, Feculæ, Flores, Gargarismi (collutiones) Galatinæ, Infusiones, Iulepi, Lapides, Liquores (per deliq.) Magisteria, Masticatoria, Morselli, (Rorala) Moreti, Olea, Portiones, Pilulæ,

L 2 Pom.

Poma ambræ, Præparata, Pulueres (Tra-
geæ) Species, Salia, Spiritus, Succī, Syru-
pi, Tincturæ, Trochisci, Vnguenta (Bal-
fami Vnguentarij, Linimenta.)

C A P. I I.

De Terris.

Terræ Officinales sunt solum quas
experientia medicinalibus vi-
ribus imprægnatas edocuit. Tales sunt
terræ minerales dictæ.

Terra Armena, bolus armena, vera
feu orientalis.

Bolus vulgaris, Bohemica, Brundusia,
&c.

Terra Lemnia, T. sigillata Turcica.

T. Silesiaca, T. sigillata Silesiaca Li-
gnicensis, Strigenfis.

Creta, *Kreid.*

Gypsum, *Gyps.*

Marga, *Mergell.*

Lithomarga, medulla faxorum, *Stein-
mark.*

Ochra, *Ochergeel.*

Rubrica fabrilis, *Ræthe, Rætelstein.*

Tripolis, Terra tripolitana.

Vires: De Viribus terrarum, quia ge-
nerali penicillo depingi nequeunt, l. 3. si-
gillatim agemus.

Præparata communiora sunt. 1.
Præparata in specie sic dicta. 2. De-
stillatæ aquæ, spiritus, &c. Vide partim
infra in classibus præparatorum, partim
lib. 3.

C A P. I I I.

De Aquis.

Aquas officinales tum natiuas esse,
tum artificiales seu præparatas, li-
bro superiore diximus.

In classe natiuarum sunt:

Aqua fontana, *Springvvasser.*

putealis *Brunnenvvasser.*

fluuiialis, *fließend vvasser.*

Glaciei Martiæ, *Mertzenisvvasser.*

Lacustris, *Stehend VVasser.*

Pluuiæ, niuea, *Regend vnd Schne-
vvasser.*

Tonitrualis, *Donnerregenvvasser.*

Ros maiialis, *Meyenthau.*

His adiungi possent aquæ minera-

les, quales sunt acidulæ ac thermæ, ve-
rùm quia officinis peregrinæ sunt, eas
hic loci prætermitto.

N. unicum quod hic moneam est,
quoties aqua simpliciter mentio fit, fonta-
nam intelligi, eamque puram, limpidam,
leuem. Leuitas enim vti spirituum copio-
sorum nota est. E. g. in Vino, ceruisia,
&c. ita & in aqua bonitatis indicium non
vltimum existit.

Præparata vltatiora ex aquis præter
pluuiam destillatam rarissima sunt,
nisi scil. decocta, &c. quæ aquæ ope fiunt,
huc referre velis.

CAP. IV.

De Lapidibus.

Lapidis vox tùm inter natia locum obtinuit, tùm inter præparata. In natiorum numero sunt. 1. Minerales lapides, de quibus hic. 2. crustacei lapides, quales in capitibus quorundam piscium; de quibus animalibus. 3. cortices lapidei nucum. 4. acini duriusculi, &c.

Lapides minerales officinales sunt:

1. *Lapides preciosi seu Gemmæ.*

Amethystus, *Amethist.*

Carneolus, *Sarda, Sardonyx.*

Chrysolithus, *Chrysolith,*

Granatus, *Granat.*

Hyacinthus, *Hyacinth.*

Rubinus orientalis, *Rubin.*

Saphyrus, *Saphir.*

Smaragdus, *Schmaragd.*

Huc Margaritæ, *perlen.*

Corallia, *Corallen.*

Lapis Bezoar Orientalis & Occidentalis, *Orientalisch und Occidentalisch Bezoarstein.*

Ex his quinque *αἱ ἐξ ἑκ'* preciosi dicuntur.

Granatus, Hyacinthus, Sapphirus, Sarda, Smaragdus.

1. *Lapides minus preciosi.*

Lapis Ærites, Aquilæ, *Adlestein.*

Alabastrum, alabastrites, *Alabaſter.*

Amiantus, alumen plumosum, *Federweiſz.*

L. Armenus, *Armenerstein.*

L. Calaminaris, *Galmeystein.*

Cryſtallus, *Chryſtall.*

Hæmatites, *Blustein.*

L. Iudaicus, *Judenstein.*

L. Lazuli, Cyanus, *Laſurstein.*

L. Lyncis, Lyncurius, *Luchsstein.*

Donnerkeil.

Magnes, *Magnetstein.*

Marmor, *Marmelstein.*

L. Nephriticus, *Grieſſtein.*

Osteocollus, *Vellstein, Steinbein-*

vvelle, Beinbruch.

Pumex, *Binnsstein.*

L. Scissilis, *Schiefferstein.*

L. Serpentinus, Ophites, *Serpentin-*

stein.

Silex, *Kiſelstein.*

Simiris, *Smirgel.*

L. Specularis, Selenites, *Aphroſeli-*

nus, Fravveneiſz.

• Spongites, Spongiæ lapis, *Schwamm-*

menstein.

Talcum, *Talck,*

Huc calculus humanus.

Vires. *Lapidosa omnia teſte Galeno lib. 9. ſimpl. deſiccatoria vi pollent, tum exiccatoria ſunt.*

Præparationes pro diuerſa natura lapidum diuerſæ quoque ſunt. Vnde & diuerſa præparata: Videlicet 1. Præparata in ſpecie ſic dicta. 2. Sal (improprie ſic dictum.) 3. Magiſterium. 4. Liquor ſeu oleum. 5. Elyxir. 6. Eſſentiæ. 7. Flores. 8. Syrupi. 9. Ingrediuntur quoque alias medicamentorum compoſitorum formulas. De quibus plenius lib. 3. vt & infra in præparatis.

C A P. V.

*De Metallis, & quæ eis affinia sunt.**Metalla sunt.*

Aurum foliatum finum, *geschlagen
fein Gold, Blattgold.*

Duplicatum, *halbgeschlagen Gold.*

Vilius, mistum, bicolor, *Zunischgold.*

N. *Est aurum alcoholisatum adscri-
bendum, Muschelgold.*

Argumentum foliatum finum, *Blatt-
silber, geschlagen Silber.*

duplicatum, *halbggeschlagen Silber.*

Æs, Cuprum, *Kupffer.*

æris squamæ crassiores, *Kupffer-*

Hammersehlag.

æris flos. *Viride æris, Spangrun.*

Ferrum, *Eisen.*

Ferri batituræ, squamæ, *Mammer-
sehlag.*

Limaturæ, *Feilach.*

Scoriæ, *Schlacken.*

Plumbum, *Bley.*

vstum, calcinatum, *genbrand Bley.*

Stannum, *Zinn.*

Metallorum præparationes. Vide sis,
lib. 3.

Metallis affinia sunt.

Mercurius, *Quecksilber.*

Cinnabaris, *Zinnober.*

Antimonium, *Spiessglas.*

Huc. *Excrementa à Metallis
segregata.*

Bisimuthum, *VVissimuth.*

Cadmia natiua metallica, Cobaltum,
Muckenpulver.

C. Factitia.

Lithargyros Auri, *Goldglett.*

Argentii, *Silberglett.*

Pompholyx, Nihili album, Tutia,
Augennicht.

Præparata singulorum dabuntur, li-
bro 3.

C A P. VI.

De Salibus.

Salia in Officinis natiua sunt & præ-
parata seu artificialia.

Natiua sunt.

Alumen rupeum, Roche, *Alaun.*

Saccharinum. *N. Præparatum est.*

Sciifile, *Spaltaleum.*

Sal. ammoniacum, *Salmiar.*

cômune, *gemein Saltz, Speisz, Saltz.*

Gemmeum, *Steinsaltz.*

Nitri, Sal petraë, *Salpeter.*

Vitriolum album, *Galitzenstein,
Augstein, VVeißvitriol.*

Cæruleum, cyprium. *Cyprisch Vi-
triol.*

Viride. *Gemein Vitriol*

C A P. VII.

De Sulphureis.

Sulphur Caballinum, *Casschuuebel.*
 Citrinum, *gelber Scheuefel.*
 Viuum, *lebendiger Schuuefel.*
 Ambra, Ambra Grisea, *Amberrechter*
Ambar.

Bitumina.

Asphaltos, Bitumen Iudaicum, *Iu-*
denpech, Brillenpech.
 Carbo petræ, *Steinkölen.*
 Gagates.

Naphtha.
 Petroleum, *Steinöl.*
 Sperma ceti, *VVollraht.*
 Succinum, Carabe. 1. Candidum.
Agistein, Bornstein, VVeisz
 2. Citrinum, *gelber, Bornstein.*
 De singulis his agetur plenius li-
 bro 3.
 N. Crustacea. E.g. *concha, &c. in ani-*
malibus.

C A P. VIII.

De Aromatibus.

Inter vegetabilia primum locum me-
 ritò sibi vendicant aromata, quippe
 quæ, vti reliquis communiora sunt, ita
 & in præscriptionibus (receptis vt vo-
 cant) simpliciter præscribuntur, non fa-
 cta, mentione aliquâ siue ex radicum
 numero illa sint, siue ex fructuum, flo-
 rum, corticumue. Talia sunt:

Antophylli, *Mutternaglein.*
 Calamus aromaticus, *Calmus, VVurtz-*
rohr.

Cardamomum maius, *Crosscardo-*
mœmlein.

Minus, *klein Cardomœmlein.*

Cariophylli, *Nägelein.*

Cassia lignea, *Mutterzimmet.*

Cinnamomum, Canella, *Zimmet.*
Canell.

Costus Arbicus Verus, Cinnamomum
 album, *vveisz. Zimmet.*

Crocus Orientalis, *Orientalisch Saf-*
fran.

2. Austriacus, f. Vngaricus, *Oester-*
reichischer odor Vngarisch Safran.

Cubeby, *Gubeben*

Folium Indum, Malabathrum, *Indis-*
chblat.

Galanga maior, *grosser Galgan.*

Minor, *Galgan.*

Grana paradisi. Cardamomum Ara-
 bum, *ParadisKærner.*

Macis, *Musscatbluet.*

Nuces moschata, myristica. Nucista,
Musscatnüsse.

Piper album, *VVeisz Pfeffer.*

longum, *langer Pfeffer.*

nigrum, *Schwartzer Pfeffer*

Schænanthum, *Camelsheu.*

Spica, Celtica, Romana, *faliunca, Cel-*
tisch Spick.

Zedoaria, *Zitunian.*

Zingiber finum album bellerinum
 Belladin Inguuer, gutter vveisser Thron-
 Inguuer.

— de buli vel rubei, *geel oder rother Ingwer.*

Vires: *Aromata in genere sunt calida & euidenter sicca, partium tenuium, hinc incidunt, attenuant, aperiunt, &c. Vide in singulis plenius.*

Preparata ex aromatibus fieri possunt formularum variarum. Apta sc. nata sunt subire infusionem, decoctionem,

confectionem, puluerificationem, adeoque immisceri possunt Electuariis, Trochiscis, &c. Petiora tamen & minus vulgaria quæ inde conficiuntur sunt: Extracta, Aqua, Olea, Salia, Magisteria.

N. *Vis aromatum quia in parte volatili potissimum consistit, præstat inde conficere preparata volatilioris nature, ut sunt destillata, &c.*

C A P. I X.

De Corticibus.

1. *Cortices officinis vstatiores sunt.*

E Fructibus: cort, Aurantiorum. *po-merantzschalen oder Rinde.*

Castnearum, *Castanienschälffen.*

Citri, *Citronenschalen.*

Gladium, Cupulæ gladium, *Eichen Hütlein.*

Granatorum. Malicorium, *Granat-Appffel Rinde.*

Iuglandis viridis, *grüne Nuszschalen.*

Limonum, *Limonerinde.*

2. *Ex arboribus & radicibus.*

Cort. Acaciæ, pruni syluestris, *Schle-dornrinde.*

Radic. Cappar. *Capparrinde.*

Frangulæ, alni nigræ, *Faulbaum-rinden.*

Fraxini (interiores) *Eschernrinde.*

Guaiaci, *die Rinde vom Frantzosen baum.*

Rad. Mandragoræ.

Quercus, *Eichene Rinde*

Sambuci, ex frutice ac radice (medij.) *mulere Holderrinde.*

Tamarisci, *Tamar-Rinde,*

Thuris

Tiliæ (interiores) *die Rinde vom Lindenbaum.*

Preparata: Ut cortices substantia differunt, alij nimirum conueniunt cum fructibus, alij cum herbis quidam cum lignis: ita & diuersis inseruiunt præparatis. Communiora tamen sunt, conditi cortices (fructuum quorundam) item Extracta, &c.

C A P. X.

De Floribus.

Flores Officinales sunt.

Flores Acaciæ, pruni syluestris, *Schle-bendornenblut.*

Amaranti purpurei, *Floramor.*

Anethi, id est, cema seu Umbellæ, *Dillenblut.*

Anthos, seu Rosismarini, *Rosmarien-blut.*

Aquilegiæ, *Agleibut.*

Basilici, *Basilienblumen.*

Betonicæ, *Betonicke.*

Borriginis, *Borrageubl.*

Buglossæ

Buglossæ, *OchsenZungbl.*

Calcatrippæ, feu. consolidæ regalis, *Rittesporenbl.*

Calendulæ, Calthæ, *Ringbl.*

Caprifolij, Periclymeni, *Specklilien.*

Carrami, Cnici, *Flor, VValdsaffran.*

Centaurij minoris, *Tausentguldenbl.*

Ceraforum, *Kirschenbl.*

Chamæmeli feu Camomillæ vulgaris, *Camillenbl.*

Romanæ, *Rœmisch Camillenbl.*

Cheriri, *gelbe violen.*

Cichorei, *VVegevveißbl.*

Cyani s. Bapti feculæ, *blauv Kornblumen.*

Fabarum, *Benenbluet.*

Genistæ, *Ginstern, Pfrimmenblüt.*

Flor. Granatorum, Balauftia, *Granatenbl.*

Hepaticæ albæ, nobilis, *Leberkrautblüt.*

Hyperici, *Iohannisblüt.*

Iuglandis, *Nußbl.* Iuli Iuglandis,

Lauendulæ, *Lavendelbl.*

Ligustri, *Hartriegel.*

Liliorum alborum, *vveiß Lilienbl.*

Antheræ liliorum alborum.

Liliorum conuallium, *Meyenbl.*

Maluæ hortensis, *VVinter Rosen.*

Meliloti, *Steinkleebl.*

Nympheæ albæ, *vveisse Seebl.*

Luteæ, *helbe Seebl.*

Pæoniæ, *peonienbl.*

Papaueris erratici: Rhæadis, *klapperrosen.*

hortensis, *Magfamenbl.*

Perfici, *Pferfigbl.*

Populi, i.e. gemmæ feu oculi, *Pappelknospen.*

Primulæ veris, *paralyfis.*

Rosarum albarum, feu potius palli-

darum, *vveißs Rosen.*

Damascenarum.

Rubearum.

Saluiæ, *Salveyblüt.*

Sambuci, *Holderbl.*

Saxifragi albæ, *Steinbrechbl.*

Scabiosæ, *Apoſtembl.*

Schœnanthi, *Camelheuv.*

Siliginis, *Kornbl.*

Spicanardi, *Spicanardi.*

Stœchados arabicæ, *Stechasbl.*

Stœchad. citrin. *Reiblumen.*

Tanaceti, *Reinfarnbl.*

Tiliæ, *Lindenblut.*

Tunicæ, *Grassnagelbl.*

Tussilaginis, *Hufflattichblüt.*

Verbasci, *VVulkrautbl.*

Violarum martiarum, *Violen.*

Ex his famosiores sunt. 4. qui peculiari nomine cordiales dicuntur: Borraginis, buglossæ, rosarum, violarum.

Preparata ferè omnis generis ex floribus compilari queunt. Decocta, Destillata, Electuaria, Infusiones, Vnguenta, Emplastra, &c. minus vulgaria tamen sunt: Succus inspissati, Extracta, Tincturæ, Essentiæ seu spiritus ac olea, &c.

N. Flores qui constant ex parte volatili, vix quicquam, vel parum salis exhibebunt, aptioresque sunt ad medicamenta, quæ sine diutina exhalatione parata possunt.

Vires: Vires florum etsi in genere describi nequeant, cum pro diuersitate herbarum varient: attamen hoc loco notare expedit, recentes esse humidiores, adque fere vi lenitina seu laxatiua polle-re, quæ marcescentibus cum tempore adimitur.

C A P. XI.

De Foliis, seu Herbis.

Foliorum & herbarum nomina in praxi seu receptis sapissimè confunduntur, notantque folia à caulibus separata. Hæc si minutiora fuerint, summities dici solent.

Herbæ visitiores in officinis sunt :

Abrotanum mas, *Stabwurtz*.

N. Fœmina cyparissus est.

Absinthium ponticum, *Rœmisch-uermuht*,

Vulgare s. rusticum, *gemein vuermuht*.

Acetosa, *Saurampff*.

Acetofella, Alleluia, *Buchampffer, Hasenklee*.

Agrimonia, *Odermenig*,

Alchimilla, *Sinnaw*.

Alkekengi, Halacacabus, *Indenkir-schenbletter*.

Alfina, Morfus gallinæ, *Hunerdarm*.

Althea, Bisinalua, Ibiscus, *Eibischkraut*.

Anagallis, *Sauchheil*.

Anethum, *Dill*.

Antirrhinum, *Hundskopff, Dorant*.

Aristolochia longa, *lange Osterlucy*.

Arinica, *Mutterwarck*.

Artemisia, *Beyfuss*.

Afarum, *Haselwurtzkrant*.

Auricula muris. Pilosella, *Mausz-æhrlein*.

Balsamita sisimbrium aquaticum, *Bachmuntze*.

Basilicum, *Basilien*.

Becabunga, *Bachbungen*.

Betonica, *Betonien*.

Borrago, *Borretsch*.

Branca vrsina, *Beerenklavv*.

Buglossum, *Ochenzunge*.

Bursa pastoris, *Teschelkrant*.

Calamintha, *Kornmuntze*.

montana, *Bergmuntze*.

Capillus Venetis, adianthum nigrum, *Fravvenhaar*.

Caprifolium, periclymenum, *Vvelt-vvinde Specklilien*.

Cardiaca, *Hertzgespann*.

Carduus benedictus, *Cardobenedictkraut*.

C. Mariæ, *VVariendistel*,

Cerefolium, *Kœrbelkrant*.

Ceterach, Asplenium, *VViltzkrant*.

Chamædrys, Iua moschata, *Gaman derkrant*.

Chamæpitys, Iua arthetica, *Nidrygpin*.

Chamæmelum Romanum, Camomilla, *Kœmisch Camillen*.

C. Vulgare, *gemeine Camillen*.

Chelidonium maius, *Schællkrant*.

Ch. minus, *Schorbockskrant*.

Cichorium, *VVegwurt*.

Cicuta, *VVuterich*.

Cochlearia, *Læffelkrant*.

Consolida regalis, *Ritterspon*.

Coscuta, Callutha, *Flächseyde*.

Cynoglossum, *Hundszung*.

Cyparissus hortulana, *Gartencypresz*.

Dictamnus creticus, *Cretischer Dictam*.

Dictamnus alb. Fraxinella, *vveisser Dictam*.

Ebulus, *Attich*.

Endiuvia

Endiuia fatiua, *Endiuien*.
 Syluestris, Sonchus, *Savvdistel*.
 Epithymus, *Tymfelde*.
 Equiserum, cauda equina, *Roszsche-
 vvantz*, *Schafftenbevr*.
 Eupatorium Arabum, Ageratum, *Le-
 berkraut*.
 Euphrasia, *Augentrost*.
 Farfara, Tussilago, *Hufflattich*.
 Foeniculum, *Fenchelkraut*.
 Filipendula, Saxifraga rubra, *roht
 Soeinbrech*.
 Fragaria, *Erdbeerkraut*.
 Fraxini folia, *Eschenlaub*.
 Fumaria, *Erdrauch*.
 Galega, ruta capraria, *Geisraute*.
 Geranium, Herba Ruperti, *Storch-
 schnabel*.
 Gratiola, *Erdgalle*.
 Hedera arborea, *Epheun*, *Eppich*.
 H. Terrestris, *Gundermann*.
 Hepatica alba, Gramen Parnassi,
vneiff. Leberkraut.
 H. Aurea nobilis, *gulden Leberkraut*.
 H. Fontana, Lichen, *Brunnenleber-
 kraut*.
 H. Stellaris, matris fylua, *Sternle-
 berkraut*, *VValemdister*.
 Horminum, vulgare Scarlea, *Scharley*.
 Hyoscyamus albus, *vneiff*, *Bilsenkr*.
 Hypericum, *S. Iohannskr*.
 Hyssopus, *Ysop*.
 Illecebra, Fabaria, *Donnerkraut*.
 Lactuca, *Lattich*.
 Laurifolia, *Lorbeerbletter*.
 Lentesc palustres, *VVasserlinsen*.
 Leuisticum, *Liebstæckel*.
 Ligustrum, *Harriegel*.
 Linaria, *vnilder*, *Flachs*, *Harnkr*,
 Lotus vrbana, trifolium odoratum,
Siebengezeit.
 Lupuli Iuli, *Hopffenspræßlein*.
 Maiorana, *Meyran*.

Malua vulgaris, *Hasenpappeln*.
 Marrubium album, Prassium *vveisser
 Andorn*.
 --- Marum.
 Matricaria, *Meterkraut*.
 Melilotus, *Steinklee*, *gelb Steinklee*.
 Melissa, *Melissenkr*.
 Menta, *Spitzbalsam*.
 M. Crispa, *Krauszbalsam*.
 M. Saracenica, *Fravvenmüntz*.
 Menthastrum, menta equina, *Ros-
 müntze*, *VValdmüntze*.
 Mercurialis, *Vingelkr*.
 Mezereum, *Seidelbest*, *Kellersbals-
 kraut*.
 Millefolium, *Schafgarbe*.
 Mororum folia, *Maulbeerbletter*.
 Morsus Diaboli, Succisa, *Abbisz*.
 Myrti folia, *Myrtenbletter*.
 Nasturtium aquaticum, *Brunnen-
 kresz*.
 N. hortense, *Gartenkresz*.
 Nepata, Cattaria, *Katzenkraut*, *Ka-
 tzenmüntze*.
 Nicotiana nostras, *Toback*, *Nicotian*.
 N. Peruuiana seu Indica, *Indianisch
 Toback*.
 Nummularia, *Pfenningkraut*, *Egel-
 kraut*.
 Nymphæa alba, *vveiss Seebumen-
 kraut*.
 N. Lutea, *gelb Seebumenkraut*.
 Origanum vulgare, *Dosten*.
 O. Creticum, *Cretisch Dosten*.
 Papaueris folia, *Monbletter*, *Magsa-
 men*.
 Parietaria, Helxine, *Tag vnnnd Nacht*.
 Paris, *Einbeerkraut*.
 Pastinaca syluestris, *Vogelsnest*.
 Pentaphyllum, quinquefolium, *Funff-
 fingerkraut*.
 Perfoliata, *Durchvvachs*.
 Persicaria, Pulicaria, *Flohkr*.

Perfici folia, *Pferſing* bletter.
 Petroselinum vulgare, apium hortense. *Peterſilien*.

Pimpinella Germanica, *Teuſch Bibernell*, *Bockſpeterlein*.

P. Italica, Sanguiforba, *welſch Pimpinell*.

Plantago maior, *breit Vegerich*.

P. minor, *ſpitʒ Vegerich*.

Polygonum, Cétumnodia, *Vegdritt*, *Veggraſʒ*.

Polium Creticum, *Cretiſcher Poley*.

Portulaca, *Burtzelkraut*.

Potentilla, Anserina, *Genſerich*.

Primula veris, *Schluffelblumenkraut*.

Prunella, *Braunnellen*.

Pulegium, *Poley*.

Pulmonaria arborea, muſcoſa, *Eichungen-moeſz*.

P. vera, maculoſa, *Lungenkraut*.

Pyrola, *VVintergrun*.

Quercus folia, *Eichenlaub bletter*,

Rosmarinus, *Rofzmarin*.

Rubi Cymæ, ſummitates, *Brumbeergipffel*.

Ruta, *VVeinkauten*.

Ruta muraria, adianthum album, *Maurrauten*.

Sabina, Sauina, *Sevenbaum*.

Salicis folia, *VVeydenbletter*.

Salvia hortensis maior, *groſſe Salbey*.

S. minor, cruciata, nobilis, *Croutʒſalbey*.

S. ſylueſtris, *wilde Salbey*.

Sambuci cymæ, ſeu ſummitates, *Holderkeimen*.

Sanicula, *Sanickel*.

Saponaria, *Seiſſenkr*.

Satureja, Thymbra ſatiua, *Pfefferkr Sadaney*, *Hunerfull*.

Saxifragia alba, *wweiſz Steinbrech*.

Scabiola, *Apoſtemenkr*.

Scolopendria, lingua ceruina, *Hirſchzunge*.

Scordium, *Lachenknoblauch*.

Sedum maius, ſemper-viuum, *Hauſzwurte*.

S. minus. Vermicularis, *Mauwpfeffer*.

Senæ folia, *Senabletter*.

Senecio, *Creutzwweiſzkr*.

Serpillum, *Quendel*.

Solanum, ſolatrum, *Nachſchatten*.

Tamariscus, *Lamarifch* bletter.

Tanacetum, *Reinfahrn*.

Taraxacum, *Pfaſſenrœhrlein*.

Thymus, *Thym*, *Thymian*.

Tormentilla, *Tormentill*, *Nablekr*.

Valeriana, Phu maius, *groſʒ Baldrian*.

V. minor, phu miſus, *Baldrian*.

Verbascum, thapſus barbatus, *VVullkr*, *Kœnigskertʒ*.

Verbena, *Eiſenkraut*.

Veronica, *Ehrenpreis*.

Vinca peruinca, *Singrun*, *Ingrun*.

Violaria, *blauv Biolʒ*.

Virga aureola, conſolida Saracenica, *Heydniſch VVundkraut*.

Vitis folia, *VVeinreebenlaub*.

Vrtica mortua, *taube Neſſel*.

V. vrens, *Brenneſſel*.

Huc muſcus arborum.

N. Ex his peculiariter numerantur.

3. *Herbæ emollientes*: malua, althæa, violaria, mercurialis, branca vrsina; quibus alij quoque betam, parietariam & atriplicem adiiciunt.

5. *Herbæ capillares*: capillus veneris, ruta muraria, polytrichon aureum, trichomanes, ceterach, scolopendria.

Preparata

Preparata non omnes eadem exhibent; sed pro diuersitate substantiæ diuersa; adeoque fere præparatis omnis generis inferuire possunt.

CAP. XII.

De Fructibus.

FRUCTUS in genere denotat omne quod plantæ ultimo proferunt, adque & semina, grana, &c. In specie tamen id nominis sibi referunt, fructus maiores, quales pyra, poma, pruna, cerasa & his similia.

Fructus vstatiores sunt.

Fructus: Aciarum, prunorum syluestrium, i.e. Pruna, Schlehen.

Alchermes, Grana tinctorum, grana kermes, Ferberkærner, Scharlach-beeren.

Alkekengi, Baccæ Halicacabi, Indenkirschen, Boborellen.

Amygdalæ amaræ, bitter Mandel.

A. dulces, süsz Mandel.

Anacardia, Elephanten Lausz.

Auellanæ, Haselnusse.

Aurantia acida, saurer Pomerantzen.

A. Dulcia, süsse Pomerantzen.

Been, grana, Beenkörner.

Cappares, Kappern.

Cassia fistula, Cassien in Röhrlein.

Cerasa acida passa, seu exiccata, gedærte Kirschen.

Citri poma, Citronen Äpfel.

Cocculæ, Kockelkörner.

Colocynthidis poma, Coloquint-äpfel.

Cidonia poma exiccata, Quittenschnitten.

Cynobati exacinata, Hagebotten.

Dactyli, Datteln.

Ebuli baccæ, Attich Beerlein.

Ficus communes, Caricæ hispanicæ,

Laubfeigen, grosse Korbfeigen.

F. Marsilianæ, Caricæ marsil. Korb-leinfeigen, kleine, Marsilienfeigen.

Fraga exiccata, gedærte Erbeeren.

Gallæ communes, gemeine Gall-äpfel.

G. Turcicæ, Türkische Galläpfel.

Granata mala, Granatäpfel.

Hederæ baccæ, Epheubeeren.

Iuiubæ, rothe Brustbeerlein.

Iuniperi baccæ, Lorbeerbeeren.

Limones, Limonia mala, Limonien.

Mespila siccata, gedærte Mespel.

Myrobolani, belliricæ.

Chebula.

Citrinæ.

Emblicæ.

Indæ, seu nigræ.

Nux aquatica, Tribuli aquatici, Wassernusse.

N. Cupressi, Cupressnusse.

N. Indica, Indianische Nusse.

N. Moschata, Nucista, Muschatnusz.

N. Vomica, Kranænglein.

N. Iuglans, Welche Nusz.

Oliuæ, Oliven.

Papaueris capita sine feminibus, Maasamen Köpf.

Passulæ maximæ, Zibebæ, Zibeben.

p. maiores, grosse Rosinen.

p. minores, Corinthiacæ, kleine Rosinen, Corinthen.

p. Massiliaticæ, blauv. Rosinen.

pinæ nuces, Pinten.

pistacia, Fistici, Pistacien.

M 3 Prunella

Prunella, *VVein Pflaumlein, Brunel-*
len.

Prunaacida, *saure Pflaumen, Tzimet-*
schen.

P. Citrina, *gelb Spilling.*

P. Hispanica, *Spanische Pflaumen.*

P. Vngarica, *Vngriſche Pflaumen.*

Rubi idæi baccæ exiccata, *Hinbeeren.*

Sambuci baccæ, *Hollunder beeren.*

Sebesten, *Schunartz Brustbeeren.*

Siliquæ ceratorum, *Xyloceratorum,*
Iohannisbrodt.

Sorba exiccata, *gedorrrte Speyerling.*

Sumach, *Rhus, Gruberkærner.*

Tamarinde, *saure Datteln.*

Vuæ seu baccæ paridis, *vuæ lupinæ,*
Einbeers, VVolffsbeer.

Præparata. Fructus aridiores, solidiores, & minus succulenti nihil peculiare habent ab herbis. Eapropter & easdem suppeditant præparatorum formulas. Fructuum succulentorum vero partus præcipui sunt: Succi inspissati seu Extracta, Succi fermentati seu vina, Spiritus f. Quintæ Essentiæ, Olea & Tartara.

C A P. XIII.

De Fungis.

Fungi Officinales sunt.

FVngus, Agarici, *Lerchenschuamm.*
Cynobati, Spongiolæ è Rosis
ficcis, *Schlaffkautz, Rosenſchuamm.*

Iuniperi, *VVacholderschuamm.*

Sambuci, *Holderſchuamm.*

Huc boletus cerui, *Hirschbrunst.*

Præparata. Communem vt naturam habent cum herbis: ita & communem aptitudinem, qua præparationem subire possint.

N. Adnascuntur quoque fungi *Vlmo, fago, quercui, batula populo alba, Inglandi.*

C A P. XIV.

De Lignis & Viscis.

Sunt Officinis vſitatoria.

Lignum Aloës, Xyro-aloës, *Agallo-*
chum Paradiſtholtz.

Aspalatus, *Rhodifer Dorn.*

Brasiliū, *Brasilienholtz.*

Buxi, *Buchſbaumholtz.*

Colubrinum, ſerpétinum, *Gifftholtz.*

Coryli, *Haſelholtz.*

Cupreſſi, *Cypreſſenholtz.*

Ebenum, *Ebenholtz.*

Guaiacum ſanctum, *Frantzosen-*
holtz.

Iuniperi, *VVacholderholtz.*

Nephriticum, *Grieſtholtz.*

Rhodium, *Rosenholtz.*

Santalum album, *vneiff Sandelholtz.*

citrinum, *gelb Sandelholtz.*

rubrum, *roth Sandelholtz.*

Sassafras, *Fenichelholtz, Sassaſſar.*

Suber, *Pantoffelholtz.*

Tamariscus, *Tamariskenholtz.*

Viscum Corylinum, *Haselmistell.*

Quercinum, *Eichenmistell.*

Tiliaceum, *Lindenmistell.*

Præparata. Ligna & visca præter vulgariore medicamentorum formulas, v.g. decoctionem, infusionem, & inde

resultates alias! quibus potissimum adaptari apta nata sunt; exhibent minus vulgariter Extracta, Aquas, Spiritus, Olea, Salia.

N. *His fuliginem adiungere licet cum suis præparatis, de quibus peculiari-ter, l. 4.*

C A P. X V.

De Radicibus.

Radix est pars ima vegetabilium, quasi primæ concoctionis officina. Eapropter cum concoctio sit nutrimenti fixioris volatilifatio & spirituisfatio (πνευματώσις) radixque nutriatur nutrimento minus elaborato, quam partes reliquæ sequitur substantiam radicum esse naturæ præ reliquis fixioris.

Visitationes radices Officinales sunt.

Radix Acetosæ (excorticata) *Saur-ampffwurtz.*

Acori vulgaris, Pseudo-acori, *Schwertelw.*

A. veri, calami aromatici, *Calmus.*

Allij, *Knoblauch.*

Althææ, ibisci, *Eibischwurtzel.*

Angelicæ, *Angelickw.*

Anthoræ veræ, *Heilgiff, Gifftheilwurtz.*

Apij (vulgaris) *Eppichw.*

Ari. *Aaronwurtzel, Teutsch, Ingver.*

Arifari, *klein Aaronw.*

Aristolochiæ longæ, *lang welsch Osterlucy.*

A. veræ rotundæ, *welsch rund Osterlucy.*

A. vulgaris, *gemein long Osterlucy.*

A. fabacæ, *runde gemeine Osterlucy.*

Armoraciæ, raphani, sylvestris, *Merrettig.*

Asari, *Haselwurtz.*

Asparagi, *Spargenw.*

Bardanæ, *grosse klettenw.*

Bistortæ, Serpentariæ, *Natterw.*

Borraginis (excorticatæ) *Borresewurtk.*

Bryoniæ, *Strickw., Zannruben.*

Buglossæ, *Ochsenhungenw.*

Cardopatij Carlinenigræ, *Eberw.*

Caryophyllatæ, *Benedictw.*

Centaurei maioris, Rhapontici *Offic.*

Chelidoniæ maioris, *Schellw.*

Ch. minoris, *Schotbockw.*

Chinæ, *Chinew.*

Cichorei, *Wegwartw.*

Consolidæ maioris, Symphyti, *Beinwelle, Wallwurtz.*

Cucumeris asinini, *Eselkurbisw.*

Curcumæ, *Seelsuchtw.*

Cyclaminis, Arthanitæ, *Schneckenbrotw.*

Cynoglossæ, *Hundszungenw.*

Cyperiperi longi, *langer wuider Galgan.*

Crotundi, *rund wuider Galgan, Cyperw.*

Dictamni albi, Fraxinellæ, *weisser*

Diptamw.

Doronici, *Gemsenw.*

Ebuli, *Attichw.*

Elcbori

Ellebori albi, *vveisz Neisv.*
 E. nigri veri Stiriaci, *Schvurtz Niesz-
vurtz, præp.*
 E. nigri vulgaris, *gemein Christvurtz.*
 Endiuia, *Endimenov.*
 Enula Campana, Helenij, *Alant-
vurtz.*
 Eringij, *Mannskrev.*
 Esula minoris, *klein VVolfsemilchov.*
 Filicis, *Farnov.*
 Filipendula, Saxifragia rubea, *rocht
Steinbrechov.*
 Fœniculi, *Fenchelov.*
 Gentiana, *Entzkanov.*
 Glycyrrhiza, Liquiritia, *Suszholtz.*
 Graminis, *Quetkengraszv.*
 Hermodactyli, *vveisse Zeitlosen.*
 Hirundinaria, Vincetoxici, *Schvual-
benov.*
 Hyosciami (excorticati), *Bilsamov.*
 Imperatoria, Ostrutij, *Meister-
vurtz.*
 Iris Florentina, *vvolriechenb Biol
vurtz.*
 I. Nostratis, *Schvvertelov.*
 Iuniperi, *VVacholderov.*
 Lapati acuti, Oxylap, *Mengelvurtz.*
 Leuistici, *Liebstaekelov.*
 Liliorum alborum, *vveiß Lilienzv-
ibel.*
 Malua, *Pappelov.*
 Mandragora, *Albraunov.*
 Mechoacanna, Mechoaca alba, *vveif-
se Rhabarbara.*
 M. nigra, Gelapa, Chelapa, Chiolap-
pa, *Schvurtz Rhabarb.*
 Meu, *Behrov.*
 Mezerei, Laureola, *Seidelbast, Kellers-
bals.*
 Morsus Diaboli, Succifa, *Abbis-
vurtz.*
 Nympha alba, Nenupharis, *vveisz
Secklumenov.*

N. lutea, *gelbe Secklumenov.*
 Onodinis seu Anodinis, *Hevve-
chelov*
 pastinaca sylv. *Pastinackov, Bogel-
nestov.*
 pentaphylli, quinquefolij, *Funfffin-
gerkravv.*
 petasitis, *Pestilentzvurtz, Neun-
kravv.*
 Petroselinij, *Petersilienov.*
 Peucedani, *Harstrangov.*
 Pœonia, *Paonienvurtz, fœminæ.*
 Masculæ.
 Pimpinella, Germanica. *Bibenel-
vurtz.*
 P. Italica, sanguisorba, *Blutkrautov.*
vveisch Bibenell.
 Plantaginis, *VVegbreitov. VVege-
rich-
vurtz.*
 polypodij quercini, *Engelsus.*
 pyethri, *Bertramov.*
 Rapa, *Ruben.*
 Raphani domestici, *f. vulgar. Rettich.*
 R. Marini, *VVeerrettich.*
 Rhabarbari veri, Rhabarbar.
 R. Monachorum, *Munch Rhabar-
bar.*
 Rhapontici veri, *Rhaponick.*
 Rhodia, *Rosenvurtz.*
 Rubia tinctorum, *Ferberræthe.*
 Rusci, Brusci, *Mauszdornov.*
 Sarsa pariglia, Saffaparilla, *Sarsapa-
rill.*
 Satyrij, *Stendelov Knabenkrautov.*
 Saxifraga, semen saxifragia, *Stein-
brechov.*
 Scabiosa, *Apostemvurtz.*
 Scylla cruda & præparat. *Meervv-
bel.*
 Scorzonera, *Giffzvurtz.*
 Scrophularia, *Braun-
vurtz.*
 Sigilli Salomonis, polygonati, *VVeiszvurtz.*

Weißwurtz.

Siferis, Secacul, *Zuckermehren, Zuckerwurtz.*

Taraxaci, *Paffenrohrleinw.*

Tormentillæ, *Tormentillw.*

Turpethi albi, *Turbith.*

Tussilaginis, *Farfaræ, Brandlattich,*

Hufflattichw.

Valerianæ maioris, *groß Baldrianwurtz.*

V. Minoris, *klein Baldrianw.*

Verbasci, *Vollkrautwurtz.*

Vrticæ, *Nesselwurtz.*

Xerua, *Sißwurtz.*

N. *Ex his usu crebiori famosiores sunt.*

5. Radices aperientes maiores : apij, fœniculi, asparagi, petroselini, rusci. 5 — minores : graminis, rubiæ, eryngij, capparis, Ononidis.

Præparata : Quod de herbis diximus & similibus natiuis, idem de radicibus dicendum : promptuarium nimirum radices esse vnde ad omnis generis medicamenta, tam interna quam externa depromi possunt. Hoc tamen de radicibus notare expedit : partes fixiores præ reliquis in radicibus contineri, aptiores itaque eas esse ad exhibenda medicamenta parte fixiori celebrata, veluti sunt: Extracta, Salia, Decocta, &c.

C A P. X V I.

De Seminibus.

S Emen Acetosæ, *Savvampfferamen.*

Agni casti, viticis, *Schaffmüllenkærner.*

Althææ, *Eibischsamen.*

Ammeos vericretici, *Ammeys vulgaris, gemein Ammeys.*

Amomi.

Anethi, *Dillsamen.*

Anisi, *Anisamæn.*

Apij, *Eppichsamen.*

Aquilegiæ, *Agleysamen.*

Asparagi, *Spargensamen.*

Attriplicis, *Mæltensamen.*

Aurantiorum, *Pomerantzenkern.*

Bardanæ, *Großklettensamen.*

Basilici, ozymi, *Basilienensamen.*

Bombacis, Gossypij, Cotti, Xyli, *Baumvullensamen.*

excorticatum.

Bursæ pastoris, *Teschelkraut.*

Calendularum, *Ringelblumf.*

Cannabis, *Hauffsamen.*

Cardui benedicti, *Cardobenedictens.*

C. Mariæ, *Mariendistels.*

Carthami vel cnici, *Feldsaffranf, Florsamen.*

excorticat. pulpa carthami.

conquassatum.

Carui, Carueos, *VViesenkümmel, Feldkümmel.*

Cataputiæ maioris, Ricinum, *groß Treibkærner.*

C. minoris, Esulæ vulpinæ, *Treibspringkærner.*

Cerefolij, *Karbelsamen.*

Cicera alba, *vveiß Kichern, vveisse Ziesererbsen.*

C. rubra, *roth Kichern.*

Cichorij, *VVegwurtf, VVegvveißf.*

Cinæ, Santonici, sanctum, *VVurm-samen.*

N

Citri

- Citri, citrei mali, *Citronenkern.*
 excorticatum.
 Coccognidij, *klein Kellerhalsf.*
 Colocynthis, *Coloquinf.*
 Coriandri, *Coriander.*
 præparatum.
 Cucumeris, *Cucumern.*
 excorticatum.
 Cucurbitæ, *Kurbesamen.*
 excortic.
 Clydoniorum, *Quittenkern.*
 Cymini, Cumini, *Rœmisch Kümmel.*
 Dactylorum, *Ossa dactylor. Dattel-*
kern.
 Dauci communis, *Wildmæhrenf.*
Vogelneßf.
 Cretici.
 Ebuli, acini ebuli, *Attichsamen.*
 Endiviæ, Scariolæ, *Endivienf.*
 Erucæ, *vveisser Senff-gelber Senff.*
vulgò.
 Fabarum, Fabæ, *Bonen.*
 Fœniculi, *Fenchelsamen,*
 Fœnigræci, *Bockshornf.*
 Fraxini, lingæ auis, *Eschbaumsf.*
 Fumariæ, *Erdrachsfamen.*
 Genistæ, *Pfimmenf.*
 Granatorum, *Cranatkern.*
 Halicacabi, Alkekengi, *Judenkirschf.*
 Hordei electi, *Gersten.*
 excortic.
 Hyoscyami albi, *Bilsenf.*
 Hyperici, *Joannskrautf.*
 Hyssopi, *Eisopf.*
 Lactucæ, *Lattichf.*
 Lapathij acuti, *Mengelwurtzf.*
 Lentium, Lentesc, *Linsen.*
 Leuistici, *Liebstockf.*
 Limonium, *Limonenkern.*
 excortic.
 Lini, *Leinsamen.*
 Lori fatiua, *Siebengezeitsf.*
 Lupinorum, Lupini, *Feybonen.*
 Maioranæ, *Majoranf.*
 Maluæ, *Papelf.*
 Melissæ, *Melissenf.*
 Melonum, *Melonenkern.*
 exortic.
 Milij, *Hirsche.*
 M. Solis, lithospermon, *Meerhirsch.*
 Myrti, *Myrtensf.*
 Napi, Buniadis, *Steckrubenf.*
 Nasturtij (hortensis), *Gartenkresf.*
 Nigellæ, Melantij, Nigellæ Romanæ,
schvuartz Kümmel, schvuartz Co-
riander.
 Præparat.
 Nuclei cerasorum exortic. *Kirschen.*
kern.
 N. Mespilorum, *Nesspelk.*
 N. Morellorum seu persicorum ar-
 meniacor. *Morellenkern.*
 N. Persicorum, *Pfersingkern.*
 Orob; Erua, *Eruenf.*
 Oryzæ, *Reisz.*
 Pœoniæ, *Peonienkern, fœminæ ac*
masculæ.
 excortic.
 Papaveris albi, *vveisser Magf.*
 P. nigri, *schvuartzer Magf.*
 Pastinacæ fatiua, *Pastinacf.*
 P. sylvestris, *Bogelneßf.*
 Perfoliatæ, *Durchwachs.*
 Petroselinæ Macedonici, Massiliensis,
Macedonisch Peterlein.
 P. vulgaris, apij veri, *Petersilienf.*
 Pimpinellæ, *Bibenellf.*
 P. Italicæ, Sanguisorbæ, *vvelsch Pim-*
pinellf.
 Pisorum, Pisa, *Erbfen.*
 Plantaginis, *Wegerichf.*
 Pori, *Lauchf, Shittlauchf.*
 Portulacæ, *Burtzelkrautf.*
 Pseudo-melanthij, *Fornrathelf.*
 Psyllij, *Flachf.*
 Raparum, *Rubenf.*

Raphani, *Rettichf.*
 Rorismarini, *Res. mariensf.*
 Rufci, *Rustenköerner, Mauszdornf.*
 Rutæ, *W Weinrautenf.*
 Sambuci, i.e. acini
 Satureiæ, *Sad. isf.*
 Saxifragiæ albæ, *vveisz Steinbrechf.*
 Sefami vulgaris, *Flachsdotter.*
 Sefelios Gretici, *Maffiliensis, Crett-
 scher Sefelf.*
 S. vulgaris, *Sileris montani, Silermont-
 ansf.*
 Sinapis, *Senffsamen, rother Senffs.*
 Spicæ nostratis, *Spicanardf.*
 Staphidis agriæ, *I aufzkörner,*
 Sumach. Vide fructus.
 Thlaspi, *Blavvensenffs. VVegkresf.*
 Thymi, *vvelsch Quendelf.*

Trifolij odorati, *Edelkleef.*
 Violarum martiarum, *blau Biolf.*
 Vrticæ maioris, *Nesself.*
 V. Romane, *Ræmischnesself.*
 N. *Ex his sunt nonnulla in praxi
 famosa, adeoque peculiariter calida
 vel frigida dicta. Sic sunt*
 Semina 4. calida maiora, anisi, fœni-
 culi, carui, cumini.
 minora; ammeos, amomi, apij,
 dauci.
 Semina 4. frigida maiora; Cucume-
 ris, cucurbitæ, citrulli, melonum.
 minora; Endiuie, scariole, lactuce,
 portulacæ.
*Preparata ex feminibus, pro re nata
 fiunt infusiones, decoctiones, emulsio-
 nes, &c.*

C A P. XVII.

De Succis.

Sanguini animalium respondet suc-
 cus nutrituus in vegetabilibus. Ea-
 propter vt è sanguinis elaboratione &
 incorporatione, perittomata diuersa re-
 sultant, stercus, scil. vrina, fel, humor vi-
 trolatus seu melancholicus, sudor, axun-
 gia, mucilago, lapili; quinimo & sanguis
 ipsemet quandoque erumpit: Ita in ve-
 getabilibus analogicè correspondent
 succi diuersorum saporum, olea, resinæ,
 gummata viscosa & resinosa, tartari, sa-
 lia, &c. Hac tamen diuersitate, quod ani-
 malia excretoriis sunt dotata, quibus fere
 perittomata excernuntur, vegetabilia
 verò rarò, nisi velis, 1. Quod gaudeant
 poris inferuentibus exhalationi subtri-
 liari. 2. Quod cum floribus tum moschi-
 na seu zibettina, i.e. beneoleps proriūpat

melligo; tum quoque nonnunquam
 grauiolens quidam succus. Hinc fit vt
 crassiora intra ipsum vegetabile fere
 maneant, atque opus habeant, qua se-
 questrantur. Accidit nihilominus in
 quibusdam, quod ex nimia redundantia
 ipsamet sibi exitum quærant, eodemque
 dato, (v.g. incisione, &c.) promptius ef-
 fluant. Sunt huiusce generis perittoma-
 ta. 1. Aquea; succi. 2. Terrestria, Gummi.
 3. Sulphurea; Olea, Balsama, Resinæ,
 Gummirefinæ. 4. Salina, Saccharum,
 Tartarus.

N. *Succi qui sponte vel trunci inci-
 sione profluunt; etsi plures dari possint, v.
 g. succus betula, qui in Finlandia & Sue-
 cia verno tempore ex vulnerata betula
 copiosè extrahitur, postmodumque potius*

vice à mulierculis etiam nobilioribus habetur, item succus seu lacryma vitis, &c. attamen, nos non nisi officinales hie damus, è quibus inter natina recensentur:

Succi alterantes.

Vinum.

Acerum.

Succus, acaciae.

Glycyrrhizæ.

Hypocisthid.

Opium.

Præparationes horum. Vide infra de succis, & speciatim lib. 4.

Purgantes.

Manna.

Aloë.

Elaterium.³

De his vide iridem lib. 3.

C A P. XVIII.

De Oleis & Balsamis.

Olea, & balsama in Officinis pro natiuis habita, sunt:

Oleum oliuarum.

Omphacinum.

Petroleum.

Oleum terræ.

Balsamus de Tolu.

de Mecha, s. balsamus verus.

Peruvianus.

Liquidambar.

Styrax liquida.

Vires: *Vide singulatim, lib. 4.*

C A P. XIX.

De Resinis.

Resina *πῆλιν* lacryma seu liquor est pinguis ac oleaginosus tum sponte ex arboribus profluens, tum interdum accedente vulneratione. Estque duplicis consistentiæ; liquidiuscula aut duriuscula.

Resine liquidiuscula sunt.

Terebinthina Cypria.

Veneta.

Vulgaris.

Pix liquida:

Resine duriuscula sunt.

Resina anime. Offic. Gumm. Anime.

Caranna.

Coopal.

Elemi. Offic. Gum. Elemi.

Lacca.

Pix græca. Colophonia.

Tacamahaca.

Thus.

Vires: *Resina omnis calefacit, siccatur, digerit, mollit, tenuium est partium magis minus, discutit, tussis, ac tibi conuenit, anodyna est vulneraria & lithontripica. Vfus resinarum tum internus est tum præcipue externus in vnguentis, Emplastris, &c.*

Præparata. 1. Vexamen chymicum resinarum in destillatione præcipue consi

consistit, quam non incongruè rectificationem dixeris, quippe qua non secus ac in rectificatione oleorum, primum Δ leniori, pars oleosa purior subtilior & clarior elicitur: igne dein fortiori, pars crassior & coloratior, coloris scilicet flauui: igne tandem magis validiori, oleum coloris rubei propellitur. Hac si seorsim excipere libet, triplicis generis nancisceris olea, quorum primum quod clarum, spiritus dici solet; subsequens flauum, olei nomen retinet; vltimum, rubrum balsamum appellatur. Denique quia resinæ cras-

sioris sunt substantiæ, relinquunt & crassiorem remanentiam, cui colophonix nomen imposuere, à Colophone regione, vnde olim aduehi suevit. Modum destillandi videsis in oleis.

2. Præter destillationem subiiciuntur nonnunquam & Extractioni, quæ tamen potius depuratio quam Extractio dicenda erit.

3. Fit & lotio resinarum, dum in ∇ in puram demerguntur & agitantur, cuius rei gratia non abs re erit, resinas ad ignem fundere, & hinc in ∇ in coniicere.

C A P. X X.

De Gummi Resinis.

Gummi-resinas voco, concretas arborum lacrymas in oleo quidem promptius, attamen & in aqua licet difficulter solubiles. Tales sunt Caphura. Mastiches:

Styrax calamita.
Huc. Myrrha &
Bedellium.
Vires & preparata quia fere discrepant. Vide lib. 4.

C A P. X X I.

De Gummatis.

Gummi seu gummata sunt concretiores, aqueis faciles soluta, profusi tum è stirpibus ferulaceis, tum ex fruticibus, tum ex arboribus excelsis. Ex his sunt quæ ferulacea vulgo dicuntur à ferulaceis arboribus, è quibus stillant. Suntque

Gummi Ammoniacum.

Galbanum.

Euphorbium.

Opopanax.

Sagapenum.

Sarcocolla

Vires, calida sunt, emolliunt, discutunt, tartaream mucilaginem resoluunt. Vsum internum vide speciatim. lib. 4.

Preparata. i. Gummi depuratum. Nimirum quia gummi pleraque heterogeneis (arena, sabulo, &c.) conspurcata afferuntur, expedit illa depurare.

N 3 Hoc

Hoc fit soluendo in liquore aqueo (calido) solutum colando, exprimendo, & denique lento calore inspissando.

2. Extractum Viscosum seu viscus. Vide infra in Extractis.

Vires *conueniunt cum gummatis mucilaginosi, quia non est nisi pars mucilaginosa à parte resinosa sequestrata.*

3. Extractum resinosum. Vide item infra in Extractis.

Vires. *Virtutes quæ integro gummi ascribuntur, latitant præcipuè in resina, unde & resina in medicamentis tam internis*

quam externis, successu feliciori adhibentur. Ex iisdem destillatur quoque felicius oleum, quàm ex integro gummi.

4. Oleum stillaticium. Vide infra in Oleis.

Gummata mucilaginosæ sunt.

Gummi Arabicum.

Cesaforum.

Sandaracha.

Tragacanthum.

Vires. *Sunt Emplastica, incrassant, acrimoniam hebetant, asperitates leniunt, &c.*

C A P. XXII.

De Animalibus Officinalibus integris.

A Pes ficcæ, *gedærrte Bienen.*
 Bufo exiccatus, *gedærrte Kröten.*

Cantharides ficcæ, *Spanische Mücken.*

Cicadæ ficcæ, *Heuschrecken.*

Lubrici ficcati, *gedærrte Regenwürm.*

Millepedæ ficcæ; *aselli, Efelchen.*

Scinci.

Scarabæi pilares, *Kefer, Schræter.*

Serpens exiccatus, *Schlangen.*

Huc Mumia, *Mumie.*

C A P. XXIII.

De Partibus Carnosis Visitationibus.

C Or Galeritæ.

Lupi.

Epar Lupi.

Porci.

Ranarum.

Tauri.

Lien Bouis.

Pulmo Agni.

Suis.

Vrsi.

Vulpis.

Vires : *Partes carnosæ ut & ipsæ animalia carnosæ integra siue viua, siue discerpta & adhuc calientia ea sint, se extrinsecus membro alicui imponuntur, vim habent fomentatiuam, paregoricam, discutientem. Hinc vsus maximi in phrenitide, cephalalgia, vigiliis, Applicari nimirum possunt capiti, cernici, plantis pedum. Impositæ tumoribus pestilentialibus vii & ictibus animalium venenatorum, præmissa tamen venosarum applicatione,*

plicatione, eliciunt virus: Attritus à cal-
ceamentis attractos, ab inflammationi-
bus tuentur. In specie pars qualibet suum
simile respicit, Epar, epata: Lien, Lienes,

&c. Specialiora dabuntur lib. 5.

Preparata vſitatoria ex partibus car-
nolis sunt, Decocta, Extracta, Destillata,
&c. Vide ſuis locis.

C A P. XXIV.

De Partibus Membranosis.

Intestina Lupi.

Vulpis.

Testiculi Apri.

Castoris seu Castorium,

Bibergell.

Prius cerui.

Tauri.

Secundina ceruina.

Umbilicus Infantis.

Rete ex animalibus.

Defingulis. Videlib. 5.

C A P. XXV.

De Cornibus.

Cornu Alcis.

Bouis.

Bubali.

Cerui.

Hirci.

Rhinocerotis.

Tauri.

Huc Vnicornu.

Vires: *Fridida & sicca habentur, disciunt, incidunt, ut plurimum sudorem mouent, atque alexipharmaca sunt, pro*

diuersa tamen natura animalium, de qua sigillatim lib. 5.

Preparata. 1. Cornu præparatum (in specie sic dictum.) 2. Cornu vſtum, Vide calcinat. c. 43. 3. C. philosophicè calcinat. Vide ibid. 4. Magisterium, 5. Galreda, Gelatina. 6. Liqueur seu spiritus. 7. Oleum. 8. Sal volatile, 9. Extractum. 10. Quinimò nec decoctionibus infusionibusve vires suas denegant.

C A P. XXVI.

De Ossibus.

Cranium, humanum (non inhumanum.)

Dens Apri.

Elephantis. Ebur.

Lupi.

Os de Corde cerui.

Lupi.

Tauri,

Talus

Talus Leporis.

Porci.

Vires. *Ossa in genere vim habent exiccandi, discutiendi, adstringendi seu fluxiones sistendi, ossa, ligamentaque corroborandi. Calcanei combusti ut scribit Rhasees summe pollent aduersus colicos cruciatus. Specialiora videl. 5.*

Prapar. Ossa vt Cornibus fere cognata sunt substantia : ita & preparationibus. Hinc fiunt 1.° Os præparatum (in specie sic dictum.) 2. Galreda seu Gelatina. 3. Magisterium. 4. Liquor seu spiritus acidulus. 5. Oleum. 6. Sal volatile. 7. Spiritus essentificatus. Vide infra suis locis.

C A P. X X V I I.

De Crustaceis seu Testaceis.

L Apides cancrorum seu Oculi cancrorum, *Krebsaugen.*

Carpionis, *Karpffenstein.*

Fercarum, *Persichstein.*

Trutarum.

Mandibula Lucij, *Hechtskiefer.*

Conchæ, concharum testæ oblongæ.

Entalium.

Dentalium.

Mater perlarum.

Testæ ouorum.

strutionis.

Vires. *Crustacea omnia, quia natura sunt salina & tartarea, medicamenta suppeditant excellentissima ad resoluendum tartarum seu calculam, ad stranguriam, dyssuriam, Ischuriam, difficultates & suppressiones urina, ad colicas passio-*

nes, ad tartareos morbos pulmonum, &c. Extrinsecus vsus sunt creberrimi in dentifriciis, præcipuè si cremata fuerint, hinc & in rimis cutis solidandis, exiccandis, &c.

N. *Omnia genera lapidum, qui in capitibus piscium reperiuntur, trita & cum vino exhibita, colicum dolorem compescunt & calculum qui in renibus defixus iacet, atterunt & comminunt. V. Vecker ex Galeno & Auicenna, &c.*

Praparata nihil ferè peculiare habent à præparationibus lapidum mineralium, de quibus lib. 3. Hinc fieri possunt, 1. Calcinata. Vide c. 43. 2. præparata (strictè dicta) 3. Sal (improprie ita dictum.) 4. Magisterium, 5. Liquor seu oleum per del.

C A P. X X V I I I.

De Lapillis.

L Apilli quamvis in animalibus plurimis, plurimisque animalium cauitatibus reperiuntur; attamen sunt rari, ac præter lapidem Bezoar (de quo lib. 5.) fere nulli, qui in officinis prostant. E re foret nihilominus, ob insignem

vim, quam in calculo resoluendo obtinent, in promptu nonnullos habere. Quales sunt:

Lapilli in Ventriculo & Vesica fellis tauri.

Calculus humanus, Ludus Paracelfo dictus

dictus, &c.

Lapilli hirundinum.

*Preparata eadem exhibere possunt,
quæ alij lapides.*

CAP. XXIX.

De Lacte & sêro Lactis.

LAc est sanguis vi mammarum pro fœtus nutrimento elaboratior reditus. Ex variis lactis generibus præ reliquis inferuiunt medicinæ:

Lac Asininum, (quod tamen nostratibus minus vsitatum.)

Caprinum.

Humanum.

Ouillum.

Vaccinum.

Optimum est ex animali sano non nimis pingui, ætatis mediæ, recens mulctum, colore candidum, quod vngui instillatum cogitur.

Vires. Refrigerat, humectat, mollit, paregoricum est, acrimoniam mitigat. Hinc vsus insignis in dysenteria (clysmatisatum) in phthisi, &c. Extrinsecus in oculorum destillationibus, capitis dolore (excellit cremor.)

N. Lac etsi optimè nutriat, tamen non omnibus aque commodum est: Nocet enim in visceris intemperie & febri; quia facile corrumpitur, malumque adaugere aptum est. Capiti itidem & nervoso generi minus convenit.

Preparata ex lacte, Butyrum, scil. Lac coagulatum, Serum & Caseus, inter natia merito recensentur.

Vires. Butyrum convenit, ut consi-

stentia, ita & viribus generalibus, cum axungis.

Lac coagulatum vim habet refrigerantem ac anodynam.

Caseus in medicina rarissimi est vsus. Recentem imponunt nonnulli Epatici ad æstum febrilem comprimendum, vetustum sunt qui commendant ad resoluendos tophos podagricos.

Serum lactis, seu Aqua lactis, fit duplici modo, per se & per admistionem rei separationem iuvantis. Per se secernitur caseosa substantia à serosa, si lac (non nimis recens) calori exponatur. Admifcentur, quæ separationem iuvent. coagulum, verbi gratia vituli, agni, &c. liquor acidulus, herba acidula, verbi gr. acetum. Spir. Vit. acetosa.

N. Sunt qui serum cum petroselino factum poscam Italicam appellant.

Vires. Calfac. & siccac, abstergit, alnum subducit, urinam ciet. Hinc vsus crebri in Infusionibus purgantibus, abstergentibus, &c. Extrinsecus extergit scabiem, datur per se ab ʒj. ad lbj.

N. Integrum tractatum, de facili medicina per seri & lactis usum conscripsit Ioannes Costaus.

C A P. XXX.

De Felle.

Fel est portio chymi excrementitia, flava, amarissima, acerrima, in epate ab utiliore parte separata, inque vesiculam propriam collecta, unde per aluum subducitur, & transeundo aluum sollicitat.

Visitationa sunt.

Fel Bouis seu Tauri.

Capræ.

Ovis.

Suis.

Vrsi.

Fel omne defumendum est ex animalibus mediæ ætatis, quæ neque famem neque sitim passa sunt, neque exercitio nimium defatigata neque ira percita: intellige nisi exaltatum fel desideraueris.

Vires. Fel omne calefacit, siccatur, inci-

dit, terget, discutit, expultricem stimulat, lumbricos amaritudine fugat. Hinc medetur (extrinsecus) hebetudini ac albedini oculorum, purulentia aurium, &c.

N. Differunt autem inter se non modo secundum magis & minus, sed & viribus peculiaribus, tum à natura alimenti, quò animal pascitur; tum à natura ipsiusmet animalis dependentibus. Inter quædrupedum fella efficacissimum est taurinum: Inter auium, præstantissimum habetur fel perdicis & gallina. In genere tamen auium fella fortiorum virium censetur, quam terrestrium.

Preparata. Fieri quidem possunt. Extracta cum V. ex fellibus siccatis. Verum præter tincturam illam Cosmeticam ex felle taurino confectam nullum in praxi vidisse memini.

C A P. XXXI.

De Medullis.

MYEL. Medulla est pinguedo ossium cavitatibus, velut nutrimentum insita.

Suntque Officinales.

Medulla Bubula seu bouilla.

Canina.

Ceruina.

Equina.

Hircina.

Hædina.

Ouilla.

Vitulina.

Vires. Calfacit, emollit, rarefacit, ulce-

ra explet. Hinc proficiunt medullarum usus in tumoribus induratis & scirrosis, &c.

N. Optima habetur ceruina, dein vitulina: Medulla Hircina & bubula tum acrior est, tum siccior, ideoque ad molliendum minus idonea.

Est & medulla spinæ dorsalis cerebrique, id est, substantia molliuscula in cavitatibus eorum collocata. Verum excepto cerebro leporino, reliquæ usus sunt rarissimi,

Preparata exinde fieri possunt præcipua, Aqua still. & Oleum.

C A P. XXXII.

De Pinguedinibus seu Axungijs vel adipibus.

Axungia. **A** Gnina, *Lammersch-*
 Adeps. *maltz, oder Fett.*
 Pinguedo. Anatina.
 Anserina.
 Aprugna.
 Ardeæ.
 Aschijf. Thymalli piscis.
 Canina.
 Caponis.
 Castoris.
 Cati fyluestr.
 Ciconiæ.
 Cuniculi.
 Erinacei.
 Gallinæ.
 Humana.
 Leporis.
 Lucij piscis.
 Lupi.
 Muris montani.
 Ovis ex lana. Oesypus.
 Porcina seu suilla.

Serpentum.
 Taxi seu Melis.
 Vrsi, fœminæ & masculi.
 Vulpis.
 Vulturis.

Huc. Butyrum & præcipuè maiale.

Vires. *Calfaciunt, humectant, emol-
 liunt, abstergunt, digerunt, pus mouent,
 anodyna sunt plus minus. Nimirum quia
 pinguedo vires quadâtenus secundum na-
 turam animalis sui sortitur, prout huius
 natura fuerit, ita & illius. Imbecillior
 est suilla (quia suis frigidior & humidior;)
 hac paulo fortior vitulina; hinc gallina-
 cea; efficacissima omnium est anserina.*

N. *Quoties adipis absoute fit men-
 tio, recipe suillam, recentem, sine sale,
 candidam.*

Preparat. Oleum stillatitium.

N. *Quomodo axungia lauetur & as-
 seruetur. Vide lib. 1. cap. 29.*

C A P. XXXIII.

De Sanguine.

H Ebr. Dam. Arab. Dem. Est proxi-
 mum animalium nutrimentum
 ex chylo in Venis & Epate elaboratum,
 adeoque de naturâ animalis magis
 participans quàm ipse chylus. In Of-
 ficinis quidem nulli prostant, adhiberi
 tamen nonnunquam solent maximè
 recentes,

Sanguis, Anatis.
 Anseris.
 Asini.
 Canis.
 Columbæ.
 Equi.
 Hirci.
 Hædi.

O 2

Homini

Hominis.

Mulieribus menstruus.

Leporis.

Perdicis.

Tauri.

Turturis.

Vires. *Calefacit, adstringit, sanguinis fluxus cohibet, magis minus pro natura diuersa animalium, nutrimentique; quæ ratione & viribus peculiaribus inter se*

differunt. Animum sanguis, quia nitrosa plerumque scatet facultate, incidit, abstergit, calculum atterit, oculorum suffusioni confert; ut columba, milui, vulturis.

Preparata Anatomia sanguinis exhibet, 1. ▽ in seu spiritum. 2. Olcum. 3. Sal volatile. 4. Sal fixum. Hic adiunge balsamū antipodagricum & magisteriū, cuius formulas vide lib. 5. de homine.

C A P . X X X I V .

De Senis.

Seuum. Ceruinum.

Damæ.

Equinum.

Hircinum.

Hædinum.

Ouillum.

Taurinum.

Vitulinum.

Huc. Cera.

Vires, *Sunt calida & humida moderate vel gr. 1. molliunt, discutiunt, aliquantulumque adstringunt.*

Preparata rara per se exhibent, ut plurimum emplastris aliisque inungendorum formulis inferiunt. Siquis tamen ea destillationi submittere velit, poterit id probè ad modum, quo Gummi-resinæ destillantur.

C A P . X X X V .

De Stercore & Urina.

Stercus nihil est aliud, quam nutrimenti assumpti pars inutilior, crassior, feculentior, à parte utiliori in ventriculo & intestinis virtute chylica aliquantulum immutata & hinc per anum excreta.

N. *Constat 1. spiritu volatili foetente flagrabili (& foetidum vocant.) 2. Sale fixiori (quo agri fecundantur) tum quoque 3. terreis ac 4. aqueis portionibus, quæ prioribus illis subiectum præbent.*

Stercora in Medicina vstiatiora sunt.

Stercus. Anserinum.

Asininum.

Aprignum.

Bouillum seu vaccinum.

Caninum seu Album-græcum

Officinarum.

Caprillum.

Ciconiæ.

Columbinum.

Equinum. 1

Galli

Gallinaceum.
Humanum.
Lupinum.
Muris. Muscerda.
Ouillum.
Passerculi.
Pauonum.
Suillum.

Vires. Virtutes stercorem eruenda sunt, tum ex natura rei alimentaria, tum ex natura animalis, cuius, vi chylifica aliquantulum eas immutari diximus. Auium excrementa (quia harum naturarum plurimum calidissima est) tota sunt nitrosa, unde & mirificam vim habent, discutiendi, incidendi, attenuandi, dissoluendi, aperiendi, abstergerendi, (scilicet maculas cutis) diuersimode tamen, prout scilicet diuersa aues sunt, diuersisque viuunt alimentis. Iumentorum stercore, vim obtinent anodynā, refrigerantem, discutientē, exhibenturque intus & extra.

Preparata præcipua quæ inde exhiberi possunt, sunt.

1. Aquæ stillatitiæ. 2. Olea stillat. 3. Salia.

N. *Præter* ∇ *m ex stercore vaccino (omnium florum dictam) non memini alias esse usitatas.*

De Urinis.

Urina est veluti colamē chymi & sanguinis, constans ex Sale viscosaque terra humiditati phlegmaticæ immixta.

Raræ etsi sint quæ in vsum medicum veniunt, tamen viribus non carent insignibus, præcipuè:

Urina humana.

Caprina.

Quilla.

Vires. Calfaciunt, siccant, abstergunt, putredini resistunt. Urinam pellunt, &c.

Preparata. Spiritus Salque volatile, Sal fixum. Vide lib. 5. de homine.

CAP. XXXVI.

De Unguibus & Ungulis Officinalibus, & de Coagulis.

Ungula usitatiores sunt.

V Ungula Alcis.
Asini.
Bouis.
Canis.
Equi.
Lyncis.

His addere licet Vnguē odoratum seu blattam byzantium.

Vires. Vide seorsim lib. 5.

Preparata. Preparata in specie sic dicta. Magisterium, quibus addi quoque potest oleum stillatitium.

Coagulum nihil aliud est, quam la-

ctis in Ventriculo quadrupedum, quæ adhuc sugunt, concretio & condensatio. Sic sunt.

Coagulum Agni.

Equi. Hippace.

Hædi.

Leporis.

Vituli.

Excipiendum coagulum antequam ipsa animalia aliud quippiam præter lac maternum degustauerint.

Vires. Coagulum omne, teste Galeno, acris & digerentis est facultatis, adeoque exiccatoria.

C A P. XXXVII.

De Acetis.

ACeta quæ in Officinis prostant, vel mera sunt, vel qualitatibus medicinalibus aliunde imprægnata.

De metis horumque preparationibus agetur peculiariter lib. 4. cl. 2.

Aceta qualitatibus aliunde imprægnata (præter pauca alia, de quibus d.l.) fiunt ex Aceto vini optimo, ac vegetabilibus, suntque vel insolata siue infusa saltem, vel quoque, quæ paucissima tamen sunt, destillata.

Modus fiendi: R. Materiam insolandam puram atque exiccatam, præpara ad infusionem, (*ut sit in decoctionibus incidendo sc. quæ incidenda sunt, contundendo quæ contundenda, &c.*) Hinc imple lagenam vel vitrum, ac affunde acetum vini acerr. donec ad lagenæ cervicem pertingat: Orificio bene clauso colloca in locum tepidum, vel temperatum & acetum viribus rerum infusarum imprægnabitur.

N. *Vegetabilia aliquantulum arefacta recipere oportet; ne squalore suo acetum corrumpant.*

Modus destillandi non discrepat à destillatione aceti simplicis de qua lib. 4. class. 2.

— Aceta Officinalia simpliciora fiunt per solam infusionem: suntque vsitiora.

Acetum Anthosatum ex inf. florum anthos.

Calendulatum ex floribus.

Caryophyllatum ex flor.

Cort. citr,

Fragor. è fructib.

Lauendul. è flor.

Menthæ: ex foliis.

Papav. rhæad. è fl.

Rosat. ex flor.

Rub. Idæi: è fructibus.

Rutæ. è fol.

Sambuci: ex florib.

Scordij: è fol.

Scylliticum, è rad.

Violar. purpur. è floribus.

Aceta composita sunt.

Acetum Alexicacum f. Destillatum alexic. F.F. v. infra. N. 1.

Bezoardicum. 2.

Prophylacticum FF. 3.

Rutaceum. F.F. 4.

Theriacle August.

1. *Acetum agrestinum solutivum Cl. D.D. S. Clossæj Archiatr. apud Metenses celeberrimi.*

R. Succi agrestæ siue omphacij depurati ʒij.

fol. Sen. Oriental. ʒij.

fem. anis. contus. ʒj.

rad. mechoac. in tenues lamellas dissectæ, (non autem pulueris, aliàs infusum euaderet viscidum) ʒβ.

garyoph. integr. n. ij.

Macerentur in Lagenâ loco frigido & de isto aceto agrestino permisce cochl. ij. aut iij. in iusculis condimenti loco, in quibus prius dissoluta sit ʒβ. cremor. ʒj. Adultis detur dosi superior integra.

Huius remedi assiduo usu hemitritæum & morbos Chronicos, quamvis longâ patientiâ edomari, probatum est.

2. *Acetum*

2. *Acetum Alexicacum seu Destillatum alexic. F.F.i.e.Francofurtense.*

R. Rad.Tormentill.

Zedoar.

Bistort. ā. ʒij.

Angelic.

Imperator.

Hirundinar. ā. ʒiʒ.

Pimpinell.

Diſtamn.alb.

Aristoloch.rot.veræ.ā. ʒij.

Herb.Card.bened.

Galeg.

Scord. ā. Miʒ.

Sed. maj.

Endiu. ā. Mij.

Fl. Calendul. Miʒ.

Rofar.rub.

Nymph.

Borag.

Tunic.

Sambuc. ā. M.j.

Poma citria recentia minimeque putrida N. viij.

Incisis incidendis, ac contusis contundendis affunde + acerr.ʒb. X. ſtent in infuſione ʒ (ʒ) poſtea deſtillentur per ʒ vitreum.

3. *Acetum Bezoardicam.F.F. Cl. Dn.*

D. de Spina.

R. Rad.Enul. camp. ʒij.

Angelic.

Oſtrut.

Valerian.

Vincetoxic.

Chelidon.

Pimpinell.ā. ʒvj.

Gentian.

Diptamn.alb.

Aristoloch.rot.

Tormentill.

Scabiof.

Succif.

Petaſit.

Zedoar. ā. ʒʒ. 4

Bacc. Iunip. M. iij.

Myrrh.elect. ʒʒ.

Fol rub.

Chelidon.mai.

Scord.

Chamaedr.

Card.bened.ā. Mij.

Incidentur & contundantur vt eſt moris, dein affunde.

Aceti vini acerr. ʒb. viij.

Spir.Vini ʒb. iij.

Theriac.Androm. ʒij.

Spir. ʒi. ʒʒ.

Camphor. ʒij.

Digerantur per dies aliquot (14.) dein exprimantur, ſiltrenturque per chartam.

4. *Acetum confortans S. Cloſſ.*

Pulſeſſig.

R. fol. rut. Mij.

fumar. Mj.

Baccar. Iuniper. ʒij.

Garyphill.

Macis.

Nucis moſch.

Teſticul.caſtor. ā. ʒʒ.

Contusis affunde acet.ros.ʒbiiij.

Infola per aliquot dies vel macera retrò fornacem.

Vires. Granidis, puerperis, & ab utero ſyncopizantibus prodeſt, odorando, tempora fricando, & pulſui utrique ex linteis eo madentibus, alligando, In febris malignis commodè additur campb. ʒj.

5. *Acetum Prophylaſticum F.F. Cl. Dn.*

D. Arnoldi VVeickard.

R. Rad.Angelic.

Zedoar.

Leuiſtic.

Pimpinell.germanæ.

Rut. ā. Mj.

Turbith.

Turbith.el. ℥ij.

Cort.citr.recent. ℥ij.

Baccar.Iuniper.bene.matur. ℥i℔.

Laur. ℥j.

Incisa & contusa, vt moris, mace-
rentur cum acet. acerr. Mens. ij. postea
destilletur per ☞ vitreum. Seruetur pro
vsu.

Vires. *Insignes vires bezoardicas aceta
hac recensita obtinent, quibus non modo
contagiosos morbos præcanere, sed & per
sudorem, urinamue expellere possent.*

4. *Acetum rutaceum. F.F.*

℞. Fol. Rut.

Scord.

Card.benedict.

Tanacet. ā. Mj.

Bacc. Iuniper.

Rad.Angelic. ā. ℥ij.

Zedoar.

Cort.citr. ā. ℥℔.

Incidentur minutim, ac infundantur
in + optimi ℔b. vj.

Viribus conuenit cum prioribus.

C A P. XXXV III.

De Aquis destillatis.

AQuæ, in Officinis, diuersimodè
paratæ prostant, simulac diuersæ
naturæ: aquæ scilicet, i.e. ad naturam
aqueam accedentes, vel spirituosæ, i.e.
spirituum naturam referentes.

Modus parandi vel destillatio est vel
infusio, decoctio, vel commixtio.

N. *Modos destillandi. Vide lib. i.*

Destillatio aquarum pro diuersitate
materiarum diuersimodè peragitur, id-
que non modo ratione caloris diuersi,
verum etiam ratione instrumentorum
variantium.

In regno MACROCOSMICO aquæ
ferè singulæ peculiares destillandi mo-
dos obtinent, ideoque specialiter des-
cribendæ erunt lib. 3.

In R. VEGETABILI destillantur
aquæ ex herbis, floribus, radicibus, lignis
& armatibus,

I. *Ex herbis & floribus viribus.*

I ℞. *Herb. vel Flores q. v. incide
minutim conqussæ, ac affunde ∇ m
(ne empyreuma contrahat) destillaque
per MB.*

N. 1. *Ex herbis floribusve virentibus
tenerioribus (quorum vis facile euanes-
cit) vt & frigidioribus, destillantur aquæ
per : Ex aromaticis autem vt & cali-
dioribus, quorum vis non ita volatilis, pro-
fundiusque inheret, commodius per vesti-
cam eliciuntur.*

N. 2. *Herbe odor quo facilius expi-
rat, eò tepidiore ☞ vtendum.*

N. 3. *Sinobiliores expetis aquas, affun-
de destillatam super materiam nouam,
ac destilla denuo.*

O. *Non abs re fuerit præmittere ma-
cerationem diei vnius ac alterius, vel
& fermentationem, addito, si libet, tan-
tillo ☉is vel fecum cereuisiæ, præcipue si
olea expetuntur.*

N. 5. *Si colorem natium spiritibus
& aquis destillatis conciliare volueris,
imponere eos in ☞ vt transeat ∇ extillans:
Verum enim vero, minus durabilis ∇ illa
futura est.*

2. ℞. *Succum ex herbis expressis ac
destilla.*

11. *Ex herbis siccis. ℞. Herbam quam-
cunque*

cunque vis, incide & affusa aqua calida macera aliquandiu; hinc destilla.

N. *Ex herbis calidis & odoratis melioris notæ & olea destillantur, sic sicca destillationi subiiciantur.*

III. *Ex Fructibus*. R. Fructus maturos. E.g. poma, scinde minutim vel conquassa ac destilla per Ψ .

N. *Ex mollioribus, exprimi potest succus ac destillari.*

IV. *E Seminibus*. R. Semina grosse contusa, macera cum ∇ hinc destilla per vesicam.

V. *Ex Radicibus*. R. Radic, conquassa, macera cum ∇ ac destilla per Vesic.

N. *Rara sunt & a ex solis radicibus destillate.*

VI. *Ex Lignis*. Ex lignis quæ eliciuntur, spirituosæ imprimis sunt, id eo quæd spiritus referendæ, Videri quoque possunt earum destillationes in oleis destillatis.

VII. *Ex Aromatibus*. R. Aromata grosse contusa, macera cum menstruo idoneo per aliquot dies (4. 5. 6.) dein destillantur per vesicam. Sic stillat ∇ & oleum. Hæc separa & si opus rectificæ. *Vide de oleis stillat. quia vno & eodem actu & olea ex aromatibus proliciuntur.*

N. 1. *Menstruum in singulis dabitur.*

N. 2. *Aqua hæ spirituosæ sunt.*

In Regno ANIMALI eliciuntur aquæ 1. ex animalibus integris molliusculis, mucilaginosisque 2. ex partibus molliusculis, V.g. Cerebro spinaliue medulla. 3. *E sanguine*. 4. *E nouellis cornibus*. 5. *E stercore*.

1. *Ex animalibus integris mucilaginosis*. R. Animalia (lota si placuerit) scinde minutissime, conquassaue hinc destilla ex MB vel Ψ , affusa, si pla-

cuerit, ∇ conuenienti: Sic paratur ∇ lumbricorum, cochlearum, vt & spermatis ranarum,

2. *Ex Medulla Cerebri*, paratur eodem modo, addita ∇ cephalica v. g. tilia, pæonia, &c.

3. *Sanguinis* destillatio etsi itidem è MB perfici queat: præfertur tamen quæ fit igne nudo ex cucurbita fictili. *Vide de oleis c. 7. & spiritib. c. 81.*

4. *E Cornibus* quomodo liquor stillat. Vide de oleis. E nouellis cornibus, e.g. ceruorum sit ∇ per Retortam vel Cucurbitam humilem è MB aut Ψ affuso pauco Vinovel & sine additione. Videlib. 5. de Ceruo.

5. *E Stercore*, fit itidem per MB. vel cineres, proditque primum ∇ . hinc oleum.

Sunt itaque:

Aque Officinarum Simples ac Phlegmaticæ.

Aqua Abrotani.

Absynthij.

Acacia flor.

Acetosa.

Acetosella.

Adianti.

Agrimonia.

Albuminis ouorum.

Alchimilla.

Alkekengi ex bacis.

Althea.

Alfines.

Anethi.

Angelica.

Anguria.

Anisi.

Apii.

Aquilegia.

Artemisia.

Asparagorum.

P

Aurantiorum

Aurantium ex florib. dicitur	Ebuli è flor.
▽ Naphæ, &c.	Endiuia.
Aurant. ex corticib.	Enulæ.
Auriculæ mortis.	Eupatorii Auicen.
Bardanæ simpl.	Euphrasiæ.
Basilici.	Fabrum fl.
Betonicæ.	Fœniculi.
Betulæ succi.	Florum omnium, lætaminis.
Bistortæ.	Fragariæ.
Borraginis ex flor.	Fragorum.
ex toto.	Fumariæ.
Buglossæ ex flor.	Genistæ.
ex tot.	Graminis ex rad.
Bursæ pastoris.	Geranij.
Calamentæ.	Hederæ terr.
Calamæ officinarum.	Hepaticæ nob.
Calcatrippæ.	H. Stellatæ.
Calendulæ.	Herniariæ.
Capillorum Veneris.	Hyoscyami.
Caprifolij flor.	Hyperici.
Cardui benedicti.	Hyslop.
Mariz.	Imperatoria.
Carui.	Lactuca.
Cariophyllatæ. ¹	Lapatis acuti.
Centaurij minoris.	Lauandulæ.
Centumnodiæ.	Leuistici.
Ceraforum nigr.	Ligustri fl.
Cærefolij.	Lilior. alborum.
Chamæmeli.	Conuall.
Chamæpityos.	Linariæ.
Cheyri fl.	Lumbricorum.
Chelidonij major.	Lupulorum.
Ch. minoris.	Majoranæ.
Cichor.	Maluæ.
Cinamom. communis.	Matricariæ.
Citri ex cortic.	Meliloti.
Consolidæ med.	Melissæ.
Coriandri.	Mellis.
Crassulæ.	Mentæ crispæ.
Cuscutæ.	Mentastri.
Ciani fl.	Mercurialis.
Cydoniorum.	Millefolij.
Cymini.	Morsus Diabol.

Nasturtij aquatici.
 Nicotianæ.
 Nucum Jugland. immatur.
 Nymphææ alb.
 Nummulariæ.
 Origani.
 Ononidis.
 Pœoniæ.
 Papaueris albi.
 Parietariæ.
 Pentaphylli.
 Persicariæ maculosæ.
 Persicorum florum.
 Petasitidis ex toto.
 Pimpinellæ.
 Plantaginis.
 Pluvialis.
 Portulacæ.
 Prælij.
 Primulæ veris.
 Pulegij.
 Pyrolæ.
 Querc. fol.
 Raphani Rustici.
 Vulgaris.
 Rorellæ.
 Roris maiialis.
 Rosarum pallid.
 rubeæ.
 Roris marini.
 Rubi idæi ex baec.
 Rutæ.
 Saluiæ.
 Sambucæ flor.
 Saniculæ.
 Sauinæ.
 Satyrij.
 Saxifragiæ alb.
 Scabiosæ.
 Scolopendrij.
 Scordij.
 Scorzonæræ.
 Scrophulariæ.

Semperuiui.
 Senecionis.
 Serpilli.
 Sigilli Salomon.
 Sigilinis fl.
 Solatri.
 Spermatidis ranarum.
 Tanaceri.
 Taraxaci.
 Thymi.
 Tiliæ flor.
 Tormentillæ.
 Trifolij.
 Trinitatis.
 Tunicæ fl.
 Tussilaginis.
 Valerianæ.
 Verbasci.
 Verbenæ.
 Veronicæ.
 Violarum ex fl.
 ex toto.
 Vitium lacrymæ.
 Vrticæ.
 Zedoariæ.

Aqua fortiores cum Vino atque ▽ *&*
Composita.

Aqua Anhaltina. infra No. 1.

Anisi cum Vino adusto.
 cum Maluatico.

Antidotalis, (Alexipharmaca
 Matthioli Aug.)

Aperitiua. 2.

Apoplectica *Crolij.* 3.

Apoplect. Sennerti. 4.

Arthritica. *Aug.*

Asthmatica. 5.

Bardanæ composita. *A.*

Bezoardica. 6.

Caponis composita. *A.*

Carbunculi. 7.

Ad desiccandos catarrhos. 8.

Carminatiua. 9.

P 2

Cepha

Cephalica aromatica. 10.
 Cephalica F.F. 11.
 Cinamom. c. Maluat.
 c. v. rofarum.
 Cōmunitatis ophthalmica. 2.
 Cordialis Herc. Sax. cal. 13.
 frigida. 14.
 Cordialis restaurans. 15.
 Cosmetica. 16.
 Cosmetica pretiosa. 17.
 Cosmetica S. Gloss. myrha-
 ta. 18.
 Damascena odorifera. 19.
 Diurtica ex nucleis F.F. 20.
 Antidysenterica. 21.
 Diuretica. Closs. 22.
 Embryonum S. Balsamus pue-
 rorum. A.
 Epileptica Langij.
 Febrifuga. 23.
 Fortis. A. vide & l. 3. c. 23.
 Ad gutturis affectus. 24.
 Antihectica. 25. 26.
 Hirundinum. A.
 Hysterica Croll. 27.
 Iuniperi c. Spir. vini.
 Hysterica Matth. Martin. 28.
 Imperialis correcta. 29.
 Lauendulæ compof. 30.
 Magnanimitatis. 31.
 Mirabilis. A.
 Nephritica. 32.
 Ophthalmica. vide collyr.
 Philosophorum. 33.
 Pectoralis. 34. 35.
 Picarum. 36.
 Regia. vide in C l. 3. c. 23.
 Saluæ compofit. 37.
 Antiscorbutica. 38.
 Antispasmodica Closs. 39.
 Splenetic. 40.
 contra Terrorem. 41.
 Theriacalis Bezoardica. A.

Theriacalis contra pestem. 42.
 Theriacalis Croll. seu Spir.
 theriac. camphorat. 43.
 de Trib. Mixtura simplex. 44.
 Trifantis. 45.
 Vitæ aurea Langij. A.
 Vitæ Matthioli. A.
 Vitæ comm. A.
 Vitæ mulierum. 46.
 Vitæ mul. camphorata. 47.
 Virtutum.
 Vomitiua Plateri. 49.
 Vomitoria Æsculap. Saturn.
 50.

N. Non possum, quin in limine aquarū
 compositarum Pharmacopœiæ tyronē erro-
 ris commonefaciā, quem in nonnullarum
 destillatione comperio. Videlicet admi-
 cceri destillandis eiusce farina materias,
 quarum vis contumacior est, quam ut de-
 stillationis opere eleuari cū cæteris queat.
 Tales sunt Gemma, Margarita, Corallia,
 ossa, cornua, aurum, &c. Eapropter si qua
 talia occurrerunt, ne frustra sumptus im-
 pendant, præstat eadem destillato admi-
 scere, siue sub formula preparatorū id fiat,
 siue, quod melius, sub forma Magisterij,
 siue quod adhuc aptius sub forma liquoris.

1. Aqua Anhaltina.

℞. Terebinth. el. lb. β.

Thur. masc. ʒj.

Lign. Aloës pulu. ʒiij.

Gran. Mastich.

Garyophyll. (aliis fl. anthos.

Nucist.

Cubeb. (aliis Galang.

Cinamom. a. ʒ. vj.

Croc. or. intep. ʒiib.

Sem. Fœnic.

Bacc. Laur. a. ʒb.

Puluerisata infundantur in V lb. v.
 digerantur per S (6.) additis Moschi
 in peria ligati g. xv. Hinc destillentur
 lentissi

lentissimo. *¶* Quod clarum est separetur à turbido.

N. *Præstat Moschum rostro alembici imponere.*

Vires: *Calf. sicc. discutit; stomachum, cor, & reliqua viscera corroborat. Hinc efficax est in animi deliquis. Extrinsecus crebrior eius usus est; confer in catarhis atque doloribus à causa frigida subertis, in Arthritide quam Vagam vocant, in Paralyti, Epilepsia, Apoplexia. Vertigine, Tremore, Leihargo, &c. sc. membrum affectum ea benè fricetur.*

2. *Aqua Aperitiua.*

℞. Rad. Eryng.
Scorzoner.
Filib.
Centaur. maj.
Brus. a. ʒiʒ.
Fœnic.
Cort. Cappar.
Tamarisc.
Fraxin. ā. ʒiij.
Citri odorat. ʒiijʒ.
Sem. Vitic.
Card. bened.
Cichor. an. ʒiʒ.
Endiu.
Scariol.
Nasturt.
Cit. an. ʒij.
Herb. Polytrich.
Adianth.
Ceterach.
Cuscut.
Scolopendr.
Betonie.
Endiu. an. Miß.
Sum. Thym.
Epithym.
Lupul.
Flor. Hyperic.
Genist.

Borrag.

Meliss. an. Mi.

Passular. min. ʒi.

Infundantur in ∇. Lupul.

Scolopendr.

Card. bened.

Veronic. an. ʒi.

Viu. Rhenan. ʒiijʒ.

Additis. Cinam. ʒiʒ.

Spec. Dialacc. ʒiʒ.

Stent in loco calido per ☿ ☿ (2.)
probe clausa, postea ʒ lentur in MB.
∇. lento.

Vires. *Maximarum est virium in referendis obstructionibus totius corporis, maxime vero Lienis, Epatis & Mesenterij, adeoque commendabilis in affectu hypochondriaco, aliisque afflictibus affinibus. Dosis cochl. i.*

3. *Aqua apoplectica Crollij.*

℞. Fl. Lil. Conuall.

Tilia.

Pœonia.

Primul. veris.

Maiozan.

Lauendul.

Saluia.

Betonie.

Rorismar.

Cerafor. nigro. & dulcium. ʒ crescentē decerptorum, q. p.

Tritis omnibus & mixtis (vel seorsim flores, seorsim cerasa destillantur) adde farinæ sinapi ʒi vel ij. affusaque ∇ comm. q. f. fermententur ac destillantur in . Spiritui elicto adde Elixyr. Epilept. Croll. an. circula aliquandiu.

N. *Ad fermentationem promouendam in ∇ illa communi tantillum lupuli ac fermenti coqui potest, vel & fermentum addere licet sine coctione.*

Dos. cochl. f.

4. ∇. *Apoplectica Sennerti.*

P 3 ; ℞. Fl.

℞. Fl. lil. conuall. q. v. infunde in Vini optimi Mens. ij. ϕ . (14.) postea destilletur ac serua. In destillato infunde postmodum.

El. Lauand. recent. q. placet.

Cubebar.

Cinamom.

Nuc. Mosch.

Macis.

Galang. a. $\zeta\beta$.

Visc. quern.

Rad. Pæon. a. ζvj .

Stent in maceratione vase clauso ϕ (14.) Hinc destilla.

N. Possunt & flores tilie addi.

5. ∇ . Asthmatica F.F.

Luffrovasser.

℞. Rad. Enul. Camp.

Vngul. Caball. à. $\zeta\beta$.

Gentian. ζij .

Garyophyllat.

Zinzib. alb. à. ζij . Θj .

Baccar. Laur.

Iuniper. a. ζij . Θj .

Cinamom. acerr.

Cardomomi a. ζij .

Fol. Sahu.

Maiozan.

Hyssop.

Marrub. a. Mf.

Irid. fl.

Polypod. q.

Liquirit.

Iuiub.

Sebest.

Vuar. passul. min.

Dactyl.

Pineat.

Amypd. d. à. ζij .

Squill. præp.

Sem. vrtic. rom.

Fœnic.

Ocym. à. ζij . Θj

Fic. ping. ζj .

Mellis despulat $\zeta\beta$.

Vini Maluat. lbiiij .

Spir. Vini lbij .

Stent simul in infusione dies aliquot (8.) dein destillentur per XX addantur Sacchari $\zeta\text{xv}\text{ij}$.

N. 1. Alij addunt & pulmonem Vulpis.

N. 2. Sunt qui Spiritum Vini omitunt, atque solum Vinum Maluaticum, pondere sc. lbviii . recipiunt.

N. 3. Destillato addunt Mosch. gr. vj .

Vires. Aquæ hæc, licet vi tituli pulmonibus solis dicata videatur, utpote quibus specificè opitulatur, crassam ac tartaream mucilaginem attenuando, asperitatem leniendo, respirationem faciliando, &c. nihilominus tamen nec insignibus caret viribus, quibus insuper debili ventriculo subuenire potis est, cruditates eius emendando, frigiditatem corrigendo, &c.

Dosis prout spirituosâ fuerit à cochl. $\frac{1}{2}$ ad 1.

6. Aqua Bezoardica.

℞. Rad. carlin. exiccat. lbj

Vincetox. $\text{lb}\beta$.

Summit. hyperic. exiccat.

absynth. an. ζvj . F. puluis

cuius ℥ . xij .

aq. font. lbiiij .

rectific. $\text{lb}\beta$.

M. & destilla per vesicam ad medias diss. in sing. lb . salis ℥ ℥ lati Θij donec acefcat.

Dos. pro præseruat. cochl. $\frac{1}{2}$. procuratio-
ne iiij . aut reiterando semel, post horas
V sudando desuper vsque dum meliora-
tionem persentiat.

7. ∇ . Carbunculi.

℞. Flor. Rorismar. f. Anthos.

Lilior

Lilior.conuall.

Violar.

Borrag.à ʒvj.

Herb.Majoran.

Salu.min.

Lauandul.

Endiu.

Spic. à ʒj.

Nucis moschat.

Zinzib.

Macis.

Garyophyll.

Cinamom.

Cardemom.

Gran. Paradif.

Cubebat.

Galang.

Visc.querc.

Auellanar.

Sem.Pæon.

Raf. c.c. à ʒj.

Incidentur & infundantur in Vini
Maluat.

▽.Lauand,

Spic.

Rosar.

Fragor.â lbijj.

Vini alb.generof. lbijj.

Postea adde.

Aurifoliat.

Margarit.

Off. de c. c.

Lap.percar.à ʒß.

Moschi. q. v.

F.f.a. destillatio in MB.

N. Olem margaritas, & c. minus rectè
subiici destillationi, rectius destillato
admisceri.

Vires. Vſus huius aquæ spirituoſa in-
ternus frequens eſt, in aquis cordialibus
ac cephalicis: miram enim vim habet ſpi-
ritus vitales, animales ac naturales ſuſ-
citandi, calfaciendi, viſcera omnia ac

præcipue neruoſum genus corroborandi,
extrinſecus ibidem uſus eius creber eſt
in Epithematibus cordialib, ac pulſum,
in Catarrhis frigidioribus, Paralyticis
membris, cephalalgia, &c.

8. Aqua ad deſiccandos Catarrhos.
Fluſzuvaſſer S. Cloſſ.

24. Serpilli q. v. inde cucurb. & af-
funde vini maluat. quantum ad coopè-
riendam herbam ſuff. relinque in cellâ
per 3. ſeptim. deinde deſtilla leniter, &
in hac aquâ macera ligni Saffaſt. torno
attriti ʒj. Dos. cochl. jß.

9. Carminatiua ſeu de Chamomill.
compoſita Grimmeruvaſſer.

2. Flor. Chamomill. Rom. M. xxx.

Incidentur & contundantur, infun-
danturque per horas 24. in

Aq. Chamomill. lb. x. (alij xv.)

Vini generoſi lb. vj.

Hinc exprime fortiffime, in colatura
iterum infundantur hor. 24. alij flores
Chamomill. com. (M. xxiv.) exprimantur,
colentur. In colatura macera.

Fl. Chamomill. M. xij.

Flaued. cort. arant. ʒiß.

Herb. Abſynth. pont. M. ij.

Centaur. min.

Puleg.

Origan. à Miß.

Sem. Aneth. ʒiij.

Aniſ.

Fænic. à ʒiß.

Caru.

Cumin.

Card. bened.

Mariæ à ʒiß.

Bacc. Iuniperi.

Lauri à ʒß.

Stent hor. 24. tunc MBlen to deſtilla.

Vires. Magnarum eſt virium in mor-
bis, à flatibus ſubortis, e.g. paſſione colica,
inflatione ventriculi & ſim. Præter quam
enim

*enim quod flatus discutit, vinis quoque
obrinet paregoricam.*

10. *Aqua Cephalica aromatica.*

℞. Nuc. moschat. ʒj.

Galang.

Calam. arom. ana. ʒβ.

Macis.

Garyophyllor.

Cinamom. ana. ʒj.

Flor. Lauand. M. ʒβ.

Vini Rhenani mensur. ij. stent in
infusione, postea destillantur.

Vires. Non capiti solum, sed & ventri-
culi maximopere conuenit, imbecillitati
eorum succurrendo, cruditates inde ortas
corrigendo, & discutiendo, Sennert. in
instituit.

11. *∇. Cephalica F. F. vel Epileptica
Schwindelwasser.*

℞. Flor. Lilior. conuall. lb. i. f.

Pæon.

Lauendul.

Beronic. a. lb. j.

Til.

Primul. Veris. ana. ʒiij.

Herb. Botrys. cum flor. mj.

Rad. Pæon. ʒiif.

Aristoloch. ʒiβ.

Diptamn. alb. ʒj.

Sem. Pæon. ʒiif.

Cubeb. ʒj.

Piper nigr. ʒβ.

Visc. quern. ʒj. ʒij

Coryl. ʒiij.

Macerentur in Vini maluat. Mensur.

2. per septimanas 3. Dein destillantur
in MB.

N. 1. *Duplici modo ∇ haec in officinis
nostris parata prostat. 1. ut iam descripta
est. 2. cum castorei ʒβ. quod vel simplici
infusione vel repetita destillatione ∇ m ce-
phalicam cum castoreo dictam consti-
tuit.*

N. 2. *Quoniam ∇e huius ingredientia,
eodem tempore recentia haberi nequeunt,
ne exiccando quid virium pereat, singula,
prout collecta fuerunt infunduntur, seor-
sim destillantur, destillatumque loco men-
strui reliquis affunditur.*

Vires. Non immeritò Apoplecticam
nominaueris, vipote cui morbo precipi-
è consecrata est. Succurrere tamen apta est,
& reliquis capitis affectibus, catarrho-
rum flatuumque nequitia introductis.

Quales sunt vertigo, Grauedo capitis,
Epilepsia.

12. *Aqua communitalis ophthalmica.*

℞. Herb. Euphrag. miii.

Celidon.

Fœnic.

Verben.

Silermont. ana. mii.

Rur.

Meliss. ana. Mi.

Caryophyllor.

Macis.

Piper. long. ana. ʒβ.

Macerentur per noctem in ∇ rosar.
alb. Vini alb. ana.

Destilla l. ∇. in MB.

Vires. *Acuit visum, sordes oculorum
detergit, maculas aufert, ulcera sanat,
&c. scil. instillata.*

∇ communitalis paulo aliter.

℞. Sum. Euphrag. mij.

Chelidon.

Verben.

Betonic.

Chamæpit.

Aneth.

Hormin.

Anagall. flor. rub. ā. mj.

Sem. Ameos. ʒf.

Rad. Caryophyllat. ʒj.

Fl. Anthos. Mβ.

Piper long. ʒij.

Macerentur

Macerentur in Vini albi q.s. per ♂
integrum & destillentur.

Vires easdem obtinet cum priori.

13. *Aqua cordialis Herculis Saxonia
calida.*

℞. Cort. citri.

Fol. Meliss.

Ocym.

Vincetoxic.

Fl. Caryophyll.

Rosmar.

Satureiæ.

Sum. Diptamn.

Scord.

Petrofel.

Fœnic. ana. Mj.

Infundantur in f. q. Vini odorati,
aut maluatici. per ♂ (3.) postea de-
stillentur: in destillato iterum infun-
dantur.

Caryophyllor.

Macis.

Nucist.

Lign. Aloës. ana. ℥ij.

Destillentur denuo.

N. *Addipossunt grana aliquot Mo-
schi & Ambra.*

Dosis à ℥ij. ad ℥℥. &c.

14. *Aqua Cordialis eiusdem
frigida.*

℞. Succ. Borræg.

Bugloss.

Meliss.

Acetof.

Oxylapath.

Trinitat.

Bistorr.

Cyan. carul.

Calendul.

Limon.

Citr. ana. lib. i.

Acet. lib. i. (alij lib. alij lib. i℥.

Sem. citr.

Portulac.

Flor. Nymph. alb.

Violar.

Rosar. à ℥i.

Terr. sigillat. strig.

Bol. armen. or.

Terr. Lemn. ana. ℥ij.

Spec. Diatr. Santal. ℥ij. (alij omit-

tunt.

Camphor. ℥j.

Infundantur species in succis, mace-
renturque ♂ (3.) Hinc destillentur per
XX. vitreum in MB.

Dosis ℥. ad ℥ij. &c.

15. *Aqua cordialis restaurans*

P. de Spina.

℞. Corn. Ceru. mollis & tenelli in ta-
leolas sect: ℔ij.

Succ. carnis vitulin & caponis in
duplici vase s.a. extract. ℔ij.

Succ. pomor. redolent. ℔i.

Bugloss.

Acetofell.

Trifol. acetos. an. ℔℥.

Vini optim. ℔ij.

Lign. Santal. citrin.

Rhod. an. ℥vi.

Cinamom. ℥j.

Lign. aloës. ℔ij.

Digerantur omnia per ♂ ϑ. 2. de in
destillentur in MB.

℞. Huius aq. ℔iiij.

Succ. citr. recent q. s. ad gratam
aciditatem. Deinde adde

Flor. caryophyll. rub. ℥iiij.

Corrag.

Bugloss.

Violar. an. ℥ii.

Ros. rub. ℥iii.

Extrahatur Tinctura, cui alde

Conf. Alkerm. ℥iii.

De hyacinth. ℥i℥.

Magist. margarit.

Q

Corall

Corall. rub. a. ʒi.

Digerantur & feruentur pro vsu.

Vires. Spiritus vitales languidos mirifice reficit, adeoque conuenit in syncope, palpitacione aliisque affectibus cordis. Dof. cochl. f. vel interm.

16. *Aqua Cosmetica.*

℞. Ceruss. alb. ℔i.

Succ. limon. ʒi.

Limac. ʒiii.

Album ov. n. xv.

Camphor.

Boracc. a. ʒi℔.

Myrrh. ʒii.

Thur.

Masticha. ʒ℔.

Infundantur hor. 24. in

Aq. Til. ℔iij.

Sambuc. ℔i℔.

Postea destillantur.

Vires. Cutem dealbat, leuemetque red-
dit.

17. *Aqua Cosmetica preciosa.*

℞. Lil. alb. ʒvi.

Ireos Fl.

Fabar. "

Cicer.

Lupinor. a. ʒ℔.

Fl. fabar recent M℔.

Tragacanth.

Ceruss. alb.

Sacchar. alb. a. ʒ℔.

Medull. panis alb. in lacte
madefacta ʒj.

Oliban.

Gum. arab. a ʒiij.

Borac.

Alum. plumos. a ʒij.

Album oui ʒj.

Camphor. ʒi℔.

In f. q. aquæ Rosar. & flor. Fabar.
an. infundantur ♂ ♀ 3. Deinde de-
stillentur.

18. *Aqua Cosmetica sine myrrhata*
S. Clossai.

℥ lactis caprill. rec. mulcti ℔ iv.
album ouorum n. xii.

ad nenuph. &

ros. albar. an. ℔i.

Succi semper viui. maior. ℔i℔.

vini Hispan. ℔ 3.

F. destillatio in MB de quâ cape ℔ii.

myrrh. opr. subtil. puluer. ʒii.

Digere per 24. horas & F. iterum de-
stillatio per MB non omnino ad siccita-
tem pro ordinariâ ablutione. Quod si
facies eruganda sit aut epidermidis as-
peritas tollenda tunc

℥ aq. myrrh. præscript. ℔℔.

Sacch. cand. ʒii.

Borac. ʒi.

Alum. viti ʒi. M. abluatur facies.

19. ▽ *Damascena odorifera.*

℞. Ireos. Fl.

Caryophyll.

Cubebar.

Cinamom. acerr.

Gran. Paradis.

Calam. arom. à ʒi.

Maioiran.

Thym.

Fol. laur.

Fl. Anthos.

Rosar. rubr. ana. Mi.

Lauandul. ʒiii.

Vini optimi Menf. 3. Macerentur ac
destillantur: Destillato liquori ad-
dantur.

Moschi ʒ℔.

Zibeth. gr. vi. M.

Vires. Calfacit, seccat, incidit, discutit,
cor ac caput imprimis reborat.

20. ▽. *Diuretica ex nucleis F.F.*

seu Liqueur diureticus,

Kernvasser.

℞. Flor. Sambuc. seccat ʒvi.

Amyg.

Amygd. amar. \bar{z} v.

Nucl. persic. \bar{z} xii.

Cerafor.

Incisa ac grossè contusa macera in
Vini maluat. menti. iiii. hinc destilla
in MB.

*Vires. Insignium virium in atterendo
calculo, abstergendis vteribus, urina-
que cienda.*

Dosis coch. j.

21. *Aqua anti. dysenterica.*

℞. Nucistæ.

Sem. Plantag.

Sanguinar.

Burs. pastor.

Sanguisorb. a. \bar{z} ß.

Gallar. \bar{z} . vi.

Cydenior. exicc. \bar{z} j.

Mespilor. exicc.

Sorbor. exicc. a. \bar{z} ß.

Boli.

Terr. sigillat a. \bar{z} j.

Flor. Balaust. Mj.

Rad. Acor. \bar{z} ß.

Fruet. Acac. exicc. \bar{z} j.

Panis tost. cum cru-

sta Mij.

Infunde in Aq. plantag.

Tormentill.

Burs. pastor a. q. f.

Stent in infusione per ϕ (8) postea
destilla ex MB.

*Vires. Conuenientissima est in alui
vterique fluore, adeoque in dysenteria,
diarrhæa, &c.*

Dosis, cochl. i. vel 2.

22. *Aqua Diuretica S. Closs.*

℞ Vini alb. in quo rad. v. diureticæ
& eryng. prius lotæ & contusæ, fuerint
maceratæ lib. i.

therebinth. &

mellis opt. an. \bar{z} iii.

succi raphan. &

malu an. quart. i. m. & infun-
dantur omnia simul per ϕ 4. adde lum-
bricorum terræ nodulo inclusorum &
filo suspensorum \bar{z} v. deinde destillentur
in MB.

℞ aquæ huius destillat. \bar{z} ij.

Spiritus \rightarrow fuccinat. id est per
octiduum cum sale volatili succin. pro-
portione subtriplà digesti ℥ss.

*M. F. dosis. Urinam & calculum po-
tenter promouet. Ex communicatione
S. Clossæi.*

23. ∇ *Febrifuga.*

℞. Rad. Scorzonæ.

Pentaphyll.

Tormentill.

Dictamn. ana. \bar{z} vi.

Sem. Citr. excort.

Card. bened.

Mariæ.

Acetof. ana. \bar{z} ß.

Santalor. omn. ana. \bar{z} j.

Galeg. Mj.

Fl. cordial. ana. Mß.

Raf. c. c. \bar{z} ß.

Contusis affundantur.

∇ . Tormentil.

Cicor.

Card. bened.

Mariæ.

Pap. errat. a. q. f.

Macerentur in vitro clauso ϕ (3.)

postea adde.

Pomor. citri contus. N. vi.

Succ. Endiu.

Acetof.

Card. bened.

Plantag. an. lib. i.

Borrag.

Scord. an. lib. f.

Destillentur in MB.

*Vires. Conuenit in febribus præcipue
malignis: malignitatem quippe discutit,*

putredini resistit.

Dosis \bar{z} j. vel \bar{z} ij. ij.

24. Aqua ad gutturis affectus

(Halsz 7.)

\mathcal{R} Fol pyri fylustr.

apij.

fanic.

periclym.

icord.

quinque fol.

aristol.rot.an.Mij.

herb.perfoliat.rotius Miiij.

cereuis. acfcentis (*Sauverbier*)

menf. iij.

fermententur simul per 3. hebdom.

tum adde.

albi græci \bar{z} ij. destilla per vesicam.

Dentur cochl. ij. bibenda in ardoribus gutturis Vnulaque inflammatione, deinde os frequenter eadem colluat, & lintea hac aq. perfusa collo obnuat.

25. Aqua Antihectica.

\mathcal{R} . Herb. hyssop.

Hed. terr.

Rorell.

Centaur. min.

Adianth.

Scabios.

Cichor.

Pimpinell.

Quinquefol.

Acetof.

Epatic.

Pulmonar.

Fl. Borrag.

Bugloss.

Papau. rhæad.

Rosar. an. p. ij.

Sem. 4. frig. mai. an. \bar{z} ij.

Rad. Cichor.

Enul. a. \bar{z} . β .

Pimpinell. \bar{z} j.

Cancr. fluuiatil. contus. No. xxv.

M. & cum lacte caprino infunde ac destilla ex MB.

Vires: *Hæctica* laborantibus mire prodest, acrimoniam sanguinis obtundendo adeoque nutritionem emendando.

Dosis, Cochl. 3. aut 4. assumpta mane ac post meridiem totidem.

26. Alia aqua antihectica,

\mathcal{R} . He. b. Pimpinell.

Epatic. stell.

Millefol.

Agrimon.

Veronic.

Nasturt. aq. a. M. i.

Sem. 4. frig. maj. an. β .

Flor. Borrag.

Bugloss.

Cichor.

Rosar. an. p. i.

Rad. Cichor.

Enul.

Pimpinell. a. \bar{z} vi.

Cancr. fluuiatil. No. xiii.

Limac. No. xvi.

Sanguin. de vitulo nigr. β bi.

Pulmonis vitulin. β bi.

Aq. Epatic. β bi

Lact. caprin. q. s.

F. Infusio & destillatio ex \mathcal{M} .

Vires ac vsus conueniunt cum priori.

27. ∇ *Histerica Crollij.*

\mathcal{R} . Rad. Diptamn.

Sem. Dauci. ana. \bar{z} j.

Cinamom. ac.

Cass. lign.

Meliss. ana. \bar{z} j.

Croc. or. \bar{z} j.

Castor. rec. \bar{z} ss.

Ex omnibus mixtis F. puluis, cui affundantur ∇ . Rutæ lib. ii. β . stent dies (4.) in infusione. Hinc destilla in MB.

Conue

Couuenit vtero prauis humoribus molestato. Discutit, suffocationi succurrit.

28. *Aqua hysterica Matthæi Martini.*

R. Fol. Meliss. odor. M. vi.

Betonic.

Puleg. an. Miß.

Calaminth.

Arthemif.

Basilic.

Chamædr.

Hyssop. a. M. f.

Matricar. P. i.

Rad. Pæon.

Eryng.

Meu.

Angelic. dom.

Syluestr. ʒß.

Sem. Caru.

Siler. mont.

Coriandr. app. an. ʒij.

Galang.

Zedoar an. ʒiiij.

Rapontic. ʒiijß.

Comminutis affunde Vini generosi & actu calidi lib. 3. stent in infusione hor. ix. ad cineres calidos. Postea vbi parum ebullierint in Vase cooperto, destillentur in Vase vitreo & quæ primo exhibit aqua seruetur.

Vires. In affectibus melancholiam redolentibus mirè efficax est. Dosis. cochl. s. vel. i.

Matthæus Mart. de morb. Mesent.

29. *Aqua Imperialis correctâ.*

R. Cott. citr. sicc. & arant.

Nuc. mosch.

Zinzib.

Garyoph.

Cinnam. tenuis a. ʒii.

Ros. rubr. ante biduum collectar. ʒßß.

Rad. cyper.

Ireos florent.

Anagal.

Acot. veri &

Zedoar. an. ʒi.

bacc. Iuniper. ʒii.

Fol. laur.

Hyssop.

Meliss.

Salu.

Thym.

Sem. ocym &

Maioran. an. ʒiß.

Flor. lauend.

Anth.

Calend.

Tunic. &c.

Sambuc. a. ʒiiij.

Incisa & contusa obuoluantur strato rosarum infundanturque per cœtiduū in æquis partibus aq. ros. & vini generosi ad supereminentiam trium digitorum in cucurb. vitreâ super cineres calid. deinde destillantur Δ lentissimo per ☉ X. integros continuato, appendendo rostro. ☿

Mosch. opt. in nodulo ligat. ʒj. vel q.v.

Vires. Medetur Cephalalgia, melancholia, paralyti, imbecillitati ventriculi, corrigit animam fatentem, sæminas facundas reddit, partum accelerat, morbus Epidemicis aduersatur, quod etiam facit (sed potentius) acetum magmatum residuo superfusum eiusque tincturâ impregnatum.

30. *Aqua Lauandula composita.*

R. Nucist.

Cubeb.

Zingib.

Cinnamom. opt.

Galang.

Calam.ar.
Macis.
Caryophyll.
Visc. quern an. ʒiſ.
Rad. Pæon.

Eruc. à ʒiſ.
Flor. Til.

Pæon.
Anthos.
Salu. ana. Mß.
Lauandul.

Lil. conuall. ana. M. x x i v.

Vini optimi q. ſ. F. infusio & destillatio in MB.

Vires. *Calfacit, exiccat, cephalica est & arthritica, intrinsecus & extrinsecus adhiberi apta.*

31. *Aqua Magnanimitatis.*

℞. Formic. (præstant maiores acidulum odorem exhibentes) Mii.

Spirit. Vini Mensur. i. vel q. ſ.

Digere vase clauso donec putrefactione in liquorem abierint. Hinc destilla per MB. aromatizaque tantillo cinamomi.

Vires. *Calfacit intensè, incidit. Vſus eius præcipuus est in atrophia siue intrinsecus, siue extrinsecus adhibere velis.*

N. 1. Si species anacard. infuderis, insignis conficies extractum, ad memoriam roborandam.

N. 2. Sunt qui animositatem eius potius excitari volunt unde & nomen accipit; fides sit penes expertum. De collectione sunt qui monent, præferendas esse formicas, quæ plenilunio cum onis simul colliguntur, hasque ad plenilunium usque subsequens digerere iubent.

N. 3. Nonnulli ℞. lib. ij. aquam magnanimitatis descripta addunt.

Confect. Anacard. ʒii.

Castor. recent. ʒi.

Fl. Bugloss.

Anthos. ana. M. j.

Cinamom. opt. ʒ.

Digeruntque per aliquot dies, hinc destillant.

Alia aqua magnanimitatis descriptio.

℞. Formicar. maior. (Majo vel Iunio collect.) q. v.

Spir. Vini rectificat. ad eminent distillat. 3.

Digestis adde

Fl. Anthos.

Ros. rubr.

Bugloss.

Meliss.

Maioran. ana. Mi.

Castorei el. ʒij.

Spec. Diamolch. dulc. ʒß.

Confect. Anacard. ʒj.

Aqu. Bugloss.

Betonic.

Tilia ana. lib. i.

Tritis terendis misce ac mensem digerantur, deinde destillantur in MB. & cum proprio sale rectificentur.

Vires. *Cordialis est & cephalica pro priori magnarumque virium ad memoriam roborandam.*

32. ▽ *Nephritica.*

℞. Rad. Enul. Camp.

Ononid.

Pimpinell.

Raphan. ana. ʒj.

Petrofel.

Leuistic. an. ʒv i i.

Fol. Leuistic.

Petrofel. an. Mj.

Saxif. c. toto ʒij.

Nucl. persic. No. x x x.

Fl. Genist.

Meliss.

Anthos ana Mß.

Sambuc. Mi.

Bacc. Iunip.

Myrtill.

Myrtill.
Halicacab.

Sem.anif. ʒij.

Incidentur & infundantur in Vini
alb. opt lib. x i i. per ♂ (8) dein destil-
lentur.

Vires. *Diuretica ac lithontriptica est.*
Dosis cochl.

33. ▽ *Philosophorum.*

R. Flor. Sambuc. rec. lib. ij.

Nymph. lib. i. β.

Herb. Lactuc.

Hortulac.

Solan. c. toto ana lib. i.

Hyoscyami alb. lib. f.

Fl. Papau. erat.

domestic. analib. β.

Rosar.

Violar. ana ʒ i v.

Succ. Semper viv. lib. iij.

Plantag.

Acetof. ana. ℥ ij.

Endiv. lib. i

Omnia recentia contusa & incisa
stent in infusione in cella frigida ♂
(10.) postea destilla in MB. vel cinere ad
siccitatem sexies reiterando semperque
destillatum affundendo super nouas
herbas, ommissis, succis, tandemque recti-
fica, rectificato adde sal ex fecibus ex-
tractum, depuratumque sepeli in terram
frigidissimam per mensem.

Vires. *Omnibus morbis calidis conue-*
nit, &c.

34. ▽ *Pectoralis Clarif.*

D. D. Lud.

von Hornigk.

R. Hepat. Vitul. N. i.

Pulmon. Vulp. N. i. ʒ

Herb. Pulmonar.

Hepat. stellat.

Saluæ.

Rutæ.

Hyssop. ana Mj.

Rad. Enul

Gladiol. à ʒ β.

Sem. Anif.

Caru.

Fœnic. à ʒ β.

Fl. Borrag

Bugloss. ana ʒ ij

Infundantur per hor. 24. in

Vin. veteris gener. M. ij.

Aqu. Scabios.

Card. bened. à ʒ i v.

Hyssop. ʒ ij.

Dein destilla in MB.

Vires. *Confortat Pulmones ac Epas,*
crassam mucilaginem attenuat, expecto-
rat, flatu discutit, obstructions reseruat,
&c.

35. ▽ *Pectoralis, F. F.*

R. Fol. Scabios.

Veronic. ana M. ij.

Capill. ♀.

Salv.

Hyssop.

Marrub.

Epat ic. ana Mj.

Fl. Borrag.

Bugloss.

Violar à M f.

Rad. Enul.

Ireos fl.

Petrosel.

Liquirit a. ʒ β.

Sem. Anif.

Fœnic.

Vrtic.

Cinamom. el.

Croc. or. an. ʒ f.

Incis. & contusa digeratur in

Aq. Scabios.

Veronic. analib. i.

Hyssop. lib. β.

Vini alb. lib. iij.

Digetantur

Digerantur per \odot (2.) destill. per MB.
adde Sacchari cand. q. l.

Vires. *Easdem cum priori obrinet.*

36. ∇ . *Picarum composita.*

R. Sem. Pæon.

Rad. Pæon.

Pyrethri. ana. $\mathfrak{z}i$.

Aristoloch. l. $\mathfrak{z}iii$.

Visc. quern. $\mathfrak{z}i\beta$.

Castorei. $\mathfrak{z}i$.

Fl. Stæchad. ar. $\mathfrak{z}i$.

Lil. conuall. $\mathfrak{z}i\beta$.

Paralyf.

Pæon. ana. $\mathfrak{z}vi$.

Lauendul.

Rorifinar. ana. $\mathfrak{z}v$.

Salu. \mathfrak{z}

Maioran.

Betonic.

Hyslop. ana $\mathfrak{z}i\beta$.

Cinamom.

Caryophyllor.

Cardamom.

Nucist.

Cubeb. ana $\mathfrak{z}i\beta$.

Singulis grosso modo contusis &
incisis infundantur

in Aq. Lil. conuall. lib. iii .

Flor. Tilix lib. $ii\beta$.

Primul. Veris. lib. i .

Deinde adde pullos picarū. N. xi i . qui
pennis maiusculis abiectis conquassentur
& addantur infusioni prædictæ, post
macerationem F. Destillatio in MB.

N. *Sunt qui picasin ∇ . liliorum lib.
 $ii\beta$. ad consumptionem medietatis antea
coquunt, infusionique postmodum addunt.
Verum quia coctione illa volutilis pars
prorsus euanesceat, quid postmodum eleue-
tur non video.*

Vires. *Cephalica & antepileptica in-
signis est. Decis cochl. i . vel 2 .*

37. ∇ *Salvia composita, F.F.*

R. Salu.

Maioran.

Thym.

Lauendul.

Epithym.

Ber n. ana Mj.

Cinam. ana $\mathfrak{z}i\beta$.

Rad. irid.

Cyper. rot.

Calam. ar. ana $\mathfrak{z}j$.

Storac. cal.

Benz. ana $\mathfrak{z}i\beta$.

Infunde in lib. i v. Spir. Vinirec. \odot
(4) dein destill. per MB.

Vires. *Cum facit & siccatur. Cephalica
& arthritica est penetratissima vsui con-
ueniens, tam internæ, quam externæ.*

38. *Aqua antiscorbutica*

P. de Spina.

R. Rad. raphan. sylu. $lb\beta$.

Scorzoner.

Cichor. ana $\mathfrak{z}iiij$.

Polypod. q. $\mathfrak{z}ij$.

Enul. $\mathfrak{z}vi$.

Cort. tamarisc.

Cappar. ana $\mathfrak{z}i\beta$.

Citri $\mathfrak{z}i\beta$.

Raf. lign. rhod.

Saffar. ana $\mathfrak{z}vi$.

Herb. menth.

Meliss.

Chamædr.

Veronic. ana Mi.

Sem. Fænicul.

Anis.

Nasturt. ana $\mathfrak{z}i\beta$.

Flor. Cordial. ana $\mathfrak{z}ij$.

Troch. de Cappar. $\mathfrak{z}vi$

Croc. $\mathfrak{z}j$.

Digerantur per \odot . 3. in

Vini alb. gener. lib. $iiij$.

Seri lactis caprin. de-
purat. lib. ij .

Aq. Cuscut.

Acetofell.

Cardui bened. ana ζ v.

Postea adde

Succi cochlear.

Becabung.

Acetofell.

Fumar. ana ζ ix.Destillantur ex \overline{M} .39. *Aqua Antispasmodica*
S. Clossai. ζ \odot Vngar. ζ iv.Succin. flau. per triduum in \times
infusi ζ i.Vini maluat. libi .F. digestio vase clauso per octiduum
in B. M. mox destillatio in ciner. ferè ad
siccitatem vitando Empyreuma. ζ huius liquoris destill. ζ ix.Aq. still. post fermentationem ceras.
nigror.

Lilij conuall.

Flor. tilia arbor. &

Pæon. ana ζ iii.Rad. vtriufque valerian. ζ ß.

Sem. pæon.

Bacc. Iuniper. rec. matur. ana ζ iii.

Pullorum hirund. exenterat. n. 3.

Corui &

Picarum i detractis plumis

exenter. ana n. i.

Castor. opt. ζ ß.

Caphur. gr. xv. F. omnium

destillatio in \overline{M} . bulliente ζ de liquore stillato quart. i.Aq. Clareta cum ambrâ & mo-
fcho ζ is M.Sumat cochl. i. aut 2. incipiente parox.
absque morâ.40. *Aqua Splenetica*, F.F. ζ Rad. Filic. ζ ii.

Polypod.

Apij ana ζ iß.

Aristol. rot.

Leuistic.

Acor. aq. (pseudoac.)

Cal. arom. ana. ζ j.

Cort. Cappar.

Tamarisc.

Lign. fraxini.

Rhabarb. elect. ana ζ ß.

Sem. Leuistic.

Caru.

Anif.

Cymin. ana ζ ii.

Sum. Absynth.

Fumar.

Cuscut.

Fl. Agrimon.

Fol. Ceterach.

Scolopendr. à Mis.

vini generos. lib. vii. stent in di-
gestione (\odot 2) Hinc destillantur per
 \overline{M} .Vires. *Lienem roborat, aperit, urinam*
*promouet, &c.*41. ∇ *Contra Terrorem.**Schreckwasser.* ζ Flor. Lil. conuall. Miif. (vel plur.Superfunde Vini albi generos. Men-
sur. 3. stent simul in loco frigido, (\odot 14)
postea destillâ per \overline{M} .

Destillato iterum adde

Cinamom. ζ is.Cubebar. ζ ß.Caryophyll. ζ iiij.

Macis.

Galang.

Zinz.

Zedoar.

Croc. or. ana ζ ii.

M. Stent bene obturata aliquandiu.

Hinc adde

Flor. Lauendul. recent. Mj.

Spic. nostrat. Mf.

Stent iterum aliquot dies.

R

Hinc

Hinc destilla in MB. Ex fecibus extrahe ☉ destilla: roque adde.

N. Sunt qui destillatum ante Salis admixtionem super ocul. 69. preparat. 3. destillant. Verum ut supra monui, rectius destillato admiscetur.

Vires. Convenit gravidis terrorem passis, praecaut abortum, fortumque confortat.

42. ▽. Theriacalis s. contra Pestem.

R. Succ. Galeg.

Acetof.

Scord.

Citriana lib. i.

Theriac. opt. 3ij.

Mista digerantur aliquandiu, postea destillentur. Dosis cochl. i. ad ij. &c.

43. ▽. Theriacalis Croll. s. Spiritus Theriacalis camphoratus.

R. Theriac. Andromach. 3v.

Myrrh. rubr. 3iij.

Croc. orient. 3ß.

Camphor. 3ij.

Mixtis superfunde V rectificatiss. 3x. stent in loco tepido, cucurbita, imposito alembico, bene clausa, ☉ (24) Hinc destilla in MB. a lentissimo calore gradatim ascendendo. Sic Spiritus prodit elegans, quem reasfunde materiae in cucurbita, digere, atque denuo destilla, idque vice tertia.

N. Sunt qui Camphoram in X ponunt, alij contra Camphoram omittunt, Spiritumque Theriacalem simplicem vocant.

Vires. Egregium eius usus est in Pestē, ciet sudorem, resistitque veneno, Sennert. in Institut. Hartmanus in Croll. Finck. in Enchirid. &c. Dosis. 3i.

44. ▽. De Tribus. Mixtura de tribus. Mixtura simplex. Diaphoreticum

in peracutis.

R. Spirit. 3i rectif. 3iij.

Di. 3i.

Aq. Therical. Camphorat. 3v. M.

Vires. Ciet sudorem, resistit putredini, magnarumque virium censetur in febribus malignis.

Dosis 3. plus minus.

45. ▽. Tristantis.

R. Nuc. Mosch. lib. i.

Macer.

Zinzib.

Granor. paradif.

Caryophyll. ana 3iß.

Rhabarb. opt. 3j.

Castor.

Spicae nard. a 3ß.

Ol. laurini. 3ij.

M. & fac ut aromata mancant integra, infunde Vini optimi lib. x i v. maceraque in vitro clauso septiman. 4. Dein cola, speciesque omnes contunde ad pulmenti formam, addanturque postea liquori colato, iterum stent per ☉, saepius agitando. Denique destilla in MB.

Vires. Cephalica & uterina est, crassos flatūs discutit.

46. ▽. Vita Mulierum. Vt ciber.

Aqua Vit.

R. Cinamom. acerr.

Nucif.

Matris.

Zihzib.

Gatyophyllor.

Gran. paradif.

Cubebat.

Cardomom. a 3ij. (alii 3iß.

Piper long. 3j. alij rectius 33.

Galang. 3i. (alii rectius 3j.

Zedoar. 3i. (alii omittunt.

Pulverifentur singula seorsim permisceanturque. Hinc adde

Fol. Salv. min.

Menth. crisp.

Fœnic. ana Mj. (alij Melissa & melius.

Affunde Vini generosi Mens. iiii. maceraque vase clauso (14) postea destilla in MB, vel vesica stanno oblita.

Vires. *Vterum corroborat, suffocationes eius compefcit, flatus discutit, idque adeo feliciter, ut generosis ac nobilibus mulieribus Palatinatus, instar Panacea in morbis vterinis habeatur. Corroborat insuper ac calfacit ventericulum, ac reliqua viscera. Exiecat catarrhos.*

Dosis à cochl. ʒ. ad ʒ. c.

Medull. destillatoria, D. D. VVeickard. in Thes. Pharmac.

47. Aqua vite mulierum camphorata
S. Spiritus matricialis comphoratus.

ʒ. i. Dictas species priores affunde V digerantur & destillentur.

3. ʒ. Camphor.

Ol. amygdal. d. ana ʒ. i.

M. optimè, digeranturque in MB. vel Cinerib. ʒ. (14) vt camphora Totaliter cum oleo coniungatur.

Hinc superfunde præfatum spiritum, rursumque per ʒ. aliquot digere. Sic Spiritus extrahit Essentiam camphoræ.

Tandem leni calore MB destilla vsque ad sublimationem Camphoræ.

N. In rostro poni possunt grana Kermetes, que ruborem destillato conciliant.

Dosis gut. XX. ad XXX.

48. ▽. Virtutum.

ʒ. Cinamom. el.

Gran. Paradisi ana ʒj.

Nucist.

Caryophyll.

Zinzib. ana ʒʒ.

Macis.

Galang. à ʒij.

Salu. ʒvi.

Vini Rhenani lib. vi.

Incisa & confusa infundantur per 24. F. destillatio.

Vires easdem obtinet cum precedenti.

49. Aqua vomitina Plateri.

ʒ. Nuc. iugland. virid.

Rad. raphan. ana part. ij.

Acet. Vini part. iij.

Conquassatis nucibus & raphano, F. digestio leni calore, dies (5. vel 6.) postea destilla ex MB.

Dosis ab ʒss. ad ʒij.

N. Nonnulli fortiozem reddunt addendo nonnihil aque benedictæ.

50. Aque Saturnina siue Aesculapij vomitoria.

Destilla + fortissimum per XX plumbeum magnum abiiciendo quartam partem acetii primò extillantis tanquam nimis debile, reliquum excipe ad siccitatem ferè totalem, cauendo tamen ne ab acetii mellagine tetrum acquirat odorem.

Dulce est gustui, datur ad ʒj, ij & ultra in febribus intermitt. pro Vomitorio & contra Epilepsiam phlegmaticam à Ventriculo suscitatum.

C A P. XXXIX.

De Aquis reliquis.

PRæter aquas destillatas sunt & aliae officinales, ex destillatis scilicet simpliciter fontana, &c. accedente rerum aliarum incoctione, infusione, admixtione, resultantes.

Modus parandi nihil discrepat à modo decoctionis, infusionis, aliàs tradito.

Ustatiores formulae sunt.

Δ. Ophthalmica, F.F. 1.

Ophthalm. Bruni. 2.

Ophth. Quercet. 3.

Aqua ad suffusionem expertissima. 4.

Saphirea. 5.

Viridis. Collyr. Virid. 6.

Perlarum. 7.

Lac virginis. 8.

Caustica. 9.

Antipodagrica Quercetani. 10.

Antipodagrica I. Raici. 11.

1. ∇. Ophthalmica, F.F.

R. G. alb. ʒij.

Baccar. Laur. excort. ʒiij.

Aq. rosar. alb.

fœnic. ana ℥j.

Bulliant l. Δ in cucurbita vitrea ad consumptionem medietatis, hinc adde Camphoræ ʒiij. M. Filtra per chartam.

2. ∇. Ophthalm. Bruni. Collyrium Bruni.

R. Vini albi.

Aq. Rosar. alb. ana ʒiij.

Aloës Hepatic. subtiliter pulv. ʒj. F. Collyrium.

Vires. Commendatur ad palpebrarum scabiempuriginosam.

3. ∇. Ophthalmica Quercetani.

R. Croc. metall. ʒj vel ʒij.

Infunde in ∇ Euphrag. fœnic. aut simil. ʒv. vel vi.

Vires Virtutis miræ est contra ambliopiam, amaurosim & suffusionem.

4. Aqua ad suffusionem expertissima.

R. Aquar. euphras.

Fœnic.

Verper. ana ʒiij

Succorum chelid. maior.

Rut. ana ʒij.

Piper. long.

Nuc. mosch.

Garyoph. ana ʒij.

Groci ʒj.

Elorum roris. aliquantulum contrit. M̄s.

Sarcocoll.

Aloës hepat. ana ʒiij.

Fellis perdicum ʒj.

Incisis tritisq; singulis adde

Sacch; albiss. ʒii.

Mell. rosar. ʒvi.

Ponantur in XX vitreo. destillentur in

MB Δ lento

℥ huius aquæ ʒj.

Spiritus ☿ rectificat. ʒj.

De hac aqua instilletur in oculum laborantem bis aut ter indie

5. Δ. Saphirea ad oculos.

R. Lixiui ☿ cum ∇ fontana facti, & filtrati. q.v.

In hoc solue ☼ parum.

Id ubi exacte solutum fuerit, aquam hanc in anciam peluim conice per

per noctem & Saphiri acquirere colorem, &c. estque diaphana in vitro seposita.

Vires. *Ad omnia ferè oculorum vitia, imò ad ulcera quævis mundanda utilissima; cancrum, ambustionem, aliaque multa vitia, sanare perhibetur. Oculis aliquot guttatantum imponuntur, prout scil. multum parumue salis arisue continuerit. Efficax item est ad pelles oculorum auferendas. Potest dilui ∇ still. scæniculi Euphrag. &c.*

N. Est vtiatissima *Agyrtis.*

6. ∇ *Viridis. Collyrium viride.*

℞. *Ærug. æris* ℥ii.

Auripigment. citrini. ℥j.

Aq. ros. alb.

Plantag.

Vini alb. ana ℥iii.

M. Bulliant simul, maneatque liquor super materiam.

Vires. *Vtile est in Pterygio, si oculo instillatur.*

Huc pertinent Aquæ Cordiales, Krafftuvasser, quæ si lac colore emulentur, lac, emulsione dicuntur, suntque ex ∇ stillatitiis, pulueribus, aliisque cordialibus.

7. *Aqua perlarum, in Officina usualis.*

℞. *Aqu. Rosar.*

Borrag.

Bugloss. ana. ℥i v.

Manus Christi perlat. ℥ij.

Sacchar. cand. ℥ß. M.

Alia.

℞. *Aqu. acetos.*

Borrag.

Bugloss.

Rosar. ana ℥i v.

Manus Christi perlat. ℥iiij.

Margarit. præparat. ℥ß.

Syrup. Granat. ℥j. M.

Vires. *Vulgo notissima sunt, utpote ad*

quas 'in extremis', tanquam ad ultimum leuamen confugitur, cochl. subinde propinando.

Huius quoque loci sunt & alij liquores Aquei, vt

8. *Lac Virginis.*

℞. *Aqu. solan.*

nymph.

lactuc.

Acet. ℥ij.

Dissoluantur in his

Lithargyr. argent. ℥j.

Ceruf. candi d. ℥iiij.

Camphor. ℥j.

Stent aliquot horis dum refederint, quæ crassa sunt, tum transcolentur per filtrum aut cribrum setaceum.

Vsus magnus lactis huius est, non solum in decorandis Virginibus, acquirendoque nitore faciei, sed & in scabie, emendanda sanguineque sistendo: tum ad passam frontem, i. e. passarum more rugatam explanandam, exporrigendamque.

N. *Aliud vide apud August.*

9. *Aqua caustica, F.F.*

℞. *Spirit. Vini rectific.* ℥iiij.

Pulu. Caryophyll. ℥j.

Zinzib.

Cinamom.

Pulu. Ceruss. ℥iß.

Alum. vst. ℥ß.

℞. ti ℥iß.

Misceantur optime & feruentur in vase optime claulo.

Vires. *Mundificat vulnera inueterata, excrescentias exedit.*

Alia.

℞. *℞. cerus. ana* ℥ß.

Alum. vst. ♂ i alb. a. ℥ij.

Aq. rosar.

Fontanæ ℥i v. M.

10. *Aqua antipodagrica Quercetani.*

R 3

R. Aq.

℞. Aq. fontan. (potius pluuiat.) in qua aliquoties extincta ♀ & ♂.

Adde vitrum ♂ iiac ♀. dulc.

Vires. Resoluit tartarum, dolores sopit.

Vid. *Querc. Redu.* tomo 3. p. 263.

11. *Aqua antipodagrica Ioh. Raici.*

℞. Aq. terimachtim vtriusque (i.e. aq. lenistia. à bolo & ♂ figill. destillatæ. ℔i.

Laudan. ♀ial. (i.e. ♀ Œti potius ♀ dulcis acet. fortissimi. an. macerati) ℥ij.

Alhadid. (i.e. ∇. ferri) ℔ii.

Calcinationis lapidis de Alcohol. (i.e. Croci metallorum) ℥j.

M. Loffel. in Podagra.

N. 1. *Aqua adhadid fit limaturam in aqua macerando, postmodumque ut nonnulli volunt per vesicam abstrahendo. Verum enimvero melius foret, ut ex ipsiusmet Raici ore in memoriam mihi reuoc. Limaturam aëri humido exponere atque instante plenilunio ex incurbita humuli seu Frinali aquam destillare, iterumque aëri reponere, ac destillare. Quæ aqua redolet naturam salis * atque in quantitate minori adhiberi potest.*

N. 2. *Aqua podagr. Rulandi forsan ab his non multum est diuersa.*

C A P. XL.

De Balsamis Odoriferis.

Balsami significationes varias dedimus libr. 1. Earum tres sunt, quæ peculiarem sibi in Officina vendicant locum. Balsami scil. odoriferi, Balsami destillati, & Balsami vnguentarij, de prioribus hic loci agere conuenit, de posterioribus infra.

Balsami odoriferi sunt medicamenta, cum vnguentis crassitie certantia, imo plerunque duriora; parata ut olea odorifera corpore crassiori retineantur, quominus, exhalent.

Corpora, quib. olea illa incorporantur, sunt 1. Cera alba depurata, 2. Oleum nucis muschate expressum, tum per se, id est non depuratum, tum depuratum. 3. Medulla vituli lota. 4. Manna depurata.

N. *Quercetani Celestem Mannam, quam in Pharmacop. Rest. cap. 26. maximopere depredicat, alij Saccharum depuratum interpretantur, alij aliter. Pe-*

rum enimvero nihil aliud à Quercetano intelligi, quam ceram depuratum, ex scriptis eius parallelis liquet. Nimirum interade, acetum Philosophicum ex acido liquore Manna Celestis parare docet, id, quod de melle intelligi, cera scil. germano fratre, demonstratur in enodatione menstruorum, cap. 57. infra.

Depuratio ceræ & olei Nucistæ fit per ☉, inprimis ☿ risatum, eius beneficio color & odor s. a. extrahitur, relicto corpore albo, huius loci idoneo.

N. *Aly℞. Cera alb. p. vj. Ol. amygdal. doceat, p. 1. ad eminentiam digiti vnius; digrunt dies (3.) hinc abstracta humiditate in MB. Corpus reliquum balsamus conficiendis adhibent.*

Modus vulgaris. ℞. Corpus requisitum, admisce olei q. s. ut f. instar lini-menti, quod tingunt colore debito.

Modus præstantior. ℞. Corpus (Ol. Nucist. depurat.) adde extractum rei, cuius

cuius Balsamus expetitur, hinc admisce quoque oleum.

N. *Propotio inter extractum & oleum est fere tripla, Olei scil. Extracti.*

Balsama vstatoriâ sunt,

Balsam. Angelicæ.

Anili.

Apoplecticum.

vide infra 1.2.

Arantiorum.

Bezoarticus pestilent. *vid. 3.*

Caryophyllorum

Cinnamomi

Citri

Cubebæ

Lauendulæ

Maceris

Maioranæ

Menthæ

Nucis moschatæ

Rorismarini

Rosarum

Rutæ

Succini

Zedoariæ.

De his vide suis locis, lib. 4.

1. *Balsamum apoplecticum Crollij secundum F. F.*

℞. Ol. Nucist. expr. ℥ij.

Ambr. nigr. ℥iij.

gril. ℥ij.

Mosch. opt. ℥ij.

Zibeth. ℥iij.

Ol. Cinnam. ℥f.

Maioran.

Lauend. ana ℥f.

Caryophyll. gr. v. i.

Succin. ℥f.

Cum balsamo Indico, q. s. F. Balsamum.

2. *Aliter.*

℞. Confect. anacard. ℥ij.

Ol. succin.

Lauendul. ana gran. iij. vel plures

Zibeth. ℥ij.

M. F. Balsam.

Vires. Confortat caput, frigidosque humores discutit, adeoque in Apoplexia, Syncope, Paralyfi, & similibus affectibus conuenit, naribus inditus, vel quoquo modo applicatus.

N. Mulieribus ob suauitatem minus commode adhibetur.

3. *Balsamus Bezoarticus pestilentialis.*

℞. Ol. Rut. st.

Citr.

Angelic. ana ℥f.

Succin. rectif. g. v.

Camphor. ℥iij.

Ol. nuc. moschat. expr. ℥f. M.

N. Oleum nuc. moschatæ lauetur aq. Rutæ, Angelic. Citri, donec fiat album.

C A P. X L I.

De Balsamis destillatis.

Balsami destillati nihil sunt aliud quàm destillati Spiritus, cum Olej portione ex resinis, gummatibus, aroma-

tibus & similibus interueniente Vinij Spiritu prolecti.

N. Habes plurima balsama destillata

in Antidot. Renodai p. 296. Item alia præstantissima Olea Balsamica in Pharmac. Spagy. Poterii p. 141. & sequentib.

Balsamus simplicissimus est spiritus albus thereb. in corpus viscidum rediens diu veterascit, ex plumaceolis admotus, vel ol. garyophyll. inspissatum (33) cum gr. iv. talis R ni itidem vulneri instillatum. Magis compositus sic fiat

℞ Hauißi. resoluatur in tantundem ol. oliu. tandiu bulliendo spatulaque lignea agitando, donec sanguinis colore tingatur, tum remoue ab Δ & adde cer. alb. ʒij. & cum refrigerari incipit adice pededentim, tincturæ rad. aristol. rot. ʒiʒ.

tincturæ ♂ (vt est cap. de ♂) ʒj.
Olei myrrh ʒʒ.

Agitentur jextra ▽ ad consist. Vn-
guenti rubentissimi quod per litum vul-
nera tam simplicia quàm composper-
sanat.

Tinctura aristol. rot. ℞ rad. aristol.
rot. in pulu. redact. ʒij.

Terræ foliat. ♂ (vt est cap. de
(♂) ʒj.

℞ ʒi. Digere super E calidos,
filtra & serua.

Vsitationes sunt.

Balsamus vitæ, vide infra. 1. & 2.

neruinus, 3.

anti-arthritis, 4.

antiparalyticus S. Cloff. 5.

mneme-cephalicus, 6.

Petri de Ebano, v. in di-
spensat August. Oleum Bal-
sami.

Huc pertinet & Liqueur seu Balsamus
Saponis, v. infra 7. 8.

1. Balsamus vitæ.

℞. Myrrh. el.

Aloës epar.

Oliban.

Balsam. indic.

Bdell.

Ammoniac,

Sarcocoll.

Mastich.

Gum. arabic.

Storac.

Ladan.

Baccar. laur.

Axung. Castor. à ʒvi.

Croc. ʒiʒ.

Nucist.

Cinamom.

Caryophyll.

Gum. animæ.

Zedoar.

Galang.

Spic. roman.

Cardomom.

Cubebar. a. ʒij.

Puluerisata & mixta infundantur in
V rectific. ad eminent. digiti 1. dige-
ranturque aliquandiu. Hinc destillen-
tur per Retortam (vitream) in cineri-
bus: Δ que lentissimo lampadis rectifi-
centur.

Dein adde

℞. Ol. Anthos.

Maioiran.

Chamomill.

Puleg.

Hyslop.

Salu.

Rut.

Spic.

Lauendul. à ʒj.

Thimi.

Satureiæ.

Cubebar.

Zedoar.

Nucist.

Nucist.expr. à ʒß.

Cina ʒ om.

Caryophyllor.

Rosar.

Citri.

Arantior.

Fœnic.

Anis.

Carui ana ʒij.

M. F. Balsamus digerendo aliquandiu.

Vires. Cordiale est insigne, balsamum-que nostrum mirabiliter recreat, putredinem arcet, sopitos spiritus vitales & animales excitat, cerebrum humidum ac debile confortat, flatus discutit, adeoque commendatur in Apoplexia, uterinis affectibus, lypothymia, &c. Quinimo adeo celebre hisce in oris audit ut instar Panaceæ in omnibus fere morbis magnatibus expetatur; usus eius tam externus, quam internus est.

Dosis gut. iij. iij. & plur.

2. Aliter.

ʒ. Serpilli M. iij.

Santali alb.

Citrin. ana ʒß.

Fl. ʒij.

Benzoi ʒij.

Cort. aurant.

Citr. ana ʒß.

Ambr. ʒij.

Mosch. ʒiß.

C. C. ʒv i.

Puluerisata ind. retort. affus. spir. vin. rectificat. ʒv i i i. Diger. per 14. dies, postea adde

Opobals.

Myrrh.

Aloës epat.

Olibani.

Bbellij.

Ammoniacy.

Sarcocoll.

Styr. ligd.

Mastich. opt.

Gummi Arabici.

Ladani.

Tacamah.

Galbani ana ʒß.

Bacc. lauri.

Axung. castorei ana ʒj

Croci ʒiii.

Nuc. M.

Cinam.

Caryoph.

Gummi Anime.

Zedoar.

Galang.

Spic. or.

Card.

Cubeb.

Spir. Terebint. in quo per mensem macerat. sint ʒiii. troch. de vipera. Hæc mixta cum superioribus digerantur per 8. dies, destillentur, Spiritus separetur, oleo vero adde.

Ol. stillat. Iunip.

Succini.

Ceræ ana ʒi.

Anisi.

Fœnic.

Cumini.

Rosmar.

Maioran.

Thymi.

Satureiæ.

Spic.

Cam. rom.

Cubeb.

Zedoar ana ʒß.

Cin.

Caryoph.

Cort. aur.

Rosar.

Angel.

S

Puleg.

Puleg.

Salu.

Rur.

Lauend.

Serpillana ʒiʒ.

Camph. ʒj.

Iasinini.

Adde ʒvi r. Spir. vini rectific. Spir.
separetur, oleum constituit Balsam.
vita.

3. *Balsamus nervinus.*

R. Ol. Terebinth. ʒi.

Lauri ʒij. Misce.

Hinc adde Gum. Galban.

Elem. ana ʒvi.

Heder.

Oliban. ana ʒij.

Mastich. ʒj.

Myrrh.

Aloës epat.

Laudan.

Castor. ana ʒij.

Puluerisata admisce oleis, stentque
♂ aliquot (3.) Dein

R. Galang.

Caryophyllor.

Cinamom. ana ʒʒ.

Nucist.

Zedoar.

Cubeb. ana. ʒʒ.

Diptamn. alb.

Consol. maj. ana. ʒij

Puluerisata infunde in ʒbi. vel q. f.
W. Hinc misce cum prioribus, ac
destilla per X vel 6 vitream in .
primo prodibit Spiritus, dein oleum
flauum ultimo nigricans, collige si-
mul oleum flauum ac spiritum pro
balsamo.

Vires. Calfacit, confortat nervos. Para-
lysin & Contracturam sanat; extrin-
secus illitus.

4. *Balsamus anti-arthriticus.*

R. Mumia.

Mastich.

Thur.

Myrrh. a ʒij.

C. ammoniac.

bdellij

opopanac.

Tartari, ana. ʒiʒ.

Melis

Citroma... ana ʒij.

Spir. Vini ʒvi.

Destillantur per alembicum in re-
ceptaculum amplum, cum quintuplici
cohobatione.

Corroborat articulos, eorumque deflu-
xiones exiccat, dolores arthriticos
lenit.

N. Paulo aliter habet Weickhard.
Thes. Pharmac. libr. 6.

5. *Balsamus Antiparalyticus*
S. Clossai.

R. blepharum siue Taxonem tempore
vindemiarum præpinguem, euisceretur
& impleatur sequentibus

℥ Galban.

Ammon.

Sagap.

Opopanac. ana ʒj.

Laudan.

Benzoin.

Styrac.

Olib.

Myrrh.

Bdell. an. ʒʒ.

Gumm. Carann.

Tacamah.

Elem. an. ʒij.

Granor. Iunip.

Laur.

Heder. arbor.

Cardamom. maior. an. ʒj.

Herb. Chamædr.

Chamæpyth.

Beton.

Salu.

Absynth.

Maioran.

Origan.

Orimin.

Thym.

Spicænard.

Iuæ arthrit.

Puleg. regal.

Menth.

Hyslop.an.Mß.

Florum Beton.

Chamæm.

Aneth.

Lauend.

Hyperic.an.Mß.

Sem. Anif.

Fœnic.

Dauc.

Carui.

Amcos.

Apij.

Bardan.mai.a.p.i.

Axung.Vrifi.

Vulp.

Anar. ana. ʒii.

Medull.Crur.vitul.&

Bubuli ana ʒii.

Communis Mi.

Concidantur, tundantur & V irro-
rentur, adde.

Tereb. Ven.

Cer.nou.ana quart.i.

Consuantur fortiter & lento Δ in
veru assentur & liquor inde stillans su-
pra carnem reiciatur, idque tandiu,
donec caro tota torrida sit, substillatus
liquor vel adeps recondatur, cuius par-
tibus duabus admisceatur Balsami ☞
Rulandi pars vna.

Vires. Mira prestat in morbis frigidis
& Ischiadicis.

6 Balsamus mneme-cepha-
licus.

R. Succ.fol.Meliss.

Basilic.

Flor.myric.

Lilior.

Primul.ver.

Rorismarin.

Lauendul.

Borrag.

Genist.ana ʒij.

Aq.Vir.

Nymph.

Rosar.

Violar.an.ʒi.

Cubebar.

Cardamom.

Gran.paradis.

Santal. citrin.

Carpobalsam.

Ireos.

Croc. or.

Satureiæ.

Pæoniæ.

Thym. an. ʒß.

Syrac.lig.

Calamit.

Opopanac.

Bdellij.

Galbani.

Gum.heder.

Ladan. an. ʒvi.

Rad.aristoloch.lōg.

Pæoni.

Ol. Therebinth.

Nardin.

Costin.

Iuniper.

Laurin.

Mastichin.

Debeen.

De spica an. ʒv.

Puluerisanda puluerisentur & mi-

ſceantur omnia. Deſtillentur \times per f. gradus ∇ . Δ & oleum ſeparetur.

Vires: tantæ efficitur eſſe ſcribunt, ut perpetuam rerum membram pariat.

Uſum eius hunc eſſe ferunt, ut primis 2. menſibus nares, & aurium meatus quotidie, magnitudine piſi illinantur; ſequentibus 2. menſibus tertio quoque die, aliis 2. menſibus bis in ſeptimana, deinceps ſingulis ſeptimanis ſemel. Hinc 14. diebus ſemel, ut ita annus compleatur; tandem annis ſequentibus, ſingulis ſemeſtribus ſemel.

Aquæ in capitis affectibus, frigidis ac catarrhoſis uſiſſima eſt, uti & balſamus.

N. Ferunt Carolum Duceſſem Burgundie à Doctore quodam Anglo decem milibus floren. emiſſe. Vid. Senneri. pract. lib. 1. part. 2. c. 5.

7. Liquor ſeu Balſamus Saponis.

R. Saponem Venetum inciſum, affunde Spiritum Vini, atque ſemel ac iterum deſtilla; affunde deſu cun-

dem, & relinque in loco calido, poſtea per chartam ſitram; eſt inſtar olei brunnei, ſeu ſpadicei coloris.

Vires. Subleuat podagraos dolores, ſi locus affectus eo illinatur.

8. Oleum ſaponis alio modo.

R. Saponis Veneti aut Hiſpan. ſcabbendo probè imminuti & argillæ communis ana partes æquales, formentur globuli inſtar nuc. moſch. & coniiciantur in 6 magno Recip. inſtructam, pelle in Reuerb. clauſo primo lento Δ poſtea validiori ad totalem uſque Π uum expulſionem, tandem Oleum fuſcum praſinum ab acutiſſimo ſpiritu ſepara, quod per rectificationem in citrinum mutabitur.

Vires. Detergit & reſoluit potentiſſimè, ratione ingredientis lixiij, dolores iuncturarum à cauſâ frigida compeſcit, coacta digerit, contuſa diſſipat, urinam prapeditam mouet, colicam flatuoſam ſolo Umbilici litu reſoluit. Ex communicatio-
ne S. Cloſſ.

C A P. X L I I.

De Bolis.

Boli in officiis pro uſu nulli extant, ſed ex præſcriptione uſui extemporaneo parantur, idque vel miſcendò ſolum, vel inſpiliando, &c.

Fiunt ex Flectuariis, pulpis, conferuis, pulueribus in coplaſtentiam minus fluidam deglutibilemque redactis.

N. Cauendum ne ſapore ingrato abominabilis euadat.

Exempla.

I.

R. Rhabarb. pulueriſ. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Conferu. Roſar. rec. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Cum Syr. roſar. ſolu. F. Bolus.

II.

R. Elect. lenitiu de manna. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

diaphanic.

diacatholic. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Cum ſaccharo alb. F. Bolus pro vice vna.

N. Addi poteſt & pulvis conueniens.

Vires. Purgat humorem ſeroſum ac bilioſum.

III.

R. Conferu. roſar. antiqu. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Laudan. opiat. gran. $\text{ii}\mathfrak{ss}$.

F. Bolus

F. Bolus.

*Confert in fluxu alui & sim. dolorem
sedat, somnum inducit.*

IV.

℞. Cassiæ rec. extract. ℥j.

Sem. anis. ℥j.

Cum Oleo amygdal. dulc. rec.

F. Bolus in nephritide.

V.

℞. Prunor. damasc. num. x.

Sebesten. num. vii.

Passul. enucl. ℥β.

Coquantur cum aqua colentur-
que fortiter. Hinc addePulp. cass. ℥ij. coquantur denuo ad
spissitudinem mellis. Tum adde

Pulu. sen. ℥iij.

Cum Sacchar. F. Bolus pro 2. vel 3.
vicibus, &c.

C A P . X L I I I .

De Calcibus seu Calcinatiis.

Calcinationem sex fieri modis dixi-
mus lib. i. Ex his duo, non nisi ig-
nem requirunt, reliqui aliud aliquid (Δ
potentialem vocant) insuper expetunt,
cuius beneficio calcinatio peragatur.

Mineralium calcinationes dabimus
sigillatim, lib. 3.

Vegetabilia, v. gr. herbe, radices, ligna,
cortices, aliaque & c. igne comburun-
tur luculento, donec in cinerem fue-
rint redacta.

N. Simili modo incinerari possunt,
& capita mortua ex distillationibus resi-
dua, si super lamina ferrea vel in fictili
comburantur.

Animalia, horumque partes molliores
comburantur vt plurimum in fictilibus
(clausis & lutatis) ad nigredinem vs-
que. Sicaues comburantur cum pennis,
lepus cum pelle, &c.

Cornua, triplici exponuntur calcina-
tioni: Vstioni, vaporationi & corrosioni;
quam præcipationem quidam vo-
cant.

Vstione comburantur cornua, donec
per nigredinem albida facta sint. Idque

plerunque in fornace figulina fieri solet.
Hinc cornua vsta dicta.

Vaporosæ calcinationis modus hic
est: Cornua suspenduntur ponunturque
in capitello, parteque superiore Vesicæ,
quæ aliquota liquoris portione adim-
pleta sit: hinc subitus accenditur ignis, vt
vapor vi caloris eleuatus, cornua pene-
trando friabilia paulatim candidaque
reddat.

N. Opus hoc est fere 3. dicitur-
que philosophicè calcinari.

Liquor adhiberi poterit, vel ∇ simplex,
destillataue appropriata, vel succus de-
coctumque medicæ intentioni respon-
dens. Liquor autem ne qua penitus ex-
halet, recentem subinde affundere
oportet.

Corrosiua calcinatio fit affusis liquo-
ribus acidis, v. gr. aceto, spiritu Di.
Gi, & sim. quibus scilicet ossa vel cornua
grosse contusa, rasaue soluantur, cor-
roduntur, postmodumque in calcem
(quam magisterium vocant) præcipi-
tantur. Vide c. 67.

N. Simili modo calcinantur & crustacea.

Modus porro calcinationis vt diuersus est, ita calcinata diuersorum sunt nominum. Hinc calces, cineres, croci, salia, vsta.

Sic sunt:

-- Calx Ois; *vide libr. 3.*

Idem, vide lib. 3.

Cineres plurimi è quibus tamen officinis 4. vsitatiores, adeoque *κατ' ἐξοχήν*.

Cineres dicti.

Absynthij.

Fabarum è stramine.

Genistæ.

Sarmentorum Iuniperi

Crocus Metallorum

Martis aperitinus } *vide*
adstrictius } *libr.*
3.

Veneris

Vsti s. combusti Cancri

Ceruorum pulli

Cuculus

Erinaceus

Hirundo.

Lepus

Passer troglotides

Serpens

Cornu cerui vsti alcis

Vngula equi.

C A P. XLIV.

De Cataplasmatibus.

Cataplasmata fiunt ex rebus medicinalibus, que vel puluerisata, vel quoquo modo in pulvis consistentiam, siue per se, siue adhibita humiditate redigi possunt: præcipue tamen parantur ex herbis (viridibus siccisue) radicibus, floribus, seminibus, oleis, fructibus, axungijs, ferinis, micis panis, & similibus.

Modus fiendi adhibetur pro re nata; cum vel signe igne. Sine igne fit ex herbis viridibus, contulis aut earum succis expressis aliisque liquoribus convenientibus, quibus reliqua admiscuntur vt fiat puliculae instar. Ignis beneficio coquantur res cum liquore conueniente in cataplasma: vel fructus succulentis vt mollescant elixantur, hinc exprimitur pulpa per seraceum, eique reliqua admiscuntur.

N. 1. *Liquor pro rei necessitate varius est, aqua, lac, vinum, & similia.*

M. 2. *Sicca præstat optimè puluerisate viridia conquassare, & ad putruginem coquere.*

N. 3. *Cataplasmata tepide fere imponuntur, exceptis anacollematis & sinapismis, &c.*

Officinalia nulla extant.

Exemplo ergo sint:

Cataplasma resolutiuum Foresti. 1.

contra cruorem, Terband 2.

de nido hirundinis. 3.

Antifebrile. 4.

Anacollema. 5.

Sinapismus. 6.

Vesicatorium. 7.

1. *Cataplasma resolutiuum*

Foresti.

R. Flor. Camomill.

Stœchad.

Sum. Absynth.

Ruth.

Canthium & stipitem eorum.

Salu.

Salu.

Sabina.à Mj.

Coque omnia simul in lixiuio
ex cinere quercus vel sambuci, vel vi-
tis albæ; deinde pistentur addendo
puluerem qui.

℞. Alumin.

Sulphur.

Gallar.

Cypress.

Sal.comun.à ʒß.

Aloes

Baccar.Laur.

Pyrethr.

Sem.caul.à ʒii.

In fine addatur stercus recens co-
lubarum vel caprarum,

Vires. *Resoluit crassos humores ac-
tumores inde ortos, ut varices, elephan-
tiam Arabum. Forest. lib. XXIX. obser-
uat. 25.*

2. Cataplasma contra Cruorem; vulgo
Terband.

℞. Bol.armen. ʒiij.

Cretæ ʒj.

Prunor.Syluest. sicc. ʒj

Puluerisa quam minutissime & coque
cum aceto acerrimo, hinc admisce.

Radic.symphyt.puluerisat. parum.

In fine adde Farinæ auenac. q. f. ad
consistentiam cataplasmatiss, subin-
de instillando nonnihil olei myrti-
lorum.

Vires. *Cruorem ex casu vel contusione
collectum resoluit & siccât. Felix Virz
in Chirurgia.*

N. Eiusce farina cataplasmata inter
Chirurgos usitatissima sunt, fiuntque ex ter-
ra sigillata, bolo armeno, sanguine
draconis, cerusa, pice, resina, succino, lapid.
calamin. succo acacie & similibus ad-
stringentibus & exiccantibus.

3. Cataplasma Laxatiuum.

℥ Rasura radibryon. rec.

Mell.commun.liquid.ana ʒi.

Fellis taurin. ʒß. M.F. Catapl.

quo venter inferior vesperi introi-
tu lecti per noctem emplastre-
tur. Puerulis ad aluum bis terue mouen-
dam lumbricosque tum necandos tum
excludendos sufficit. In adultis v.

℥ Succorum cucum. agrest.

Panis porcin.ana ʒj.

Lactis ricin. 8c

Tithym. ana ʒß.

Pulu.hyer. pier. ʒiij.

Pulp.colocinth.

Helleb.vtriusque ana ʒij.

Cass.rec.extract. ʒij. aut iij.

Nutrientur omnia simul. F. Catapl.
quod ventri admoueatur ab umbili-
co ad pubem, vel cum butyr.vetusti
putrefacti q. s. incorporentur in Vnguen-
tum.

4. Cataplasma de nido hirundinis
Mynsicht.

℞. Nidi hirundinis num. i.

Alb.græci ʒß.

Rad.Alth.

Lil.alb.à ʒj.

Caricar. ping.

Dactylor.an.num.iii.

Coque in ∇ ad remanentiam pultis,
postea adde

Ol. Violar.

Farin.Chamamel.

Fænigr.

Sem.Lin.

Tritic.ana ʒvi.

Cerebr.cati. ʒß.

Pulu.noct.combust.

hirund.combust.ana ʒij.

Vitell.ouor.num.ij.

Croc.orient. ʒj. M.F. Catapl.

Commendatur in angina desperata
collo sæpius tepide applicatum.

5 Cata.

5. *Cataplasma antifebrile*,
 ℞. Fol. vitic. maj.
 Solan,
 Semperuiu. ana Mj.
 Tel. arani ʒij.

Sal. q. s.
 F. Catapl. applicandum pulsib. in
 febb. Perr. Hisp.

Huc pertinent & *Anacollemata*,
 quæ nihil aliud sunt quam Cataplas-
 mata frontalia, intercipiendæ deflu-
 xioni consecrata, adeoque fiunt ex
 adstringentibus quæ vt plurimum al-
 bumine oui subiguntur, E. gr.

6. *Anacollemma frontale*.
 ℞. Mastich.

Thur.
 Myrrh. ana ʒif.
 Bol. arm.
 Pulu. later. à ʒß.
 Croci ʒj.

Cum Albumin. oui, Ol. rosac. & pau-
 xillo acet. F. Frontale.

Vires. *Prodest in lippitudine aliis-
 que affectibus oculorum fronti impositum.*

Aliud.

℞. Argillæ vstæ.
 Farinæ volatil. *Staubmeel*.

Boli armen. à ʒß.
 Suc. Acac.
 Hypocist. à ʒij.
 Cum Album. oui & modico aceto
 F. Frontale.

Vires. *Conuenit in Hamorrhagia
 narium.*

*Huc referendi sunt & Sinapismi ve-
 siccatoriaque in forma Cata-
 plasmatæ.*

Hæc fiunt ex sem. Sinapi; nasturtii,
 vrticæ; radic. thapsiæ, cyclamin.
 bryon, scyllæ, allij, Euphorb. cantharid.
 & similibus, susceptis pulpa ficu-
 um, fermento, melle, oxymelite, sapo-
 ne & similibus.

7. *E. gr. Sinapismus*.
 ℞. Pulpæ caricar. (in + coctar.)
 ʒij.

Sem. sinap. ʒj. M.
Ruborem cuti inducit.

8. *Vesicatorium*.
 ℞. Cantharid. præparat. (i. ei alis &
 capitibus abscissis, num. xxx.

Fermenti acris. ʒj.
 Cantharides puluerisatæ suscipian-
 tur fermento, humectando si opus sit
 aceto acri.

C A P. XLV.

De Clysteribus.

Clysmus, Clystina, Enema, est liquor
 imprægnatus facultate medica-
 mentali, per syphonem in intestina in-
 tromittendus.

Duo ergo, continet. 1. Liqueorum.
 2. Facultates, quibus liquor imprægna-
 tur.

Liquor is, est decoctum (plantarum,

pisorum, carnis, &c.) vel similis humor
 Medici intentioni commodus. E. g.
 Vrina, lac, serum lactis, oleum, &
 siml.

Facultates Clysterum variæ esse pos-
 sunt, purgantes, alterantes, anodynæ,
 lithontriplicæ, carminatiuæ, abstergen-
 tes, adstringentes, & cat. Inter ceteros
 tamen

tamen vſitatores ſunt clyſteres purgantes, qui vt plurimum compoſiti ſunt, ſiuntque ex partibus (4. 5.) decocti alicuius emollientis, partib. (1. 2.) olei. additis inſuper purgentibus ac ſtimulantibus verbi grat. Electuariis ſpeciebus & ſimilib.

N. *Purgantium doſis duplo maior eſſe poteſt in clyſteribus, quam in aſſumendis; oleum additur ubi emollendum erit, omittitur ubi fortiter purgandum & renuellendum.*

Dofis eſt ab ꝑiii. in infantibus, ad xii. vel xv. in adultis.

Modus parandi liqueſcet vno ac altero exemplo:

1. R. Vrinæ ꝑb. i. F. Clyſma in Hy-drope.

2. R. Oleum Oliuar. ꝑv. vi. vii i. F. Clyſma ad leniendam alium.

3. R. Herb. emoll. ana M. j.

Rad. Alth. ꝑj.

Fl. Chamomill. M. ꝑ.

Fic. ping. N. v.

Vitell. oui, num. i.

Coque in ſ. q. aquæ ad ꝑb. i.

In colatura diſſolu. caſſ. pro. Clyſteri-bus ꝑvi. Bened. laxat. ꝑb. Ol. Chamæ-mel. ꝑiij. Sal gemmæ. ꝑj. vel Sacchar. rubr. ꝑb. ad ꝑj. F. Clyſma.

N. *Sunt qui ſal commun. vel gemma ad ꝑj. uſque iniiciunt. Verum quia*

podex locus maxime ſenſibilis eſt, præſtat doſin hanc imminuere.

Huc referendi quoque ſunt Clyſteres vterini (μυτρίχυστα) qui itidem ſunt liquores medicamentales per ſyphonem (μυτ εγγύθην) in vterum fundendi. Liquor itidem hic varius adhiberi poteſt, aqua ſtillatitia, decoctum, ſuccus vel ſimile quid, cui pro rei exigentia admixcentur pulueres. Electuaria, olea & ſimil.

Dofis pro vice vna ſufficiens eſt ꝑiii. vel v. vi. præter propter.

Exemplo ſint.

1. R. Decocti Euiſeti & Tormen-till. ꝑiii. Olei Myrtin. ꝑiſ. Tro-chiſc. de ſpod. ꝑi. M. F. Clyſter, in menſium fluxu.

2. R. Hydromel. ꝑiii. v. mell. ꝑiſ. F. Clyſter ad eluendum vterum.

3. R. Succ. mercurialis depurati, vel decoct. rubiæ tinct. Eryng. aut cyclaminis, vel radic. aper. vel ſaluiæ, matricariæ, nepetæ ꝑiii. Pulu. myrrhæ ꝑii. Clyſter ad promouenda menſtrua.

Ad hunc locum pertinent & Iniectiones penis, quæ itidem ex liquore conueniente fiunt ſiue decoctum is ſit, ſiue aqua ſtillatitia, vel ſimilis.

C A P. XLVI.

De Conditis.

Conditorum conſtitutionem abſoluunt res condiendæ ac liquor condiens, quibus pro libitu atoma-

tizans accedit.

Res conditi aptæ ſunt, radices, cortices, caules, fructus, uoces, & flores aliquot.

T

Duo

Duo in rebus condiendis præcipue consideranda occurrunt.

1. Quia res condienda vi liquoris intus ac extus perfundi postulat, mollem illam esse nec nimis crassam oportet.

2. Quia esui condita præcipue destinantur, haud ingrata ac gustu abominabilia ea sint, fas est. Hinc si durior & amarior res condienda fuerit, maceretur antea in ∇ frigida dies (5. 6, 7, 8, pro re nata) singulis diebus aquam deplendo, recentemque dando, vel coquatur insuper donec mollescat, amarorque quodammodo extrahatur. Caue autem ne nimia extractione solum cadaver condiendum relinquantur. His adde, si crassior, maior, solidior res condienda foret, secandam eam esse, pro exigentia, secundum longitudinem, latitudinem, tessulatum, &c.

N. 1. *Loco aqua nonnunquam lixivio macerare expedit, hinc aqua simpliciter dulcorare.*

N. 2. *Quid si libuerit condita aromatizare, aromata condiendis insigi poterunt.*

Liquor, quo res condiuntur est Saccharum clarificatum, & syrupisatum, id est, in aqueoliquore dissolutum, & ad syrupi consistentiam inspissatum; nonnunquam mel depuratum, aliquando muria.

Sic condiuntur.

I. Radices.

R. Radices bene purgatas (integras si teneræ fuerint, vel sectas, si crassiores) exemptis si opus lignosis partibus, redige ad mollitiem & si opus sit, ad saporem gratiorem, ut docui, hinc sicca & cum Sacchari ana. (circiter.) tantilloque decocti proprii,

vel aquæ, coque ad consumptionem humiditatis; consistentiamque Syrupi.

II. Cortices,

Cortices nihil à radicibus peculiare habent.

III. Cortices.

R. Caules) à pellicula exteriori purgatos) reduc ad mollitiem, hinc coque cum ana Sacchari in decocto solum, ad consistentiam.

IV. Fructus.

R. Fructus molliores (e. g. cerasa, baccas, ribes, berberes, mala persica, & simil.) affunde Sacchari Syrupisata vel mellis part. dimidiam, coque ad consumptionem humiditatis. (alias situm contrahit.

Duriores, ut poma citria, cytonia, & simil. prius ad mollitiem redigendi sunt, amariore ad saporem gratiorem. Limonia & oliuæ muria imponuntur.

V. Nuces.

R. Nuces virides, perfora stylo, macera dies (9. 10.) in ∇ frigida l. a. hinc coque ut mollescant; siccatas aromatiza, configendo cinamomo aut caryophyllis, cumque sacchari ana. ac aquæ q. f. coque.

VI. Flores.

Flores condiuntur affusione Sacchari syrupisati. Sunt autem pauci qui hac ratione integri condiuntur, scilicet flores citri, arantiorum, & interdum rosarum. Ex reliquis fiunt potius confervæ. Capparum flores sale; genistæ, sale & aceto condiuntur.

N. *Sunt qui flores albumine oui conquassata illito saccharo pulverisato aspergunt, solis calori exponunt, floresque hac ratione integros coloratosque conservant.*

Condita officinalia vtiatiora sunt.

Condita Aurantia poma integra ac in partes dissecta.

Aurantiorum

Aurantiorum flores
 cortic.
 Berberes
 Borragin. rad.
 Calami aromat. radic
 Cassia
 Cerasa amarena
 Cichor. rad.
 Citria poma integra.
 in taleolis.
 Citria maxima cum Carne
 Citrinat.
 Citria sicca, *trustener Citrinat.*
 Citri cortices, *eingemachte Citron.*
 Schalen.
 flores.
 Consolid. mai. rad.
 Corna.
 Cydonia, *eingemachte Quittin.*
 Cynosbati baccæ, *eingemachte Han-*
 buten.
 Enulæ rad.
 Eryngii rad.
 Lactucæ Hisp. caule, sicci, *trustene*
 lactuc.
 Mala armeniaca præcocia, *eingemach-*
 te Mollesen oder Mam-
 meleucken.
 Mespila integra.
 Myrobalani Belliric. } *afferun-*
 Chebulæ } *tur con-*
 Citrinæ } *dita ex*
 Emblicæ } *India.*
 Nuces Indicæ, scilicet moschata, cum
 inuolucris, *gantze Muscatnusz mit*
 den Schelffen.
 Nuces moschata, scilicet sine inuo-
 lucris, *eingemachte Muscatnusz*

ohne Schelffen.
 Nuces Juglandes.
 Persica.
 Pimpinellæ rad.
 Piper nigr. in racemis ex India af-
 fertur.
 Pruna sylvestria, *eingemachte Schlehen.*
 Pruna citrina, *eingemachte Spelling.*
 Pyra muscatella, *eingemachte Zucker-*
 bierlein oder Muscateller
 Bieren.
 Rhabarbarum
 Ribes.
 Satyrii rad.
 Scorzonæræ rad.
 Sorba, *eingemachte Speyerling.*
 Zedoariæ rad.
 Zingiber Chinense.
 commune.
Sunt & quæ condiuntur aceto; sale, &
 simil. vt
 Modus condiendi est.
 F. Consperge cum sale ac com-
 prime, vt sal in exudante humiditate
 liquefcat.
 N. Si res condienda minus succu-
 lenta fuerit, affundi poterit modicum
 ▽ a.
 2. Affunde + stentque vt pene-
 tret, vel si nimium liquoris sit, exhalet
 aliquantulum.
 Sic prostant.
 Condit. Cappares.
 Cucumeres,
 Oculi genistæ.
 Limonia poma.
 Oliuæ.
 Portulacæ summitates

C A P. XLVII.

De Confectionibus Saccharatis.

Confectiones Saccharatæ, id est:

Res Saccharo obductæ, sunt.
1. Saccharatæ siue Saccharacæ, simpliciter ita dictæ. 2. Confectiones Saccharocando seu candifato incrustatæ. His 3. subiungere licet Sacchara succis florum certorum sub colore horundem imprægnata. Sacchara insuccata non immerito vocaueris.

Modus conficiendi confectiones Saccharatas.

R. Rem conficiendam, inde pelui cupreæ (*Confeck Kessel*) saccharumque syrupisatum paulatim installando, continuo supra calore versa, vt humiditate absumpta Saccharum rei conficiendæ adhæreat, ac tandem instar crustæ eandem obducatur.

Res quæ hoc modo conficiuntur sunt semina, nuclei excorticati, aromata, radices, cortices, vt & flores ac summitates, sed rarè.

N. 1. Semina si opus sit preparantur prius macerando in +, vt semen Coriandri.

N. 2. Si amatoria conficienda fuerint, corrigi volunt antea, ad modum, quem in conditis docuimus.

Res quæ confectiones confiunt est Saccharum Canariense, interdum Saccharum candifatum.

Plerunque primum amylo res conficiendæ obducuntur, hinc Saccharum superducitur. Vnde duplicis generis confectiones proflare solent; finæ scilicet ex mero saccharo, & minus finæ ex amylo &

saccharo, vt dictum, præparatæ.

Modus conficiendi confectiones saccharo candifato incrustatas non differt ferè à modo condiendi, nisi sola brodij condientis saccharati consistentia, nimirum hoc si crassius fuerit, saccharum in crystallos concrefcit, resque iniectas quæ crusta obducit.

Confectiones vfitatiores Saccharatæ sunt.
Confectio Amygdalarum dulcium *überzogene fusse Mandeln.*

Amygd. amarar.

Anisi, *überzogen Anis Samen.*

Lauatiui, *Purgier Anis Zucker.*

Calami aromatici, *überzogen Kalmus.*

Cardamomi minoris, *Cardomomen Confect.*

Carui, id est, seminis, *überzogen Kümmel.*

Caryophyllorum, *überzogen Negel.*

Cichorei rad. *überzogen Cichorenvv.*

Cinæ. Santonici. sem. lumbricorum, *überzogen Wurmsamen.*

Cinamomi, *Zimmet Confect, überzogen Zimmet.*

Coriandri, *überzogen Coriander.*

magni, *mit grosser Crispatur.*

Corporis sine anima, confectio.

Molchardina, moschata, *Bisem Z.*

Cubebarum, *überzogen Cubeben.*

Dauci communis, *überzogen wild*

Mährensamen.

Feniculi.

Lauendulæ florum.

Macis.

Maioranæ sem.

Pimpi

Pimpinellæ rad.

Pinearum.

Zedoariæ.

Zingiberis.

*Confectiones Candisate scilicet Saccharo
cando incrustate.*

Confectio Acori, Candisarten Calmus.

Aurantior cort.

Caryophyllorum.

Cinnamomi

Citronata, id est cort. citri
maior.

Citri cort. i. e. minor.

Macis.

Nucis moschat.

Zingiberis. }

Huc

Sacchara insuccata

Saccharum rosaceum

violaceum, &c.

CAP. XLVIII.

De Conseruis.

RES conseruifandæ (conferuandæ)
vt plurimum flores sunt, raro herbæ,
rarius radices, rarissime caro fructuum.

Modus.

R. Quod conseruifare volueris,
conquassa (mortario præcipuè lapideo
pistilloque ligneo) aque inter quassan-
dum admisce Saccharum.

Proportio Sacchari variat: In rebus
humidioribus ac mucilaginosi conser-
uifandis, recipitur duplum: in sicci-
oribus ad triplum vsque ascenditur, additur-
que nonnihil ∇ æstillatitiæ.

Flores & herbas recentes conserui-
fare oportet, atamen si nimia humidita-
te scateant, in vmbra exiccari aliquan-
tulum expetunt.

N. 1. *Sunt qui ex floribus ac saccharo
S. S. S. faciunt, solique id ipsum exponunt.
Alii Iulepum conficiunt, eumque admis-
cendo conseruifationem absoluunt.*

N. 2. *Poteris, si volueris, flores vel
herbas conseruifandas in minutissimas
antea incidere partes. hinc addito Saccha-
ro conseruifare vti dictum.*

Radices prius coquendæ sunt, dein-
conquassandæ, vel & per setaceum ini-
ciendæ. hinc conseruifandæ.

Caro *fructuum* omnino setaceum
traici expetit.

Conseruæ vfitatiores sunt.

Conseru. Absynthii romani è summi-
tatibus.

Acaciæ flor.

Acetosæ fol.

Acetosellæ fol.

Anthos, id est, flor. rorisinar.

Betonice fl.

Borragin. fl.

Buglossæ. fl.

Calendular. fl.

Cardui bened. summ.

Cichorii ex fl.

Citri pulpæ f. medullæ.

Cochleariæ fol.

Consolidæ maior. flor.

Euphragiæ summit.

Fumariæ summit.

Galegæ, summ.

Genistæ flor.

Heder. terr. comp. Aug.

T ;

Lauer

Lauendulæ fl.
 Liliorum alb. fl.
 Liliorum conuall.
 Maioranæ summit.
 Malu. fl.
 Meliss. fl.
 Menthæ fol.
 Nymphææ alb. fl.
 Papau. errat. fl.
 Portulacæ fol.
 Pæoniæ fl.
 Persicorum fl.
 Primulæ veris fl.
 Prunellæ fl.

Pulegij summit.
 Rosarum albar.
 rubrarum recens &
 antiq. ♂ lata.
 Saluizæ fl.
 Sambuci fl.
 Scabiosæ.
 Scordij.
 Tiliæ fl.
 Tunicæ fl. i. e. caryophyll. horæ.
 Tussilaginis fl.
 Veronicæ summit.
 Violarum martiarum.

C A P. XLIX.

De Decoctionis.

Decocta fieri possunt ex rebus omnibus, quæ pronæ sunt, vires elixatione brodio suo communicare, adeoque ex *mineralibus*, *vegetabilibus*, & *animalibus*.

E *Mineralibus* non respuunt decoctionem Terræ crudæ, calcinaturæ, Lapides calcinati, Metalla calcinata, Antimonium crudum & calcinatum, Sūs crudus, cinnabaris, Lithargyrium, &c. Nimirum aquæ etiam simplici incoctæ vires quasdam impertiunt, maximè tamen, si adhibitus fuerit liquor facultate penettante grauidus, qualis Vinum, Acetum, Aquæustilatiæ. Quin & Metalla ignobiliora, potissimum si calcinata ea fuerint, verbi gratia, minium, cerusa, limatura ferri calcinata, & sim. decoctioni apta sunt. Decoquantur autem hæc omnia, in pulueres redacta.

Ex *Animalibus* decoctioni parent

partes carnosæ, membranosæ, cornuatùm cruda rasata, tùm calcinata, & simil.

Verum enim vero, hic loci de Decoctionis potissimum agemus porulentis, in praxi vñtationibus, quæ Apoze-mata communiter dicunt. Hæc parantur imprimis è *vegetabilibus*: videlicet è *radicibus*, *corticibus*, *herbis*, *floribus*, *baccis*, *fructibus*, *lignis*. Superadditis tamen nonnunquam (sed rarò) nonnullis à mineralibus aut animalibus.

Liquor in quo res ex communiter elixantur, est aqua fontana, (hæc adhibenda, quoties alius alicuius mentio nulla fuerit facta,) aqua pluuiæ, aqua destillata, (sed non adeò commodè ob spirituosa portionis exhalationem, nisi coctio in diplomate instituat,) serum lactis, hydromel, Vinum.

N. Hoc præstat in fine coctionis superinfundere.

Quantitas liquoris ad res coquendas varia sumi solet, prout sc. res longiore vel breuiorem coctionem experierint. Duriore liquidum ac solidiores vt diutius sunt coquendæ, ita maiorem liquoris quantitatem requirunt, quippe coctione liquor paulatim exhalat. Sumitur autem e. gr. proportio quadrupla; sextupla, decupla, duodecupla, &cæt. Respondent enim Man. i. ʒß. ʒv. vel ʒvi. pugillo ʒij. vel ʒiij.

Modus parandi absolvitur.

1. Præparatione ad decoctionem.
2. Decoctione.
3. Clarificatione.

1. Præparatio fit incidendo, contundendo, radendo, limando, &c.

2. Decoctio fit vulgariter. 1. Ae nudo. 2. Vase aperto æneo stanno obducto, 3. Ordine obseruato, s. a. Est autem coquere s. à materias coquendas non simul & semel iniicere, sed diuersis vicibus, prius posterius, prout naturæ volatilioris, fixioris, mollioris, durioris, solidioris, res fuerint. Nimirum si cornua, ligna, cortices, radices, folia, semina, aromata ac flores decoctioni destinantur, primum cornua, ligna, cortices & radices aliquandiu coquenda sunt, hinc folia ac semina superiniicienda, tandem quoque sub finem decoctionis, aromata & flores; vtpote quorum vis facile in auram euanescit.

N. Res duriores macerantur prius aliquandiu.

3. Depuratio, vulgariter albumine oui, cum quo decoctum expressum, vel saltem colatum ebullit, quod dein per colum traicitur. Vide lib. i. c. 14.

Clarificare.

Ursupatio: Quia saporis minus grati ferè sunt decocta, gratia conciliatur Saccharo Syrupoue addito ad singulas doses ʒj. plus minus, pro palato ægroti. Quin imò & aromaticus sapor superaddi ferè solet, nonnihil ex aromatibus commiscendo.

Sunt decocta celebriora.

Decoctum.

Alterans, vide infra N. 1.

Antimoniale. 2.

Aperitiuum maius. A.

-----cum Rhabarb. A.

minus s. lenitiuum

minus A.

Capillorum veneris, A.

Carminatiuum Clysmaticum, Cord.

Commune ad dissoluenda solutiuua Cord Renod.

Commune Medicinale cum & sine sena. A.

Epaticum 3.

Epatis vituli, 4.

Epithymi, A.

Florum & fructuum, A.

Fumariæ.

Hystericum, 5.

Maiale, 6.

Pectorale simplex & compositum A.

Purpans Quercetan. 7.

Splenis bouis; 8.

Senæ, v. A.

1. Decoctum alterans.

℞. Santal. rubr. ʒß. (alii ʒvi.

Succ. citr recent. ʒi. (alii ʒj.

Sacchar. clarificat. ʒj.

Aqu. fontan. purifs. lb. iij.

Stent in maceratione per noctem, mane coquantur ad lbß. colentur, ac seruentur pro vsu.

N. Alii addunt & Spir. ʒi ʒj.

Aliter.

℞. Santal.

℞. Santal. rubr. ʒβ.

Sem. citr. ʒβ.

Fl. Rosar. rubr. p. iβ.

Sacchar. caudi. ʒj.

Spir. B-i ʒβ.

Aqu. fontan. lb. iij

Digerantur per noctem, hinc deco-
quantur ad lb. iif.

Colaturæ adde

Rob. ribium

Succ. citri.

Saccat. depurat. à ʒj.

Vires Refrigerat, cor viresque
confortat.

2. Decoctionum ☿ iale Cl. D. D.

Lud. ab Hornig.

℞. Rad. fassaf. ʒj

Lign. visc. Querc.

Lentisc. à ʒvi.

Fol. Beton. Mj.

Parata pro decoctione coq. in aq.
p'ouialis limpida Mensur. iv. bulliant
per horæ, postea ☿, crudi ʒj. in petia li-
gati & porro bulliant, donec mensura
vna & dimidia sit consumpta.

Vires. Catarrhis medetur, scabiemque
curat, impuritates tum per insensilem
transpirationem, tum per aluum edu-
cens.

Vfus: mane haustus calide assumi-
tur.

3. Decoctionum Epati-
cum.

℞. Rad. Aristoloch. rot. ʒj.

Rhabarb. opt. ʒβ.

Chamaleon. nigr. ʒii.

Rad. Petrosel.

Cichor. à ʒvi.

Cardopat. ʒij.

Herb. Endiv.

Scabios.

Betonie.

Acetos. à Mj.

Sem. Fœnic. ʒj

F. Decoction in ∇ font. lb. iv. ad
consumpt. tertiæ partis.

4. Decoctionum Epatis
Vituli.

℞ Epar vituli. in frusta incisum.

Santal. rubr.

Cinamom. ana ʒβ.

Spic. nardi.

Rosar. rubr. ana p. i.

Conseru. flor cichor. ʒj.

Trochisc. Rhabarb.

Eupator ana ʒvi.

Coque in phiala capaci benè oc-
clusa calori balnei feruentis horas 7.
vel 8. donec hepar totum ferè in liquo-
rem redactum sit, quem ad perfe-
ctionem decoque addendo si velis sac-
charum.

Vires. Conducit in omnibus Epatis
affectibus, & imbecillitatibus; in fluxu
præsertim hepatico & hydropisi.

Dosis iij. iij. mane ac vespere.

Quercetan. in Pharmacop. Rest. cap. 26.

N. Eodem modo fieri quoque pos-
sunt decocta Pulmonum non solum Vul-
pis, sed & Vituli & agni, addendo pe-
toralia affectibus pulmonum congrua.
Quercetan.

5. Decoctionum Hystericum.

℞. Herb. puleg.

Artemis.

Abrotan.

Matticar.

Meliss.

Verben.

Serpill. ana Mj.

Rad. Pimpinell.

Baccar. Lauri. ana ʒij.

Castor. ʒj.

Sabin. ʒij.

M. & lege artis F. decoctionum.

Vires. Ciet menses, uterumque roborat.

6. Decoctionum

6. *Decoctum Maiale.*

℞. Herb. Fumar. Mj.

Summ. Lupul.

Cichor.

Agrimon.

Alplen.

Absynth. pont. à Mf.

Rad. Polypod. ʒiʒ.

Glycyrrhiz. ʒiʒ.

Fol. Sen. ʒij.

Sem. Anif. ʒij.

Omnia quæ haberi possunt recentia, misce cum reliquis ac coque in serilaetis lb. iv. ad tertias.

Colaturæ adhuc calidæ infunde per noctem.

Rhabarb. el. ʒij.

Spic. indic. gran. vii i i.

Schænanth. ʒf.

Ebulliant semel ac iterum, hinc colentur,

Vires. Sanguinem purificat.

Dosis ʒiv.

7. *Decoctum purgans pro delicatis.**Quercetan.*

℞. Follicul. fen. f. st. ʒvi.

Aqu. pomorum redolentium aut fragorum q. f. pro vna vice.

Macera vase clauso per horas 24. addendo parum succi Limonum, hinc bulliant, fortiterque exprimantur, adde

Succi pomorum redolentium recentis, ʒiʒ.

Sacchari candi si libet.

Clarifica cum albumine oui, ac aromatiza cum v cinamomi.

Vires. *Leniter purgat sine fastidio.*8. *Decoctum splenis bouis.*

℞. Splenem bouis integr. in frustra incisum.

Cinamom. grossè contus. ʒj.

Caryophyllor. ʒiʒ.

Croc. ʒij.

Vini alb. seu maluat. q. f.

Indein vitrum capax, quod benè clausum in MB. feruentissimo, hor. 24. ebulliat, donec splen in particulas minutissimas coctus & consumptus fuerit, magnaue Iuris exquisitissimè cocti, & fragrantissimi copia restet.

Vires. *Specificum est ad duritiem & obstructionem lienis & mensum suppressionem.*

Dosis ʒiij. continuando per quatuor aut quinque dies, cum menses fluere soliti sunt. *Quercetan. in Pharmac. Restit.*

N. *Potest itidem redigi in formam Extracti, vide infra.*

Plures decoctorum formulas qui expetitur, adeat Quercetanum in Pharmacop. rest. VVeckerum, Poterium, & simil.

C A P. L.

De Eclegmatis, Lohoch, Linctibus.

Materia præbent pectoralia: videlicet pulueres, conferturæ, mucilagines, syrapi, decocta, mella, pulpæ, sapæ, & simil.

Modus parandi.

℞. Pulueres conuenientes, fructus, gummi arabicum, Tragacanthum, fucum glycyrrhizæ, amyllum, &c. incorpora

V

pora

pora (in mortario, piloque ligneo) cum mellis, syrupi, mucilaginis, decocti, & simil. liquoris glutinosi, q. s. donec exactè mixta & mellis consistentiana nacta fuerint.

Ex tempore quæ præscribuntur, fiunt ex Eclegmatis vsualibus, pulueribus; conferuis; cum syrup. q. s. incorporatis, vel ex solis, syrupis cum sacchar. candi vel penidiati, q. s. mixtis.

N. 1. *Decocta iidem ac succi in formam Eclegmatis cum Saccharo coqui possunt.*

N. 2. *proportio pulueris est ferè vnc. 8. ad. syrup. vnc. ij.*

Eclegmata vsualia sunt.

Lohoch, ad asthma, f. scyllæ

compof.

de Cassia *vid. infra.*

N. 1.

de Caulib.

de Farfara

de Papauere

Passulatū, N. *Alind.*

vide infra 2.

vide
August.
&c.

de Pinp.

de Portulaca

de Pulmone vulpis

Sanum & expertum

è succo scyllæ

1. *Lohoch de Cassia pro Clysteribus.*

R. Herb. Maluæ

Mercurial.

Parietar.

Violar.

Betæ

Abfynth. ana M. i.

Coqu. in f. q. aqu. ad lb i v.

Adde pari pondere Medull. cas. & mellis despumati ana F. Lohoch.

2. *Lohoch passularum f. Electuarium passularum.*

R. Passular. minor. vnc. i v.

Sacchar. cand. vnc. ij.

Aqu. Scabiosæ.

Fœnic.

Farfar. à vnc. ij.

F. l. a. Eclegma.

Vires; *Conferit in Tussi; acrimoniam Catarrhorum mitigat.*

C A P. L I.

De Electuariis & Mixturis.

Electuaria sunt, vel molliora, (consistentiâ confectionem opiatarum) vel solidiora in tabulis. Priora sunt huius loci.

Modus parandi varius est, adeoque potius exemplis quàm regulis demonstrabilis.

Electuaria vulgaria (confectiones opiatæ communiter appellatæ,) fiunt è pulueribus minutissimis, melle despumato calente, (rarò saccharo syru-

pisato) susceptis, quibus solubilia si admiscenda ea sint, seorsim dissoluta subinde affunduntur, post modumque; ad fermentationē loco tepido reponuntur.

Reliqua fiunt sola ferè mixtura, scil. puluerum, electuariorum vsualium, conditorum in frustula dissectorum) conferuarum, extractorum seu essentiarum, & simil. quæ suscipiuntur liquore, maximeque syrupis q. s. ad consistentiam. Et hæc dicuntur vulgò *mixtura*.

N. *Adiunguntur*

N. *Adduntur & interdum pauca guttula oleorum stillatiorum, vel spirituum & suc.*

Sunt Electuaria, tum alterantia, tum purgantia.

Electuaria alterantia usitiora sunt.

Electuarium.

Diacorum Aug.

Pseudoacori, *vide infra*. N. 1.

Alexipharicum 2.

de Ciconia 3.

Alkermes, f. Confectio Alkermes.

De Allio, 4.

Anacardinum; f. confectio Anacardina, f. confectio sapientum. A.

Antidotus Matthioli, A.

Archigenis, A.

Athanasia magna, A.

Aureum Alexandrinum, A.

Camphoratum, 5.

Chalybeatum A.

Chalybeatum, Horatii Augeni, 6.

Arcularij, 7.

Corroborans specificum croll. 8.

Cordial. 9.

de Croco, 10.

Diaphoreticum Plateri, 11.

Diacodium, A.

Diureticum Montag. A.

de Ferri scorpiis, A.

Hystericum, 12.

de baccis lauri Rhafis, A.

Micleta Nicolai, A.

Mithridatium, A. C.

Oruietanum, 13.

Nucum, 14.

Diaolibanum, C.

de Ovo,

Papa f. Guidonis contra pestem, A.

Philonium Mesur, A.

persicum Mes. A.

maius f. Romanum Nicol. A.

Tharsense Galeni, A.

contra phthisin, 15.

Podagricum S. Cloff. 16.

Regum, 17.

Requies Nicolai cum saccharo, A.

Resumptium Fernelii C.

Dia-satyrium, A.

Scorbuticum, 18.

Dia-scordium Fracastor, A.

Theriaca Andromachi, A.

Diateffaron, A.

Communis, A.

Triphera magna, A.

minor, A.

Saracenicæ, A.

El. Vitæ Arnold. de V. N.

N. *Quia species aromatica ad electuaria, cum melle vel saccharo conficienda, ordinate olim fuerunt, & harum pleraque Electuarii nomine communiter adhuc veniunt, quas vide infra; Præstaret tamen species ab Electuariis distinguere.*

Electuaria lenientia usitiora sunt.

Electuar.

Diacassia cum manna, A.

Diacatholicum, Antidotus Catholica Nicolai. A.

Diaprunis simpl. A.

solutivum, Diadamasenum, A.

Hiera piera Galeni, f. simplex, A.

Lenitium Florenzolæ, A.

de Manna, A.

Triphera Persica Damasceni, A.

Elect. Purgantia usitiora.

Electuar.

Diafarum Fernelii; *vide infra* 1.

Antimoniale, 2.

Benedicta laxativa, Nicol. A.

Diabalzemer. f. Elect. Sennatum A. Renod.

Diacarthami f. Diacnicu, A.

Caryocostinum, C.

Catharticum Imperiale, Nicol. C.
de Citro solutivum, A. C.

Diacydonites f. Diacydonium laxativum, A.

N. *Ad Gelatinas referri potest.*

Episcopi f. Elefscoph. A.

Hamech. f. confectio Hamech maior, A.

Hiera composita, A.

Logadij, A.

Pacchij, Archigenis, Russi, f.

Diacolocynthidos, A.

Indum maius, A.

Diaphanicum Mesux, A.

Fernelii, A.

de Psyllio, Montagnanæ, A.

Rosarum Mesux, A.

de Succo rosarum Nicol. A.

N. *Vsitatus est in Tabulis.*

Diafebesten, Montagnanæ, A.

Diafenna Nicolai, A.

de Tamarindis. 3.

Huc Passulæ laxativæ, A. C.

ELECT : ALTERANTIA.

1. *Elect. Pseudoacori stomachicum.*

2. Rad. Pseudoacori. à cortice exteriore mundat. lb. 1. minutissime incisæ & conquassatæ infundantur in Vini rubr. ℥ (3. 4.) Hinc coque ad consumptionem vini, molliciemque radicis.

Postmodum adde mellis depurat. lbij. vel iij. iterum parum coctis addantur Zinzib. optimi minurim incis. ℥ iij. vel iv. misceantur optime l. Δ ad consistentiam; hinc remoue ab Δ & immisce.

Pulu. Cinnam. acer. vnc. β.

Piper long. ℥ iij.

Galang.

Nucist.

Macis

Cubeb.

Cardamom. ana ℥ iij.

Gran. paradif.

Piper nigr. ana ℥. i. plus minus F. Elect.

N. *Alii admiscunt amygdal. dulc. & pineas excort.*

Vires. *Confortat stomachum & caput frigidum. excrementa incidendo excicando, &c.*

Dosis ad magnitud. auellana vel inglandis; mane ac vesperi.

2. *Electuarium Alexipharmacum, Cl. Dn. D. Petri de Sp. F. F.*

℞. Rad. Diptamn.

Garyophyllat.

Cyper. rot. à ℥ iij.

Asari ℥ vi.

Ireos flor. ℥ iij.

Fol. Rut.

Fl. Rosar. rubr. à ℥ iij.

Diptamn. cret. ℥ iij.

Spic. indic. ℥ iij.

Cinamom.

Croc. or. à ℥ iij.

Baccar. Iunip.

Laur. à ℥. vi.

Mustich. ℥ iij.

Agar. tr.

Myrrh. el. à ℥ iij.

Bol. arm. præp.

Spec. liberant. à ℥ vi.

Contundantur subtilissime & cribrentur. Postea

℞. Nuc. iugland. ℥ iij.

Fic. pingu. ℥ iij.

Conquassentur simul additoq; modico vini trahantur per cribrum ad pultis consistentiam. Deinde

℞. Sacchar. opt. lbij. ℥ iij.

Dissolue

Dissolue cum aquæ q. f. Δ lento.

Postea adde

Mellis despumat. ℥iij.

Coque ad aquæ consumptionem.

Deinde adde

Puliculam illam ficuum & nucum.

Theriac. Andr. $\frac{3}{4}$ i x.

Conseru. ros. rubr. ℥iij.

Succ. Absynth. inspiss. $\frac{3}{4}$ i f.

Misce optime cum spatula ligna, dein remoueantur ab igne, & agitentur continuo, donec refrixerint, postea adde pulueres, misceanturque perfectissimè, in fine adde

Ambra grise. drach. i.

Mosc. $\frac{3}{4}$ j.

E. Electuar.

Vires. *Vfus eius creberrimus fuit in sauiissima illa nuper a peste, in quam præseruando, quam curando profuisse compertum est.*

3. Electuar. Alexipharmacum de Ciconia; Arcanum Alexipharmacum.

Rz. i. Recentem ciconiæ sanguinem destilla per \mathcal{M} . remanentem in cucurbita sanguinem exicca & puluerisa. Hinc

2. Extrahe Sal ex ventriculo ciconiæ incinerato, beneficio aquæ illius ex sanguine destillatæ, idque puluerisatæ illi sanguinis remanentiæ admisce.

Hiscæ 3. addantur in vitro satis capaci:

Succin. alb. el. $\frac{3}{4}$ i.

Corall. rubr.

Baccar. matur. vna inuersa.

Essent. Mumia.

Rad. Anthor. à $\frac{3}{4}$ f.

Lap. Bez. or. drach. iij.

Theriac. opt. vnc. i f.

Hoc cum oleo pini (ex nucl. express.) incorpora, deinceps tantum olei super-

addendo, vt digitos 3. vel 4. lares emineat. Tandem insolentur aliquandiu orificio vasis diligenter obstructo, quo enim verustius eò melius.

Vires, *Efficacissimum est contra omnia metallica, animalia & vegetabilia venena, quæ tum vomitu, tum secessu, tum sudore expellit.*

Dosis vnc. f. cum haustu ∇ a, vini, vel lactis tepidi Croll.

N. Loco \ominus ex ventriculi cinere extracti mallempisæ tunicas puluerisatas admiscere.

4. Electuarium s. mixtura de Allio.

Rz. Digitor. allij, num. i v.

Frixis & contusis cum melle & mithridatij, drach. iij. adde

Sperm. ceti.

Granor. Iuniper. ana $\frac{3}{4}$ j.

Castorei $\frac{3}{4}$ j.

Pulu. parietar. $\frac{3}{4}$ j.

Oxymell. squillit. q. f. f. Elect.

Vires: *Insignium virium est contra colicam.*

5. Electuarium Camphoratum Kegleri.

Rz. Rad. Diptamn. alb.

Tormentill. à drach. ii.

Zinz. alb. vnc. ii. (rectius $\frac{3}{4}$ f.)

Sacchar. cand. vnc. ij.

Margarit. præparat. vnc. f.

Nuc. vomic.

Os de c. c. à drach. ii.

Camphor. vnc. i.

Theriac. Andr. vnc. i v.

Sacchari alb. in aq. acetos. solut. q. f. f. Electuarium.

Vires. *Alexipharmacum ac sudoriferum est, maximèque vsum in morbis malignis.*

Dosis drach. j. ad ij. & c.

Paulo aliter.

℞. Rad. Diptamn.

Tormentil.

Zedoar. ana *unc. ℞.*Zinzib. *drach. ij.*Herb. card. bened. *unc. ℞.*

Turb. alb. & gumm.

Nuc. vomic. a *unc. ℞.*

Rhabarb.

Of. de. cc.

Oc. ☉ à *drach. i.*Camphor. *unc. i.*Sacchar. *unc. i.*Theriac. Androm. *unc. vi*

M.F. Electuarium.

6. *Electuarium Chalybeatum Horatii
Augenii.*

℞. Piper.

Zinzib. ana *unc. ℞.*

Cardamom.

Caryophyllor.

Doronic. *ut* Angelic.Croc. ana *drach. ii.*Tamarisci *unc. ℞.*

Sem. Basilic.

Anis. ana *drach. ℞.*

Limatur. chalyb. præp. lb. f.

Mellis despumati, lb. ij.

F. Electuarium.

Vires. *Confert in intemperie frigida
mulierum.*

7. *Aliud Elect. Chalybis Arcularij.*

℞. Scob. Chalyb. ℥ij.

Succ. recent. promorum Borsdorff.
purific. ℥vi.

Macera 24. hor. effunde per inclinatio-
nem. Succus novus affundatur, tribus
vicibus id reperatur. Succum tandem inf-
pissentur ad formam Electuarii.

Dosis à ℥ij. ad ℥℞.

8. *Electuarium corroborans specificum f.
Medicamentum specificum omnium se-
ptem membrorum principatum,
Crollii.*

℞. Ol. succiniter vel quater (per ∇
Maioranæ vel simil.) rectificati
drach. ij.

Spir. ☽ li veri.

Salis cranii human. (vel magiste-
rii. ana *unc. ℞.*

Tincturæ croc. or.

Granor. alkerm. ana. ℥ij.

Sal. margarit.

Corallor. ana ℥j

Ol. Cinamom.

Macer. ana ℥℞.

Lact. ☿ is ℥j.

Extr. Spondii i℞.

Antimon. diaphoret. ℥℞.

Magist ☿ ℥j. i.e. ℥ i

☽ lati

Tinctur. croc. ♂

Extr. chelidon.

Rhabarb. ana ℥℞.

Liquor. crystall

calcul. microsmic. ana ℥j.

Cum extracta & inspissata Theriacæ
essentia melle iuniperino, conservarosa-
rum, addendo pro libitu saccharum ro-
faceum F. electuarium. addita Moschi &
Ambre ana drachma i.

N. Propter ventriculi sympathiam
cum reliquis membris addantur spirit.
☿ i veneris *drach. ij.* atque Ol. Nucist.
stillat. *drach. ℞.*

Dosis à gr. 5. 6. 7. usque ad 20. &c.

9. *Electuarium seu mixtura cor-
dialis.*

℞. Conseru. rosar. *unc. viij.*

Borrag.

Bugloss. à *unc. iij.*Violar. *unc. ij.*Nymph. *unc. i℞.*Confect. Alkerm. *unc. ℞.*Pulp. citr. condit. *unc. iij.*Fl. citr. condit. *unc. ij.*

Spec. Diarrhod. Abb. ℥. ij.

Margarit.

Margarit. præparat. ʒ.ii.

Corallor. vtrorumque

præpar. ana ʒiij.

Lign. Aloës pulu. ʒ i v.

Ambr. gryf. gran. v i.

Fol. ʒum. x.

Cum syrupo acetos. citri q. f. F.
mixtura.

Vires. Spiritus vitales Balsamumque
natura corroborat.

Dosis ad magnitudinem auellanae.

10. Electuar. de Croco.

Croc. or. ʒ. i.

Rad. Zedoar.

Tormentill.

Nuc. vomic. à drach. ij.

Camphor. ʒj.

Sem. Eruc.

Rad. Diptam. n. alb.

Angelic. à drach. ij.

Perafit. drach. iij.

Theriac. venet. vet. ʒvi.

Mithridatii. vnc. vi.

F. Electuarium.

Vires. Alexipharmacum est Kegel-
rianonihil vel parum cedens.

11. Electuarium diaphoreticum
Plateri.

R. Syrup. de papau. ad ʒvi.

Rob. sambuc.

Ebulana ʒi.

Spir. Iuniper. ʒ. vi.

M. in Electuarium.

Vires. Somnum conciliat, dolores sopit
atque sudorem ciet, adeoque conuenit in
hydropse. vide Hechstett. lib. i. obseru.
dec. 3. cas. i.

12. Electuarium hystericum seu lau-
danum facile.

ʒ fragment. lapid. pretiosorum

Saphyr.

Hiacinth.

Topas.

Smaragd. ana ʒi.

Corall. alb. &

rubr.

Margar. præpar. a. ʒ i v

Rad. Galang.

Rhabarb. an. ʒiij.

Gumm. arab.

Opopan

Galban.

Thur.

Mastich. an ʒii.

Bdell.

Sarcocoll. an. ʒii.

Euphorb. ʒß.

Camphor. ʒiß.

Sem. coriandr.

Fœnic.

Cardamom.

Salis communis.

Opii Thebaic. a. ʒß.

Cinnam. ʒii.

Spiritus thereb. ʒi.

Mell. despumat. tßß.

V &

Aq. Imperial. an. q. f.

F. Laudanum f. a. instar Opiatæ

Dos. iij. gran. super bibendo parum
vini, & os frequenter Oxycr. colluendo
ad præcauendum faucium & gutturis
ardorem propter euphorb.

Suffocatis ab utero, hemicranicis con-
uulsis à causâ frigidâ magno solatio est,

13. Electuarium Ornetanum.

ʒ Rad. carlin. seu chamæleont. alb.

Tormentill.

Pistoloch.

Aristol. rot.

Scorzon. hispa.

Calam. arom.

Angelic.

Imperator.

Anthor.

Sem. fanton. &

Fol.eiusd.

Dictamn.alb.

Bol.arm.

Terr.figillat.an. ʒj.

Theriac.veter. ʒiij

Mell. hispan. cocti pondus triplum
F.Electuar.*Vires & dosiſ eadem quæ Theriaca
Androm.*14. *Electuar. Nucum.*

℞. Nuc.Iugland, num.xx.

Ficuum ping. num. xv.

Rut. vnc. i.

Sal. commun. ʒß.

Mellis, vnc. ij.

M.F.Electuarium.

*Vires: Alexipharmacum est.*15. *Electuarium contra
phthiſin.*

℞. Conferv. Roſar. vet. ʒii.

Loch. de pulm. vulp.

Papau.

Pino. ana ʒß.

Sem. 4. frig. mai. ex cort.

Lactuc.

Cydonior. an. ʒj.

Amygd. dulc.

Pinear.

Piſtac. ana. ʒß.

Maſtich.

Terr. figillat.

Bol. armen. ana ʒß.

Gum. arab.

Amyl. ana ʒj.

Spec. Diatragac. fr. ʒiß.

Diaparnid. ʒß.

Sem. Papau. alb.

Portulac. ana. ʒj.

Pulmon. vulpis exicc. ʒß.

Cancr. fluuiatil. vſt.

Trochiſc. de Carab.

Tragacanth. ana ʒj.

Cum Syropo de papau. & glycyrrh.

F. Mixture

*Vires: Acrimoniam mitigat, tenuita-
tem increaſſat.*16. *Electuarium podagricum**S. Cloſſei.*

℥ Refin. ſcammon.

Ialap. an. ʒi.

Hermodaſt. ʒvi.

Sagapen. ʒiß.

Sem. Anis.

Fœnic.

Carui

Milii ſolis.

Galyophyll. i

Mari.

Coſti arab.

Zinzib.

Maſtich. a ʒß.

Liquetur ſagap. in aceto ſcyllit. co-
letur per ſetaceum commiſcendo pulu.
præſcriptos, & in mortario marmoreo
admicendo per pugillos ſacch. pulueri-
ſatum & irrorando aq. iuæ Arthrit. F.
Electuar. vt Opiata, addendo eſſentiæ
aniſ. gutt. x.

*Dofa ʒij. ad ʒß. ad præcautionem do-
loris arthritici ſingulis menſibus in oc-
caſu) &c.*

17. *Electuar, Regum,*

℞. Pinear. vnc. iß.

Roſar. rubr. drach. ij.

Amygd. dulc. vnc. ß.

Santal. citrini. ʒii.

Ambr. griſ. ß.

Moſchi, graniii

Sacchari albifiſ. ▽ roſar. fragran-
tiſ. ſolut. ʒi. i.

*Vires. Refrigerat, exiccet, nutrit, cor-
roborat &c.*

18. *Electuar. Scorbuticum.*

℞. Conf. cochlear. ʒiijß.

Chamædr.

Melifiſ.

Roſar.

Rosar. incarnat.
Acetof. citri à ʒvi.

Condit. calam. arom.
ZZ.

Rad. Pimpinell.
Cort. citri à ʒiij.

Extr. Ausynth.
Iuniper.

Sem. Sinap.
Eruc. à ʒij.

Cardamom.
Cinamom. à ʒj.

¶ Gti. ʒiʒ.
Ol. Anif. ʒj.

Cinam. ʒʒ.

Cum Spir. de Cinam. & de cochlear. q. f.
F. Mixtura.

Vires. *Referat obstructions mesenterij, lienisque tenorem corroborat, ideoque in scorbutico affectu virium est insigniū.*

Dosis magnitudine inglandis parua mane ieiuno stomacho assumpta.

ELECTVARIA PURGANTIA.

2. *Diasarum Fernelij.*

℞. Syrup. menth.

violar. ana vnc. vii.

Coquantur in mellis crassitiem sub finem subducto igne insperge: Radicis peponis arefactæ.

Seminum raphani & vrticæ maceratorum in ∇ rosarum, arefactorum, & tritorum ana vnc. i.

Rad. asar. contritæ & cretæ ʒij.

Cinamom.

Sem. fœnic. à drach. iij.

Confice in electuario liquido.

Vires. *Omnis generis humores circa ventriculum & præcordia exuberantes, vomitione ducit non continuato, sed*

ex interuallis facto impetu, seni atque pregnantii tutum ac facile.

Dosis drach. ij. vel vnc. ʒ. ex aqua hordei vel ex mulsâ.

2. *Electuarium ʒ ale Crollij.*

℞. Vitri ʒ correct. per X vide libr. 3.

Theriac. androm. à vnc. ij.

Nuc. moschat.

Mastich.

Cort. arant.

Corall. rubr. præp. à drach. ij.

Caryophyllor.

Sem. Fœnic.

Coriandr. præp. à vnc. ii.

Pulueriscentur optimè & commisceantur. F. Massa pilularum, cum miua cydoniorum, q. f.

Vires. *Purgat minori violentia, quam vitrum, ac inprimis per secessum.*

Dosis debiliori, pilula una magnitudine pisi, fortiori dua.

3. *Electuarium de Tamarindis D. D.*

Greg. Horst.

℞. Fol. Sen. f. f. ʒv.

Cinamom. opt. ʒvi.

Sem. fœnicul. ʒi.

Vini maluat. opt. ℥iij.

Semel ebulliant, postea in loco calido per ʒ p digerantur vase clauso F. deinde colatura cum expressione, qua extrahatur pulpæ passul. min. & maior ana ʒ i v ʒ. Extractæ massæ per setaceum adde pulpæ Tamarind. Elect. diaprum. f. lenitiui an. ʒiij. crem. ʒi ʒii. ol. Nucis mosch. still. ʒʒ.

M. F. Electuarium.

Vires. *Purgat leniter serosos, biliososque humores.*

Dosis ʒj. circiter.

CAP. LII.

De Elixiriis.

ELixyr in officinis est liquor spirituosus, facultatibus præcellentibus, mediante infusione imprægnatus. Hinc conuenit vt plurimum cum Tincturis liquidis.

*Modum parandi singula ferè
suum obinent.*

Vsitationa sunt:

Elixyr Alliatum. N. 1.

Curi. 2.

Camphora. 3.

Hystericum & Antepilepticum S. Closs. 4.

Epilepticum Ant. Iren.

en. 5.

Crollij. 6.

Cratonis. 7.

Iuniperinum, vide lib. 4.

Pestilentielle. 8.

Nephriticum. 9.

Elixyr Proprietatis. 10.

Syncopticum. 11.

Vterinum Croll. 12.

Vite Matthiol. August.

maius Quereet. 13.

minus Quercet. 14.

1. Elixyr alliatum.

R. Allior. expurgat. N. xx.

Contundantur, & imponantur: affunde Sp. Vini rectific. ad 4. digit. eminent. destilla ex MB. per cohobias, semper noua alia addendo, in vltima destillatione adde camphoræ in peria ligatæ collo & bici appensæ 3. 1. destilla vt prius, habebis præstantissimum Elixyr alliatum.

Vires. Magni præseruatini locum habet, in peste, quouis mane cochlear. vnum, vel per se vel cum aq. still. Card. bened. aut Veronic. assumptum.

Vid. Deodatus in panth.

2. Elixyr Citri.

R. Cortic. citr. recent. ab albicante medulla separator. lb. iij.

Vi non rectif. lb. xij.

Macerentur aliquandiu, postea destillentur per vesicam cum refrigeratorio, donec phlegma stillare incipiat.

Huic spiritui, cum pauxillo croci tincto, adde

Succ. citri purific. lbij.

Habebis Elixyr citri.

N. Sennertus addit quoque ʒm rosarum lb. ss. in qua soluta Sacchar. cand. unc. x.

Vires. Elegans est cordiale & antidotus contra pestem & aeris contagia.

Dosis cochl. i. singulis auroris. ieiuno ventriculo, nisi Epatis calidior temperies, vel capitis imbecillitas prohibeant, eo enim casu, satiato ventriculo melius confert, Tenzel. in exegefi.

3. Elixyr Camphora. ss. Vi Camphoratus, ʒ pestilentialis Hartmanni.

R. Vi opt. lbij.

Camphor. select. (tempore Aestiuo) ʒ vii. ʒi. (Hyemali) ʒ x. ʒii. M. incisa prius camphora; & statim soluetur sine Δ, appende in nodulo croc. or. ʒ ss. & fiet Vi aurei coloris. Serua in vitro benè clauso.

Vires. Viliissimus est in peste, tam præseruando, quam curando.

N. Pore

N. Poterit itidem adhuc semel destillari. Hariman. in pract. loc. de peste.

4. Elixyr hystericum & antepilepticum.

℥ Rad. pæon.
acor. ver.
visc. querc. ana ℥j.
sem. pæon. ℥ss.
fantal. rubr. ℥ii.
flor. nymph. alb.
lauend.
Ros. rubr.
Papau. errat a M^{ss}
camph. ℥ii.
extracti opii purifs. ℥ii.
castor. per V ℥i.
spiritus sang human. vel
ceruini ℥ xii.
volatilis ℥j.

Ignemensstruo digerantur in diplomate, coletur liquor per chartam ferueturque

Dos iunioribus à gutt. vj. ad ℥ss. adultis ad ℥j. in vino, insculis, aq. stillat. tam in paroxysmo, quam diebus aliquot ante Nouilunium. Idem Elixyr valet aduersus hemicraniam, Cephalæam, vertiginem per aliquot dies continuos sumptum, purgato tamen antea corpore.

5. Elixyr Epilepticum, D.D.

Erejen.

℞. Spirit. Corall.

¶ i à ℥ss. ℥ii.

⊖ is cran. human. volat.

sangu. human. volat.

Succin volatilis à ℥j.

M. stent in digestionem, (14.) seruetur in vitro benè clauso.

Dosis guttula aliquot.

6. Elixyr Epilepticum Crollij.

⊖ lum ad flauedinem calcinatum;

imbibe Vi ut f. massa.

℞. Huius massæ ℥ss.

Rasur. cranii human.

Visc. Quercin.

Vngul. alcis

Granor. Pæon. à vnc. i.

Omnia scindantur & tundantur, postea mixta destillentur per Retortam gradatim.

Huius egressi liquoris ℥b. i. rectificetur in M^{ss}. supra

Castorei

Spec. Diamosch. dulc. ana ℥ss.

Anacardin. (fruct.) ℥vi.

Postea adde V i ℥b i v.

Sal. Pæon. drach. i.

Liquor. salis perlar.

Liquor. salis corall. à ℥i.

Ol. anis.

Succin. ana ℥ii.

M. & digere in M^{ss} per mens.

Dosis cochl. f. vel integrum in V pæon. & simili, continuando dies (9)

7. Elixyr antepilepticum Cratonis.

℞. Ciner. cornic. ex nido extract.

Turtur.

Cran. human. calc. ana ℥i.

Gran. Tiliæ autumnno collect. ℥ii.

Stercor leonin. ℥ss.

Affunde V ad eminent. digit. 3. extrahes. a. ex fecibus calcinatis elixiua sal, addeque extractionibus. Postea adde vini maluatici tantundem (cum V) & sacchar. candi vnc. i v.

Dosis cochl. f. ad i.

8. Elixyr pestilentielle.

℞. i. Flor. A i ℥iii.

Ol. Iuniper. (è bacc.) rectificat. ℥. viii.

Succin. rectific. ℥. ij.

Digerantur ut fiat solutio florum

2. ℞ Theriacæ Androm. ℥b. i.

F. Extractio cum V optimo, abstrahe

abstrahere i.

3. R. Rad. Enul. c.

Angelic.

Baccar. lunip. à vnc. iij.

Extrahatur Tinctura cum eodem spiritu, abstrahaturque iterum Vi . Misce iam extractum hoc cum extracto Theriacæ, ac affunde olea illa essentificata, prius tamen filtrata. Circula omnia simul lentissimo calore.

Vires. Secretum est, quod in peste & morbis epidemias ad miraculum operari solet, tam præservando, quam per sudorem contagium expellendo.

Dosis, in præservatione guttula aliquot, in curatione à \mathfrak{z} . ad \mathfrak{z} ij. in vino, aceto rosaceo, aqua scordij, vel alio aliquo liquore appropriato. Croll.

9. Elixyr Nephriticum.

R. Baccar. myrtillor.

Heder.

Alkekeng.

Iuniper. ana \mathfrak{z} ij.

Herb. Adianthi.

Veronic.

Rusc. ana p. i.

Rad. Cyper.

Pimpinell.

Ononid. ana $\mathfrak{z}\beta$.

Succ. Limon. \mathfrak{z} ij.

Fl. Genist.

Bugloss.

Sem. Melon.

Cucurbit. ana \mathfrak{z} j.

Nucl. auellonar. c. pellib. N. i v.

Vi rectific. q. s.

F. infusio in cella subterranea.

Vires. Prodest nephriticis ac calculosis, calculum atterendo & expellendo.

Dos. coch. s. vel i.

10. Elixyr proprietatis.

Elixyr hoc desumptum est ex Paracelso. Archidox. libr. 8. num. 6. ubi omis-

so menstruo. (origine ut loquitur) & Myrrh. Aloepat. Croc. ana, circular, in arena lenissimo calore per menses duos, dein elicit oleum per XX , idque cum anatico pondere circulari (vide de extractis) per mensem circular. Menstruum illud omisum varias opinionnes peperit, unde & diuersi processus, inter quos tamen vltatissimus est hic Crollianus.

R. Myrrh. Alexandr.

Aloës Epatic.

Croc. Orient. vel Vngar. à \mathfrak{z} i v.

Puluerisata humecta V alcoholisato, hinc affunde Ol. \mathfrak{A} r. p. c. ad emin. digit. 2. 3. extraheque tincturam ac decanta. Relictæ materiæ affunde V & vltius extrahe, decantaque. Tandemque restant feces, destillationi submitte, destillatumque prioribus adde.

N. Elixyr hoc si aliquandiu digestionis commiseris, gratus fit sapore, atque efficacius operatione.

Vires. Partium est tenuium, calfacit & exiccat, à putredine conseruat, sudorem ciuit, proficiuus eius usus est in morbis malignis, hypochondriacis, uterinis, stomachi cruditate, atque inde appetitu imminuto. Extrinsecus mundifica valde vulnera sordida.

Dosis à gutt. viij. ad xij. & plures, Croll.

11. Elixir Syncopticum S. Cl.

R. Aq. florum trium cordial.

Calend.

Lilii conuall.

Roris Solis an. \mathfrak{z} i v.

Succi limon. depurat lb . i

Aq. ros. quart. tres

Meliss. lb . s.

Florum tunic. \mathfrak{z} iij.

M. in matraccio magno & inde in nodulis Antidoti Oruietanæ (cap. 5 i. descript.)

descript.) ʒʒ.

Confect. de hyacinth.

Alkerim.

Diamb. an ʒii.

Croci Oriental. ʒvi.

Camph. ʒʒ.

Cort. citr. cond. raspat.

ʒʒ

Sacch. cand. in aceto

ros. solut. ʒiv.

Omnia in matracio sigillantur luto tenaci, stent in ventre equino per 15. ʒ, deinde in MB. destillantur admiscendo sub finem ʒiv. pulu. diamb.

Hoc remedium mira præstat aduersus febres syncopales, Apoplexiam morbosque subitaneos. Dos. cochl. ij. paulò ante pastum, sed præmissis generalioribus ad plethoram vacuandam.

12. Elixyr uterinum.

ʒ. Castor. ʒʒ.

Croc. vnc. ij.

Extrahe tincturas sc. cuiusque seorsim cum V, abstrahe, ad remanentiam extractorum, quibus mixtis adde:

Extr. artemis. ʒiv.

Sal. matr. perlar. ʒj.

Ol. stillat. angelic.

anis.

succin. à ʒij.

Digerantur mixta omnia per 8.

Dosis huius Elixyris ʒj. vel ʒij. ingruente paraxysmo qualicunque hystorico, tunc ilico sanantur, provocato sudore. Quod si singulis mensibus appetentibus menstruis equali dosi utantur, non reuertetur morbus. Croll.

13. Elixyr vita mainus Quercetan.

ʒ. Rad. Zedoar.

Angelic.

Gentian.

Valerian.

Tormentill.

Scorzoner.

Galang.

Lign. Aloës.

Santal. citr. a ʒij.

Fol. Meliss.

Ment. rubr.

Maiozan.

Basilic.

Hyslop.

Thym.

Fol. Chamæpit.

Chamædr. a. Mʒ.

Græn. Laur.

Iuniper.

Cort. Limon.

Arantior. sicc.

Sem Pæon.

Sesel.

Aneth.

Fœnic.

Anis.

Citri.

Card. bened. à ʒij.

Caryophyllor.

Cinamom.

Macis.

Zingib.

Cubeb.

Cardamom.

Piper long.

rot.

Spic. nard. a ʒij.

Benzoini.

Myrrh.

Oliban.

Succin.

Mastich. à ʒvi.

Fl. Rorismar.

Salu.

Pæon.

Stœchad.

Calendul.

Lauendul.

X 3

Hyperic.

Hyperic.
 Centaur. min.
 Beronic.
 Lil. conuall.
 Tilix ana p.ij.
 Cichor.
 Rosar. rubr.
 Buglosf. à p.i.
 Mellis optimi
 Sacchar. alb. ana ℥i.
 Aqua Vita optimè rectificata
 ℥x.

Digerantur s.a. ♂ (8, 10) vase Hermet. clauso. Hinc f. expressio quæ destilletur, (ponendo in rostrum mosch. ℥℥. ambr. grif. croc. ana ℥i.) igne, initio gradus 1. & extillabit ∇ clara, quam collige seorsim: dein auge Δ ad grad. 2. & prodibunt spiritus nebulosi. Tandem Δ adhibe fortiolem vt extillet oleum, & maneat infundomateria sicca, nec tamen perfecte arida, ne empyreuma extillatum sapiat. Ex hac residua materia extrahe tincturam f. a. cum ∇ illa priori clarissima & effunde. Demum miscetres illos liquores, ac destilla denudè per gradus vt prius, singulis seorsim susceptis. Ex materia in vtraque destillatione residua, postquam incinerata fuerit, elice ⊕ beneficio ∇ illius clarif. primo extillata, eamque ∇ in sale imbutam misce cum spiritu & oleo ac circula.

Vires. Huius Elixiris ineffabiles sunt virtutes ad curandas & præcavendas Vertigines, Epilipsias, Apoplexias, Paralyfes, Manias, Melancho-

lias, Asthmata, Syncopes, Lypothymias, stomachi, & aliarum partium debilitates cachexias, hystericas passiones, & alia id genus summa & deploranda symptomata.

Dosis, guttula aliquot in ∇ vel decocto conueniente.

N. Hic Quercetani processus non sine causa à Chrimiatro celeberrimo, Friderico Creiffen correctus est, quam correctionem, Quercetano Reduino inueni.

14. Elixyr vita minus eiusdem Quercet.

℞. Rad. Gentian.

Centaur. min. à ℥iij.

Galang.

Cinamom.

Macis

Garyophyllor. à ℥j.

Flor. Salu.

Rorifinar. à p.ij.

Vini albi generos. ℥. vr.

Macerentur in ☿ ♂ ♀ (8) dein exprimantur fortiter. Expressio destilletur per ☿ in cinere ad siccitatem. Residua materia extrahe tincturam cum ∇ illa destillata, s.a. Postmodum incinera materias relictas & elice sal cum ∇ card. benedict. vel simili (vel & fontana) sal inspissatum & purificatum adde tincturæ superiori & circula.

Vires. Specificum est remedium ad omnes cachexias, stomachi capitisque imbecillitates.

Dosis cochlear. 1.

CAP. LIII.

De Emplastris Ceratis & Dropacibus.

Cerata (cerota) nihil ferè ab Emplastris differunt, nisi quod paulo sint molliora & tractabiliora, adeoque; non rarò inter se confunduntur.

Fiunt ex rebus pinguibus, oleis videlicet, resinis, (quæ faciunt ut cuti tenacius adhæreant) axungiis, medullis, gummatis, iisque cera q. s. susceptis, additisque nonnunquam & pulueribus.

Modus fiendi.

R. Liquabilia, fundeque ad ignem, hinc immisce sensim pulueres, agitaque continuo donec refrigescant.

N. 1. *Proportio cera ad olea est $\frac{1}{4}$; ad resinas $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{12}$.*

N. 2. *Proportio puluerum ad olea est $\frac{1}{8}$.*

N. 3. *Gummata addenda si qua purganda prius fuerint ac soluenda in aceto, similine liquore aqueo, vel si alias humor aqueus (acetum, decoctum, succus, mucilago) addendus fuerit, cum oleis initio tantisper solutio illa vel liquor coquendus erit, donec plane exhalarit.*

Emplastra modo fiunt eodem.

1. Funditur cera cum oleo, hinc admiscuntur resinae, adipēs, gummata, ut similiter liquecant, tandem subducto igne admiscuntur pulueres, continuoque agitantur, donec refrigescant.

N. 1. *Antequam planè refrigerint malaxari solent aqua frigida, inque cylindros s. magdaleones redigi.*

N. 2. *Si lithargyrium addendum sit,*

primum id in oleo erit coquendum.

N. 3. *Proportio exacte definiri nequit, recipiuntur tamen ferè ad aridorum $\frac{3}{4}$ olei, pinguedinis vel mellis $\frac{3}{4}$. ceræ lb. i. resinarum $\frac{3}{4}$ viij.*

N. 4. *Loco ceræ alia nonnunquam recipiuntur, e. gr. ladanum & simil.*

Cerosa usitatoria sunt

Cerotum ex Betonica

Capitale

Cerine Cresiphontis

Diachalciteos

Diapalma

de Galbano, s. maticale

Infrigidans Galeni

Oesypi

Diapiper.

expelle arietina

pro Herniosis

Isis

Sacrum s. Diadictamnum, s.

Emplastrum diadictam.

Santalinum

Sparadrappum Vigonis

Stomachale.

Emplastra usitatoria sunt:

Emplastrum

Album coctum, Aug.

Apostolicum. A.

Arthriticum, N. 1.

Asclepiadis, VVeck.

Barbarum maius, VVeck.

minus. Dissaldens

in Cordum.

Basilicum maius, Aug. VVeck.

minus, A.

è lapide

è lapide calaminari, *Zeltenpflaster A.*

Cephalicum, 2.

Ceroneum, *A.*

de Cerusa, *Renod.*

Diachylon. simpl. f. hlb. *A.*

composit. f. empl. de

mucaginibus, *A.*

magnum, *A.*

paruum, *A.*

cum gummis, *A.*

Citrinum, *A.*

de crusta panis, *A.*

Diaphoreticum, 3.

Diuinum, *Renod. VVeck.*

Febrifugum, 4.

ad Fonticulos, *F. F. 5.*

ad fracturas ossium, *Ren.*

de tribus farinis, *VVeck.*

Gryseu è lapide calaminari, *A.*

Gummatum *Paracels. 6.*

ad Herniam, 7.

ad Hydropem, *A.*

de Ianua, *Ren.*

Isis flauum. *Dissaldeen in*

Cordum.

de baccis Lauri, *A.*

Mastichinum, *Renod*

Magneticum, 8.

de Meliloto, *A.*

de Minio, *A.*

Mundificatiuum, 9.

Neruinum, *A.*

Nigrum sticticum, *A.*

Oppodeldoch, 10. 11.

Oxycroceum commun. *A.*

Vigonis, A.

Diaphænicum calidum, *A.*

frigidum, *A.*

è ranis, *Vigonis, Renod.*

de Rhabbaro, *A.*

Saturninum. 12.

ad Scyrthos. 13.

Sparadrap. *Renod.*

de stercore canis, *Vigonis, VVeck.*

Spleneticum, 14. 15.

Sticticum, 16.

Stomachicum. *VVeck. aliter habet Renod.*

Diasulphur, 17.

Tetrapharmacum, *A.*

ad tophos, *A.*

de Tacamahac, 18.

ad Tophes, 19.

Viride, *Cord. VVeck.*

Vesicatorium, 20.

Filij Zachariae, *A.*

Dropaces, 21.

1. *Emplastrum Arthriticum F. F.*

2. *Emplastr. Diachyl. magn. 3v1.*

Oxycroc.

Diapalm. à 3ij.

Medull. ceruin.

Axung. Vrsin. à 3ß.

Tacamahac. in vino dissolut. 3ij.

M. F. f. a. Emplastrum, quo oleo vulpino malaxetur.

Vires. Doloribus arthriticis, maxime proficuum est, discutit, resoluit.

2. *Emplastrum Cephalicum,*

F. F.

3. *Resin. pin. 3ij.*

Ladan

Myrrh.

Mastich. 3v1.

Gum. Tacamahac.

Galban.

Opopan. à 3ß.

Visc. Tiliae. 3v. 3ij.

Sem. Pæon. mar. 3ij. 3ij.

Cubeb. 3iv.

Ol. Succin.

Nucist. à 3ß.

Gummatis in + dissolutis f. f. a.

Emplastrum, addendo Terebinthinae 3iijß. M.

Vires.

Vires. Capitis catarrhos exiccat, idemque corroborat, proin confert in Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, & similib.

3. Emplastrum Diaphoreticum.

℞. Cerae citrin. \bar{z} xvj.

Bdell. puluer. \bar{z} v.

Colophon.

Pic. naual. ana \bar{z} iv.

Succin. citrin. \bar{z} iij.

G. Ammoniac. \bar{z} ij.

F. Emplastrum l.a. malaxan. locum Ol. ouorum.

Vires. Discutit, serosam humiditatem elicit & absorbit.

Vsusest præcipui in Ischiatica, intumescencia pedum, & simil.

4. Emplastrum Febrifugum Strobelbergeri.

℞. Terebinth. cypr. opt. \bar{z} iß. liquecant in vase cupreo super Δ moderato; huic iniice.

Araneæ. Viuar. in hypocaustis vel locis mundis captar. N. xv.

Misceantur & agitentur cum pistillo ligneo, vsque dum color Terebinthinæ fiat cineris, & vix aliquid de araneis deprehendatur: Tum iterum tepefactæ mixturæ adde:

Telar. aranearum mundatum quantum prædictæ araneæ texere, vel harum loco adhuc 19. araneas mediocres: iterum fortiter agitentur: Interea etiam immiscendo

Asphalt. opt. pulueris. &

*. albiss. ana \bar{z} iß.

Terantur vsque dum refrigerat materia, & acquirat consistentiam Emplastri nigerrimi. Reponantur per 14. \bar{o} . tandem rursus ad Δ mollescat & manib. oleo febrifugo inunctis malaxetur modicè.

Vsus. Formentur inde Emplastra instar 4. Thaleri, quæ auro vel argento obducta, corioque testæ, imponantur pulsib. vtriusque carpi hora vna ante paroxysmum, relinquendo per 9. \bar{o} . Tunc eadem hora in profluentem aquam proiciantur.

N. Oleum febrifugum videc. 72.

Emplastrum hoc est de quo Strobelbergerus introductionem typis expressam omisâ descriptione Anno 1626. divulgauit, descriptionem itaque transmisit mihi Clariss. D. D. Ioh. Christoff Cisenmenger Physicus Ord. Imperialis Heilbrunnensis, amicus meus integerrimus, cuius verba ne de genuina descriptione dubites, hic subiungo. Et sunt: Hanc descriptionem mihi communicauit illustriss. Comitis Caroli à VVolckenstein (qui non solum à quartana huius beneficio liberatus, sed & 100. Thaleris à D. Strobelbergero emit:) Frater Adamus Comes à VVolckenst. p. r. Ord. Teuton. Commendator in Heilbrunn.

5. Emplastrum ad Fontinellas. F.F.

℞. Cerus.

Lithargyr. à \bar{z} vi.

Ol. Rolar. \bar{t} . j.

Aqu. Rosar. \bar{z} viij.

Coque l. Δ . in fine adde ceræ alb. \bar{z} iij.

F. l. a. Emplastrum.

Vires. Arcet inflammationem.

6. Emplastrum Gummatum, Paracelsi.

℞. Gumm. Serapin.

Bdell.

Opopanax.

Galban. à \bar{z} j.

Solve in + cola, colaturæ adde

Mastich.

Thur. masc. à \bar{z} iij.

Y

Cereæ alb.

Ceræ alb. ad pondus omnium.

F. Emplastrum.

Vires. *Mundificat vulnera & consolidat, discutit tumores.*

7. Emplastrum ad quamvis herniam exceptâ hydrocele.

℞ exuius anguillarum non salitas & in aq. calcis lotas, coque in lixiuio donec crassescant, & F. instar glutinis, quod effunde super marmor.

℥ huius glutinis traiectioni ℥ i v. adde

Lapid. hæmatit.

Sacchari hni.

℥ vsti an. ℥ iij.

Gumm. ammon. in + acerr. solut. & cum ol. Myrrh. confusi ℥ iij.

M. omnia in fictili super **E** lentos, ut coeant in massam Empl. tenuis, extendatur super alutam. Hoc gluten adeo tenax est ad hernias glutinandas, imò ad solutum peritonæum, ut omne aliud impar sit, superponendo leuissimum subligaculum & diartam congruam obseruando.

8. Emplastrum magneticum.

℞. Gumm. Serapin.

Ammoniac.

Galban. à ℥ iij.

Solve in + cola & inspissa:

Hinc

℞. Terebinth. laric.

Ceræ ana ℥ β.

Liquefac ad ignem, atque subducto igne admisce exactè gummi, & tandem

Ol. Succini. ℥ ij.

atque tandem

Lapid. seu magnetis arsenicalis drach. iij.

Terræ **Θ** i ℥ j.

F. Emplastrum ac malaxa cum Ol. Scorpionum.

Vires: *ulceribus aut carbunculis pestilentialibus applicatum subito rumpit, venenum ex imò instar magnetis potenter attrahit, nec apertum ulcus coire patitur, ane perfectam extractionem omnis venenositatis. Hartman, in Pract.*

N. Lapidem smarag. et. Arsenic. Vide in Lapidibus.

9. Emplastrum mundificatum.

℞. Ceræ lb. i.

Resina alb. ℥ i v.

Terebinth. laric. ℥ j.

Ol. bufonum.

Scorpion. ana ℥ ij.

Styrac. liquid. ℥ v i.

Suc. chelidon. expr. ℥ i v.

Aristoloch. rot. ℥ β.

Gumm. ammoniac. in +

solut. & inspissat. ℥ i f.

Myrrh.

Sarcocoll. à ℥ j.

F. l. a. Emplastrum.

Vires. *Mundificat vulnera venenata ac fistulosa. Hartm. in pract.*

10. Emplastrum Oppodeldoch, secundum

Fel. Würtz.

℞. Ceræ Virgin. lb. ij.

Terebinth. lb. i.

Ol. commun. ℥ i v.

His liquefactis adde

Succi Chelidon.

Fol. querc.

Alchimill.

Veronic. à ℥ i f.

Coque ad consumptionem humiditatis, dein admisce.

Gumm. cum **+** depurat. & inspissat.

Ammoniac.

Galban.

Opopan. à ℥ v i.

Colophon. ℥ i f.

Succin. ℥ β.

Mastich.

Mastich.

Myrrh.

Oliban.

Sarcocoll. à ζ iii.

Omnibus benè mixtis & paululum refrigeratis adde agitando

L. Hæmatit. præparat. ζ iiß.

Croc. ♂ ζ ij.

♀. ζ j.

Tut. præparat. ζ ijj.

Lapid. calaminar. ζ x.

Tandem in fine admisce

Terræ Oli edulcoratæ q. f.

ad colorem brunnium, i. e. purpureum conciliandum,

F. Emplastrum.

Easdem vires ac applicationem cum stricto Crollit obtinet.

N. Terebinthinam addere præstat ante pulueres.

11. *Emplastrum Oppodeldoch Paracelsi.*

R. Gumm. Galban.

Oppopan. à ζ ijj.

Ammoniac.

Bdell. à ζ j.

Macerentur per ♂ (8. vel plures) in X cola & inspissa ad consistent. mellis: Cein

R. Lithargyr. pulu. lb. f. (alij lb. iß.

Ol. commun. lb. f.

Coque lento Δ continuo agitando, donec brunnium siue spadiceum colorem acquirit: hinc adde

Ceræ lb. i.

Qua liquefacta, immisce etiam superiora gummata, & paulo post.

Ol. Laurin. ζ ijj.

Moue diligentissimè, donec nimirum omnia exactissimè fuerint mixta, remoue ab igne ac adde

Croc. ♂

Mum. transmar.

Magnet. præparat.

Magist. corall. alb.

rubror. à ζ ß.

Lapid. calamin. præp.

Myrrh. rubr.

Thur. masc.

Mastich.

Rad. aristoloch. rot. à ζ j.

Hos pulueres infunde pedetentim in liquefactum Emplastrum, omnia exactè miscendo:

Postremo

R. Balsam. succin. ζ j. (ol. crassioris.

Ol. laurin. ζ j.

Terebinth. ζ ß.

M. & liquefac seorsim, solue in eodem.

Camphoræ ζ j.

& tandem Croc. or. ζ ß.

Solutionem hanc seorsim factam, cum Emplastro calido misce exactissimè, vt fiat Emplastrum, quod malaxa oleo hypericonis.

Vires. *Curat omnia vulnera, punctim & cæsim inflicta sine omni pure. Excrescentiam carnis impedit, eius tantum, quantum opus est producendo. Vlcera antiqua prius mundificata similiter curat.*

N. *Si fortius desideras & ad sananda quævis æsthiomena & corrodentia ulcera proficuum*

R. Croci metallor.

Colchotar.

♀ ii per se præcipit. ana q. v.

M. puluerisando, atque pulueris huius ζ ß. misce ad liquefacti Emplastri ζ ß. superaddendo aliquid Terebinthinæ. *Harimann. in Croll. & in Præctica.*

12. *Emplastrum Saturninum experimentum à S. Cloß.*

Y 2

℥ albi

℞ albi plumbi ʒi v.

Cretæ albi. ʒi β.

Myrrh. rubr. ʒij.

Amalgamatis ex part. ij. ♀ & parte vnâ lūi, ʒvi.

Axung. verris q. f. ad formandum Emplastrum in mortario calido.

Vires: *Vlceracallosa & maligna, imò pessima vnâ sola admotione curat, abluendo ea primo (si sordida sint) aquâ dissolutionis lapidis Salutis Crollii. mox Empl. in alutâ sat. spissè extensum admoveatur Vlceri, & si opus sit Emplastro Diachalciteos contineatur, superinducta fascialanea (Gallicè felin) satis stricta, neque remoueaturs ante 15. d.*

13. Emplastrum ad Scyrrhos
S. Clossai.

℞ Gumm. carann.

Tacamahac. an. ʒj

Ammon.

Galban. an. ʒij.

Liquentur in aceto & per linteum colentur, deinde admisce

Ol. liliorum alb. ʒ β.

Axung. taxi ʒij. M. & adde

⚥ mineral. vel aquilæ alb. dulcificat. ʒj

Redige ad formam Emplastri & adiunge

Lytharg. subtiliter pulueris. ʒj.

Rad. elleb. nigr.

Bryon. an. ʒij. M.

Hoc Empl. omnes tumores contumacissimos & crudos vel suppurat in partibus suppurabilibus, vel ex toto resoluit, si flatus prædominantur.

14. Emplastrum Spleneticum de
Cicutâ, F. F.

℞. Cicut. cum toto incisâ & pulueris. ʒix.

Succ. express. eiusdem ʒiv.

Ol. cappar. ʒxviii.

Iriui ʒvi.

Misce, digereque in ℞ per ♂ 4. dein coque. Hinc colentur cum forti expressione.

In hac dissolue:

Ceræ nouæ ʒ. i v β.

Gumm. amoniac. in succ.

cicut. sol. ʒi β.

M. F. Emplastrum.

Vires. *Lienem obstructum aperit, reborat, dūritiem emollit, &c. sed & ruborem inducit.*

15. Aliud Empl. Spleneticum Foresti.
Ceratum de Ammoniaco dictum.

℞. Ammoniac. in + dissol. ʒj.

Empl. de melior. an. ʒi β.

Furfur. frument. cribrat. ʒj.

Pulu. rad. Bryon.

Ileos ana ʒi β.

Pingued. anat.

Anser.

Gallin. à ʒiij.

Bdellij

Galban. à ʒi β.

Ol. irin. ʒi.

Bulliant leniter in mucilag. inibus sem. lini & fœnugr. a q. f. & vt in formam debitam cerati coquant, adde Ceræ ʒi β.

Terebinth. &

Resin. pini ana ʒi β.

F. Emplastr.

Vires. *Plurimum emollit & resoluit dūritiem scyrrhosam, coque nomine arcum Foresto fuit. Obs. l. 20. 12.*

16. Emplastrum Sticticum
Crollii.

℞. Minij

Lap. calam. ana ʒi β.

Lithargyr. auri & arg. ana. ʒiij.

Ol. Lini.

Oliuar. ana ʒi β.

Laurin. ʒi β.

Ceræ

Colophoniz

Colophonix ana ℥j.

Vernicis.

Terebinth. ana ℥ss.

Gumm. Opopanac.

Galban.

Serapin.

Ammoniac.

Bdellij ana ℥iij.

Carabe citrin.

Oliban.

Myrrh. Alexandr.

Aloës epat.

Aristoloch. long.

rotund. ana ℥j.

Mum. transmarin.

Magnetis.

Hæmatit. ana, ℥iβ.

Corall. albor. rubeor.

Marr. perlar.

Sanguin. Draconis.

Terræ medicat. Strigenf.

Vitrol. alb. ana ℥j.

Fl. Antimon.

Croc. ♂ ana ℥iij.

Camphor. ℥j.

1. Gummata 5. soluantur & depurentur soluendo in aceto, exprimendo & rursus inspissando.

N. *Dosis potest augeri propter feces adiiciendas.*

2. Oleo lini & oliuarum admisceatur Lithargyrium vtrumque, coquendo & agitando, donec oleum coloretur, postea addatur lapis calaminaris, & paulo post, minium. Coquantur ad sufficientiam (horas duas) cuius proba est, si supra vnguem gutta concre scat & condensetur.

3. Tandem addatur circa finem Vernix. Oleum Lauri, cera, colophonix; omnibus benè mixtis & liquefactis affunde succesiue gummata liquefacta, diligenter agitatione misce, idque calore

lentissimo (caue ne bulliat) postea admisce pulueres; ultimo Camphora resoluta in oleo Iuniperino addatur.

N. *Si forte nimis durum esset, addatur adhuc aliquid cere & colophonix. (prestat terebinthina) Proba iusta decoctionis hæc est; guttula aliquot frigescant, (in aquam sc. frigidam stillatæ, vel supratabulam metallicam,) hæc refrigerata si digitis adhaerint nimis molles, signum est imperfectæ decoctionis, coquatur igitur ulterius ut dure scat. Tum affunde in frigidam, ac malaxa bene (hor. 3. vel 4.) manibus inunctis oleo ex chamomelin. rosar. iuniper. lumbricor. hypericon. ana q. v. mixto.*

Vires. Prodest contra inueterata ulcera & vulnera recentia, consolidando, mundificando, putredinem arcendo. *Mature scire facit apostemata cuncta.*

17. *Emplastrum Diasulphur. Rulandi.*

℞. Balsam. $\frac{1}{4}$ r. Ruland. ℥iij

Ceræ. ℥β.

Colophon. ℥iij.

Myrrhæ ad pondus omnium.

Omnibus præter myrrham liquefactis & bene commixtis inspergatur myrrha subtilissimè trita, lentoque Δ coquantur, ($\frac{1}{4}$. horæ) semper agitando. Hinc ab igne remoue, agitaque donec refrigerescant.

Vires. *Curat omnis generis ulcera, Sennert. in Institut.*

18. *Emplastrum Stomachicum de Tacamahaca.*

℞. Tacamahac. ℥iij.

Storac. ℥i.

Ambara momentum.

F. Emplastr. cum oleo aliquo appropriato v. g. mastich, &c.

Vires. *Emplastrum est stomacho longè utilissimum, siquidem roborat, appeti-*

tum ciet, concoctionem inuat, & flatus discutit. *Monard.*

19. *Emplastrum ad Taphos & gummata*

♀ *ea. S. Cloff.*

℥ empl. Opodeldoch Penoti aut Croll. rec. ♀ vulgar. aut ♂ an. part. æqual. Malaxentur simul cum pauxillo gumm. guaiac. & exalutâ nodis admoveantur.

20. *Emplastrum Vesicatorium, Clariss.*

D. D. Petri de Spina, pro

usu F. F.

℞. Cantharid. sine alis & cap. ʒiʒ.

Myrrh.

Mastich.

Camphor.

Afæ fœtid. à ʒʒ.

Butyr. recent.

Terebinth. lor. à ʒij.

Ol. rosat. ʒiʒ.

Ceræ. ʒj.

F. a. Emplastrum.

Vires. *Supra corium crassiusculè extensum hor. 8. vel 10. Vesicam excita.*

N. Vide idem apud Gregor. Horstium l. 4. obseru. part. 1. ubi omittere suadet Afam fœtidam.

21. *De Dropace.*

Ad Emplastra pertinent & Dropaces; qui sunt Emplastra, à pice, vt no-

men, ita & substantiam sortita, licet interdum quoque malagmatis instar fiant.

Modus fiendi.

Liqua picem, addito tantillo olei, & simil. hinc immisce immaniscenda materialia.

N. Materialia sunt piper, pirethrum, rosmarinus, euphorbium, castoreum, bitumen, Arsal petra sal commune, cinis sarmentorum.

℞. Picis aridæ ʒi. Olei ʒii. F. Dropax simplex.

℞. Picis ʒii. ol. citon. vel mastich. ʒ. M. Confert in vomitione ventriculo impositus.

℞. Picis sicca, ceræ nou. ana ʒiʒ. axung. suilla ʒv i. ♀ viv. ʒj. Liquentur in crassitiem Emplastri.

℞. Picis ceræ, colophon. ana ʒiii. ♂ ʒiʒ. bitum. ʒi. ♀ viv. ʒiii. piper. euphorb. ana ʒii. cantharid. ʒʒ. castor. ʒi. F. Dropax.

Vires. *Inferuiunt Dropaces precipuè membriscalfaciendis, sanguini alliciendo, & consequenter atrophia emendanda.*

Adhibetur calfactus, (derasis antea capillis) auelliturque antequam omnino refrigescat, iterumque calfit & applicatur, idque toties, donec pars rubescat.

C A P. L I V.

De Emulsionibus.

EMulsio, ab emulgendo sic dicta, est medicamentum liquidum lac colore æmulans, ex medulla fructuum, seminumue lactescentium interueniente liquore appropriato, prolectum.

Exhibent, lacteum humorem, amy-

gdalæ, sem. 4. frig. maior. sem. pauer. (alb.) portulac. lactuc. card. marix, card. benedicti, cannabis, violar. bombacis, Napi, Aquileg. Citri, &c. nuclei pæon. pinæ, pistacia, persicarum nuclei.

Lactea

Lactea substantia elicienda satisfacere poterit liquor aqueus quicunque. veruntamen quia intrinsecus emulsion-
es ferè sumuntur, gratos adhibere li-
quores fas erit. Tales sunt aqua stil-
latitia, aqua fontana, cum panis frustu-
lo decocta, decoctum hordei, glycyrrhizæ, cicerum, C. C. passularum, iuu-
barum & simil.

Quantitas liquoris varia est, modo maior, modo minor, prout crassior, vel dilutior emulsio expetitur. Communiter autem sumitur, triplum, quadruplum ad decuplum, & ultra.

Modus fiendi.

R. Lactescencia, quæ adhibere ani-
mus est, (excorticata si excorticari
possint, ut amygd. sem. frig. mai.) pista in
mortario (præstat lapideo) subinde non-
nihil liquoris (ne attritu pinguescant)
instillando, hinc affunde liquoris
medietatem circiter, exprime per lin-
teum. Residuum, (quia substantia lacte-
scens vix tota vice vna emulgetur,) contunde denuò, ac emulge cum reliquo
liquore.

Usus. Per se propinari poterit, vel &
aliis exhibendis inseruire, ut sunt potissi-
mum pulveres cordiales minerales, vel
his similia magisteria, &c.

N. 1. Quod si ingrata foret, dulcorari
poterit saccharo, vel rotulis; exempli
gratia, manus Christi, iulepo violar. rosar.
vel simil.

N. 2. Caue, acida commisceas, quippe
his substantia lactescens ad subsidendum
prompta est.

Quia emulsionem ex medicami-
nibus sunt, quæ faciliè corrumpuntur,

ex tempore ad præscriptum pareri so-
lent.

Sic fit

*Lac, id est, Emulsio amygdala-
rum dulcium.*

R. Amygd. dulc. excorticar. lb̄ss. de-
coct. hordei mensur. i. F. emulsio.

Emulsio nephrocathartica.

R. Sem. violar. purpur. ʒiij. vel ʒvi.
cum ∇ veronic. F. emulsio.

Emulsio ad acrimoniam.

R. Amygd. infus. in ∇ rosar. ʒij. Sem.
melon. papau. alb. à ʒj. hordei mundi diu-
tissime cocti ʒiij. F. emulsio in ∇ hord.
lb̄ss. adde Iulep. ros. ʒii.

Emulsio expulsiua.

R. Sem. Aquileg.

Napian. ʒii.

Aq. Fumar.

Galeg.

Aquileg. a ʒiij.

F. Emulsio.

Vires. Valet ad morbillos & exan-
themata expellenda.

N. Addi possunt pro libitu Iuleb vio-
lat. ʒiij. ut & pulveres appropriati, V. g.
C. C. ocul. cancri, &c.

Emulsio refrigerans.

R. Decoct. C. C. vsti, vel si alius ad-
stricta sit. C. C. raspat. lb̄ i.

Sem. 4. frig. mai. an. ʒiii.

Papau. alb. ʒi.

F. Emulsio.

Vires: Commoda est in febribus, pra-
cipue epidemiis.

N. In pleuriticis affectibus soleo ad-
miscere Aquam papau. errat. semenque
Cannabis seminibus illis frigidis inter-
miscere, &c.

C A P. L V.

De Errhinis.

ERrhina variis parantur formulis; videl. liquoris extracti, linimenti, pulueris, &c.

Liquores tùm simplices adhiberi possunt, v.g. succus betæ, maioranæ, rutæ, &c. Tùm compositi.

Errhini liquidi formula sit

1. *Errh. Cratonis.*

℞. Sem. nigell. 4. diebus in acet. ros. infus. atque pulu. ʒij.

Aqu. maioran. cum succ. herbar. expr. ʒiij. M.

Purgat caput. Crato.

2. *Errh. Montani.*

℞. Succ. bet. recent. iij.

Aqua. maioran. ʒij.

Ol. amygd. ʒi.

Misc. cum brodio pulli.

Vires. *Commendatur admodum ad eliciendos catarrhos per nares. Vfusque eximij dicitur in tinnitu aurium.*

Errhinon in formâ pulueris

S. Clossæi.

℥ Florum ptarmicæ ʒij.

Bethon. ʒi.

Nicotian.

Rad. angelic. an. ʒiij.ß.

Transmittantur per setaceum addendo.

Scobis ligni S. ʒij.

Cubebar. ʒi.

F. Puluis.

Vires & Dosis: *Huius ʒi. attrahatur per nares ex tubulo incurvato. Euacuat per nares & os magnam mucii liquidi salinaeque copiam.*

Extractum Nasale,

P. de Spina.

℞. Succ. recent. anagall. ʒiij.

betæ.

nicotian. scem. à ʒij.

betonic. ʒi.ß.

Turpeth. gumm. ʒv.

Agaric. albiss. ʒij.

Infundantur in s. q. aqu. scabiosæ; digeranturque in vase clauso ʒ (8) Hinc decantetur, abstrahaturque ad consistentiam extracti mollioris.

Vires. *Potentissimè educit pituitam; & humores salsos à capite per nares; catarrhosque ad fauces & pulmones destilantes ad nares diuertit, parum naribus inditum.*

Linimenta, vide infra de unguentis.

CAP. LVI.

De Epithematis.

Epithema etsi etymologicè omne id sonat, quod parti alicui imponitur, siue liquidum id sit, siue durum: at tamen in praxi denotat recentioribus (veteribus enim malagmata, vnguenta-que notabat, mediæ corporis regioni accommodata) medicamentum liquidum, quod spongiâ, panno, linteo, stupa susceptum parti alicui imponitur.

Fiunt Epithemata ex ▽ stillatitiis, succis, decoctis, emulsionibus, aliisque liquoribus conuenientibus, siue solis, siue cum pulueribus, speciebus, electuariis, & similib. commixtis.

N. Penetrationis ergo additur nonnunquam aliquid vini odoriferi, aceti, spirituum seu aquarum spirituosarum.

Proportio { Liquor. ℥ss.
Puluer. ʒj. ad ʒss. & ultra)
Vini vel spiritus ʒj.
plus minus.

Adhibentur ferè repidè, præcipuè capiti & cordi; artub. v. etiam frigide applicari possunt.

Epithemata in officinis parata nulla extant, sed ex tempore miscentur, cuius rei gratia species certæ in promptu haberi solent.

Vt

Species pro Epithemate Cordis. quibus & alias substituere licet Epatis.

Exempla erunt.

I. Epithema Cordiale.

℞. Aqu. Rosar. i v.

Nympheæ

Violar. à ʒij. i

Bugloss.

Meliss. à ʒss.

Vini alb. odorif. ʒj.

Pulu. sem. acetos.

Corall. rubr. præparat.

Santal. citrini.

albi à ʒss.

Cort. citri. ʒj.

Croc. ʒss.

M. fiat Epithema.

Vires. Cordi refrigerium adfert, syncope correptos excitat, panno scarlatosusceptum, cordisque regioni repidè impositum.

II. Epithema Epaticum.

℞. Aqu. portulac.

Rosar.

Plantag.

Acetos.

Intyb. à ʒiv.

Sem. portulac.

acetos.

Endiu. à ʒj.

Troch. de camphor.

Santal. citr. à ʒij.

Aceti parum.

M. F. Epithema.

Vires. Epatis & sanguinis assum demulcet, & hinc sistit hæmorrhagiam narium Epati repidè impositum.

III. Epithema in febribus malignis.

Z

℞. Aqu.

℞. Aqu. Rosar.

Sambuc.

Lactuc.à ʒi.ʒ.

Acet. rosac.

rutacana ʒi.ʒ.

Spec. Diatr. Santal. ʒi.

præparat. ʒi.

Theriac. Andr. ʒi.ʒ.

Crocī ʒʒ.

M. F. Epithema, cui & tantillum camphoræ admisceri poterit.

Vires. *Carpis & fronti applicatum æstum febrilem mirum in modum, in febribus malignis præcipuè mitigat, Cephalalgiam lenit, somnum conciliat.*

CAP. LVII.

De Extractis, ac 1. de Menstruis.

EXtractum campus latissimus est, fieri nimirum possunt ex *mineralibus, vegetabilibus ac animalibus.*

Liquor, cuius beneficio extracta fiunt, [menstruum vulgò dici solet] varius occurrit. Spiritus vini, spiritus iuniperi, spiritus mellis, spiritus Terebinthinæ, Vinum, Hydromel, serum lactis, ros maialis, uti & huius spiritus acetum destillatum, ∇ stillatitia, (siue ex aqua fontana pluuialiue, siue ex vegetabili vno, aut pluribus, & simil. elicit illa sit, Nec enim quivis humor, cuius extractioni convenit, sed certus certæ; sulphureus sulphuræ, salinus salinæ, &c.

Inter alia autem menstrua famosissima sunt. 1. ∇ i. 2. ∇ vitæ ☿ sata Quercetani. 3. ∇ temperata Basilii. 4. Acetum Philosophicum Quercetani. 5. Menstruum vniuersale, aqua calica Lullii dicta, de quibus paucis disserere placet.

1. Spiritus Vini.

Spiritus Vini menstruum adeo famosum est, ut quoque catholicum nonnullis dicatur. Adhiberi solet, ubi simpliciter menstrui mentio facta fuerit. Verum

enim vero, nun in extractione purgantium commodè adhibeatur. non immeritò dubitatur: an tam dubitandi præbet natura illius sulphurea, quæ parti salinæ extrahendæ, quali purgatrix facultas inhaeret, minus commoda est: Rationi huic ad stipulatur experientia, qua constat, vim purgaticem, quam ∇ intactam reliquit, postmodum alij paruisse menstruo. Ea propter cum farrago sit copiosa menstruorum suppetat, quæ non modò minus sunt laboriosa ac minus preciosa, sed & purgantibus qualitibus extrahendis commodiora, satius erit loco ∇ laboriosi ac preciosi aliud quoddam menstruum eligere, e. gr. aquam destillatam convenientem.

Adhibetur ∇ tùm simplex, tùm acuatus, vide lib. 4.

N. *Sunt qui ∇ crebris distillationibus per serpentinæ, id est, serpentes canales destillatum & in substantiam pinguem redactum, circulum maius Paracelsi esse volunt, sed malè.*

2. ∇ vitæ ☿ sata Quercetani.

Quercetanus inter Medicos Hermeticos haud postremus, peculiaria prædicat menstrua,

menstrua, quæ tamen sibi met referuauit. Inter hæc sunt ∇ vitæ tartarificata ac acetum philosophicum. De ∇ vitæ Ξ facta in *Pharmacop. restit. capite. 26. Hætelæus*, inquit, *ha d'ardie animaduertisti in variis eiusmodi purgantibus Extrahis, varia quoque menstrua & dissoluentia, apta tamen & congrua à nobis usurpari & quarum magni & egregij effectus abunde satis patebunt. Sed verus & peritus Chymicus qui ingeniosa quadam arte & industria sciuerit preparare ∇ in vitæ tartarificatam, huiusque perfectam cognitionem adeptus fuerit, is poterit inde eruere dissoluens quoddam siue menstruum generale, quo extrahet Essentias omnium rerum purgantium, radicum, foliorum, herbarum, seminum, fructuum & eorum; is inquam verè gloriari poterit, de summo & elegantissimo naturæ mysterio, de quo non licet plura addere, ne iustam doctorem iram & reprehensionem incurram, &c.* Hæc Quercetanus de sua ∇ vitæ tartarificata, cuius præparationem nullibi expresse tradidit, nisi intellectam velis ∇ vitæ ex hydromelite Ξ facta prolectam, de qua in *Pharmacop. cap. de Hydromel.* hæc habet: *Ex commemorato maluatico Vino nostro artificiali (i.e. ex hydromelite.) extrahitur præstantissima ∇ vitæ, vino longè accommodatior ad eliciendas rerum essentias. Sit vt sit, parum cedere videtur, nisi prorsus eadem sit (vt multi opinantur,) ea, scil. quam dabimus l. 4. Cl. 2. de Vino.*

3. *Aquatemperata Basilij.*

Occurrit itidem de menstruo hoc Basiliano varietas non parua. In hoc tamen conveniunt omnes, quod ex ∇ originem trahat, quem alii acunt sale communi, alii sale fermentorum, alii spiritu salis, de quibus plenius lib. 4. de Vino.

4. *Acetum Philosophicum Quercetani.*

Aceti sui Philosophici crebrò meminit Quercetanus, æque primas inter aceta tribuit. Verum adeo ænigmaticas illius reliquit descriptiones, vt mentem genuinam vix assequi liceat. *Acetum Philosophicum*, inquit, (in *tetrad. de antidot. ζαηφ*) *ex acido liqore roris seu manna celestis, cum eadem met minera per digestionem, & fermentationem Philosophicas fit & preparatur, & paulo post, componimus & conficimus, inquit; (acetum Philosoph.) ex mixtione & conuenienti proportionem, fermentatione ac vnione aerea aciditatis animalis & mercurialis acoris aquei, cum vegetabiliter restri.* Hæ sunt descriptiones à Quercetano relictæ quarum obscuritas diuersas peperit interpretationes, adeoque diuersas acetii illius præparationes. Libavio fit ex rore martio & manna: aliis fit, ex mellis & salis liquefacti an lb. i. \times lb. ii. quæ digesta simul destillantur cum rectificatione aliquoties reiterata. Modum vtrumque etsi non penitus reiiciam, attamen neuter mentem Authoris satis explicasse videtur. Nimirum secundum hunc acetum philosophicum fieri colligitur, ex aceto hydromelitis vinosi, & sale Ξ i, vel proprio sale. Etenim mel quid aliud est, quam ros seu manna cœlestis, industria apum (vnde & animale audit) congestum? Hinc ipsemet Quercetanus reiectis aliis acetis, verbi gratia, è vino & simil. vtpote quæ ad solutionem & extractionem rerum metallicarum inidonea sint, præfert aceta hydromelitis vinosorum, scil. quæ cum manna cœlesti, naturam animalem percurrerunt. & præter vegetalem inducunt. *Vide Tetrad. pag. anbi 406.*

Idem Quercet. in *Pharmacop. restit.* vbi in descriptione theriacæ de melle agit, Mel produci & elaborari ait ab apibus, quæ solummodo pascuntur manna cœlesti, & ex floribus odoriferis suauissimis & delicatissimis succis alimentum ex-fugunt.

Per terrestre vegetabile Vini tartarum intelligi ex eo liquet, quod vinum omnium vegetabilium nobilissimum facit, adeoque καὶ ἑξοχὴν vegetabile vocari ait.

5. *Menstruum Vniuersale.*

De Menstruo vniuersali satius esse duco tacuisse, quam aliquid incerti tradidisse: Veruntamen non possum quin moneam, posthabitis rebus particulari-bus, ad subiectum vniuersale esse aspi-randum, idque quærendum, non quale pedibus calcatur, sed quatenus Vesta ea est nitidissima, id est, tartarea veste inuoluta.

Modus parandi Extracta.

℞. *Materiæ*, ex qua Extractum pa-rare libet, q. v. para ad infusionem grossè puluerisando, scilicet incidendo, ra-dendo, & simil. hinc affunde men-struum, (exempli gratia V) vt su-peremineat digit. (2. 3. 4.) reponè in teporem, (℞. cineris, fimi, &c.) ex-traheque s. a. Tadem depletiones omnes confunde & abstrahe l. ∇. (exempli gratia ℞.) ad consistentiam debitam.

N. 1. *Extracta cum menstruis non-dum abstractis, confusa, Tinctura dicun-tur.*

N. 2. *Crebriora fiunt huiusce Ex-tracta ex purgantibus, rariora ex alte-rantibus, quippe horum succi loco ac titu-lo Extractorum, Essentiarumue fere asser-uari solent.*

Sic parantur Extracta:

Ex MINERALIBVS, modo iam descripto, vti patet. lib. 3.

N. *Extracta mineralium pleraque Tinctura nomen retinent, de quibus infra.*

Ex VEGETABILIBVS, scil. 1. ex herbis, 2. floribus, 3. seminibus, 4. fructibus, 5. radicibus, 6. lignis & cortici-bus, 7. aromatibus, hinc 8. ex resinis, 9. ex gummatis.

I. *Herbarum* Extracta sunt rara, quippe [vti dictum], succi eorum loco pro-stant. Fieri tamen possunt.

1. Modo generaliter dato, ex herbis, scil. siccis.

2. Ex succis inspissatis (si subtiliora Extracta expetis,) cum ∇ sua propria dephlegmata (spiritu) quod Extr. dein filtrandum & ad consistentiam redi-gendum.

3. Quercetanus. ℞. Herbas viri-des, conquassat, elicitque ∇ leniter de-stillando V. Fecibus omnino siccis, (nihil tamen adustionis redolentibus,) & in puluerem grossum redactis, af-fundit ∇ illam destillatam, extrahit-que s. a.

II. *Florum* Extracta in specie sic di-cta, rara itidem sunt. Succie contra ex-pressi inspissatique (qui communiter Extractorum ac Essentiarum nomine veniunt) crebriores; de quibus in succis agitur.

Extracta prioris generis fiunt.

℞. Flores vel gemmas (e. gr. hyperi-conis) incide ac affunde V rectific. vt vndique madesiant, macera (∇ 8.) dein exprime. Expressionem purifica per di-gestionem ac subsidentiam (non cum albumine oui, quod in omnibus tinctu-ris, in quibus aliquid resinæ latitat, benè notandum.) Partem puriorem à fecibus decanta;

decanta; **V**m destillando abstrahe; remanentemque tincturam coagula ac serua. Sic paratum vsuale est Extractum, seu Essentia Croci, quæ nonnunquam Tinctura titulo venit.

N. *Fieri itidem possunt cum aquis propriis, vel alienis, convenientibus tamen, præcipue si acidula ea fuerint redidæ guttulis aliquot spiritus ʒis, vel Turlioli.*

III. *Seminum* Extracta eodem cum reliquis parantur modo, beneficio **V**.

IV. *Fructuum* Extracta (proprie sic dicta,) rariora itidem sunt, crebriores succi inspissati, quæ veneunt nomine saparum, rob. mellium & succorum. Fieri nihilominus quoq; possunt ex fructibus siccatiss per **V**, vel quod melius, cum sua propria Aqua vitæ, (spiritu) quæ postmodum abstrahitur relicto Extracto in consistentia mellis. *Quercetanus in Pharmac. præst.* Sic fiunt Extractum baccar. iuniperi baccar. lauri. Vide & Tincturas.

V. *Radicum* Extracta vsualia pleraque sunt succi. Sufficit enim si succolentæ eæ sunt, faciliorisque expressionis, (non mucilaginosæ) solummodo coquere, exprimere ac inspissare. Nihilominus tamen parari quoque possunt extracta subtiliora, nimirum

1. Ex radicibus minus succulentis, modo generaliter dato cum **V** parantur.

N. *Quercetanus in Extractis bezoardicis parandis adhibet spiritum iuniperi, abstractamque ʒm (in inspissatione) reseruat pro usu ibidem bezoardico.*

Sic fiunt, Extracta Angelic. Aristoloch. Enulæ, Gentian. (cuius succus magis vsualis est, Imperatoriæ, Pæoniæ,

Tormentillæ, Zedoariæ.

2. Ex radicibus succulentis, ac mucilaginosi, fit 1. Succus inspissatus, hinc ex succo seu mucilagine inspissata, l.a. cum **V** extractum confit. Sic paratur Extractum Symphyti.

3. Huc referre licet & succos qui digestionem rubicundiores euaserunt, ideoque sanguinis titulum nacti sunt, vel Mumia.

2. Radicem succulentam quamcunque vis, purifica optimè, contunde ac exprime succum; hunc in phiola digere calore **MB**, donec in rubeum conuertatur colorem. Materiâ in rubedinem conuersa, omnique hypostasi siue crassamento ab ea separato, separetur liquor, qui colore albo inde destillabitur, extracto in fundo remanente sub forma sapæ rubicundæ. *Quercetanus in Pharmac. restituit. c. 26.* Sic fit Extractum ex radice Hyoscyami, cuius vsus est in anodynâ cuiusdam & laudani compositione. Sic paratur & Extractum Esulæ.

N. *Ex radice Symphyti & Satyræ simili ferè modo, Extracta sanguinea, seu sanguines eliciuntur. Nimirum pulpa illarum cum pane ac vino vel Sp. vini digerantur, defecentur ac inspissentur. Verum enimvero non Extracta sed succi sc. proprie dicendi sunt. Vide suis locis libr. 4.*

VI. *Lignorum & Corticum* lignorum Extracta, duplicis generis ferè acquiri possunt, Viscosum scilicet ac Resinosum.

Viscosum, quia naturæ est aqueæ, nihil aliud est quam succus inspissatus, ea propter & menstruo pareat aqueo, coctioneque interueniente faciliè elicitur.

Resinosum (resina, gummi alias), sulphureo

phureo felicius obedit menstruo in quo excellit ∇ , quem aqua admiscere fas est.

*Modus eliciendi extracta resinosa
seu Gummata.*

\mathcal{R} . Rasue. ligni (v.g. Guajaci) q.v. (lb. 7. 8.) affunde ∇ optimum, (ex vino, fecibus vini, vel hydromelite vinoso,) digere vitro clauso \mathcal{B} dies (12. 15.) & rubescet; deinde exprime fortissime, vt egrediatnr quoque liquor spissus rubicundus & oleaginosus. Hinc fiat abstractio, donec materia in fundo maneat, in consistentia mellis, bulliendoque bullas emitat, non secus ac mel ipsum. Tunc calentem materiam effunde in ∇ frigidam, & coagulabitur instar aloës, aut gummi rubei. *Quercetan. Pharmacop. restit. cap. 26.*

N. 1. In consiciendis huiusce generis extractis, non incongruè loco ∇ i adhibere quoque licet hydromel quoddam vinosum, aut ∇ as stillat. conuenientes, v.g. ∇ .ulmaria, cardui benedicti, fumaria, & similia, quas tamen acidulas reddere oportet cum succo Limonum aut simili. Quinimo & sola fontana, interueniente sufficienti coctione resinosum extractum elicere potis est.

N. 2. Idem Extractum cum ∇ i re-
tificatiss. allectum, precipitatur nonnunquam affusione ∇ a, diciturque Magisterium; vt Magisterium Cinamomi, lalappa, &c.

Extracta Viscosa.

\mathcal{R} . Rasuram ligni q.v. coque cum aqua quam sufficienter, hinc exprime, clarifica & inspissa q.f.

VII. Aromatum Extracta vteo promptius obediunt ∇ nonnihil addere conuenit, v.g. \mathcal{R} . Caryophyllor. grossè contus. \mathfrak{z} ij. ∇ still. \mathfrak{z} xii. ∇ \mathfrak{z} iv. macera vase clauso. Dein exprime, clarifica per

digestionem, abstrahe aliquantulum in \mathcal{B} (ob spiritum qui primùm extillat,) reliquū euaporare sine ad consistentiam debitam. Eodem modo fieri possunt & Extracta ex aliis aromatibus. v. g. ex calamo aromatico, cardamomo, cubebis, cinamomo, &c.

VIII. Resinarum extractio non nisi depuratio est, qua Resinæ in ∇ re-
tificatissimo soluuntur, colantur, ac demum abstracto ∇ inspissantur, vel affusa aqua, quâ sulphurea ∇ natura diluitur ac debilitatur, præcipitantur. Et hæc nonnunquam titulo Magisterij veniunt, aut Resinæ, exempli gr. Resina vel Magisterium scammonij, & simil.

IX. Gummatum Extracta sunt portiones gummatum, tum viscosæ, tum resinosæ ab inuicem scil. separata. Conuenit igitur hæc separatio, iis solem, quæ parte viscosa ac mucilaginosâ simul constant, vt ferulacea; sitque. \mathcal{R} . Gummi aliquod ferulaceum, solue lento calore (præstat in cucurbita cæco alembico occlusa, vel vase simili,) solum ac depuratum, repone aliquot diebus, & subsidebit pars resinosa. Hinc decantetur liquor turbidus (à resinosa parte subsidente) clarificeturque (si opus) depurando cum albumine oui, vel per linteum colando, vt clarus euadat; dehinc inspissetur lenissimo calore \mathcal{B} . Sic habes viscum, i. e. Extractum viscosum.

Resinosa illa subsidentia lento quoque calore exiccata, exhibet resinam, i. e. resinosum Extractum.

N. Extrahit quoque Resinam ∇ re-
tificatissimus.

In ANIMALIVM familia Extracta suppeditare possunt partes carnosæ, quæque his assimilata membranosæ,

v.gr.

v.gr. Matrix. Hinc sterocra, fella, ossa, cornua.

Ex *car nibus* carnosisque partibus fieri possunt Extracta, si loræ exiccantur atque cum, *V* vel simili appropriato spiritu extrahantur, postmodumque ad consistentiam debitam inspissentur.

N. 1. *Præstat*, si primum antequam exiccantur, in *V* myrrha essentificato, aliquos *S* macerentur. Vide Extractum splenis bonis, libr. 5. Item Extractum munitia humana, libr. 5.

N. *Quercet. Pharmac. rest. cap. 29.* inspissat decocta, additque appropriata, (vide supra in decoctis) atque ita Extracta cariosa parat.

Ex stercorebus animalium si qua Extracta parare animus sit, per *S* id optimè perficies, quippe hic foetorem corrigit.

Ex *fellibus*. R. Fella exiccata, extrahe cum *V*. vide in Boue lib. 5.

Ex *ossibus*. R. Ossa (v.gr. 2. vel 3. crania recentia) tere crasso modo, affundeque aquam vitæ, [iuniperi seu saluiæ,] vt (dig. 4. 5.) supernatet, digere vase accuratissimè clauso, (*S* 12.) post coletur & exprimatur fortissimè. Sic liquor exhibet rubicundus instar sanguinis, qui oleosus & resinofus erit. Iterum affundatur fecibus nouum menstruum, digerendo, (*S* 4. vel 5.) cola & exprime. Expressos liquores destilla in alembico, donec remaneat Extractum in forma Sapæ. *Quercet.*

N. *Digeri & depurari poterit.*

Ex *cornibus*. Extracta cornuum fiunt è teneris (ceruorum) cornibus, vel è cornibus etiam induratis, sed adhuc recentibus, mediante itidem *V* vitæ appropriata, quæ accidula prius reddita sit cum liquore *A* is accidulo. *Querc. Pharmac. rest. cap. 26.*

N. *Extracta in Syrupos rediguntur*, addendo post clarificationem Syrup. pomor. redolent. vel rosar. pallidar. vel Cinnamonom. In puluerem verò per frequentem cohobationem cum aqua propria, & lentam exiccationem.

EXTRACTA vſitiora ALTERANTIA.

1. Alterantia simplicia.

Abſynthii
Acori
Agallochi, f. Ligni Aloës.
Angelicæ rad.
Aristoloch. rot. rad.
Card. benedict.
Caryophyllor.
Castorei.
Centaur. min.
Chelidonijs maior.
Croc.
Cubebar.
Dictamn. f. fraxinellæ.
Enulæ c.
Galangæ.
Gentianæ.
Guaiac.
Imperator. rad.
Melissæ.
Menthæ.
Majoranæ.
Myrrh.
Petasitid.
Pæon.
Rutæ.
Sabinæ.
Satytij rad.
Scabiosæ.
Scordij.
Symphyt.
Tormentill.
Valerian.
Zedoar.
Zinziber.

2. *Alterantia Composita.*

Extr. Laudanum opiatum, cum & sine
Moscho & Ambra, *vid. lib. 4.*

Bezoardicum Quer. N. 1.

Chalybeatum. 2.

Hystericum. 3.

Matricale S. Cloff. 4.

Pestilentielle. 5. 6.

Pulmonum. 7.

Satyrii comp. of. 8.

Theriaca. 9.

Theriaca benedicta. 10.

Theriaca caelestis. 11.

Vterinū Mynsichti. 12.

1. *Extractum Bezoardicum Quercetani, pro Laudano suo.*

℞. Rad. Angelic.

Zedoar.

Galang.

Tormentill.

Cort. citri.

Lign. Aloës.

Santal. rubr.

citrin. à ʒj.

Gran. Alkerim.

Dictamn.

Spic. nard.

Garyophyll.

Nuc. moschat.

Macis.

Cinamom.

Been alb.

rubr. à ʒiſſ.

Camphor. ʒj.

℞. Extractio cum ♡ vitæ Iuni-
perina.

Vires. *Eximiarum est Virium in ar-
cendo Veneno, morbisque contagiosis, qua-
lis pestis, febres maligne.*

2. *Extractum Chalybeatum magnum.*

℞. Limat. Chalyb. præp. ʒiij.

Rad. Ireos fl. ʒj.

Bugloss. sylu.

Cyclamin.

Eryng.

Bryon.

Zingib. an. ʒß.

Fol. Ceterach.

Ling. ceruin.

Betonic.

Rut.

Chamædr.

Chamæpit.

Agrimon.

Calamenth. a. g. xv.

Spic. indic.

Croc. or. an. g. v.

Cort. fraxin.

Rad. Capp.

Fag.

Salic.

Cost. dulc. an. ʒj.

Visc. quern. ʒj.

Cinamom. ʒß.

Sem. Ameos.

Cardamom.

Cumin. acet. macerat.

Coriandr. præp.

Agni cast.

Melanth.

Petroselin.

Portulac. an. ʒß.

Siler. mont. ʒj.

Galang.

Caryophyll.

Macis.

Xylaloës.

Zedoar.

Doronic.

Gentian. an. g. xv.

Incisa & contusa grosso modo
infundantur in f. q. V. & f. l. a. Extra-
ctum.

Vires: *Magnas vires obtinet in ape-
riendis obstructionibus præsertim lienis,
Epatis, vteri ac Mesenterij, adeoque
morbis*

morbis inde natis subuenit.

3. *Extractum hystericum.*

℞. Succ. Saurin.

Centaur. min.

Matricar.

Arthemif.

Fol Melifs.

Flor. Calendul. a. MB.

Rad. Angelic.

Filicis.

Aristoloch. rot. a. ʒβ.

F. Extractio cum aqua Melifs. ac
Sabinæ addendo Sal. ꝑ. tantillum,
Tinctura inspissetur.

℞. Huius Extracti ʒij.

Extract. Myrrh. ʒj

Croc. ʒβ.

Castor. ʒβ.

Borrac. ʒij.

Fecul. Bryon. ʒiif.

F. Massa.

*Vires: Menses obstructos reserat,
uterinasque passiones discutit.*

Dosis ʒβ.

*N. Aquilla abstracta itidem magnas
suppetias ferre potius est in iisdem af-
fectibus.*

4. *Extractum Matricale*
S. Cloſai.

℥ extracti lienis bouis

Puleg. regal. &

Croci cum V parati ʒij.

Myrrh. in aq. rut. murar. cum spiri-
tu D acida, dissolut. ʒij.

Extract. cort. arant. & citri ʒij

Fæcul bryon. ʒβ.

Camphor. Natæ cum V præmis-
sâ digestionem eiusdemque ab-
stractionem in E dim.

*Vires. Huius portio ad pisi magnitu-
dinem dissoluitur in Aquâ aliqua hyste-
rica & exhibeatur.*

5. *Extractum pestilentielle.*

℞. Rad. Angelic.

Olsnit.

Imperator.

Zedoar.

Vincetoxic. à ʒβ.

Tormentill.

Gentian.

Petasit.

Succif.

Pimpinell. à ʒj.

Sem. Leuistic. ʒiij.

Angelic.

Melifs. à ʒij.

Sem. Citr. ʒi.

Gran. Iuniper. M. ij.

Fol. Veronic.

Melifs.

Arthemif.

Scord.

Galeg.

Scabios.

Card. bened. Miß.

Fl. Hyperic. M. i.

F. Extr. cum V. & inspissetur.

*Vires. Maximam est virtutum in
arcendo aëre pestilentiali, eodemque mor-
bo & similib. malignis affectibus curandis
& precauendis. Sudorem mouet.*

Dosis à ʒj. ad ʒij. &c.

6. *Extractum pestilentielle Tycho-
ni de Brahe.*

1. ℞. Teriac. Androm. veter. lb. i.

Extrahe Tincturam cum V rectificati-
fis. ad superemin. palme affuso, Vase
bene clauso. Effusiones filtra & abstrahe
l. Δ ad consistentiam mellis.

2. Fiant flores 4 is simplices ter per
se & quarto ex Aloe, Myrrha & Croco
semel leniter eleuati.

℞. Horum ʒi v.

Ol Iuniper. è bacc. rectific. ad emi-
nent. digit. 4.

Aa

N. Pareſſ

N. *Potest etiam addi olei succin. re-
Etificati pars quarta, sic melius.*

Stent in digestionem tepidâ & impræ-
gnabitur oleum tinctura \mathfrak{A} is ru-
bicundâ, effunde, ac si libet filtra.
Itaque

\mathfrak{R} . Extract. Theriac. part. x i i.

Bals. illius \mathfrak{A} is. part. i.

Addendo si libet nonnihil Ex-
tract. rad. Angelic. Nag. Succin. alb. &
Sal. Absynth. vt & aliquantulum de
Spiritu illo theriacali abstracto, digerantur
(d. 8.) Hinc fiat separatio ad con-
sistentiam mellis.

*Summum est curativum pestis. Desis
g. viij. x. xij. &c. In aqua appropriata
statim ab initio morbi assumpt. vt sudo-
rem cieat. Præseruationis vice assumi po-
terunt quotidie mane g. ij. vel iij.*

N. *Potest ulterius exaltari per ad-
ditionem Tincturæ Corallorum, Sapphyr.
Hyacynth. & Margarit.*

*Quinimo vt uniuersalius inde medi-
camentum exurgat, acui potest tantillo flo-
rum reguli \mathfrak{J} ialis diurnam reuerber-
ationem rubificatorum. Vide lilium
Theophr.*

Descriptionem hanc Rudolpho
Imperatori submissè communicauit
Tycho Brahe.

Ex communicatione D. Iohan.
Vvaltheri Held.

7. Extractum Pulmonum.

\mathfrak{R} . Pulmon. Vulpis, incide in frusta
minutissima, ac adde

Herb. Veronic.

Hyssop.

Scabiosana. MB.

Sem. Anis.

Fœnicana \mathfrak{z} j.

Coque in phiala capaci benè oc-
clusa in MB. seruanti horas 7. vel 8. do-
nec pulmones in liquorem redacti

fuerint. Hinc cola, colaturamque in-
spissa l.a. addendo Sacchari q. libet, ad
consistentiam extracti.

*Vires. Imbecillitati ac affectibus pul-
monum confert.*

N. i. *Eodem modo fieri quoque
possunt Extracta Epatis, Splenis, & si-
milium, ex Decoctis supra è Quercetano
allatis.*

N. 2. *Præstat modus quem supra
generaliter dedimus.*

8. Extractum Satyrii com- positum.

\mathfrak{R} . Extract. Satyr. simpl. \mathfrak{lb} ss.

Sal. margarit. \mathfrak{z} ss.

Ol. nucist. still.

Anis.

Cinamom. an. \mathfrak{z} ss.

*Vires. Impotentibus succurrit. Do-
sis gutt. aliquot. ad 20.*

N. Extract. simpl. v. l. 4.

9. Extractum Theriacæ seu Essentia. Theriacæ simplex & alcolisata

\mathfrak{R} . Theriac. Androm. opt. extrahe s.
a. tincturam cum ∇ vitæ iuniperina,
vel ∇ ex tophis ceruinis, vel simili ∇
bezoardica siue theriacali. Decantatas
tincturas destillaad remanentiam Es-
sentia Theriacæ in consistentia mellis,
quam serua pro vsu, titulo Extracti the-
riacæ simplicis, vel adde falex incinera-
taremanentia elixiuatum, sub nomine
Extracti s. Essentia Theriacæ alcolisatæ.

N. *De hoc Theriacæ & similibus
Extractis, duo quæ moncam, habeo.*

*Primum suggerit ingredientium di-
uersitas, quâ vix credibile est, singulorum
Essentias aque uni soli menstruo parere.
Nec est quod oggerant, fermentando
cuncta in vnâ naturam coaluisse: Du-
bium enim haud leue, vitrum fermentando
natura rerum adeo immutari possit, vt
quæ antea menstruum reum prorsus
respuebant*

respuebant, facta fermentatione id ipsum amice amplectantur.

Secundum, quod monere duxi, ipsam et prabet fermentatio, quippe que potissimam rerum fermentabilium partem in Q.E. exaltat, id est, volatilisat, spiritua-lem ac volatilem reddit. Exemplo sint Vinum, Cereuisia, succi fructuum fermentati, & similia, Ea propter cum Tin-ctura destillationi submitatur, qua volatili-ior pars abstrahitur, quis infringet Extractum in fundo destillatorij remanens, potissima sua parte esse exutum.

Ut has difficultates eurent, sunt qui species seorsim menstruis idoneis extra-hunt, atque Extracta postmodum con-iungunt. Verū enim vero, nec hi ad metam ad quam collimant, pertingere videntur. Etenim compositionem Theriaca subeunt non paucanatura aromatica, subtilioris, tenuioris, volatiliioris, &c. Que facultates ad Theriaca constitutionē nō minus neces-sarie sunt, quam relique in substantia minus volatili residentes. Idcirco, cum volatiles illi spiritus à fixioribus in inspis-satione separentur, operationē Theriaca integram in Extracto hoc quis sibi sponde-bit? Adde quod hac ratione nonnullorum ingredientium ferocia, que alias fer-mentando in Theriaca cicuratur, indomi-tamaneat, imo vires suas exerere aprior euadat. Præstat itaque Theriacam in sua propria substantia adhibere, quam labo-riosa hac extractione operam perdere. Id quod de aliis quoque, exempli gratia, pilu-larum quarundam Extractis censendum.

Verum enim vero, non simpliciter The-riaca Extracta improbata velim, præ-cipue si spirituosiores seu oleosiores partes interueniente præcipitatione sint reser-uata. Quia in re non possum, quin industriā commendem Chymici solertissimi Friden-rici Greiffen Pharmacopai apud Tubin-

genses celeberrimi, Amici mei honorandi, qui imperfectionem preparationum ha-rundem perpendens, perfectiorem, non ita pridem in decade suanobissimorum medi-camentorum, Iuris publici fecit, unde

10. Theriaca Benedicta Quercetani
aucta & correctæ.

1. Soluenda.

R. Troch. scyllit. Quercetan. ʒvi.
de Viper. Venetian.

Ess. (extr.) opii cum ✕ fact. ana ʒiij.
Succ. Glycyrrh. in ∇ still. sol. & in-
spiss. ʒiβ.

Ess. croci (cum V.) ʒj.

Myrrh. ✕ sol. & inspiss.

Oliban. in gran. à ʒvi.

Gran. styrac. cal. in ∇ sol. & ex-
prefs.

Gum. Arab. albiss.

Sandarac. in gran.

Succ. Acac. in ✕ sol. & insp.

Hypocist. ✕ f. & inspi.
ana ʒβ.

Asphalt. el.

Galban.

Mastich.

Opopanax. (singul. in gran.) à ʒij.

Essent. Castor. ʒ. 1.

2. Extrahenda aromata.

Piper. long. ʒiij.

Cinam. ac. ʒiβ.

Acori f.

Cass. lign. Veræ.

Cest. Ver.

Pip. albi.

nigri.

Schananth.

Spic. Indic.

Stœchad. arab.

Zedoar.

Zingib. alb. à ʒvi.

Cardam. min.

Carpobals. veri.

A a 2

Cubeb.

Cubebar.
 Folij
 Galang.
 Garyophyllor.
 Macer.
 Spic.celtic. à ʒβ.
 Lign. Aloës ʒij.
Extrahenda reliqua.
 Miobalā. Chebul. ʒvi
 Baccar. iuniper. ʒβ.
 Laur. ʒij.
 Fl. Rosar. rub. ʒiβ.
 Hyperic. ʒ.
 Centaur. min. ʒij.
 Herb card. bened.
 Scord. cret. à ʒiβ.
 Calam. anth. mont.
 Dictam. cret.
 Marrub. à ʒ. vi.
 Abrotani.
 Chamædr.
 Chamæpit.
 Orig. cret.
 Polii cret.
 Rorismar.
 Salu. min.
 Scabios. à ʒβ.
 Maioran.
 Mari.
 Lign. Asphalt.
 Santal. citr. à ʒij.
 Agaric.
 Rad. irid. Flor. à ʒiβ.
 Angelic.
 Pentaphyll.
 Rhabarb. el.
 Tormentill. à ʒvi.
 Aristoloch. rot.
 Asar.
 Cyper rotund.
 Diptamn. alb.
 Enulæ camp.
 Gentian.

Imperator.
 Meu.
 Pimpinell.
 Phu Pontic.
 Serpentar.
 Succif.
 Valerian.
 Vincetoxic. an. ʒβ.
 Aristoch. long.
 Cruciat. à ʒij.
 Sem. Buniad. seu Napi a-
 greft. ʒiβ.
 Petrosel. maced. ʒ. vi.
 Ammeos.
 Amomi racemos.
 Anis. torrefact.
 Citri.
 Fœnic. cret.
 Hyperic.
 Sefel. seu Siler. mont.
 Thlaspi seu Nasturt. alb. à ʒβ.
 Dauci cretic. ʒij.
 3. *Puluerisanda.*
 Confect. serpentum iuniperina Quer-
 cet. ʒiiij.
 Terr. sigillat. ʒ. vi.
 Lemn.
 C. C. usti à ʒβ.
 4. *Liquida.*
 Balsam. Indici
 Ol. Nucis moschat. expr. à ʒiβ.
 Garyophyllor.
 Succin. camphorat. ʒiβ.
 Spir. ʒi.
 1. F. Extractio seorsim medietatis
 aromatum & reliquorum extrahendo-
 rum, singulorum sc. i. cum V rectific.
 2. cum V ☉. pluuiiali, Essentiam cum
 V extractam præcipita cum Extractio-
 ne in V ☉. Hinc abstrahe in M ac
 collige seorsim spiritum theriacalem
 primo egredientem, seorsim etiam V the-
 riacalem subsequenter ad consistent.
 mellis.

mellis. Residuam medietatem in puluerem redige.

2. Ex remanentia incinerata elixiuia

Θcum ▽ pluuiali.

3. In spir. theriacali solue sandarac. Olib. Naltich. storac. omnesque Essentias non satis liquidas eo dilue.

4. Cum ▽ theriac. in pultem redige Trochisc. de scyllis & Vip. solue in eodem succum Glycyrrhizæ, G. Arabic. & C proprium.

5. In spir. Terebinth. 3vi. solue Asphaltum.

6. Reliqua omnia, vt Ess. Opii. & Hypocist. Acac. Myrrh. sagapen. Galban & Opopanac. solue in ✕.

7. Omnes extractiones, solutiones, pulueres, Balsama, olea expr. destill. spiritus & Θia s.a. commisce quam optime & redige in massam pilularem. Hinc

11. Theriaca Cælestis.

R. Theriac. benedict. prior.

℞iβ.

Extrahe cum sp. Theriacali, effunde & abstrahere ad consistent. mellis Abstractum spir. (essentia seorsim asservata). reaffunde remanentiæ priori, extrahe denuo & decanta. Remanentiæ affunde 5 rectific. ac extrahe residuam essentiã eius, decanta iterum, & confunde cum priori. Residuam remanentiam in ▽ theriacali & tandem in ✕ spiritu Salis balsamici (Θ) fortificato extrahe. Et his vltimis Extractionibus priores præcipita & ad consist. mellis coagula, tandem permisce.

Magist. corallor.

Perlar. à 5j

Hyacinthi.

Rubin.

Smaragd. à vi.

Bezoard. Animal.

Mineral.

Sal. corallor.

Perlar. à 3β.

Bezoard. oriental.

Terr. sigillat.

Vnicorn. veri.

Ofs. de C. C. à 3iii.

Ambr. grif. 3ii.

Inspissa in vase duplici ad formam Extract. vel massæ pilularis.

Vires. *Vires Quercetanus huic attribuit admirabiles in Venenis & contagiis arcendis; in exagitatione spirituum humorumque sedanda, in catarrhis, dolorib. & vigiliis mitigandis. In Balsamo nativo corroborando, putredine præseruanda, &c.*

N. Rationem utriusque huius compositionis videsis decade superius allegata,

12. Extractum uterinum Mynsichti.

R. Bacc. Sambuci

Ebuli ana 3iv.

Rad. Pæon. debitè collect.

Arthemif. rub.

Dictamn. alb.

Bryon. ana 3ij.

Visc. quern.

Sum. ameós.

Herb. puleg.

Meliss.

Cass. lign.

Croc. or.

Castor veri. ana 3β.

Extrahe cum V. eumque separa ad remanentiam extracti. Postea adde

Sang. porcæ in clibano exiccat. & cum ▽ hysterici. præpar. 3β.

Bezoart. Iouial.

Mag. Iouis Anglic.

Matr. perlar.

Corallor.

Ol. antophyllor.

Aa 3 Angelic.

Angelic.

Succin. alb.

Arantior. ana ℥j.

Denuo misce & f. Extractum pro usu.

Vires: *Medicina est saluberrima in affectibus uterinis, etiam deploratissimis: Dosis ℥j. à 3. tribus aut 4. diluculis continuis in aq. aliqua conueniente.*

EXTRACTA PURGANTIA.

Extracta purgantia simplicia, vt & quæ sub nomine alicuius simplicis veniunt, vide lib. 4.

Purgantia Composita.

Extractum

Benedictum, vide infra, N. 1.

Diacarthamum f. Cnicopharmacum, Aug.

Catholicum, A.

F. F. vide infra 2.

Sennerti, 3.

Arnoldi VVeickhardi, 4.

Cholagogum Querc. A.

Holagogum Andernaci, A.

Melampodij. scilicet Ellebori nigri Mindereri, A.

Melanagogum Querc. A.

Panchymagogum Crollij, 5. 6.

Hartinanni, 7.

Augustanorum.

Plegmagogum Querc. A.

Pilularum Aggregatim. A.

Aurear, A.

Cochiar, A.

Lucis maior. A.

1. Extractum benedictum.

℞. Fol. Sen. el.

Rhabarb. à ℥ij.

Agaric. ℥j.

F. Extractum.

Vires. *Purgat biliosos ac mucilaginosos humores.*

Dosis à ʒβ. ad ʒj.

2. *Extractum Catholicum Francofurtense.*

℞. Aloes succotrin. ℥j.

Turbeth. el. ʒβ.

Colocynth. ʒvi.

Agaric. albis.

Diagryd.

Rad. Ellebor. à ʒβ.

Spec. Diarrhod. abbat. ʒj

Macis.

Strachad. ar.

Galang.

Cardamom.

Zedoar.

Caryophyll.

Cinamom.

Fl. Anth.

Lign. Aloës

Visc. querc. à ʒβ.

Ambr. grif. ʒj.

Infunde omnia in V (8) excoptis speciebus, Diarrhod. & Ambra, fiat que Extractum, cui adde Extractum specierum Diarth. itidem per V factum ac Ambram.

Vires. *Omnes humores blandè purgat.*

Dosis à ʒj.

3. *Extractum Catholicum Sennerti.*

1. ℞. Diagryd.

Trochisc. Alh.

Gumm. de Peru, ana ʒβ.

Aloës ʒj.

F. Extractum cum V seorsim.

Idem f. Extractum.

2. ℞. Turbith. el.

Rad Elleb. nigr. à ʒβ.

Rhabarb. ʒj.

Spec. Diarrhod. abb. ʒβ.

Arom. trofat. ʒij.

Vtrumque Extractum coniungatur ad massam pilularem constituendam.

Dosis

Dosis à ʒj. ad ʒij.

N. *Felicius forsan procederetur, si Resina Diagrydii, Magister. Gummi de Peru, Extraet. Aloës, per se fierint, ut libr.*
 4. docebimus, atque Trochisci Albandal cum reliquis infunderentur.

4. *Extractum Catholicum, D. D.*

Arnoldi VVeickhardi.

ʒ. Aloës succotr. ʒʒ.

Rhabarb. opt. ʒv.]

Fol. Senn. f. st. ʒiv.

Rad. Mechoac. ʒij.

Colocynth. ʒj.

Turpethi el. ʒiiʒ.

Eful. præparat. ʒʒ.

Gener. ʒ. mirobalan. à ʒij.

Cinamom.

Zinzib.

Macis.

Galang.

Zedoar.

Garyophyllor.

Cardamom.

Cort. citr.

Schœnanth. à ʒj.

Spec. Diamb. ʒij.

Diarrh. abb. ʒiiij.

F. Extractio l. a. cum ♀ & ∇ fœnic. exprimatur & inspissetur.

Dosis ad ʒʒ. vel ʒij.

4. *Extractum Panchymagogum*

Crollij 1.

ʒ. Spec. Diarrhod. Abbat.

Diamb. ana ʒj.

Extrahatur Tinctura cum ♀ f. a. vitrum crebro mouendo.

Deinde

ʒ. Pulp. colocynth. ʒvi.]

Turpeth. gummof. ʒv.

Agaric. opt. ʒj.

Rad. Elleb. nigr. veri ʒj.

Scammon. Elect. ʒvi.]

Fol. Sen. ʒiv.

Rhabarb. el. ʒiiij.

Elater. ʒij.

Sem. Ebul. trit. ʒiiij.

Hermodaet. ʒij]

Incidenda incidantur, terenda terantur; affunde Tincturam illam specierum, extrahaturque Tinctura f. a. decantatas extractiones inspissa leni calore M ad consistentiam mellis, postmodum adde

Ol. Cinam.

Caryophyllor.

Nucist. ana gutt. x.

Sal. perlar.

Corall. ana ʒij.

Salem è fecibus superioribus calcinatis extractum.

Rasur. cranii human. [vel off. calcinat.] ʒʒ.

F. Massa.

Vires. *Nen datur melius catharticum, quod minori molestia omnes humores noxios expurget.*

Dosis à ʒj. ad ʒij. ex vino maluatico, vel alio generoso, è iusculo, vel aliis catapotis aggregatiuis admixtis; datur & in forma pilulari.

6. *Extractum Panchymagogum*

Crollij 2.

ʒ. Pulpæ colocynth. ʒvi.]

Agarici

Scammon. el. ana ʒʒ.

Hellebori nigri

Spec. Diarrhod. Abbat.

Aloes succotrin. ana ʒj.

Extrahe f. a. cum ♀ eumque iterum abstrahere. Et quia in extractione sæpè virtus purgatrix solet debilitari, ideo quidam solent ad vnam partem Extractorum addere crudorum purgantium partem alteram: adde ergo superioribus, antequam Extractum in furno remanens plane inspissetur.

Trochisc

Trochisc. Alhand. ʒvi.

Diagryd. preparat.

Agaric. troch. à ʒß.

Aloës Epatic. ʒj.

Puluerisata redigantur in massam
iustæ consistentiæ.

Dosis à gran. 20. ad 35. & 30.

& ultra.

N. Aliud vide in Pharmacop.

Augustana.

7. Extractum Panchymagogum

Hartmanni.

ʒ. Fol. sen. s. st. ʒij.

Rhabarb. el. ʒi.

Rad. Hellebor. nigr. ʒj.

Turberth. alb. gummof.

Polypod. quern.

Trochisc. Alhand.

Agaric. Trochisc. ana ʒß.

Medull. sem. cartham.

Myrrh. rubr. el. ana ʒiij.

Spec. aromat. Garyoph.

Diamb. ana ʒj.

Cortic. citr. ʒj.

Concisa & contusa extrahantur
simul omnia cum ∇ & ∇ cinam. ana
ʒiij. F. Expressio. Feces denuo extrahan-
tur cum sola ∇ cinam. tenuiori, percole-
tur postea. Extracto adde Extracti Aloës
cum ∇ Betonic. vel Veronic. facti ʒiij. F.
mistio, & inspissatio ad iustam consi-
stentiam, addendo Ol. Garyophyllor.
gran. 10.

Dosis à ʒß. ad ʒiij. Harman. in Croll.

Alias insuper descriptiones videre po-
teris dicto libro.

C A P. LVIII.

De Farinis.

Farinarum conficiendarum modus
vulgaris est.

Sunt vstratiores in Officinis.

Farina Amyli, f. amydi, Krafft. Meel.

Auenæ.

Fabrum.

Fœni græci.

Glandium.

Hordei.

Lentium.

Lini.

Lupinorum.

Orizæ.

Pisforum.

Siliginis.

Triticici.

Volatilis, Staubmeel.

C A P. LIX.

De Feculis.

Feculæ ex radicibus nonnullis, iisque
viridibus eliciuntur, rarissime ex foliis.

Modus fiendi.

ʒ. Rad. (v. gr. ar.) q. v. lotam vel ra-
sam.

fam, conquassa optimè in mortario, affundendo aquam subinde, vt fiat pulpa liquidiuscula, hanc fortiter exprime, expressionem liquidam repone, vt subsideat fecula. Feculam subidentem exicca. Sic fiunt.

Fecula Ari.

Bryoniæ.

Iridis nostrat.

Liliorum albor.

Pæoniæ.

Raphani marini.

Scyllæ.

Serpentariæ.

N. Scylla operationem habet peculiarem. Vide lib. 4.

Ononidis radix cocta in s. q. aqua (hor. 3. 4.) si decoctum illud clarificatum prius & aliquantulum inspissatum reponatur, itidem ad fundum mittit.

CAP. LX.

De Floribus.

Flores in Chymia sunt subtiliores corporis partes, per sublimationem, à crassioribus particulis, sub forma sicca separata.

Modus, vt singulis ferè diuersus est; ita & in singulis describi postulat.

Vsitatores sunt.

Flores Antimonij.

Cinnabaris Antimonij.

Flores Arsenici, 30 sublimatum.

Benzoin.

Mercurij varij, huc ♀ dulcis.

Salis *.

Sulphuris varij.

CAP. XLI.

De Gargarismis, Diaclysmatis & Dentifricis liquidis.

Diaclysmata, (Collutiones oris,) sunt liquores, qui in ore detinentur, iterumque expuuntur. Hi si gargarizando adhibeantur, dicuntur Gargarismi seu Gargarismata, quod tamen vocabulum etiam generaliter pro diaclysmate non rarò vsurpatur. Eadem si phlegmati è cerebro eliciendo destinantur, Apophlegmatismi nomen assumunt.

Liquores hi in Officinis pro vsu nulli extant, sed ex tempore, ad præscriptiones datas, dispensantur. Fiunt vt plurimū

ex aquis (simplici vel destillata,) succis, decoctisue conuenientibus, in quibus pro libitu diluuntur syrupi, mella, sapæ (Zii, iiii, liii, ad lb. i. v. x) tantillum aceti, Ovi, Di crudi, præparati, spiritus Di, Qi, & simil. In summa, omnis generis liquores, & quicquid in his dissolubile est, diaclysmata ingredi non nequeunt.

Exemplo sint:

1. Diaclysmata Odontalgicæ & apophlegmatizans.

R. Piper alb.

B b

long.

long.

Cubeb.

Staphisagr.

Cort. mori

mandrag. à ʒi.

Rad. pyrethr. ʒij.

Contundantur & ex vino albo f.
decoctum, ad lb. i. Incolatura dissolu-
turtantillum aceti.

F. Diaclyfina.

2. *Diaclyfina refrigerans.*

℞. Cancros viu. N. v. vi. vel viij.

Sedi maior. M. iii. vel iv.

Contunde & exprime succum.

Vires. *Maximè prodest in inflamma-
tione oris & faucium.*

3. *Diaclyfina ad gingivas.*℞. Aqu. Chelidon. min. bis destil-
lat. ʒiv.

Ousti ʒj.

M. & si libet f. filtratura.

Vires. *Insignium virium est in gingi-
varum putredine.*

4. *Aliud.*

℞. Aq. Chelidon. min.

Plantag. an. ʒiʒ.

Cochlear. ʒi.

Extr. Chelid. min. ʒj.

Mell. rosar. ʒ.

Spir. Dig. vi. M.

Vires: *Vires easdem cum preceden-
ti obtinet, sed feliciores, præsertim in gin-
givarum putredine scorbutica.*

5. *Diaclyfina seu Gargarismus anti-
scorbuticus. S. Cloß.*

℞. Herb. cochlear.

Pyrol.

Beccabung.

Nasturt. aquat. a. Mj.

Rad. aristol. rot.

Eaul. camp. an. ʒj.

Rhabarb. opt. ʒʒ.

Baccar. laur. ʒvi.

Croci ʒj.

Zinzib. alb. ʒij.

F. pulvis grossus: Maceretur per bi-
duum in lbij. cereuis. veter. idque ib di-
plomate, decoctum coletur.

Vires: *Valet ad gingivas scorbuticas
& sanguifluas, Patiens eo os colluat, ac
mane & vesperi ʒij. de eodem hauriat.*

6. *D. Ad faucium inflamma-
tionem.*

℞. Aqu. Plantag. ʒij.

Rosar.

Acetos. à ʒj.

Prunell. ʒii.

Rob. Diamor. ʒʒ.

Opæparat. ʒʒ.

M. F. Gargarismus.

7. *Diac. apophlegmatizans.*

℞. Cort. rad. sambuc. ʒi.

Rad. Galang. ʒʒ.

Pyrethri. ʒii.

Fol. Betonic.

Origan.

Maioran.

Meliss. à M. i.

Cubebat. ʒiʒ.

Sem. Sinap. ʒj.

Vuar. passar. M. i.

Coquantur in vino vel aqua,

℞. Colatur. lb. ʒ. præter propter

Oxymel scyllit. ʒiij.

M. F. Gargarismus.

Vires. *Phlegma è cerebro elicit*8. *Huc referendi sunt LIQVORES,
fricandis dentibus, gingivisque
destinati.*

℞. Aqu. Prunell.

Plantag. ana ʒiij.

Rob. Diamor.

Syr. rosar. sic. a. ʒ. vel ʒj.

Spir. ʒi ʒʒ. M.

Inferuit ad dentes dealbandos,

exter

extergendos, stabiliendos.

dentis dealbandos, sed & stuporem eorum inducunt.

N. Spiritus acidi profunt maximè ad

CAP. LXII.

De Gelatinis.

Gelatina est succus inspissatus, purior, clariusculus, cum saccharo in scatulas effusus & congelatus. Et hinc Gelatina dicitur.

Parantur è fructibus nonnullis succulentis, tum è cornibus ac ossibus tenerioribus.

E Fructibus.

℞. Fructus, exprime succum, expressum coque & clarifica, (cum albumine cui,) hinc addito saccharo inspissa sensim & effunde in scatulas.

Aliter.

℞. Fructus, coque in ∇, decoctionem citra expressionem decanta, vel filtra, saccharumque addendo inspissa.

E Cornibus & Ossibus tenerioribus fit sine Saccharo.

℞. Rasur. cornuum ossiumue (vel eadem in fragmenta minutiora redacta,) coque vel digera aliquandiu in ∇ (commun. stillatitiaue appropriata) hinc coque & filtra calidè, coagulaque.

N. Quod si ossa & cornua nimis dura sunt, acuari ∇a poterit liquore aliquo acido, verbi gratia, spirit. Ⓢi, ✕ & simil.

Exemplo fit

Gelatina ossium de corde cerni.

℥. Rasur. ossium cordis cerni .iij. Coq. in aq. & vini albana lib. per horas 6. aut 8. ad medias, deinde colentur, in colaturâ diss. sacch. opt. ℥vi. agitentur simul cum.

Succilimon. ℥ij.

Aq. ros. ℥j.

Dein recoquantur ad medias, addendo sub finem

ambr. griseæ seorsum in aq. ros. infus. ℥ss.

Tincturæ cinnam. in vino fact. ℥j.

Colentur & refrigerentur.

Sic sunt

Gelatina Cytoniorum.

Pomorum.

Pyrorum.

Ribium.

Cornu. cerui.

Cranij humani.

N. 1. His immiscentur nonnunquam pulveres, vel Extracta, & simil. unde Gelatina composita, tum alterantes, tum purgantes, v. gr. Gelatina Cytoniorum purgans, videlib. 4.

N. 2. Sunt qui Gelatinas Cytoniorum, Marmelatas vocant, easque tum simplices, tum aromatisatas pro usu domestico parant, varij coloris.

CAP. LXIII.

De Infusionibus.

Infusionis (infusi) nomen potionibus potissimum imponi, iisque purgantibus, lib. I. diximus, harum rationem hic loci exhibemus.

Liquorem exhibent aquæ stillatitiæ, (tum & fontana,) serum, mulsum, hydromel, vinosum, vinum, & simil.

Materia infusioni apta, etsi & ex mineralibus & animalibus sumi queat, tamen huius loci inprimis sunt vegetabilia, & maxime purgantia cum corrigentibus.

Modus parandi.

Recipiuntur res medicamentales, præparatæ ad infusionem, incidendo, contundendo, limando, &c. prout in decoctorum doctrina traditum; immerguntur liquori, quantitate & qualitate intentioni medicæ respondentem, reponunturque, si extractio maturanda, loco calido, (in cineres vel iuxta fornacem.) Hinc decantetur liquor, exprimaturque pro usu.

Proportio liquoris præscribitur ferè q. s. id est, ut materia cooperiatur, liquorque superemineat digitos versos, I. 2. 3. &c.

*Exemplo sint*1. *Infusio Cholephlegmagoga.*

R. Agaric. elect. ʒiʒ.
Rhabarb. opt. ʒj.
Zinzib. ʒss.
Spic. Nard. gran. v.
Sal. gemm. gran. iij.

Pulueriscentur grossæ & infundantur per noctem in

Aqu. Eupator.

Cichor. à ʒiʒ.

Hinc calefiant & colentur cum expressione. F. Porus.

Vires. *Purgat bilem & phlegma.*

N. *Sal gemmæ additur ad facilitandam extractionem: cuius rei gratia & sal ꝑ addi poterit.*

Huius generis sunt Vinamedicata, (vt & Cereuisia medicata,) tum alterantia, tum purgantia, v. g.

2. *Vinum Arthriticum.*

R. Fol. chamædr.

Chamæpit.

Sum. Salu. ana ʒiʒ.

Flor. Primul. ver.

Anth.

Lil. conuall. ana ʒiʒ.

Raf. Lign. Guaiac. ʒviii.

Visci quern. ʒiʒ.

Rap. Chin. ʒiij.

Caryophyllat. ʒiv.

Vini musti mensur. Lxxx.

Ponantur ad feruescentiam, vt deferueant.

3. *Vinum Medicatum Cephalico-Spleneticum.*

R. Rad. Garyophyllat. ʒiʒ.

Cichor. ʒiʒ.

Enul. ʒj.

Herb. Ceterach.

Veronic. c. fl.

Card. bened. c. florib.

Epatic. stellat. c. flor.

Summit. Centaur. min. ana

Miʒ.

Cort. Arant. sicc. $\mathfrak{z}\beta$. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Incidantur herbæ, contundanturque grossè radices & cortices, infundanturque in vini mensur. viii.

Vires. *Catarrhis insigniter opitulatur, caput, epar, & lienem corroborat.*

4. *Vinum Matricale.*

R. Herb. Meliss.

Puleg.

Capill. ♀.

Salu.

Calamenth.

Artemis. ana M. β .

Fl. Squinanth. $\mathfrak{z}\beta$.

Calendul.

Cheir. ana pij .

Nucist.

Macer.

Cubebat.

Cardamom.

Granor. Paradyf.

Zedoar. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Vini generosi mensur. iv. addendo saccharum pro libitu.

5. *Vinum purgans.*

R. Fol. Sen. Al. f. st. (sine stipitib.) $\mathfrak{z}\text{x}$.

Follicul. sen. $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$.

Epithym. $\mathfrak{z}\text{vi}$.

Sem. cartham. conqu. $\mathfrak{z}\beta$.

Gialapp. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Cort. Helleb. nigr. $\mathfrak{z}\beta$.

Cinamom. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Galang. $\mathfrak{z}\beta$.

Zingib. $\mathfrak{z}\beta$.

Cort. citr. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Vini mensur. i.

Vires. *Purgat humorem Melancholicum & scorsum. Dosis $\mathfrak{z}\text{ij}$. iij.*

N. Plura Exempla aliunde petere licet, vel ex decoctis, vel ∇ is destillatis compositis huc arcessere. Nimirum species dictorum Medicamentorum non minus & hic adhiberi poterunt.

6. *Vinum Sanctum.*

R. Vini alb. opt. \mathfrak{lb} . xv.

Lign. Guaiac.

Sars. Parill. an $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$.

Fol. Sen. f. st. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Polypod. q. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Conquassata infundantur, digeranturque hor. 24.

Vires. *Valeat ad morbos frigidos, paralyticos, cacochymicos & maxime ad luem \mathfrak{z} inueteratam. Singulis diebus mane \mathfrak{z} viij. & sero ante ingressum lecti tantundem, patiens capiat. Exerceatur valide, nec opus ut semper domi in claustro maneat, Philip. Mull. in mirac.*

Huc pertinent Vina Hippocratica seu Clareta.

v.g.

7. *Claretum laxatiuum.*

R. Cinamom.

Galang.

Garyophyllor.

Macis

Zinzib. à $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Turbith. alb. $\mathfrak{z}\text{vi}$.

Fol. sen. el. $\mathfrak{z}\text{i}$.

Mechoacann. $\mathfrak{z}\text{iii}$.

Sacchar. $\mathfrak{z}\text{iii}$.

Vini generosi $\mathfrak{z}\text{xvi}$.

Aqu. fontan. $\mathfrak{z}\text{viii}$.

Cremor. $\mathfrak{z}\text{ii}$.

Stent in infusione per noctem, deinceps colentur per Manicam Hippocraticam.

Vires. *Purgat humores melancholicos & pituitosos.*

Dosis $\mathfrak{z}\text{ij}$. vel iij.

8. *Claretum purgatorium, s. Vinum Hippocraticum \mathfrak{z} iale.*

R. Vitri \mathfrak{z} subtiliss. pulueris. $\mathfrak{z}\text{i}$. $\mathfrak{z}\text{ii}$.

Vini alb. opt. $\mathfrak{z}\text{viii}$.

Digerantur vase vitreo bene clauso, in $\text{MB. } \mathfrak{z}$ (6.) deinceps cola, colaturæque adde

Bb 3 Sacchar.

Sacchar. albiss. puluerifat. ℥iij. vel ℥iij.
 Aromatisetur cum opt. ▽ cinam.
 & seruetur. Dosis ℥ij.

Vires. *Satis leniter suauiterque operationem suam infra & supra exercet. Sala.*

C A P. LXIV.

De Iulebis & Moretis.

Iulebi (Iulepi) in Praxi vsitatissimum potionis genus constituunt, quod ob saporem gratum, pro potu ordinario aegris praescribitur plurimum solet.

Parati autem in Officina nulli extant, sed ex tempore parantur.

N. *Iulepi violaceus & rosaceus Officinarum, Syrupi consistentiam obtinent.*

Parantur ex liquore potulento, in quo Syrupi, saccharumue dissoluntur, additis, prout visum fuerit, & aliis in liquore illo dissolui aptis, qualia succi, spiritus, & simil.

N. *Syrupi vices & conserua supplere potest, accedente colatura.*

Liquor ille potulentus adhibetur varius: Aqua stillatitia, fontana, (correcta pane tosto) decoctum, verbi gratia, C. C. Glycyrrhizae, Hordei, & simil.

Proportio Liquoris. ℔. i.

Syrupi. ℥ij. ℥ij. vel prout palato placuerit.

Acidiusculi, adeoque gratiores, non raro reddi solent, spiritu ℥i ad saporem gratum vsque instillato.

Exemplo sint.

1. R. Decoct. C. C. vsti, id est, in quo c. c. (v. gr. ℥i. vel ii.) sit Coctum ℔b. i.

Syrup. papau. err. ℥i.
 corallor.

Succ. Berberor. ana ℥iij.
 M. F. Iuleb.

Confert in febribus aliisque sanguinis ebullitionibus, quas vigiliae alique fluxus comitantur.

2. R. Aqu. fontan. pane correct. ℥x.

Iulep. Rosat. ℥iij.

Syr. cinam. ℥iij.

Aqu. Rosat. ℥i v.

Spir. ℥i q. s. ad gratum saporem videlicet ℔b. vel ℥iij.

F. Iuleb.

Vires, *Refrigerat, roborat, potiusque gratus est aegrotis.*

3. R. Aqu. hordei, id est, decoct. ℔b.

Conseru. rosar. ℥iij.

Conquassetur conserua, tantillum subinde decocti affundendo, hinc coletur & si placuerit, filtretur.

N. 1. *Acida si decocto C. C. (inprimis è crudo C. C.) instillaris, turbidum id redditur.*

N. 2. *Poterit itidem Santalo rubro aromatzari, santali scil. ℥iij. simul conquassando.*

Huius quoque loci est Moretus, nostratibus dictus, potionis genus, ex aromaticis aliisque confortantibus commixtum, addito ad gratum saporem saccharo vel syrupo.

N. *Moretus dicitur à moris seu diamoro ingrediente. Estque mulierculis nostratibus potionis genus vsitatissimum, quo veram impregnationem confortari, falsam exturbari, persuasum sibi habent.*

1. *Moretus*

1. *Moretus vsualis pro ditioribus.*
 R. Diamor. c. sacchar. ʒij.
 Iuleb. rofar.
 Aqu. cinamom. â ʒj.
 Spec. Diambri. ʒß.
 Trag. Stomach. ʒiß.
 Vini optimi, lb. i. M.
 R. Diamor. c. sacchar. ʒii.
 Iuleb. rofar. ʒiß.
 Aqu. cinamom. ʒj.
 Vini generosi, lb. i. M.

N. *Species quæ adduntur, post infusionem colando iterum separantur.*
Nodulus pro puerperis.
 R. Croc. integr. g. vi.
 Galang.
 Macis ana ʒj.
 Antophyllor. N. i v.
 Cardamom. ʒj.
 Baccar. laur. decort. N. vi.
 Dentur mixta.

C A P. L X V.

De Lapidibus.

Lapidis nomen hic fume non pro lapidibus natiuis, sed pro medicamentis præparatis, quæ veniunt nomine lapidis, vt sunt 1. Lapis vegetabilis dictus. 2. Medicamenta in duritiem terream ac lapideam excocta.

Lapis vegetabilis nihil aliud est, quam essentielles vegetabilis alicuius partes coniunctæ, ac in lapidem q. coagulata. Fitque

R. Plantam siccam ʒj. digere cum menstruo proprio (▽ propria stillatit.) stestilla, vt habeas phlegma, spiritum ac oleum. Ex remanente ac superstite materia incinerata extrahe sal beneficio phlegmatis. Ex eadem (seue eiusdem speciei planta) extrahe tincturam cum spiritu illo. Hinc imprægna tincturâ suâ s. a. ad sufficientiam. Postea adde olei quantum imprægnum illud sal imbibere potest, & in lapidem quasi coagulentur.

N. Huiusce medicamenti genus etsi in Officinis paratum non extat, opera precium tamen esset, introducere, in quo

tamen notandum, quod lentissimo igne in lapidem paulatim conuertere id oporteat.

Alias lapidis nomine veniunt. Lapis septicus s. cauterium potentiale; tum quoque lapis philosophorum, (de quibus Augustani,) & præter hos.

1. *Lapis Corrosiuus.*

R. Lixiuum, è quo sapo niger coquitur. Id sartagine exceptum coquatur in lapidem, qui tesserarum in formam scinditur, cum refrixerit, ac vitro rectè obturato seruatur.

Vires. *Cauterium insigne est, dimidie hora spacio foniculum inducere sufficiens. Heurn. in Meth. pract.*

2. *Lapis s. magnes arsenicalis.*

R. ʒ crudi.

℞ r. flau.

℞ albi.

Pulu. subtilissimè lentoque igne liquefac. Vase refrigerato eximitur materia, quæ frigore indurefcit.

Vires. *Vfus eius est in peste, ubi in forma periapti de collo suspèditur: ingreditur in super Emplastrū magneticū. Hartm.*

3. *Lapis*

3. *Lapis medicamentosus Crollij,**f. Lapis salutis.*R. \odot i virid. lb. i. alb. lb. \beta. Alumin. lb. i \beta.

Anatron, id est, fel. vitri

Sal. commun. ana ʒiij. ʒi.

Absynth.

Arthemif.

Cichor.

Persicar.

Plantag. à ʒ. i.

Ponantur in olla vitreata, affunde parum aceti rosacei, ac coque igne l. f. apius agitando: vbi incipit spissescere, adde

Cerus. lb. \beta. Boli armen. ʒ. i v.

Diligenter miscantur omnia, donec vi ignis mediocris in lapidis duritiem massa concreuerit, quæ postea fracta olla eximenda, & ad vsus referuanda.

N. Si gummata, myrrham videlicet & thus, addere voles, instituaturn coctio lenta, comburantur, nec vis illorum in igne evanescat.

Vires. Virtutes eius varie sunt. Tollit ulcera & defluxiones; desiccatur vulnera inueterata; curat erysipelas, scabiem, tineam, serpigines.

Modus utendi.

Liquefcat eius ʒj. in ∇ pluvial mensura i. filtretur, filtratura hac utere, iñm lauando, iñm linteolum imbuendo ac imponendo.

4. *Alia descriptio, Ioannis Greiff.*R. Alumen. ʒ. i v. \odot li vngar. vir. ʒij.

alb.

Tartari.

Borrac.

Mastich.

Thur.

Sal \ast à ʒj. Cerus. ʒ. v i. Boli arm. ʒiij.

Crasso modo contusa, coquantur in olla vitreata capaci, cum + fortissimo, vt supra. *Hartm. in pract.*

5. *Alia.*R. \odot lb. i. \odot lb. \beta.

Cerus.

Alumin.

Boli armen. à ʒ. i v. Sal ammoniac. ʒij.

Omnia bene trita coque l. ∇ . cum + ad eminentiam digit. 2. affuso in olla satis capaci, donec omnia redigantur in lapidem durum.

6. *Alius Lapis salutis.*

R. Alumin.

Myrrh. à ʒiij. \odot i alb.

Anatron.

Cerus. à ʒij. Thur. ʒj.

Boli armen.

Ærugin. à ʒ. i v.

Tere simul, & cum + q. s. coque ac coagula in lapidem.

7. *Lapis mirabilis,*R. \odot i alb.

virid.

Sacchar. fin.

 \odot i ana lb. i. \beta. Sal \ast ʒi \beta. Alumin. crud. ʒ. i v. Camphor. ʒj.

Minutissime pulverisata, misceantur cum muria siue brodio oliuarum conditarum, vt fiat instar mellis. Coque dein lente & coagula in lapidem.

Vires.

Vires. *Easdem vires obtinet cum prioribus lapidibus salutis.*

8. *Aliter: Lapis rubens dictus,*

℞. Vitriol. roman.

alb. ana lb. i. ℞.

Alumin.

Litargyr.

Lap. calamin. ana ℥ i v.

℥. albi puri.

Sal. ammoniac.

Commun. ana ℥ ℞.

Affuso aceto coque l. Δ semper agitando, & cum incipit spissescere adde

Ceruf. venet. lb. ʒ.

Boli arm. ℥ i v.

M. diligenter, & coque in duritiem lapidis.

CAP. LXVI.

De Liquoribus.

Liquores hîc voco humores per deliquium, aut similiter paratos.

N. *In his excellunt salia resoluta, quæ Balsami, vel interdum olei nomen, licet minus accurrate, sibi vendicarunt.*

Resoluuntur salia per deliquium, si veri humido exponantur, vel & humore aqueo imbibantur: reliqua quia peculiarem modum obtinent, quo in liquorem redigantur, specialiter suis locis innotescunt.

Liquores vſitationes ſunt.

Liquor. Salis ammoniaci.

Arsenici.

Corallorum

Cryſtallorum

Sâlis gemmæ.

Lapidis Iudaici.

Ludi f. calculi humani.

Oculolum cancri.

Perlarum.

Saturni.

Talci.

Tartari, i. e. oleum ¶ i.

Huc Liquor. Lumbricorum.

Myrrhæ.

Commendatur itidem maximopere Liquor Lubronripticus compositus.

℞. Ocul. cancr.

Lapid. Iudaic.

Lyncur.

Spongir.

Ætit. ana q. v.

Pulueratis affunde Spiritum Salis ad digit. 3. ſtent in ſolutione ꝑ aliquot, hinc depleatur ſolutio, reſtitantque materia, nouo ſpiritu ſalis affuſo denuo ſolutioni ſubmittatur, donec tota ferè ſoluta ſit. Solutiones confuſas coagula euaporando vel abſtrahendo. Coagulatum tritum ſolue per deliquium, liquorem hunc coagula iterum, ac ſolue, idque repete donec coagulationem vltiorem admittere nolit.

Vires. *Maximarum cenſetur virium in calculo reſoluendo.*

Dofis gutta 4. 5. & c. indies propinata. Vide Medull. deſt. part. i. tr. 10.

Liquor ad vlcera.

℞. Calc. viu.

Sal. ammoniac. ana.

Læuiga ſimul & funde ad ſollem fuſione maturata, & confluit vt ¶. quam effunde. Maſſæ huic tritæ adde ſal tantundem ac fuit alterutriuſ, reponetque in cellam ad liqueſcendum.

C c Vires,

Vires. Sanat impetigines, ulcera fistulosa, aliaque maligna & inueterata mundificat, & ad sanationem disponit,

proin confert in cancro, serpigine, lue venerea, & simil.

CAP. LXVII.

De Magisteriis.

Magisterij nomen etsi æquiuocum sit, uti libr. 1. dictum: attramen communiter vsurpatur pro puluere, ut plurimum, candido, per præcipitationem ex certis quibusdam rebus præparato. Res illæ tum è mineralibus sunt, ut terræ & lapides, tum è vegetabilibus, ut Herba, &c. tum ex animalibus; ut ossa, cornua, crustacea.

Modus fiendi.

R. Materiam ex qua Magisterium parare constitutum est, tere aut comminue grossè, hinc affunde liquorem conuenientem, acidum vel similem ut soluiatur vel extrahatur; solutio præcipitatur (affuso liquore vel materia cuius vis soluentis vis obtundatur,) præcipitatus pulvis abluatur si opus sit ∇ communi, hinc exiccetur lente.

Sic fiunt

Magisteria.

1. E Mineralibus.

Tritis affunditur soluens, soluiturque s. a. solutio præcipitatur, eluitur & ficcatur.

N. 1. Liquor soluens vulgariter adhibetur \times , tum per se, tum acuatum per $\text{Sp. } \odot$ vel similes spiritus minerales, scil. \odot , \ominus &c. vel peculiaris destillatur solutioni aptus liquor, de quo suis locis.

N. 2. Præcipitatio fit communiter oleo H i p. d. nonnunquam spiritus \odot i. illo modo grisea aliquatenus euadunt præci-

pitata; hoc; albescunt magis.

N. 3. Quæ consistentia sunt durioris, ut lapides, antea calcinari volunt. Vide specialius lib. 3.

2. E Vegetabilibus.

1. Tritis grossè vel incisis affunde lixiuium forte ex \ominus H i & ∇ pluuiiali paratum, extrahatur, decantetur ac præcipitetur affundendo aquam aluminis (in qua O solutum) exicca lente.

N. 1. Præstat adhibere herbas mediocriter siccas.

N. 2. Sic nobis in usu sunt tam ex alterantibus, quam purgantibus, verbi gratia. Magisterium Rhabarbari, cuius dosis $\mathfrak{z}\text{ss}$.

2. Sulphureis, i. e. quæ oleosa parte scatent, extrahitur Tinctura beneficio V . rectificatiss. præcipitaturque affusa aq. com. vel ∇ aluminis.

N. 1. Sic fit, Magist. Resinarum, Succini, Corticum resinosorum c. gr. cinam. Turpetb. Chalapp. &c.

N. 2. Extractis Cat. non immerito annumerari poterunt.

3. Ex animalibus.

Ossa, Cornua, Crustacea seu Testacea exhibent sua magisteria modo qui de lapidibus traditur. Videlicet beneficio \times vel spiritus alicuius mineralis, acidi & acris.

Vsitiora sunt

Magister.

Concharum

Concharum.
Corallorum rub.
alb.

Cornu Cerui.
Cranij humani.
Chrystallorum.

Dentis apri.
Granatorum.

Hyacynthor.

Lap. Iudaici.

Magnetis.

Mandibularum lucij.

Matris perlarum.

Oculorum cancri.

Ouorum struthij.
Percarum lapillorum.
Perlarum.

Rubino.

Saphiror.

Smaragdorum.

Terræ sigillatæ.

Tutiæ.

Vitri Venetiani.

Vngulæ alcis.

Sic & Mag. Ialappæ.

Scammonij.

Succini.

Turpethi.

C A P. L X V I I I.

De Masticatoriis.

Masticatoria, *Δισκωδοντα* sunt apophlegmatizantia ita dispensata, vt dentibus mastificentur.

Fiunt modis tribus:

1. Simplicia, vel integra, vel in pulueres redacta, concisaue mastificantur; vt Mastiche, vniæ passæ, pyrethrum, cubebæ, folia saluiæ, agaricus, & simil.

2. Eadem contusa nodulo includuntur, qui ori inditus dentibus subinde comprimitur.

3. Eadem cum cera, mastiche, carne passularum ficuumue, terebin-

thina, melle, & simili in massam subiunguntur, dentibus submittenda, verbi gratia.

℞. Rad. pyrethr. ℥j. Nucist. Zinzib. ana ℥ij. Mastich. ℥j. Dissoluatur Mastiche in pista calida cum pistillo, hinc cætera admisceantur subigendo in massam, vel pastillos mastificabiles pondere ℥β.

Item.

℞. Rad. Pirethr. Mastich. ana ℥β. subigantur cum cera in morsulos magnitudine auellana.

C A P. L X I X.

De Morsellis & Rotulis.

Morselli, (Morsuli Tabulæ,) ex omnibus Medicamentorum generibus fieri possunt, quæ non respuunt cum saccharo soluto commisceri, inque placentas indurari. Talia sunt pulueres, Semina, (minutiora) condita, Conseruæ, Olea, Extracta: Inprimis tamen ad morsellorum compositionem cooptantur pulueres, de quibus tamen notandum, quod non opus sit æque subtiles eos recipi, ac in rotulis.

Modus fiendi.

R. Sacchari q. s. solue in liquore debito super ignem: hinc coque ad consistentiam, vt Frigefactum induretur, (probare id poteris tantillo in orbiculum stanneum vel lapideum effuso:) Hnc immisce sensim pulueres, optime agita, effundeque dum adhuc calore liquidum est, supra tabulam cupream lapideamvè, vtrefrigescat & induretur, demum scinde in tabulas.

N. 1. In purgantibus loco sacchari recipi potest Manna, cuius proportio vti & sacchari pro Medici voluntate adhibetur: vt plurimum recipitur sacchari sextuplum, octuplum, &c. prout res immiscende fortiores vel inoratiores fuerint, e. gr. ad Extracta & Olea destillata maior sacchari quantitas expetitur.

N. 2. Nuclei ac semina emulsioni apta, si ad morsellorum constitutionem concurrant, pro libitu in emulsionem redigi poterunt, quæ saccharum dissoluantur.

N. 3. Condita, duplici modo morsellos faciebunt. 1. Conquassata. 2. In frustula incisa.

N. 4. Olea destillata si occurrerint in fine ea instillare oportet, vel paratis morsellis illinere. Idem Iudicium sit de Moscho ac Ambra, quæ in aqua rosar. dissoluuntur, atque paratis tabulis illinuntur.

Vstatiores sunt alterantes.

Morsuli.

Bezoardici è pulu. bezoardic.

Cephalici è speciebus cephal.

è succo & corticibus citri, s. de citro, vide infra. N. 1.

Imperatoris, è spec. Imper.

Pectorales, 2.

Post pastum, A.

Saccharum rosarum tabulatum.

Saponea, A.

ad Vermes, A.

Zingiberis cocti, A.

Purgantes vstatiores.

Morsuli.

Diacarthami, A.

Diaphanic, A.

Diaturbith. cum thabaarb. è speciebus,

de Diagrydio, s. laxatiui, v. infr. 3.

de Manna, s. at. vid. lib. 4.

de Mechoaca, 4.

è succo rosarum, A.

1. *Morselli de Citro.*

R. Carn. citr.

Citr. citr. condit. concis. à ʒj.

Ol. citr. gran. xij.

Succ. citri puriss. q. s.

Sacchar. in ∇ citri sol. ʒxv i.

F. l. a. Morsuli.

Sunt Cordiales, vt citrum.

N. Finnt

N. *Fiunt & simplices è succo, corticibus & saccharo.*

2. *Morsuli pectorales, F.F.*

℞. Pinear. rec. in ∇ rosar. parat. ʒi.

Amyg. d. excort. ʒv.

Sem. Melon. rec.

Cucum.

Cucurb. à ʒij.

Spec. Diarrhod. abb. ʒiv.

Mag. perlar. ʒj.

Sacchar. alb. in ∇ rosar. & scabios. fol. ʒxvi.

F. l. à Morsuli.

Sunt nutritivi, refrigerantes, acrimoniam mitigantes, adeoque conveniunt in hectica.

3. *Morsuli de Diagryd. flaxat.*

℞. Crem. ʒij.

Refin. scammon. ʒb.

Sacchar. in ∇ rosar. fol. lb. i.

F. Morselli.

Purgant bilem.

Dosis adulto ʒb.

4. *Morsuli de Mechoacha, F.F.*

℞. Conferu. violar. ʒj.

Spec. Diatragac. fr. ʒi.

Turbith. gum.

Mechoac. alb. ana ʒb.

Diagryd. præpar. ʒij.

Ol. cinam. still. gran. vi.

anif. gran. iv.

Sacchar. in ∇ fanic. fol. ʒxiv.

F. l. a. confectio in morsuli.

Purgat bilem ac phlegma.

Dosis à ʒb. ad ʒi.

Vide part. i. l. 4. observat. Cl.

Gregor. Horstij.

De Rotulis.

Rotularum parandarum modus idem est, nisi quod Rotulæ, quia formulas Morsulis minores expetunt, medicamenta requirant, quæ rotularum formationem non impediant. Pulveres ita-

que subtiles esse oportet, dosique minori.

Proportio sacchari vulgarissima est octupla, ($\frac{1}{8}$) plus minus. In purgantibus vero quadrupla, ($\frac{1}{4}$ sacch.) In oleis stillatitiis maior, scil. puluer. ʒj. ol. gran. iv. &c.

N. *Fiunt & rotulæ è succo & saccharo, si scil. hoc in illo solum ad consistentiam iustam coquatur & rotuletur. Veruntamen notatu hic dignum, Rotulas, quæ ex succis acidulis fiunt, v. gr. è succo citri non admittere coctionem, sed sola parari mixtione. Videlicet, ℞. Sacchari pulverisat. lb. i. calefcatur ad ignem lenium, hinc affunde succi, v. gr. Berber. ʒij. misce & effunde in rotulas.*

Rotulæ usitatores sunt.

Rotulæ de Berber.

manus Christi simpl.

perlar.

Diatragacanth.

✠ris pectorales.

Laxatiuæ infantiles.

1. *Rotulæ pectorales.*

℥ Sacch. albif. ʒj.

Florum ✠ benzoinat. (vt cap. de ✠ dicitur) ʒii.

Ambr. grif. gr. vi.

Mosch. Orient. gr. ij.

Ol. fœnic. gutt. iii.

Gumm. tragac. in aq. sca-

bios. infus. q. l. F. massa

2. *Rotulæ infantiles laxatiuæ.*

℥ Cranii human. præpar. ʒij.

♀ ii per sextam ☉ oneim dulcificat.

Rad. lalap. an. ʒj.

Margar. præpar. ʒij.

Confect. alxerm. ʒi.

Ol. cinnam. gutt. vi.

Sacch. in aq. scord. solut. ʒiiij. F. Rotulæ.

Vermes necant, & inde genitam Epilepsiam arcant.

Quinimo ex singulis pulueribus & speciebus, tam alterantibus, quam

purgantibus, addito saccharo in conueniente soluto Rotulæ pro rei exigentia fieri possunt.

C A P. LXX.

De Oleis Stillatitiis.

Olea proprie sic dicta, triplicis generis in Officinis veniunt. 1. Destillata. 2. Expressa. 3. Infusa ac cocta, *Olea destillata.*

Olea stillatitia ex singulis simplicium familiis parari possunt, mineralium, vegetabilium, ac animalium.

MINERALIA, quæ Oleum fundunt, maxime sunt ex genere sulphureorum; vt succinum, carbo Petræ, & simil.

Destillatio illorum eadem est, quæ resinarum vel gummatum.

VEGETABILIA primaria, ex quibus olea destillantur, sunt herba, flores, fructus semina, radices, ligna, cortices aromata.

Secundaria sunt olea, resina, gummi,

Modus destillandi olea ex primariis, eadem opera perficitur, quæ ac spiritus destillari diximus, & vt plurimum per vesicam.

N. 1. Felicius oleum ascendit. 1. Si nonnihil ☿ is vel ☿ i immiscetur.

2. Si digestio fermentatione pramittitur, cuius promouende gratia nonnihil fecum cereuisie, vel ☿ is com. ☿ inè addi poterit,

3. Si Oleum præcipue expetitur, statim auctiore igne destillatio incipi potest.

1. Ex herbis. R. Herbas virides,

vel siccas, q. v. contunde ac affunde vin, (additoque ☿ is manipul. vno ac altero, colloca ad putrescendum,) hinc destilla per vesicam.

N. Herba sicca plus olei suppeditant quam virides.

II. Ex floribus, (siccis præcipue) olea ad eundem modum destillantur, præcipue si contusi dies aliquot (14.) adiecta parte ☿ is $\frac{1}{2}$ (vel huius loco sacchari,) cum ☿ fuerint macerati. Sic sunt oleum chamomillæ, lauendulæ, rosarum, &c.

III. Ex seminibus. R. Semen, e. gr. feniculi grosse contusi, lb. i. affunde ☿ font. feruentem, q. s. addendo ☿ is M. i. (vel insuper si liber, ☿ i $\frac{1}{2}$ aut ij.) digere dies (8.9.10.) hinc destilla ☿ mediocri per Vesic.

IV. Ex fructibus, e. gr. baccis iuniperi, lauri, & similibus, simili ratione, vt dictum, oleum educitur.

N. Fermentatio promoueri potest addito tantillo fecum cereuisie.

V. Ex radicibus. R. Radices conquassæ ac digere cum ☿ aliquandiu, hinc destilla per vesicam.

N. 1. Præstant sicca, vt ☿ que collecta fuerunt, antequam in stolones abeant.

2. Maiorem olei copiam si expetis destillationis residuum cum ☿ illa destillata,

ta, macera ac destilla iterum.

VI. Ex corticibus non lignosis oleum ad eundem cum radicibus paratur modum, v. grat. ex cort. arantior. citri. & c.

N. Præstant cortices nondum exsiccati.

VII. Elignis & viscis. R. Segmenta lignorum arida, q. v. imple retortam terream, (lutatam,) ac destilla in excipulum fat amplum, igne nudo gradatim adhibito, sic extillat primum liquor clarus, continuato hoc igne post horas (4.5.) sequentur spiritus nebulosi, tandem auge ignem, ut fundus retortæ candescat, sic ascendit oleum nigricans & fœtidum, quod à liquore separa ac rectificat. Sic fiunt olea è ligno guaiaci, agallochi, buxi, coryli, ebeni, iuniperi. tantali, serpentarii, sic & viscorum coryli, querni, & simil.

N. 1. Fieri quoque possunt per descensum, sed nostratibus inusitatum est, oleumque crassius exhibet.

2. Caute procedas, nec nimium properes, spiritus enim impetuosus receptaculum disicere proclives sunt.

3. Elici quoque possunt olea huius sortis ex resinosis lignorum Extractis, ad modum resinarum aliarum destillatis. Kesi. 1. cent. 86.

4. Sunt & ligna, sed pauca, quæ oleum suum, (quod subtilius ac volatilius est,) per vesicam cum ∇ fontana destillata tarde licet, profundunt, ut sassafias, lignum rhodinum, cypressinum. Videlicet lignum serratum vel minutim incisum, mace-retur in ∆ aliquandiu, dein destilletur per vesicam; destillatione dies aliquot continuata prodit tandem oleum.

Rectificantur olea, tùm ex cucurbita, tùm ex vesica, cum ∇ copiosa quantitate destillando. Nonnunquam tamen, si ponderosiora sint, arenæ immixta

per retortam rectificari opus habent.

VIII. Ex aromatibus. R. Aromata grossè cōtusa, (pulvices minus olei fundunt,) macerentur cum menstruo idoneo, per aliquot dies, (4, 5, 6,) hinc destilla per vesicam, sic prodit oleum & ∇.

N. 1. Poterit itidem & aliquid ⊕ vel ⊖, vel i admisceri.

N. 2. Alij in eiusmodi oleis elicientis amygdalas rebus addunt, ut maiorem copiam nanciscantur, sed si audulenter; etenim partem maiorem eiusce olei amygdala sibi merito vendicant.

3. Alij digerunt primo aromata in spiritu Terebinthina cohobato aliquot vicibus supra ⊕ calcinato. Verum nec hipurum oleum aromaticum nanciscuntur.

N. 4. Separatio olei ab ∇ fieri potest

1. Subsidente. Nimirum si aliquandiu (♂ 14.) destillatum immortum in cella steterit, subsidet oleum. 2. Filtrando per chartam. 3. Per gossium. Vid. l. i. c. 14.

IX. Ex resinis. R. Resinarum lb. 2. vel 3. affundatur ∇ quantitas copiosa, destilleturque per vesicam.

Sic prodibit Oleum, quod primo clarissimum stillat ∇ supernatans (dicitur vulgò Spiritus.)

Hinc incipit paulatim flavescere, muta itaque receptaculum, & suscipe flavum hoc Oleum, (si placet seorsim,) continuando destillationem, donec nihil olei amplius extillet, (dicitur Oleum.)

Tandem exime materiam in vesica resistantem, (quæ colophonia dicitur,) eamque destilla ex retorta in arena, & extillabit oleum crassum rubrum, (Balsamus vulgò.)

N. Possunt quidem Olea hæc & Balsamus una eamque destillatione per retortam

retortam elici, igne scil. gradatim adhibito, verum enimvero præstat per vesicam priora illa elicere, tum ut præcaueatur evaporation, tum quoque ne eorum æstu labor irritus reddatur, quod aliis facile accidit. Si nihilominus volupe sit per retortam ea simul destillare, æstus tunc præcaueri potest, si arenam resina liquefacta immiscueris.

Sunt autem resinae usitate Lentisci, (Terebinthina cypria,) Laticis, (id est, Terebinthina vulgaris,) pini.

X. Ex gummi-resinis. R. Gummi-resin. lb. 1. inde retortæ vitreæ, (ventre capaci) ut saltem tertia pars impleatur, destilla per arenam in receptaculum, aliquota parte v. e. adimpletum, primo v. lento, & prodibit oleum: dein auctiori, & extillabit Balsamus.

N. 1. Ut feruescentiam præcaueas, arena aliquid admiscere poteris: Alij loco arena addunt triplum silicium grosse contusum, vel salis aliquid, quo ascensionem olei promoueant.

N. 2. Rectificari potest hoc oleum per cineres cum v. destillando, vel & laterum fragmenta ignita eo imb. bendo, atque ita destillationem peragendo, non secus ac destillatur oleum de lateribus.

Sic fit Oleum è Gummi. Anime. Elemi, Tacamahaca.

XI. Ex gummatis, (præcipue ferulaceis) Olea elici possunt ad eundem modum quo ex resinis. Nimirum oleum subtilius per vesicam cum v. destillando elicitur, crassius ac ponderosius per retortam. Vel si manis destillatione vna eademque vtrumq; per retortam elicere, destilla in initio calore leniori, ac suscipe oleum subtilius seorsim; dein collige crassius igne auctiori. Præstat tamen per vesicam, ut de resinis dictum.

N. Feliciter eliciuntur hæc olea ex Ex-

tractis resinosis, ad modum quem in resinis dedi.

Reliquorum oleorum præparationes, si qua ab hisce discrepant, specialius in singulis edocebimus.

Ex ANIMALIVM familiâ exhibent Oleum, cornua, medulla, cerebri, ossa, ungula, pinguedines sanguis, stercora, (vide de vis.)

Cornua, ossa, ungula, igne nudo per retortam (terra lutatam) pelluntur, funduntque vno ac eodem labore liquorem seu spiritum acidum, (phlegmatè commixtum,) oleum ac sal volatile. Oleum id rectifica.

Medulla, cerebri ac spina fundit oleum, si admisto E per retortam vitream ex arena destilletur.

Pinguedines (axungia, sebum, butyrum, cera,) destillantur aliis rebus commixtæ, ex cucurbita vel retorta vitrea idque per cinerem aut arenam; commiscuntur autem, vel cum lateribus puluerisatis, vel cum silicibus calcinatis, vel cum cinere arenae, ut eo facilius oleum ascendat.

N. Quantitatem rei adiicienda edocebit pinguedinis destillanda consistentia, quæ in aliis mollior, in aliis durior, plerumque autem sumitur pars tertia vel quarta, interdum pondus æquale.

Sanguis destillatur igne nudo ex cucurbita figulina alta ac spaciofa, ad remanentiam terræ nigrae, levis ac spongiosæ. Destillatum liquorem filtra per chartam, & transibit liquor, remanente in charta oleo færente, (in parua quantitate.) Liquor hic exhibet spiritum, Salque volatile hinc inde vasis destillatoriis adhærescit.

N. Præstat sanguinem calentem recipere, (metretas scil. 2. vel 3.) cumque in MB, clauso vitro digerere (9. vel plures)

plures) hinc per gradus destillare.

Olea destillata vſitatoria.

Oleum Abſynthii

Anethi

Angelicæ

Aniſi

Aurantiorum

Butyri maialis

Benzoin

Calami aromatici

Camphoræ

Cardamomi

Carui

Caryophyllorum

Cerærectificat.

Chamæmeli

Chærefelij

Cinnamomi

Oleum Citri cort.

Cymini

Cubebærum

Euphorbii

Galbani

Guaici

Hyſſopi

Iuniperi è baccis.

ex ligno, Auguſt.

Laterinum Philoſophorum A.

Macis

Maioranæ

Maſtichis

Meliſſæ

Menthæ

Nyrrhæ rectific.

Nucis moſchatae

Origani

Piperis

Pulegii

Roriſmarini

Roſarum

Saluiæ

Saponis

Saluinæ

Serpilli

Smegmatis

Spicæ

Succini albi

flau

Tartari.

Terebinthinæ.

Zedoariæ.

Zopiſſæ.

C A P. L X X I.

De Oleis expreſſis.

Exprimuntur Olea ex feminibus ac nucleis nonnullis oleoſis.

Modus.

N. 1. Nucleos ſiccōs (e. gr. amygdal.) non rancidos, excortica ac contunde in mortario lapideo minutiffimè, hinc inde ſacculo, ac exprime fortiter ſub prælo.

N. 1. Preſtat ut plurimum maſſam illam tritam in ſartagine torrere, vel va-

pore ∇ calida tepefacere. Exemplo ſit vulgaris ille modus exprimendi olea ex ſemine Linis, papaueris, & ſimil.

N. 2. Eliciantur quoque Olea, ſed pauca, per decoctionem reſin ∇ qua decoctione pars oleoſa ſupernatat: ſic fit Baſſamus peruianus, oleum lauri, & ſimilia.

N. 3. Olea ſine Δ expreſſa ſunt ſaporis gravioris.

D d

Vſitatoria

Vſitatiora ſunt.

Oleum Amygdalarum amarum, dulce

Auellanaarum, A.

Balaninum è balano myre-
pſica.

Cannabis

Oleum Carthami, A.

Ceraſorum ex nucl. A.

Citri è granis, A.

Erucae ſem.

Hyoſcyami. ex femin.

Iuglandium, ex nucleis.

Lauri, A.

Lini ſem. A.

Macis.

Nigellæ, ex ſem.

Nucis moſchatae, A.

Oliuarum ex oliuis maturis.

N. *Hoc Oleum intelligitur, quoties**Olei ſimpliciter mentio fit.*

Omphacinum ex oliuis immaturis.

Ouorum, ex vitellis.

de Palma, ſ. de palla.

Papaueris.

Perſicorum nucleor.

Pinearum.

Piſtaciorum, A.

Raporum ſem.

Ricinum, ſ. de Cheruâ

Sefaminum, A.

C A P. LXXII.

*De Oleis per infuſionem & coctionem, &c.***O**lea hæc tum ſimplicia, tum com-
poſita officinis vſitatiffima ſunt.*Modus parandi.**1* *Simplicia* recentia incifa coquuntur in oleo mixto aquæ, vino, aliue liquoribus conuenienti, idque tantisper, donec humiditas aqua exhalarit.*2* *Sicca ſimplicia* in oleo mero macerantur.

Commodior modus hicce eſt.

Herbis exiccatis ac pulueriſatis affunde oleum, digereque in NB horas (12) dein exprime fortiter, expreſſionem expone calori leni, vt feces ſubſideant, quas ſepara.N. *Oleum communiter adhibetur oliuarum, interdum omphacinum, vel aliud, de quo peculiaris ſemper occurrit admonitio.**Vſitatiora Olea inſolata ſimplicia.*Oleum Abſynthii, cum Oleo Om-
placino.

Abrotani.

Anethi.

Chamæmelinum

Cheyrinum

Cydoniorum, c. Omphac.

Enulæ, c. O. Sefamin.

Euphorbii, c. Ol. Cheyrino.

Febrifugum. 1.

Formicarum

Hederæ terreſtris.

Hyperici comp. Goleri. 2.

Ellenberg. 3.

Iaſminum.

Irinum.

Ligutriaum, Cyprinum
de Alcanna.

Lilinum.

Liliorum conuall.

Lumbricorum, c. Ol. Omph.

Maſtichi

Mastichinum, c. Ol. Omph.

Menthæ, cum Omph.

Melilot. ex fl.

Momordicæ, ex fruct.

Myrtillorum, c. Ol. Omph.

Myrrinum, c. Ol. Omph.

Nardinum simpl.

Nicotianæ

Nymphaeæ alb. c. Ol. Omph.

Pestilentielle. Bartol. 4.

Populeum

Purgans comp. 5.

Ranarum

Rosatum vulgare

Omphacinum

Rutæ

Sambucinum

Scorpionum simp.

è Styrace

Verbasci

Vernisium. Vernix, c. Ol. Lini

vide libr. 4. Juniper.

Violarum ex fl.

N. *Huc pertinet & Balsamus & is Lithargyri, & simil. quæ nihil aliud sunt quam oleum s. spiritus Terebinthina mineralibus illis imprægnatus.*

Olea cocta composita.

Oleum de Capparibus.

Castorei

Costinum

Croci

Hyperici

Liliorum

Maioranæ. f. Sampsuchinum

Mandragoræ

Moschellinum

Nardinum comp.

Papauerium

de Piperibus

Resolutivum

Rosarum Mesuæ.

Scorpionum compo-

tum magnum

Stomachale Cratonis

Vulpinum

Zanetinum Melichij.

Cord. in append.

1. *Oleum febrifugum Serobelbergeri.*

2. Ol. Nymphaeæ vnus saltem annis

Lumbricor.

Rosar.

Hyperic.

Amygdal. am. à 3j.

Mixtis impone scorpiones viuos.

N. 1x. Exponentur soli (paretur si possibile in ingressu ☉ in signum my vel ☿.) donec moriantur scorpiones, tunc etiam adde

Theriac. Andr. opt. 3ß.

Relinquantur in solari per ☿. 14.

Vires. *Easdem vires cum aliis scorpionum oleis libr. 5. descriptis obrinet. Inprimis tamen inseruit Emplastro febrifugo conficiendo.*

2. *Oleum Hyperici compositum s. Balsam Hyperici. Nobiliss. Georg. Goleri à Rabenstem.*

3x. Oleum Hyperic. opt. lb. 1.

Vini generos. sextar. tres

Ol. Terebinth.

Laterin.

Lumbricor. à 3ij.

Cetæ 3j.

Pinguedin. human. destillat.

Ol. de medulla (hum. vel ceru.)

destill. à 3iij.

Theriac. Andr.

Mithridat. à 3j.

Visc. querc.

Til.

Coryl. à Mj.

Fol. Persicar.

Rut. murar.

Pyrol. à M. iij.

Flor. Antirrhin. M. viiij.

Dd 2 Hyperic.

Hyperic. M. iv.

Verbas. M. ij.

Betonic.

Centaur. min.

Prunell.

Consolid. aurca.

Parnic. Austriacæ

Chelidon. à M. i.

Sem. Antirrhin. ʒiſs.

Hyperic. ʒiſs.

Rad. Dracuncul. maculat

Aristoloch. rot.

Symphyt. à M. ſs.

Scrophular.

Fabariæ l. Crassul. mai. à Mj.

Bulliant siue coq. in diplomate vase optimè clauso, ud consumptionem Vini. Exprimantur fortiter; postea imponantur:

Croc. ♂.

Mumia.

Mastich.

Thur.

Myrrh. à ʒij.

Denuo coq. leuiter, dein pro circulatione ponantur ad solem, hyeme ad fornacem.

N. Non opus est prædictum oleum vel Balsamum de nouo sæpius conficere, siquidem Balsamus iste ad solem collocatus facile ex nouis floribus, superius annotatis & foliis Persicariæ & Pyrolæ, nec non de semine Hyperici augeri potest, & de nouo restaurari, & tantum iniiciendo & ad tempus aliquod in sole digerendo, postmodum hyeme colando & ad fornacem collocando. Quo enim vetustius hoc oleum fuerit, eò efficacius & nobilius euadet.

Vsus & Applicatio: 1. Hoc oleum siue Balsamus excellentissimus existit contra hausta venena, introsumptus: Hac tamen conditione, ut prius concitetur Vomitus

per lixtiuum vel oleum oliuarum calidè bibitum, vel quod melius per ∇ Nicotiana s. Tabaci.

2. Calculum & arenas pellit, sæpius in oño cocto assumptum.

3. In magna quantitate exhibitum vermes ventris necat & expellit, præsertim si in ∇ Persicariæ exhibeatur.

4. Prædicto modo usurpatum, corpus ab omni corruptione & multis vlcerib. præseruat, ut planè nulla in corpore humano siue interius siue exterius nasci queant.

5.6. Auriginem quoque & Hydro-pisindiscutit.

7. Interna itidem vulnera & qua confusa sunt mirabilieffectu curat.

8. Vomitus sanguinis & Dysenteriam vi compescit atque constringit.

9. Vulnera omnia externa, qualiacunque sint, etiam ea quæ Venenatis armis inflicta fuerunt, mira celeritate Balsamica vi contrahit atque conglutinat, omnia alia vulnerum symptomata prohibens actollens, si linteola rasa in eo madesiant & vulnerib. imponantur, illa sæpius lauando & extergendo. Possunt insuper hoc oleo omnia Emplastra Stictica, quemadmodum & reliqua in sua virtute & efficacia sola malaxatione confortari, ut maioris inde virtutis & energie sint.

10. Incapitis v. vulnerib. ubi cranium quoque ad duram vel piam matrem lalum fuerit, optimè & studiose cauendum, ne prædicta linteola nimis humida vulnerib. supponantur, sed antea perquam bene expressa sint: Si vel una gutta sola super duas illas membranas caderet, iam de vulnerato actum esset & insaniam incurreret.

11. Præterea omnes impressiones magicas, ab imaginatione, iaculatione, imprecationibus

precationibus & lamiarum prestigiis infestas, stupendo plane modo irritas facit, & persanat, tam interius assumptum, quam exterius illitum, applicatumue.

12. Quod si alicui cultri, ligna, vitra, seta, panni lacerati, fila, acus, crines, resta & quaecunque alia intra corpus & stomachum vel & gulam, unde suffocationis periculum incurrat, per incantamenta & prestigias impasta fuerint, sique nullis aliis medicamentis cedere velint, hoc oleo inungantur, ac ipsis quoque adhibendum exhibeatur, quantitate trium cochlearium. Admirabilem vim experieris: vel enim praedicta omnia, per aliquod magnum vlcus excitatum, tanquam aliquod emunctorium protruder, vel per vomitum reiciet, aut tandem per inferiora coget, ac tandem ager penitus incolumis citra omnem perditionem euadet: Balsamum hunc mecum communicauit Clariss. Dn. D. Iohan. Christophorus Gissenmenger. Physicus Imperialis, Reip. Heilbronnensis, Amicus ac Fautor meus honoratissimus.

3. Oleum Hyperici compositum D. D. Erhardi Ellenbergij.

R. Fol. Hyperic. recent. M. iij.

Contunde modicè, deinde superfunde

Ol. de scorpion. simpl. lb. iij.

Ponantur in ☉. per ☞ 4. Postea in M. per ☞ 24. coque & fortiter exprime. Cola oleum per Colatorium vino albo lotum. Deinde adde.

Flor. Hyperic recent. contus.

M. iij.

Relinquito denuo ad solem ☞ ☞ 4. & mox coquito in M. cola vt ante. Idem repetendum cum florib. sem. per recent. bis teruè, donec oleum sangui-

neum acquisuerit colorem. Hinc

R. Cymar. (semin.) Hyperic. immaturatum, modico vino albo generoso madefactum lb. iij.

Coque in M. per ☞ 3. postea exprime vt ante, & hoc reiterandum quater, semper cum cymis recentib. Post hac

R. Card. sancti. (benedict.)

Meliss.

Verben.

Scabios.

Betonic.

Chamaedr. à M.

Contunde modicè & coq. in M. per triduum: deinde cola. Colaturæ iniciantur

Sum. Galeg.

Scord. rec. an. M. i.

Centaur. min.

Diptamn. crer.

Rorissarin. à M.

Coq. in oleo prius herbis contusis per ☞ 3. in M. F. colatum. Deinde

R. Rad. Zedoar.

Diptamn. alb.

Angelic. gummos.

Aristoloch. vtriusque

Carlin.

Valerian.

Gentian.

Tormentill.

Vincetoxic.

Cort. citr. ana 3 lb.

Contusa infundantur & coq. per 4. in M. & exprim. fortiter ac ingerim iniciantur.

Caryophyllor.

Macis

Scœnanth. à 3 lb.

Santal. rubr. 3 lb.

Bacc. iunip.

Laur. à 3 lb.

Cinam. ac. 3 lb.

Benzoin.

Benzoin.

Storac. cal. à ʒvi.

Contusa & hæc ponantur in MB
per ʒ. 3. dein coletur. Postea
℞. Bufon. N. ij

Natricem N. 1. { Serpentem no-
bis Væck dictâ
seu Boam.

Aranear. viu. N. CC.

Iniiciantur in oleum prædictum
& coque per ʒ. 2. Postea abiiciantur
& imponantur.

Rha barb. el.

Myrrh fin.

Aloë Epat. à ʒij

Croc. ʒj

Spic. nard. ʒiʒ.

Theriac. Andr.

Mithridat. an. ʒvi.

Coque in diplomate per 4. nec
amplius coletur, sed conseruetur pro
vfu.

Vfus. Valet præcipue contra omnia
Venena. Illinitur arteriis manuum, pe-
dum & cordi, repetitur illitio tribus al-
ternis horis. Pestem tam curat, quam præ-
seruat. Febriles insulsi arcet (multum
dorso, & meta carpiis manuum, pedum-
que plantis.) Dolores colicos demulcet.
Vriam prouocat. Vermes per secessum ex-
pellit (illitum umbilico:) Valet ad vulnera
que vel ab animali venenato, vel ferro in-
fecto sunt infecta. In paronychia nihil
præstantius, si statim ab initio antequam
inflammatio venenosa supervenerit, facta
fuerit inunctio.

Hoc oleo siuere ex communicacione Ia-
cobi Holzapffel Pharmacopaino stratis
diligentissimi, Affinis mihi dilectis-
simi.

4. Olenm antipefilentiale Bartol.

Bonacursu Itali.

℞. Flor. hyperic. lb. 1.

Rad. tormentill.

Carlinæ

Aristol. rot.

Centaur. maj. an. ʒvi.

Sant. omnium

Spic. nard.

Celt.

Licetamn.

Bacc. iuniperi

Zedoar.

Gentian.

Imperat.

Card. ben. an. ʒʒ.

Carpobals.

Doronic.

Cort. citri

Fol. persic.

Artemisf.

Rutæ

Beton.

Scord.

Camædr. an. ʒiij

Radic. Pimpin.

Valerian. maior.

Vincetox.

Been vtr. an. ʒiijʒ.

Antor.

Scorzon.

Bistort. an. ʒvi.

Moschi

Maceris an. ʒij.

Caryll. ʒiʒ.

Macerentur per 3. dies in vini malu. lb v
coq. exprim. expresso adde recentes spe-
cies supra dict s adde

Bufonem magn. viuum.

Viperam viuum

Ranam

Lacertas

Cochleas v.

Scorpion. L.

Lignialoes ʒʒ.

Theriac.

Mitrid.

Mitrid.an. ℥ij.

Benzoi.

Galbani an. ℥i℔.

Laudani.

Succini

Myrrh.an. ℥j.

Ol.hyperic.℔ij

Oliu. vet. ℔v.

Cineribus stillentur omnia, fiatq;
tercohabatio, tandem oleum decantetur,
quo inungitur cordis regio sub axillis
& inguina ad arcendam pestem.

5. *Oleum purgans compositum*

S. Cloſſei.

24 Ricini American. &c

Sem. cataput. minor.

Ebuli mundat. a. ℥ij.

Ebuli. mundat. a. ℥ij.

Rhaharb. pulueris. ℥j.

Santal. citrin. ℥℔.

Contund. fortiter, donec abeant in
pastam, ex quâ per expressionem fortem,
eliciatur Oleum.

*Dos. gutt. vj. in infculo prapingui, alias
ardorem in gutture excitat, quamobrem
à nonnullis pilula unica ex mi-
câ panis duabus guttulis huius ol. ine-
briatâ fingitur, vel inter duas oblatas
concluditur. Purgat à vxo & p̄cto hydro-
pe affectos.*

CAP. LXXIII.

De Pilulis

Pilulæ fieri possunt 1. ex rebus qui-
buscunque siccis, beneficio viscidis
ac glutinosi alicuius liquoris (Syrupi,
Mucilaginis, Succu aliquantulum
inspissati, Extracti, & simil.) incor-
poratis.

2. Ex folis succis extractisue in-
inspissatis.

N. 1. *Salia liquationi fermen-
tationique apta sunt, idcirco si qua
admiscenda, in minima dosi admisce-
ri volunt.*

N. 2. *Extracta vel succi in-
spissati rediguntur commodius in
pilulas, si addatur nonnihil pulue-
ris appropriati, quam si sola inspissatione
incrassentur.*

N. 3. *Potest & olei guttula vna
ac altera instillari.*

Modus fiendi.

2. Medicamenta conuenientia
(pulueres,) atque cum liquore
viscido conueniente, contunde quam
optimè in mortario, vt exactè cuncta
misceantur ac cohæreant.

N. *Pilula etsi ex omnis gene-
ris medicamentis parari possint, ra-
riores tamen sunt alterantes, crebriores
purgantes.*

Sunt

Pilula alterantes vſtatiores.

Pilulæ de Bdellio, August.

Bechiæ, Cord.

*Pilulæ Bechichæ albæ } conueniunt
nigræ } cum Tro-
chiscis, à quibus sola
forma differunt.*

de Castorio, A.

de Cynoglossa, A.C.

Renod.

Diaphore

Diaphoreticæ, *vide infra*, N. 1.

Diureticæ, 2.

Antepilepticæ, 3.

Febriles, 4.

Narcotice Plateri, 5.

de Stryace S. Clofs, 6.

contra Tussum, 7.

Pilulae purgantes.

Pilulae de Agarico Mesuæ, A. C. R.

Aggregatiuæ maiores Mesuæ f.

Polychrestæ, A. C. R.

Aggregatiuæ minores Mesuæ A.

Alephanginæ, s. aromatica,

Pilulae Solis Mesf. A. C.

Alephanginæ Valerii Cordi

de Aloë lota, A. & C.

rosata, A.

& Mastiche, A. C.

de Ammoniaco, Querc. inf. 1.

Arabica Nicolai, A. C.

Arthritica, s. arthetica, A. C.

Arthritica Schæffer, 2.

Affaieret Auicennæ, A. C. R.

Aureæ Nicolai, A. C. R.

N. *Alias Pilulas huius nominis conscripsit Marsilius Ficinus, quas & Magicas vocat, vide VVecker.*

Pilula Benedictæ, A. C. 3.

Cholagogæ, Querc. v. 4.

Ante cibum.

N. *Pilularum, quas ante cibum appellant, varia occurrunt descriptiones. Sunt enim qui omnibus pilulis stomachicis id nominis imponunt. Renodius stomachias Galeni ita communiter appellari ait VVeckerus diuersis exhibet descriptiones. pilularum ante cibum, tum & pilularum ante & post cibum, dictarum.*

Pilulae de Colocynthide Damasceni, A. C.

Dicuntur & hoc nomine Pilulae de Nitro Tralliani.

de Elula, Fernelij, v. 5.

de Eupatorio maiores, Mesuæ, A. C. R.

N. *Potius Pilula de Rhabbaro dicenda sunt.*

de Euphorbio Mesuæ, A. C.

de Euphorb. Quercetani, 6.

Febriles, 7. 8.

Febrifugæ Schæffer, 9.

Fœtida Mesuæ, A. C. R.

de Fumaria Auicennæ, A. C. R.

Gun. mosæ, 10.

de Hermodactylis, A. C. R.

de Hiera picra, A. C.

Hiera simpl. A. C.

de Hiera cum Agarico, A. C. composita, A. C.

Hydroticæ, A.

Hydropicæ, Bontij, 11.

Iliacæ Rhafis, 12.

Imperiales, A. C.

N. *Renodius alias exhibet, quas & Catholicas indigitat.*

Indæ Haly, A. C.

de Lapide armeno, C.

Lazuli, Mesuæ, A. C. R.

de Ladano, 13.

Lucis maiores Mesf. A. C.

minores, Cord.

Marocostina, Mindereri, 14.

Mastichinæ, conciliatoris, A. C. R.

Matricales Schæffer, 15.

de Mechoacanna, Renod.

de Mezereo Damasceni, A. C.

de quinque generibus Myrobalanorum, Tralliani, A. C.

de Nitro, s. Diacolocynthidos A. R.

Octomera, s. de octo rebus, Nicolai, A. C.

de Opopanace, Mesuæ, A. C.

Panchymagogæ, Quercet. 16.

Pestilenciales Auicennæ, s. communes, A. R.

N. *Cordo dicuntur pestilenciales, Russi, seu de tribus.*

Pestilenciales

Ruffi, A. C.

Pestilentialia composita, 17.

Antipodagrica, 18.

Polychrestæ S. Cloßi. 19.

de Rhabbarbaro Mesuæ, A. C.

de Sagapeno, s. Serapino, Mesuæ
A. C.

de Sagap. Quercetani, 20.

de Sarcocolla Mesuæ, A. C.

Sine quibus Nicolai. C. R.

Stomachicæ Alkindi, A. C.

Stomachic. Mesuæ C.

de Succino, 21.

Tartareæ melanagogæ, Querc. 22.

Tartareæ Bontii, 23.

Tartareæ meæ descriptionis, 24.

ALTERANTES.

1. *Pilula Diaphoretica S. Cloßi.*

℥ cinnabar. ♂ i rectificat. ʒj.

Præseruatiui ex croco myrrh. &
aloe ʒß.

CrySTALL. ʒ. ʒj.

Ol. guaiac. q. s. ad incorporationem

F. pill. duæ, exhibeantur super bi-
bendo cochl. i. acidi Guaiac. mixti
cum tribus partibus vini alb.2. *Pilula Diuretica S. Cloßi.*

℥ Tereb. Vener.

Galbiana part. æq. M. in mortario mar-
mor. terendo diutissimè. vsque dum si-
mul incorporentur, quod difficultate
non caret. *Dos. est à ʒj. ad ʒij. Tereb.*
Olo addita vim eius vomitiuam refra-
nat. & diureticam conciliat.3. *Pilula Ant. Epileptica*

S. Cloßi.

℞. Præcipitati solaris per se in matra-
cio Δ febrili continuo, parati ʒj.

♂ mineralis ʒiv.

Ol. ♂ febrifugi (vt dicetur cap. de
♂) gutt. xx.Extracti castor. per V euaporando
facti

Succin. ana ʒj.

de pæon. mari cum V facti

Pæon. fæmin.

Bryon. ana ʒiß.

Fol. helleb. nigr. subtiliss. triturat. ʒij.

F. puluis & cum succo porri massâ pi-
lularum, cui admisce Ol. angelic. satiu.

Spiritus Oli ana gutt. x.

*Vfus: Cap. ante paroxysmos aut post
quadram (æ pill. duas ʒj. ponderantes,
sumendo postea in sculum carniū acido
Oli conditum.*4. *Pilula febriles.*

℞. Extr. card. bened. ʒiß.

centaur. min. ʒj.

c. c. vlt. præparat.

sal. absynth. à ʒß.

Cum Syropo de card. benedict.

F. num. xx.

*Vfus. Exhibeantur ante paroxysmum,
expecteturque sudor.*5. *Pilula Narcotica Plateri.*

℞. Opij. puriss. ʒi.

Infunde V vitæ ʒß. dissolu. lento ca-
lore, eodemque exicca.Deinde alia affusa V vitæ mollescat,
additis ol. cinam. pran 2.*Postea.*

℞. Cinam. ʒij.

Sacchar. cand. ʒi.

Piper. ʒi.

Sem. coriandr. ʒij.

Croc. ʒß.

Subtilissimè puluerisatis adde
opium dissolutum, sensim opio puluēres
miscendo.Postea cum syr. de papauer. redi-
gantur in massam pilularem, addendo
moschi ʒß.Massa hæc diu in mortario agitur,
& nè exsiccet, Ol. de Been parum
subigatur. Seruetur in loco humido.
Vires. Dolores sopiunt, somnū conciliant.

E c

Dosis

Dosis gran. 5. 6. Sennert. in Institut.

6. *Pilula de Styrace sine laudanum*
Pectorale.

2. *Styrac. calamit. ʒij. a*
Laudan.

Olib.

Myrrh. an. ʒj

Succi glycyrrh. ʒiʒ.

Ambar. grif. ʒj.

Extract. Opii per X patati ʒj.

Croci cum V facti ʒiij.

M. cum

Syr. de cort. citri ʒij.

F. Massa pilul.

Dosis gran. x. Sistit pertinacissimam
tussim & catarrhum ferinum, Prag-
nantibus non sine abortus discrimine
tussientibus multoties cum successu de-
dit S. Clossens Archiater apud Me-
tenses.

7. *Pilula ad Tussim.*

℞. *Succ. Glycyrrhiz.*

Thur. ana ʒi.

Myrrh.

Croc.

Opii ana ʒj.

Cum Syr. pap. errat. q. f.

F. Massa.

Vires. Catarrhos subriles & salsos à
capite ad pectus incrassant, ebullitiones
humorum sistunt, tussimque sedant.

Dosis à gran. viij. ad ʒʒ.

Purgantes:

1. *Pilula de Ammoniaco Querce-*
tani.

℞. *Aloës cum V Endiuix solutæ &*
purificatæ, ʒiv.

Gumm. ammoniac. in. + scyllit.

soluti & colati.

Myrrhæ in Vino igne MB dissout

& dum calet adhuc, trans-

colati à ʒʒ.

Masticbis

Spec. Diatr. Santal. à ʒʒ.

Croc. ʒij.

Sal. Fraxini vel Absynth.

Cum Syrupode stæchade, vel de
succ. rosatum.

F. Massa Pilularum.

Vires. Purgant insigniter tartarum,
omnemque feculentam corporis materiam,
magnoperè conferunt aduersus omnes
defluxiones cachexias, oppilationes lie-
nis, eiusdemque duritiem & scirrhum,
febres quartanas inueteratas: præstan-
tissima sunt ad homines corpulentos eua-
cuanodos.

Dosis à ʒʒ. ad ʒj. ad laxationem alui,
alias ascendi poterit ulterius.

2. *Pilula Arthritica Guiljelmi Er-*
nesti Schæfferi Medici Fran-
cofurtensis.

℞. *Resin. Ialapp. ʒʒ.*

Essent. Rhabarb. ʒij.

Aristoloch. rot. ʒiv.

Gentian.

Tartar. vitriolat. an. ʒj.

Diagrid. rosat. ʒiv.

Mag. Chalyb. ʒj.

M. F. cum Essent. Fol. senn. Pilulæ
numero xxx. pro ʒj. & deaurentur.

Ha pilula apprimè conueniunt in ca-
tharrosi defluxionibus, imprimis; iis,
qua ad artus decumbunt, pituitam & se-
rosos humores blande educunt, & viscera
obstructionibus liberant.

Dosis v. viij. vel. ix.

Acuuntur interdum Troch. Albandal.

Mag. Gut. gemm. & c.

3. *Pilula benedicta, F. F.*

℞. *Aloës rosat. ʒʒ.*

Gumm. Ammoniac. in guttis. f.

purissimi, ʒij.

Succ. card. benedict. in spissat. ʒi.

M. cum vino albo, vel V card.
bened. rectificata.

F. Massa

F. Massa.

N. Aloë succorina purissima subri-
lissimè teritur, succus rosarum incarnata-
rum ad pulvis consistentiam permiscetur,
siccatur, teritur.

Usus ante, & post pastum, imo eius ini-
tio de fine.

Dosis gran. xv. ʒj. &c.

4. Pilula Cholagoga de Centauro
Quercetani.

R. Succor. optimè depuratorum

Centaurei minor.

Rosar. pallidar.

Eupator. Mesur.

Rad. oxylapathi à ʒiv.

Quibus adde aloës præparat. (ad
modum Quercet. vide libr. 4.) ʒvi.

Digerantur M.

hor. duodecim, ut fiat perfecta dissolu-
tio & mixtio, dein omnia coagulentur
ad mellis consistentiam.

Cui adde

Pulu. Rhabarb. ʒi.

Xylo aloës

Myrrhæ à ʒij.

Croci

Cinamomi à ʒß.

Spec. Diatr. fantal.

Trochisc. Diarrhod. à ʒi.

M. F. Massa.

Vires. Presunt in omnibus febribus
biliosis, arguato morbo, & cachexia. Je-
coris itidem catararumque partium,
nutritioni dicatarum, obstructionibus
mirificè auxiliantur.

Dosis à ʒß. ad ʒi.

5. Pilula de Esula Fernelij.

R. Cortic. rad. Esulæ minor. macerata
hor. 20. in ✚ & succo por-
tulacæ ʒij.

Grana Ricini expurgata & torre-
facta. numero xv.

Mirobalanc. citrinor. ʒiß.

Chamædryos

Chamæpityos

Spicæ nardi

Cinnamomi ana ʒij.

Omnia tenuissimè trita excipiantur Tra-
gacanth. ∇ rosar. solut. ʒi.

F. Massa.

N. Esula non sit recens, sed saltem ante
menses octo collecta.

Vires. Valde turbant, sed sunt efficaces
in corporibus robustis.

N. Minus exiccabuntur, sed & minus
efficaces erunt, si excipiantur syrupo rosa-
rum solutino, non mucagine Traga-
canthi.

Dosis à ʒj. ad ʒiß. &c.

6. Pilula de Euphorbio, Quercetan.

R. Euphorb. præparat. (ad modum Quer-
cet. vid. libr. 4.) ʒi.

Spic. nardi.

Mastiches à ʒvi.

Opopanax.

Sagapeni præparat.

Bdell. ana ʒß.

Agaric. troch.

Troch. Alhandal. à ʒiij.

Syrupi violati aciduli, q. f.

F. Massa.

Vires. Mirabiles sunt contra omnis
generis febres chronicas, intermittentes
atque quartanas, nec non contra omnes
cachexias, hydropisim & colicos dolores.
Dosis. à ʒj. ad ʒij.

N. Habet Quercetanus & pilulas pe-
stilentiales de Euphorbio.

7. Pilula Febriles s. ʒiales ad febres
Hartmanni.

R. Vitri ʒii (iusto tempore si fieri
potest, & diligentissimè) præparati. prate-
reaque cum spiritu ʒi albificati &
tenuissimè pulverisat. ʒß.

Sacchar. candi ʒiii.

Farin. tritic. ʒiv.

Fe 2 Croc.

Croc. elect. ℥j.

Coque cum v commun. l. ad confitentiam pulvis, cauendum tamen studiose, ne in fine massa aduratur, sed ferè panis formam habeat. Asseruantur in integritate sua quadriennium : Postea tandem scabritiem contrahunt, minus deinde vtilis.

Vires. Mirificè febriles mineras, aliæque symptomata exhauriunt. Exhibentur ante paroxysmi insultum, cum vestigia horroris gliscunt.

Dosis a ʒss. in pueris; ad ʒj. in adultis fortioribus.

8. *Pilule febriles ad quartanum Sennerti.*

℞. Ol. ʒ ii saccharati. ʒi.

Aloës succotr. ʒss.

Ambr. gryf. ʒij.

Croc. ʒiiß. (vel essent. croc. ʒi.

F. Massa pilularum.

Vires. Purgat per inferiora, nonnunquam per sudorem.

Dosis ʒß. ante paroxysmum, cum conseruau. g. rosarum, &c.

N. Dicitur Laudanum mercuriale,

9. *Pilule febrifuge D. D. Schæfferi.*

℞. Sp. hier. picr.

Resin. lalapp. an. ʒij.

Fecul. Aron.

Essent Rhabar.

Lign. Colubr.

Gentian.

Centaur. min.

Rosar. rub.

Diagryd. rosat.

Tartar. vitriolat. an. ʒj.

Ol. citrig. vi.

M. F. cum Essent. Fol. Sen.

Pilulæ n. x x x. pro. ʒj.

In omnibus febribus intermitentibus admodum vtilis sunt & in ventriculi compressionibus, eiusque cruditatibus à

bile & pituita ortis, vermes quoque expellunt.

Dosis iij. iv. v. vj. vij.

10. *Pilule gummosæ S. Cloß.*

℞. gummi, ammon.

Galban. in aceto scyllit. liquat.

& per linteum traiecit. a ʒiij.

aloës in vesicâ.

myrrh. ana ʒij.

mastich.

croc. Orient. an. ʒij.

turbith.

agar. trochisc. an. ʒi v.

trochisc. alhand. ʒj.

scammon. præpar. in ʒss.

balsam. Peruu. repidi ʒiij. M. omnia simul, & adde ʒ cum ʘ præcipit. ʒij.

F. Massa pilul. in alutâ ol. amygdal. dulc. inuoluenda; coquenda sunt lento Δ donec + paulatim euaporato (spatulâ semper agitando) materia in massam reducat.

Dosis Cap. ij. aut iij. instar baccarum iuniperi horâ primâ ante prand. & in ingressu tecti.

Vires. Dupliciter agunt in morbis quartanariis, hydropæ, cachexiâ, chlorosi, mensuris prouocandis, iustero utroque; primo per vim suam attenuantem & emoll. materiam præparant Catharticis expellendam; secundo humores liquatos fluxilesque redditos blandè expurgant

11. *Pilule Hydropice Bontij, Medicj apud Hollandos quondam celeberrimi.*

℞. Aloës opt. ʒiiß.

Gumm. gutt. gam. subtiliter puluer.

& cum maluatico dissoluti

& laugati, ʒiß.

Diagryd. eodem modo parat. ʒi.

Gumm. ammoniac. ʒiß.

℥ lat. ʒiß.

Cum

Cum syrup. ros. sol.

F. Massa.

N. *He sunt ille pilula, ex quibus una cum 4 reis, infra descriptis, Bontius, Principis Auriaci Medicus maximam sibi famam acquisuit.*

Vires. Educunt aquas potenter.

Dosis à ʒß. ad ʒj.

12. *Pilula Iliacæ Rhafis.*

R. Colocynthid.

Sagapen. ana ʒvi.

Diagryd. ʒij.

Cum succo porri.

F. Massa.

N. *Alij omisso succo porri, solunt sagapenum in vino, coque reliqua suscipiunt.*

Vires. Soluunt passionem iliacam ac colicam, cephalalgicis, hemicranicis salubres sunt. Verum cum iudicio vsurpanda.

Dantur à ʒß. ad ʒʒ.

14. *Pilula de Ladano.*

R. Ladan. ʒß.

Mastich. ʒj

Caliant in mortario & dissolutis adde

Troch. Alhand. ʒiij.

El. de succ. rosar. ʒß.

Cum Syr. ros. sol. q. s.

F. Massa.

Vires; Subducunt alium, mucilaginemque ʒream emolliunt & expurgant, vsusque sunt insignis in dolore colico.

Dosis à ʒj. ad ʒj.

Greg. Horst. obs. part. 1. 4. obs. 11.

14. *Pilula Marocostina Mindereri.*

R. Mari veri.

Croc. orient. ana ʒi.

Agar. trochisc.

Cost. veri Indici.

Myrrh. elect. à ʒiß.

Ammoniac. thym. ʒiij.

Rhabarb. el. ʒvi.

Lign. Aloës ʒß.

Aloës succotrin. &c.

1. Soluatur ammoniac. in + scyllit.

1 Diluatur myrrha læuigata in + rutac.

3. Diluatur aloë læuigata in mu- charo rosar. ʒvi. defecetur, coleturque.

Hinc miltis his tribus, affunde succ. limon. aut citri. ʒi v. addeque agaricum cum succis apii, fœnic. & absynth. in pulticulam subactum, accedente modica irroratione ▽ cinamomi, vt & Rhabarbarum simili molo cum succis cichor. pimpinellæ ac fumaricæ subactum.

His ita mixtis, terantur crocus, costus & lignum aloës, diluanturque cum aqu. rosar. fragr. & succ. citriana.

Tandem confunde vtrumque & affunde.

Aqu. Lupul.

Borrag.

betonic. à ʒi v.

Card. bened.

Agrimon.

Iv. arthetic.

Centaur. min.

Rorismarin.

Ceraf. nigr. à ʒi v.

Degerantur in MB ʒ ʒ 3. dein decantetur, filtretur & abstrahatur in MB. postmodum inspissetur ad consistentiam pilularum.

Ex fecibus residuis fiat de nouo Extractio cum extillata & illa abstracta ▽ f. a. exprimatur leuiter, coletur & inspissetur pro pilulis.

Vires. Mucilaginem tartariam in ventriculo, mesenterio, liene, epate colle- tam incidunt, paulatim educunt, visce- ra eadem, vt & caput simul roborant.

E e 2 adeoque

adeoque morbis quamplurimis inde ortum trahentibus succurrunt. Vide & pilulas Tartaræ Querc.

Dosis à ℥ss. ad ℥j. Extracti prioris; posterius enim dosi exhiberi potest maiori.

15. *Pilule matricales* D. D.

Schæfferi.

℞. Sp. hier. picr. ʒss.

Extr. Afar.

Gentian.

Aristoloch.

Helen.

Myrrh.

Dictamn. alb.

Rub. Tinct.

Croc. an. ʒß.

M. F. pil. cum Syr. Artemis. instar. pisorum.

Menses cient & puerperia promouent, uterum ab impuritatibus liberant.

16. *Pilula Panchymagoga* Quercetani.

℞. Aloës optime præparat. (modo Quercetan. vide libr. 4.) ℥ß. affunde succum violarum optimè per digestionem depuratum, atque ad mellis consistentiam inspissatum, expone calori solis vel simili, singulis diebus rudicula lignea agitando, sic ex ætè paucis diebus commiscebuntur. Mixtioni suo tempore (prout habere recenter poteris) adde de

Succorum (optimè per digestionem depuratorum, & ad mellis consistentiam inspissatorum.) sc.

Florum primulæ veris

Perficæ arboris

Rosar. pallidar.

Cichorij.

Bugloss.

Hyperic. ana ʒiv.

His cum Aloë perfectè mixtis, (crit

Massa ℥ij.) adde.

Extract. Sennæ.

Agaric.

Rhabarb. à ʒij.

Cinnamomi.

Pulu. scenic.

Anisana ʒi.

Spec. Diatrisantali, ʒiv.

F. Massâ.

17. *Pestilentialia composita.*

℞. Aloës epatic. puriss. ʒj.

Croc.

Myrrh. an. ʒj.

Zedoar.

Gentian. an. ʒj.

Rhabarb. el. ʒij.

Agaric. alb. ʒj.

Theriac. Andr. nucis Jugland. quant.

Species pulueriscentur seorsim, dein misc. in mortario. Ex massâ f. Pilulæ instar pisorum.

Vires. *Memoriam roborant, visum acuum, omnia membra confortant, tormina ventris sedant, aluum laxant, cruditates tollunt, putredinem, pestilentialisque morbos arcent. Quin & sudorem cient, adeoque Panacæa instar nonnullis habentur.*

Prophylaxeos causa sumitur Pil. N. 1. singulis diebus. Curationis vero viij. vel x. cum aq. conuen. agerque benè tectus sudet.

N. *Sunt qui Pilulas Iosue vocant, seceratasque sic habent.*

18. *Pilula antipodagrica* Doringi.

℞. Pulu. Chamæpith.

Chamædr. ver. an. ʒij.

Centaur. min.

Rad. aristoloch. rec.

Rhapont. ver.

Gentian.

Sem. hyperic.

Crān. human. præpar.

an. ʒiʒ.

Rad. Cichor.

Santal. rub. an. ʒi.

Incorporentur cum f. q. succi Chamæpith. addendo nonnihil terebinth. cypr. pro meliore vnione. f. pil. pro libitu.

Vjus: assumantur per 30. dies singulo trimestri pondere ʒʒ. Horst. obseru. l. 3. obser. 3. pag. 258.

19. *Pilula Polychresta S. Closs.*

℞. Extract. aloës cum succo cichor. præpar. ʒiv.

Colocynth. per aq. fumar. parat.

Resin. scammon. subtil. puluerisat. an. ʒij.

Croci Angl. puluer.

Salis ʒi.

Myrrh. troglod.

Flor. ʒ benzoinat. a. ʒj.

F. Massa. f. a.

Dosis ʒj. ieiuno stomacho mane sumenda aut tribus post cenam horis. Omnis generis humores purgant.

20. *Pilula de Sagapeno Quercetani.*

℞. Sagapen. gummos. depurat. ʒvi.

Ammoniac. depurat. ʒiij.

Extract. trochisc. Alhand. ʒi.

Diagryd. ʒʒ.

Salis gemm. ʒiʒ.

Cum syrupo violato acidulo & tincto, f. Massa, ex qua conficiantur pilulæ in pisi vel ciceris formam.

Vires. Admirandi sunt effectus in febribus quartanis, dissolunt nimirum feces gummosas, & tenaciter corpori nostro adherentes.

Dosis, unica pilula initio paroxysmi, continuando aliquot dies. Sed usum earum precedat preparatio, v. gr. cum decoctis preparantibus melanagogis, & similibus.

21. *Pilula de Succino Cratonis.*

℞. Pulu. Succin.

Mastich. à ʒʒ.

Aloës ʒx.

Agaric. ʒiij.

Aristoloch. rot. veræ, ʒi.

Cum Syrup. de Betonic. q. f.

F. Massa.

Vires. Aluum leniter soluant, caput roborant, adcoque à catarrhis præservant. Præscribit Author bis in mense, sumereque inbet post primum somnum.

Dosis ʒ. Crato.

22. *Pilula Tartarea seu Melanagoge.*

Quercetani.

℞. Crystall. vel cremor. ʒ. ʒiij.

Polypod. quern. ʒij.

Passul. corinthiac. ʒiʒ.

Myrobalan. omnium ana ʒʒ.

Flor. Bugloss.

Borragin.

Nymph. ana p. r.

Coquantur in f. q. aquarum fumaræ & scolopendriæ ad medietatis consumptionem. Hinc

℞. Decocti huius depurati ac clarificati. ʒiij.

Succi pomorum redolentium depuratur. ʒi.

Adde

Foliculorum fenæ mundat. ʒiij.

Turbith.

Rad. hellebor. nigr. veri à ʒiʒ.

Macis.

Myrrh. el. ʒi.

Caryophyll.

Cinamom.

Epithym. à ʒʒ.

Macerentur & digerantur ad ignē ʒ. (4.) vase vitreo clauso; deindum materia adhuc feruet, fiat expressio, vel per setaceum traicctio, cui adde aloës depurat. ʒiij. omnia sufficienter coagulentur

coagulentur ad ignem lentum: addendo sub finem dum fetè refrigerata erit materia. †

℞. Spec. Diarrhod. abb.

Latific. Gal.

Troch. Dialac. à ʒi.

Sal. Absynth.

Fraxin. à ʒij.

Essent. (tinctur.) croci. ʒij.

Ol. anis. aliquot. guttul.

Reducantur in bonam pilularum consistentiam.

N. His pilulis adicit interdum Effentias Aloës & Scammon, Essent. (Extract.) Rhabarb. à ʒiʒ, Essent. (Extr.) Sen. ʒi. & Essent. (Extract.) Trochisc. Alband. ʒʒ. plus minus. vocatque polychrestas.

Vires. Admiranda illarum virtus (inquit Querc.) nunquam satis laudari potest, purgant utramque bilem, omnes humores crassos, tartareos, salsos & mucilaginosos radicitus eliciunt, vel è partibus etiam profundissimis; succurrunt diuersis maniacis & melancholicis affectibus, febribus quartanis opitulantur, & conducunt aduersus psozam, cancerum, lepram, & luem veneream; eo quod purificent totam massam sanguinis a variis corruptionibus, diuersorum effectuum electricibus causis. Sumi possunt mane ac vespri post cœnam parciozem & ante somnum.

Dosis ʒ. vel ʒiʒ. ad summum.

23. Pilula ʒrea Bonij.

℞. Aloës succotr. el. ʒiij.

Gum. ammoniac. (cum + squill.) depur. ʒiʒ.

℞. lat. ʒiʒ.

F. l. à Massa.

Vires. Prioribus substitui possunt, maximè enim sunt lenamini in morbis ʒreis, quales sunt affectus hypochondri-

acus, abstractio lienis, mesenterij, &c. Incidunt enim tartaream mucilaginem, imprimis qua in prima ventris regione collecta est, eamque per deiectionem expurgant.

Dosis à ʒi. ad ʒj. mane vel ante cœnam. ʒʒ.

N. 1. Tanta sunt apud Hollandos astimationis, ut piaculum habeant, communes eas reddere.

Duplicis autem circumferuntur ibidem sortis.

1. Parantur uti iam dedimus.

2. Recipiunt Extractum Rhabarbari paratum ex Rhabarbari el. ʒʒ. & corrigentibus spec. diamargarit. frig. & diarrhod. Abbat. à ʒ. in succo citri per noctem maceratis; in quorum colatura dissoluntur species superiores, fitque l. a. Massa. Et sic respiciunt magis Epar, regionemque secundam bile leuant.

N. 2. Eodem illa priores pilula, addito styracis ʒ. nostratibus in usu sunt ex ordinatione D. D. Petri de Spina. Medici ut celeberrimi, ita dexterrimi.

24. Pilula ʒrea mea descriptionis.

℞. Aloës lucid. fragat. id. est, cum succo fragorum insuccata. ʒi.

Resin. ammoniac. ʒiijʒ.

Sal ʒ subdole,

Essent. croci orient. à ʒi.

Magister. ʒi purgant. in ▽ buglossæ aliquoties soluti & coagulati. ʒij.

Extr. Gentian. ʒiʒ.

Cum tinctura ʒj.

F. Massa.

Vires. Saburram tartaream & mucilaginosam ex infimo ventre imprimis leducit, Lienem, Vicerum & Epar infarctum liberat, morbosque inde prognatos felicissimè curat.

Dosis ʒʒ. vespri ante cœnam assumpta.

pta. Quippe die subsequenti leniter deiectiones aliquot causatur.

N. Constitueram pilulas has, utpote quarum operationes optatis multoties expertus sum, mihi soli reformare, at vincit candor, & amor in proximum, cuius saluti non prodesse, vetat conscientia.

N. Desideras forsan, amice Lector, in numero Pilularum, Angelicas, vulgò dictas, quas Clariss. D.D. Harimann. Beye-

ro, p.m. Officina nostra acceptas referunt. Has liberrimè infernissimè, nisi cautum esset illas propalare. Eapropter excusatum me habeas, ceteròque tibi persuadeas descriptiones multorum ingredientium, quas pro Angelicis venditari videris, non esse genuinas, ipsa enim duobus solis nituntur vegetabilibus. Suntque Extractum propriè dictum, Extracto improprie dicto, ccm-mixtum, &c.

CAP. LXXIV.

De Potionibus.

Potulentorum genera in Praxi visitiora diximus esse Apozemata seu Decocta, Aquas, Emulsiones, Infusiones, Portiones, Portionesque alias. De prioribus alias dictum, de posteriori hic loci agendum.

Est Potio, de qua hic agimus liquor, in quo alia Medicamenta crassiora diluta sunt, & præcipuè purgantia: Quin & solæ infusiones nonnunquam sufficiunt.

Modus ergo parandi sola ferè mixtio est, quam si res diluenda seu dissoluenda, viscosa & tenax fuerit, in mortario absoluerè conuenit.

Liquor adhiberi potest varius, visitatius tamen recipiuntur Decoctiones, Infusiones & maximè Aquæ destillatæ.

Res dissoluendæ sunt Syrupi, Electuaria, Extracta, Manna, pulueres & similia.

Exemplo sint.

1. Potio Purgans.

℞. Extr. Fol. sen. ʒiʒ.

Rhabarb. ʒiʒ.

Cnicopharm. ʒiʒ.

Syr. Diafer. ʒiʒ.

Rosar. solut. ʒv.

Aq. Cinam. j. (ad saporem, &c.

Fl. Acac. ʒj).

M. F. Potio pro vna vice.

Vires. *Educit humores biliosos & pituitosos, 2. Alia.*

℞. Fol. sen. ʒiiʒ.

Epithym. ʒij.

Rhabarb. el. ʒiʒ.

Spic. celt. ʒj.

Infundantur in decoctione pectorali, q. s. per. noctem.

In colatura dissolue.

Syrup. rosar. sol. ʒiʒ.

confect. Hamech. ʒiʒ.

F. Potio.

Purgat humorem melancholicum.

3. Potio sudorifera.

℞. Diascord. Fracastor. ʒiiʒ.

Aqu. ☉ & ☿. ʒij.

Mell. Gran. Iuniper. ʒj.

Extr. card. bened. ʒiʒ.

Aqu. card. bened. ʒij.

M. F. Potus.

Ff

Vires

Vires. Sudorem mouet, virumque insignium est in febribus malignis.

4. *Alia sudorifera.*

℞. Liquor. Lumbri. ℥ij.

Theriac. Andromach. ℥j.

Spir. $\frac{1}{2}$ i. ℥j.

Aq. cinam. ℥i.

Mixtur. simpl. ℥i.

Aq. Veronic. ℥i℥.

M. F. Potus.

Vires. *Admirandarum virum est in arbritide vaga, si semel ac iterum repetatur.*

5. *Potio Vulneraria.*

℞. Herb. Sanicul.

Veronic.

Pyrol. an. Mii.

Consol. Sarac.

Trichoman. ana M i.

Flor. Borrag. $\frac{1}{2}$

Bugloss. ana p. i.

Sem. Anif.

Fœnie. ana ℥ij.

Cinam. ℥iii.

Iuiub. N. vi.

Dactyl. N. iij.

Bulliant in f. q. aq. hord. f. a.

Vires. *Conuenit in vulneribus præcipue pectoris, ubi & expectoratio necessaria est. Sumantur de die ℥ij. cum ℥ij. ocul. cancri. Glandorp.*

N. Plures vide apud Quercet. & alios.

6. *Alia potio Vulneraria.*

℞. Herb. Vinc. peruinc.

Millefol.

Betonic.

Alchimill. ana M i.

Rad. Zedoar. ℥ij.

Vincetoxic. ℥j.

Nuc. vomic. ℥ij.

Macis ℥℥.

Nucist. ℥ i.

Galang. ℥ij.

Coq. in aq. & vini ana mens. f. ad ca-
sum digitor. 2. transuerforum. Colaturæ
exhibeantur ℥ i v. mane ac totidem post
meridiem.

N. *Formulas plures habes in Quercetan.
Rediu. tom. 2. pag. 859. & alibi.*

C A P. L X X V.

De Pomis Ambra.

POma ambra fiunt ex odoratis pulue-
ribus, (addi & olea possunt,) qui cera,
styrace liquida, balsamo indico, muc-
lagine Tragacanthi, cum tantillo Tere-
binthinæ ad tenacitatem si opus sit, su-
scepti, additaque ∇ rosarum, vel simili
optimè incorporati, in globulos prout
visum fuerit, rediguntur.

N. *Nomen mutantur ab Ambra, non
quod ea necessario & semper ingrediatur,
sed quia odorem suauem spirant, adeoque
ambrae amulantur.*

Exemplo sint.

1. *Odoriferum Crollianum.*

℞. Macis.

Caryophyll.

Cinamom. vel cass. lign. odorat. an. ℥ij.

Moschi ℥℥.

Zibett. ℥ij.

Gumm. arab. ℥ i.

Tragacanthi prius suprà fornacem
siccati. ℥ij.

Hæc duo gummata cum moscho te-
rantur.

Omnibus

Omnibus diligenter tritis, misce Zibettam, & affunde aquam Namphe, (id est, ex floribus aurantiorum,) seu Damascenæ odoriferæ pro libitu, (ex odoratis specificis & ▽ rosarum præparatæ, in qua prius per 8. dies in digestionem modicum de Paracelsi carbon. vel Zibetta occidentali admixtum sit,) atque incorpora.

N. 1. Carbon seu Zibetta occidentalis, quantum ex Paracelsi archidox. coniecturari potest, nihil est aliud quam sterminus seu ~~Ex~~ humanum, in digestionem aliquandiu positum, & ex foetidissimo illo odore, sponte sua longa digestionem summam suauolentiam natum. Vide Hartman. in Croll. ut & lib. 5. class. 1. ut & Agricola. in comm. Popp.

N. 2. Poterit & parati, si puluerisata illa mucilaginem Tragacanthi (in ▽ a odorifera soluti) suscipiantur.

Vires ac Vfus. Adhibuitur naribus odore suo sanguinem mouet, & cor supra modum refocillat, Apoplexia, Epilepsia, Colica, Suffocatione matricis, pestilentiali aura.

N. Misceri potest tantillum cum oleo nucisæ expresso, ut fiat q. linimentum, & in supra dictis morbis debito modo adhiberi. Croll.

2. Aliud Pomum ambra.

℞. Storac. calamit. ʒiʒ.

Benzoin.

Laudan. ana ʒʒ.

Caryophyllor ʒij.

Nucist.

Macis ana ʒi.

Rad. ireos fl.

Cyper. rot. à ʒiʒ.

℞. Rosar. ʒi.

Lauendul.

Maioiran. ana ʒʒ.

Storac. liquid. ʒi.

Zibett. ʒʒ.

Mosch. ʒj.

Cum Balsamo indico

& ▽ rosar. ana q. f.

F. Massa.

3. Aliud.

℞. Ladani pur. ʒi.

Styrac. calam. ʒij.

Benzoin. ʒi.

Nucis moschat.

Cinamom.

Macis ana ʒʒ.

Coriandr.

Garyophyllor. ana ʒj.

Mastich.

Oliban. ana ʒi.

Lign. Aloës. ʒʒ.

Ambr. gran. v.

Mosch. gran. x.

F. Massa.

4. Aliud.

℞. Styrac. cal. ʒii.

Mastich.

Thur. masc.

Sandarach. à ʒiʒ.

Costi,

Spic. à ʒi.

Lign. aloës ping. ʒiii.

Mosch.

Ambr. an. gran. aliquot.

Terebinth. parum.

F. Pomum.

Fluxus inhibet.

N. Videsis & apud August. Pomum Ambra, 1. 2.

CAP. LXXVI.

De Preparatis.

Preparata Officinarum communiter, & in specie sic dicta, nihil aliud sunt, quam simplicia nonnulla duriuscula in tenuissimum puluerem, accedente aqua aliqua cordiali, redacta.

Talia sunt: Terræ, Lapides, Perlæ, Corallia, Vngulæ, Crustacea. (testacea.)

Æ. Rem præparandam, læuiga super porphyrite, lapide versatili quam minutissime, inter læuigandum asperge aquam aliquam cordialem, (vt plurimum ꝓ rosarum adhibetur,) vt fiat instar pultis, hanc expone loco tepido vel aëri, vt in vmbra exiccetur.

N. *Quæ solidiora & duriora, adeoque minus læuigabilia sunt, vstione antegressa calcinari friabiliaque reddi solent, vt cornua, ossa, crustacea, & simil.*

Vsitatiora sunt

Præparat. Cinnabris.†

Conchæ marinæ

Corallia alba

rubra

Cornu cerui vstum,

Cranium human.

Crystalli

Granati

Hæmatites.

Hyacynthus.

Lapis armenus.

Iudaicus.

Lazuli.

Magnes

Mandibula Lucij piscis.

Margaritæ.

Mater perlarum.

Ocul. ☉.

Oua Struthij.

Percarum lapides.

Rubinus

Sapphirus

Smaragdus

Succinum

Tutia.

Vngula alcis.

CAP. LXXVII.

De Pulueribus, & Speciebus.

Pulueres ac species fiunt tritura lævigatione uè, quarum apparatus nonnunquam, exiccatio, calcinatioque antegressæ.

N. 1. *Res si subtilioris volatiliorisque fuerint substantia, trituram minus formem expetunt.*

N. 2. *Res puluerisande, etiamsi commisceri debeant, si sint diuersa duritiei, seorsim terantur.*

N. 3. *Quia virtutes puluerum facile euanescent, præstat, quorum puluerisatio sine mora perfici potest, nisi crebrioris sint usus, integra asseruare.*

Pulue

Pulueres sunt tùm simplices, tùm
compositi.
Simplices magis vsuales sunt.
Puluis Agarici
Asari
Aurantiorum corr.
Caryophyllorum
Cinnamomi
Crocī
Cubebarum
Concharum febrilis, *v. lib. 5.*
Glycyrrhizæ
Hellebori, albi
Ialappæ
Lumbricorum
Mechoacannæ
Rhabbarbari
Santalorum cunctorum
Senæ
Puluis Serpentum, *vide libr. 4.*
Tormentillæ
Ventriculi gallinarum
Zingiberis.
*Pulueres compositi prostant sub
titulo puluerum vel specierum.*
Sunt vsuales pulueres alterantes.
Puluis contrâ Abortum, *August.*
Adstringens Galen. A.
Alexiterius Sal. *infra* N. 1.
Anonymi contra Phthisin, A.
Bezoardicus Nicol. A.
NB. Alium habet Renodans
Bezoart. sine preciosis, 2.
cum preciosis, 3.
Electuarii de bolo, A.
Cachecticus Quercetani, 4.
Cæsaris gryseus, A.
rubeus, A.
contra calculum, A.
ad casum, A.
Cathæreticus pro ossib.
S. Cloff. 5.
de cineribus Auicen. A.

de cypero. 6.
Cypheos, A.
ad dentifricia, A.
Dentifricius, 7.
Alius S. Cloff.
contra defluxiones. 8.
Dysentericus, 9.
Epilepticus Marchionis cum
& s. Vnicornu, A.
Antepilepticus de secundina, 10.
Antiepil. diaphoreticus, 11.
Epilepticus, 12.
pro Epithemate cordis, A.
epatis, A.
Febrilis, 13.
Fortis, Tragea fortis, 14.
Grossus. Tragea grossa, spe-
cies incisa, 15.
Haly. A.
Hepaticus. Tragea hepatica
Quercet. 16.
Hystericus. Tragea hystERICA
Quercet. 17.
Hysteric. A.
Antinephryticus. Tragea Anti-
neph. Querc. 18.
Partum prouocans. A.
Helidei de Paduanis, A.
Rubeus pannonicus, A.
Saxonicus, A.
Sperniolæ compos. 19.
Stomachicus. Quercet. 20.
ad strumam, A.
Trithemii, 21.
Violarum odoratus, A. C.
Pro vlceribus gutturis, A.
Species Diambri. cum ambra & mo-
scho, A.
Diambri. sine ambra & mo-
scho, A.
Dianifu, A.
Dianthon, A.
contra Apoplexiam, A.

- Aromaticæ caryophyllatæ,
 cum & sine ambra &
 moscho, A.
 Aromaticæ rosatæ cum & sine ambra
 & moscho, A.
 Diacalamenthes, A.
 Cephalicæ, 22.
 Diacinnamomi, A.
 Diacorallii, A.
 Confectionis cordialis, A.
 contra pestem Ferd. Imp. A.
 Cordiales cum & sine ambra, & mo-
 scho, A.
 Diacubearum, 29.
 Diacurcuma, f. Diacrocu, A.
 Diagalanga, A.
 de Gemmis calidæ, cum & sine am-
 bra & moscho, A.
 de Gemmis frigidæ, A.
 Ducis, f. Electuarij ducis, A.
 de Hyacintho, A.
 Dialysopu, A.
 Imperatoris, A.
 Diaireos Salom. A.
 simpl. A.
 vsitatæ, Ibid.
 Iustini, f. Electuarii Iustini, A.
 Dialacca, A.
 Lætificantes Galen. cum & sine am-
 bra & moscho, A.
 Lætificantes Rhafis, A.
 Liberantes, confectionis liberant. A.
 Species Lithontribon, A.
 Diamargariton calidæ Auic.
 Diamargariton, frigidæ, Nic. A.
 Diamoschu amaræ, A.
 dulcis, cum & sine
 ambra & m. A.
 Diapenidion, A.
 Diatrion pipereon, 1. & 2. A.
 Diapleres archonticon. cum & sine
 moscho, A.
 Diapæonias, cum & sine ambra
 & moscho, Cord.
 Diaprasii Nicolai, A.
 Electuarii resumptiui, A.
 Diarrhodon abbatis, cum & sine
 moscho, A.
 Rosatæ nouellæ, A.
 Diaspoliticon. A.
 Diatrion Santalon, A.
 Diathamaron, cum & sine mo-
 scho, A.
 Diatragacanthi calidæ, A.
 frigidæ, A.
 ad Vermes, confectio ad vermes, A.
 Dia- Xylo aloës, cum & sine am-
 bra & moscho, A.
 Dia Zingiberis, A.
 Huc Sal Philosophorum, 24.
 Sacerdotale, 25.
 Purgantes Pulveres.
 Pulvis Arthriticus Paracelsi, vide infra 1.
 Chalogogus Quercetani, 2.
 Pulvis Cornachini, 3.
 Laxatiuus, Tragealaxatiua, C.
 Melanagogus Quercetani, 4.
 Nasalis, ad nasalia, A.
 Panchymagogus Quercet. 5.
 Passauanticus, 6.
 Phlegmagogus Querc. 7.
 Salæ, 8.
 Senæ præparat. Montagn. A.
 Solutiuius, de tribus, A.
 Magistralis Stock-
 staldi A.
 Sternutatorius, A.
 Sternut. Rulandi. 9.
 Baumannii ro.
 ad suppositoria communia, A.
 acutiora, A.
 sicca,
 Tartari præparat. A.
 ad vermes, A.
 Species benedictæ laxatiuæ, id est,
 Electuarii benedict. laxatiu.
 Diacarthamu,

Diacarthamu, id est, Electuarii

Diacarth. A.

Caryocostini, i. e. Electuar. A.

Episcopi, s. Elefoph. A.

de succo rosarum, id est, electuarii.

Diaturbith. cum Rhabarbaro.

PVLVERES ALTERANTES.

1. Pulvis Alexiterius specificus

Ang. Sale.

2. pulu. viperini ʒij.

Extr. Bezoardici pretiosi
magisterii margarit. an. ʒʒ.

Ol. sem. Angel destill. ʒʒ.

Cinnam. gutt. vi.

M. in mortario vitro.

Dosis à ʒj. ad ʒʒ. cum vehic appropriatis singulis quadris (a, is qui iam veneno infecti sunt danda est ʒj.

Extractum Bezoardicum

sic fit.

2. Ligni aloës resinos.

Granor. Kern.

Santal. alb. odorif.

Cass. lignex.

Zedoar.

Croci opt.

Schœnanth.

Rad. carlin.

Vincetox.

Doron.

Angel.

Fol. dictamn. Cret.

Scord. Cret. an. ʒij.

q. s. f. extractum s. a.

cui adde.

Magisterii lapid. pretiosorum cum

Dcalcinat.

2. Pulvis Bezoardicus sine preciosis,

F. F.

3. Bol. armen. ver. cum aqu. scabios.

præparat,

Terr. sigillat. Silefiac.

Rad. diptamn. alb.

Tormentill. ana ʒvi.

Angelic.

Gentian.

Rad. Petasit.

Zedoar.

C. C. vst. præparat.

Succin. alb. præparat.

Ofs. de c. c.

Rasur. Ebor.

Cort. citr.

Corall. rubr. præp. à ʒʒ.

M. F. Pulvis subtilissimus

Dosis ad ʒj.

3. Pulvis Bezoardicus cum pretiosis.

4. Pulu. modo præscripti, ʒi.

Margar. præparat. gran. xvi.

Hyacynth. præparat.

Rubin. præparat.

Granat. præparat.

L. Bezear. or. a. gr. viii.

Fol. argent.

Aur. ana num. i.

F. Pulvis subtilissimus.

Vires. Cordialis ac diaphoreticus insignis est, usque præcipui in morbis malignis.

Dosis à ʒj. ad ʒij.

4. Pulvis Cachecticus Quercetani.

5. Limitatur. chalyb. in tenuissimum alcohol. per ∇ simplicem redactæ, vel cum ʒi. recalcinatæ. ʒi.

Fec. rad. Ari ʒiʒ.

Ambr. gris. ʒʒ.

Essent. corall. (Magist.

Margarit. ʒij)

Succin. præparat.

Cinamum. ana ʒiv.

Sacchari. q. s. ut fiat pulvis gustui gratus.

Vires. Est summum Remedium ad cachexias, tam virginum, mulierum, quam virorum, iuuenum ac senum.

Dosis

Dosis cochlear. f. mane continuando ad dies aliquot.

5. *Pulvis Catharticus pro ossibus*
S. Cloff.

℞ rad. irid.

aristol. rot.

cupho. b. an. ʒʒ.

Sabin. sicc.

O vst.

℥ præcipitati ana ʒj.

Ceruf.

Myrrh. an. ʒij.

Ol. garyoph. ʒj. M.

F. pulvis quo aspergatur os cariosum carne denudat. & aq. O. prius ablutum.

6. *Pulvis de Cypero odoriferus.*

℞. Rad. Ireos flor. ʒiʒ.

Cyperi rot.

Acor. à ʒii.

Lign. Santal. citr. ʒʒ.

Rhodij. ʒi. ʒii.

Spec. Diambri. ʒiii.

Trech. ʒʒ.

Ambr. gran. xii.

F. Pulvis.

Vires. *Pulvis est odoriferus, confortans spiritus vitales & animales.*

7. *Pulvis Dentifricius.*

℞. Silic. fluviatil. calcin. ʒiii.

Lap. punic. præparat. ʒʒ.

Rad. Ireos fl. ʒij.

Ol. stillat. ros. ʒʒ. (vel ex lign. rhod.

F. Pulvis subtilissimus.

Vires. *Exterget dentes, factorem oris emendat.*

N. 1. *Alium vide apud August.*

N. 2. *Dentifricij pulveres sunt potissimum ex puluerisatis corallis, calcinatis ossibus, cornibus, lapidibus, crustaceis, radicibus ireos, crustâ panis tostâ, salibus vstis, cineribus, & simil.*

Alius S. Cloff.

℞ farin. laterum rubrorum ʒʒ.

Imbibatur per vices spiritus 4 pari quantitate & fiet plus, cui addes 4 vini alb. ʒiij.

Panis ad nigredinem vsti ʒii. M.

F. Pulvis, quo dentes nigrore aut virore infecti confricentur, & vino calente abluantur.

8. *Pulvis contra defluxiones, Flus-pulver, Kothlauffpulver, F.F.*

℞. Mastich. alb.

Succin. in fragm.

Summ. Sabin.

Rut.

Oliban.

Sem. cannab. ana ʒiv.

Stœchad. citr. M. ij.

M. F. Pulvis grossus.

9. *Pulvis Dysentericus Crollij.*

℞. Succin.

Sang. dracon.

Lap. Hæmatit.

Corall. rubr.

Sem. Portulac.

Plantag.

Anthor.

Rad. Tormentill.

Terr. sigillat. à ʒii.

Balaustior. ʒi.

Nucist. num. iv.

Cinamom. ʒʒ.

Croc. ♂ adstring.

Talc. calcinat.

Matr. perlar. calc.

Oss. microcosm. calc. à ʒi.

Lapides læuigentur, reliquisque minutissimè tritis addantur.

Vires. *Valet in omnibus profluuiis alui, menstruorum, narium, &c.*

Dosis ʒi. ad ʒiʒ. vel ʒij.

10. *Pulvis antepilepticus de secundina.*
℞. Secundin. puelli primogeniti exsiccat. ʒʒ.

Cranii maris calcinat. ζ i.
 Pulu. pullorum corui, ζ ij.
 Coagul. lepor. ζ i.
 Rafur. c. c. ζ ij.
 Castor. ζ β .
 Succin. albif. ζ ij.
 Visc. quern. ζ . decrefc. collecti. ζ β .
 Granor. & rad. Pæon. ante noui-
 lunium collect. à ζ β .

Ambr. grif.
 Moschi ana \mathfrak{D} β .
 Spec. Dianth.
 Diaplrir archont.
 Lætific. Galen.
 Corall. præparat.
 Margarit. præparat. à \mathfrak{D} j.
 F. Puluis subtilissimus
 11. *Alius Antiepilepticus Dia-*
phoreticus.

\mathfrak{R} . Cinnaber. ζ ij purificat.
 Magist. corallor.
 perlar.
 cran. human. ana.
 F. Puluis subtilissimus.

Dosis à gran. 10. ad 16. bis in septi-
mana exhiberi potest. Hartmann. in
Pract. Sennert. Instir.

12. *Pulvis Epilepticus D. Arn.*
VVeickardi.

\mathfrak{R} . Rad. pæon. decrefcnt ζ collect. ζ j.
 Sem. Pæon. masc. excort. ζ β .
 Vng. alcis ζ ij.
 Succin. alb.
 C. C. vst. ana præp. ζ ij.
 Margar. præp.
 Corall. rub. præp. ana ζ j.
 Stercor. pæon. \mathfrak{D} iv.
 Lap. Bezoar. or. ζ j.
 Vnicorn. veri \mathfrak{D} j
 Limatur. \odot vngar. ζ j.
 Croc \mathfrak{D} .

Manus Chr. perlat. ζ β .

F. Puluis subtilissimus addendo

Ol. still. macis β .

Dosis a. \mathfrak{D} β . ad ζ β .

13. *Pulvis febrilis.*

\mathfrak{R} . Rad. Diptamn.

Petasil.

Zedoar.

Fol. scord. ana ζ ij.

Sem. card. bened.

C. C. vst. præpar. a ζ i.

ζ diaphoret. ζ ij

F. Puluis subtilissimus.

Vires. Est contra omnis generis fe-
 bres, quas per diaphoresin expellit.

Dosis ζ . Grunlingius.

14. *Tragea fortis. Species*
fortes.

\mathfrak{R} . Piper nigr. ζ ij.

Zingib. ζ i.

Croc. or. ζ i.

Caryophyll.

Galang. à ζ j.

F. Puluis.

Vires. *Vsus esse potest in aroma-*
tisandis cibis,

15. *Tragea grossa. Species*
grossa.

\mathfrak{R} . Glycyrrhiz. ζ β .

Cinamom. ac. ζ v.

Zingib. alb.

Calam. arom. à ζ ij.

Galang.

Zedoar à ζ j.

Nucist.

Garyophyll.

Macis

Cubebar. à \mathfrak{D} j.

Confect. anif.

fanic.

caru.

coriandr. à ζ v i.

Aromata incidantur grosso mo-
 do, confectionibusque admisceantur.

Vires. Confortat veniriculum, adeoque

G g digestionem

digestionem inuat.

16. *Tragea Hepatica Quercetani.*

R. Corall. rubr. præparat.

Spod.

Spec. Diatragac. à ʒij

Fl. Hepatic.

Sem. acetos.

Portulac. à ʒi.

Croc. ♂ optimè præparati, ʒiijß,

(cum ∇ simpl. vel cum ♀.)

Croc. ♂ ex Ol. ♀ parat. ʒij. (vide l. 3.)

Sacchar. rosar. prohibitu.

F. Pulvis.

Vires. Pulvis est admirabilis, contra omnes obstructions, imbecillitates ac intemperies hepatis, cui pristinum robur reparat: singularis porro aduersus omnes fluxus hepaticos, cachexias, hydropises, icterum, &c.

17. *Tragea Hysterica Quercet.*

R. Cass. lignæ.

Calam. arom.

Sem. agni casti.

Pastinac.

Rutæ.

Pæon.

Anis.

Fœnic.

Cardamom.

Macis

Cinnamom.

Caryophyllor. à ʒi.

Fec. Bryon. ʒiijß.

Sacchari anthosati ad pondus omnium.

M.F. Pulvis.

Vires. Prodest albo mulierum fluori & uteri suffocationi.

Dosis ʒiijß.

18. *Tragea Antinephritica Quercetani.*

R. Tunicæ interior. ventriculi Gallinæ,

Stercoris albi Gallin. à ʒß.

Pulueris pelliculæ interioris, quæ in putaminibus ouorum reperitur. ʒiijß.

Herniariæ

Cinnamomi à ʒiv.

Nucleor. mespilor. ʒii.

Sem. Fœnicul.

Anis. à ʒj.

F. Pulvis subtilissimus

Vires. Effectus pulueris huius efficacissimi sunt in alterando, & expellendo calculo. Valet itidem ad colicam passionem.

Dosis ʒßj.

19. *Pulvis Sperniola compositus Crollij.*

R. Myrrh. el.

Thur. masc. à ʒij.

Croci trit. ʒß.

Camphor. ʒiij.

Tere omnia & misc.

Puluerem hunc imbibe ∇ stillat. sperniolæ id est, spermatis ranarum, vigesies vel trigesies, ita tamen, ut semper prius sponte exiccetur.

Hinc serua ad vsus

N. Sperniola colligenda est mense Martio, triduum circiter ante nouilunium, (sic non faciet) destillandaque MB.

Vires. Summum est remedium in Hemorrhagia e naribus, gutture, utero, quia frigidityte sua coagulat sanguinem. Confert quoque, si solvatur cum aceto, & Erysipelati, doloribusve podagricis calidis applicetur. Hemorrhagiam quoque vulnere impositione sistit, Paronichiam necat, &c.

Dosis gran. 4, 5, 6, 7, 8,

N. Si hemorrhagia e sanguinis corruptione originem traxerit, non malum sanè remedium, quippe putredinem ar-

cet.

cet. In uterinis vero affectibus, ob myrrham ac crocum, aliud adhibere mallet.

20. Pulvis Stomachicus, Quercetani
f. Brickmanni.

℞. Rad. Ari. præparat. ʒij.

Acori vulg.

Pimpinell. à ʒi.

• Ocul. cancr. ʒß.

Cinamom. ʒij.

Sal. Absynth.

Iuniper, à ʒj.

Sacchari rosati, q. s.

F. Pulvis.

Vires. Exhibetur non tantum ad ventriculum corroborandum, cui proprie conuenit, sed etiam ad capitis affectus, hemicraniam, vertiginem, melancholiam hypochondriacam, cachexiam: ad calculum ac febrem quartanam: habet enim facultatem deoppilandi, tartarum resoluendi, &c.

Dosis ʒß ad ʒij.

Præparatio radicis Aronis fit macerando, cum vino albo, horis 12. hinc decantatur vinum nouumque affunditur, denuoque antea maceratur, qua maceratione acrimonia extrahitur. Hinc radix lente siccanda.

21. Pulvis Trithemij.

℞. Calam. arom.

Gentian.

Cymin.

Siler. montan.

Anisi.

Carui.

Leuisti.

Petrofelin.

Spic. nard. a. ʒß.

Zinzib. albi,

Chamæpyr.

Fol. fen. el.

Cryst. ʒi a. ʒvi.

Macis

Cubeb. an. ʒij.

Garyoph. ʒvi.

M.F. Pulvis subtilissimus.

Vires. Sunt qui huius laudes summe commendant, ad memoriam confortandam. Videlicet, post purgationem conuenientem. ℞. Huius pulueris ʒj. ▽ magnanimitatis gutt. xij. & vini nonnihil, sumuntque mane & vespere per totum mensem; altero mense, mane solum; tertio bis velter singulis septimanis idque mane; quarto mense bis qualibet sept, & postea ad dies vita singulis mensibus semel, crescente Luna. Sed crapulam vitare movent, ebrietatemque.

22. Species Cephalica, F.F.

℞. Cinamom. ʒij.

Rad. pæon.

Sem. pæon. exc.

citr. exc. ana. ʒx. ʒij.

Zinzib.

Cubeb.

Caryophyllor.

Macis ana ʒv. ʒj.

Spec. cordial.

arom. garyoph. a. ʒviij.

diamosch. dulc.

Spec. diamb. ana ʒß. gran. vi.

Nucist. num. ij.

F. Pulvis.

Vires. Calfacit caput, exiccat catarrhos, spiritus animales & vitales purificat, corroborat, adeoque balsamo natino insigniter confert.

Dosis à ʒß. ad ʒij. vel. ʒj.

20. Species Diacubearum.

℞. Santal. trium ana ʒß.

Spod. præparat.

Raf. Ebor. ana ʒiii.

Sem. Amomi.

Cubeb. ana ʒi.

F. Pulvis.

Vires. Aperit & confortat Epar.

24. Sal Philosophicum.

℞. ʒi. fusi.

Sal gemm. ana ʒi.

Galang.

Macis

Cubebar. ana ʒj.

F. Pulvis.

Vires. Inuat concoctionem ventriculi, cruditatesque consumit.

Dosis gran. 4. mane, ieiuno stomacho.

25. Sal Sacerdotale.

℞. Sal. commun. torref. ʒij.

Piper ʒi.

Cinamom. ʒß.

Zedoar.

Zinzib. ana ʒß.

Sem. cumin.

caru. ana ʒi.

F. Pulu. subtilis.

Vires. Dolori capitis medetur, ventriculum calfacit, cruditatesque & flatus consumit, concoctionem inuat, colicum dolorem profligat.

Dosis gran. viij. ad xv. &c.

Idem aliter.

℞. Sal. commun. ʒij.

Cinamom.

Cumin. ana ʒij.

Zinzib.

Amom.

Siler. mont.

Piper.

Satureia

Hyslop.

Origan.

Puleg. ana ʒi.

F. Pulu. subtilis.

Vires. Easdem cum priori obtinet.

N. Dicitur Sal Sacerdotale, quia Sacerdotibus olim (tempore Elia) ad dolorem capitis & oculorum caliginem in ususuisse statuitur.

PVLVERES PURGANTES.

1. Pulvis Aritheticus Paracelsi.

℞. Hemodactyl.

Turbeth. opt.

Diagryd.

Fol Senn. el.

Rasur. cran. vel ossium human. Sacchari. ana.

Vires. Purgat securè & blandè omnes defluxiones podagricas.

Dosis ʒß. ʒj. ex aqua Iua arithetica fragaria, &c.

2. Pulvis Chalagogus Querc.

℞. Rhobarb. elect. ʒij.

Fl. Violar. ʒij.

Rosar. pallid.

Hyperic. à ʒi.

Spec. Diatrionfantal.

Mastiches

Cinamomi à ʒß.

Diagryd. ʒj.

Sacchar. violat. ʒi.

M. F. Pulvis.

Dosis ʒi.

3. Pulvis Cornachini.

Fit ex mixtione diagrydii ☿ ati, & ♂ diaphoretici cum cremore ♀ i com-mistorum, proportionè in vicem prorenata variante, verbi gratia, Diagryd. ☿ t. gran. vii. viii. vel ʒß. ♂ diaph. gran. v. vi. vii. &c. Crem. ♀ i. ʒj.

Vires. Tantum pulveri huic attribuit Author, ut peculiarem de eo conscripserit librum, commendatque ad omnes ferè morbos, qui purgatione opus habent.

4. Pulvis Melanagogus Querc.

℞. Fol. Sen. ʒi.

Sem. anis.

Fœnic. à ʒi.

Cinamom. ʒj.

Crysell. ♀ i. ʒi.

Sacchari. ʒi. M.

Dosis à ʒi. ad ʒj.

5. Pulvis Panchymagogus Querc.

℞. Cry

℞. Cryſtall. ꝑ i. ʒj.

Senæ el. ʒx.

Hermodaetyl.

Turbith. à ʒß.

Rhabarbari

Agaric troch. ana ʒiij.

Scammon. præparat. ʒij.

Macis

Cinnamomi

Galang. an. ʒiß.

Sacchari violati, ad
pondus omnium.

Dosis ʒ.

6. Pulvis Passauanticus.

℞. Flor. Borrag.

Violar. ana ʒij.

Zinziber.

Spic. nard. ana ʒi.

Glycyrrhiz.

Sem. anif à ʒi.

Diagryd. ʒiii.

Rhabarb. el. ʒv r.

Turbith. gumm. ʒi.

M. F. Pulvis.

Vires. Purgat omnes humores noxios,
maximè bilem.

7. Pulvis Phlegmagogus Quercetani.

℞. Spec. Diacartham. ʒii.

Agaric. Trochisc. ʒß.

Turbith

Hermodaetyl. ana ʒi. M.

Dosis ʒij.

8. Pulvis Phlegmagogus; Salæ.

℞. Cryſt. ʒi.

Hermodaetyl. mund. à ʒi.

Turbeth. albi. ʒvi.

Resin. Scammon. ʒii.

☉ Caryophyll. cum saccharo,

mist. ʒß. M.

Vires. Purgat serenos ac phlegmaticos humores, sine molestia.

Dosis ʒß. ad ʒi.

9. Pulvis Sternutatorum.

Martini Rulandi.

℞. Sem. Nigell.

Hellebor. alb. ana ʒi

Maiozan.

Rorismar.

Saluiz ana ʒß.

Mosch. gran. ii. M.

Caput roborat, pituitam elicit.

℞. Fl. Anthos.

Lauendul.

Salu.

Betonic.

Fol. Maiozan. a ʒi

Macis.

Cinamom.

Glycyrrhiz.

Ellebor. alb. præp. ana ʒi.

Tabac. opt. ʒi.

Omnibus puluerisatis & probe mix-
tis; adde

☉ Still. anif.

Garyophyll.

Macis

Maiozan. ana g. i v. M.

11. Alius, Iohann. Nicolai Ban-
manni M. D.

℞. Fol. Tabac. indic. ʒi. ʒi.

Rad. Ireos flor. ʒiß.

Lap. pumic. ʒii.

Moschi gran. ii.

F. Pulvis.

N. Moscus omittendus erit. si muli-
eri adhiberi debeat.

C A P. LXXVIII.

De Sacculis.

SAcculus fomentatorius fieri potest ex
Svegetabilibus quibuscunque incisis,
sc. crassiusculeve contusis, sacculoque in-
futis.

Applicatur tepidè siue siccum saccu-
lum velis, siue humidum, id est, in liquo-
re coctum & expressum.

Exemplo sint.

1. *Sacculus stomachalis.*

Calament.

Origan.

Betonic.

Absynth. an. M. 1.

Maioran.

Fl. Rosar. rubr. à M. ß.

Camomill. odorat. p. 1.

Rad. calam. arom. ʒiij.

Nucis moschat. num. 1.

Baccar. Laur. ʒiij.

Sem. anis.

caru.

cumin. à ʒi.

Ex conquassatis & incisis F. Sac-
culus stomachalis cancellatim interfu-
tus.

Vires. *Confortat Ventriculum. Crato.*

2. *Sacculus cordialis.*

3. Fol. Meliss. M. 1.

Basilic.

Card. bened. à M. ß.

Santal. citrin. ʒiij.

Cort. citri.

arantior. à ʒi.

Fol. Laur. ʒi.

Cinamom.

Galang.

Nucis condit. [Nucist.

Macis ana ʒj.

Lign. Aloës. ʒß.

Sem. citri.

Meliss. ana ʒß.

Fl. Borrag.

Bugloss.

Anthos.

Meliss. à p. 1.

Rosar. p. ß.

Ex his crassiusculè contusis, F.

Sacc. interceptus serico.

Vires. *Confert in palpitatione. Crato.*

3. *Sacculus Nephriticus, seu Pare-
goricus.*

4. Herb. Malu.

Heder. ter.

Bismalu.

Cerefol.

Parietar. ana M. ß.

Rad. Alth.

Lil. alb. à ʒi.

Sem. Fœnugr. ʒvi.

Fl. Camomill.

Melilot.

Saxifrag. à p. 1.

Contusis & incisis, F. Sacc.

Incoctus pluriæ, lactiue applicetur
renibus in dolore nephritico.

Huc pertinent & Cucupha, cuius

Exemplum sint.

4. *Species pro Cucupha, F. F.*

5. Rad. Ireos ʒiij.

Cyper. rot. ʒiij.

Fl. Lauendul.

Anthos. ana ʒiij.

Fol.

Fol. Menth.
 Maioran.
 Ocym.ana ʒij.
 Storac. cal.
 Benzoin. ana ʒiij.
 Sem. Nigell.
 Coriandr. præp.

Summ. Thymi
 Stœch. ar.ana ʒi.
 Mosch. gran. iij.
 Ambr. gryf. gran. ii.
 F. Puluis grossus, qui gossypio
 susceptus infusatur pileolo serico, inter-
 passando.

C A P. L X X I X.

De Salibus preparatis.

Salia tùm natiua in Officinis extant, tùm artificialia: de natiuis alibi, de artificialibus hic loci agere fas est.

Artificialia salia, vel sunt simplicia, vel composita, seu mixta.

Simplicia, (proprie sic dicta) totuplicia sunt, quotuplices res naturales, quipperes nulla est, quæ salis prorsus expers sit, imò constitutiore rerum naturalium primitus ex sale dependet.

Medium quo salia eliciuntur liquor quilibet aqueus est, in quo salia vt soluantur, ita & eidem sese immiscunt. Quia tamen res naturales pleræque valide compactæ sunt, præmissumque requirunt apparatus, quo compedes, quibus sal impeditum est, aperiantur, pro diuersitate compactionis, diuersi quoque apparatus inuenti sunt.

Creberrima tamen præ reliquis est incineratio, qua partes mixtæ disgregantur, salque fixum in cinere remanente aprum redditur, in ∇ liquefcere, muriamque constituere, maxime si incineratio, transcolatioque repetita interuenierint.

E. gr.

R. Cinerem (absynthii, à carbonibus purificatum,) coque cum ∇ in

lixitiuum, vel transcola ∇ in feruidam aliquoties; sic imprægnabitur Φ ce, nomenque fortietur lixiuii. Hoc purifica filtrando, in spissaque lenta euaporatione, aut crystallisatione.

N. 1. Salia, hac ratione calcinata, quia lixiuium sapiunt, nec satis albicans calcinantur, id est, comburantur, funduntur uè communiter ad ignem, vt albedinem acquirant. Verum potior videtur ratio albificandi per iteratas solutiones, filtrationes ac inspissationes, hac tamen admonitione in maiori dosi hac salia esse exhibenda, Saporem lixiuiosum quod attinet, optimè is aboletur, si cineres cum Φ is ana circiter mixti, accenso Φ calcinentur, atque hinc elixiniationi submittantur.

N. 2. Salia hac fundunt spiritum penetrantissimum, si ad modum, quo Sal commune destillantur.

Salia volatila, (essentialia nonnullis dicta,) nihil aliud esse videntur, quam portio salis aliquantulum elaborata humori nutritiuo immixta, necdum substantiæ crassæ insinuatæ.

Modus fieri ex plantis.

R. Plantam conuenientem coque cum magna quantitate aquæ, hinc ex-
 prime

prime succum, eumque optimè purificatum inspissa aliquantulum, reponeque ad crystallisandum, f.a.

N. Si succum purificatum recenti herba affuderis, interueniente digestionē, coctione ac expressionē, ut prius, maiorem salis copiam nancisceris.

Exhibent iridem ligna, ossa, cornua, sanguis, &c. salia volatilia, sed non nisi interueniente destillatione, qua parietibus vasorum destillatoriorum ea adharescunt. Vide in oleis destillatis.

Salia improprie sic dicta, parantur ex lapidibus, metallis, cornibus, ossibus, crustaceis, quæ beneficio acidi cuiusdam spiritus soluuntur, communiter recipitur. *X*, vide Magesterium,) filtrantur, & euaporatione in puluerem rediguntur, quem sal vocant.

Hunc salem abluunt aliquoties, ne acidum sapiat, & seruant pro vsu, vel edulcoratum in liquorem per deliquium in cella resoluunt. Vide Liquor.

Salia simplicia vsuatiōra.

Sal Absynthii fixum

Essentiale.

Acetosella

Sal. Aluminis. Saccharum O.

Angelica

Artemisia

Borraginis

Cancrorum

Cardui benedicti fixum

Essentiale.

Centaurii minoris.

Cerefolii

Chamameli

Cichorei

Cinamomi

C. c. volatile

Cranii volatile

Euphragia.

Fabarium è stramine &

corticibus

Fœniculi

Fragariae

Fraxini è ligno.

Fumariae

Genistae

Guaiaci volatile

Hederæ terrestres.

Hyperici

Hyslopi

Iuniperi è baccis.

ex ligno.

Lauendulae

Maioranae

Matricariae

Melissae

Menthae

Nitri crystallini.

fixi. Lapis prunellae.

Ononidis

Perficariae

Pimpinellae

Plantaginis

Rutae

Salviae

Sanguinis humani.

Scordii

Succini volatile

Tamarisci

Tartari

Vitrioli vomitium

Vrinae

Vrticæ

Zedoariae

Salia improprie sic dicta, (rectius calces diceres,) vsuatiōra sunt.

Sal Iouis

Saturni

Corallorum

Perlarum, &c.

Salia composita:

1. Sal Alkali.

2. *Ψ. lib. 1.*

Cinet.

Cinet. Ifatidis, ℥. β.

℥ i. Diana ℥ i.

Coque in ∇. vt fiat lixiuium, filtra ac inspissa ad siccitatem.

N. 1. Theophrastus. ℞. Cinerum clauell. ℥. cinerum faba um, extrahit lixiuium, coagulatque

N. 2. Veneriani. ℞. Ψ. ℥. 1. cineris fagi, vel quercus. ℥. ij. Fellis vitri. ℥ i calcinati. ℥ i à ℥ ij. Fac lixiuium, atque exinde Sal.

N. 3. Alkali aquinacationem vide lib. 1.

Vfus huius Salis solus Chymicus est, inferuitque separationi Ois à ♀e, si in fluxu incititur. 2. Facit ad fluxionem (& facilitandam.

2. Sal Alembrot.

℞. Θ. pręparat. ∇. Salis alcali, à ℥ i. F. lixiuium cum succi menthę ac caryophyllat. ana ℥ ii. aquę fontan. ℥ ii. Filtra & coagula.

N. 1. Dicitur & Sal Ellebrot. Sal Taberi. Sal Alkitran.

N. 2. Est & Sal Alembrot. natiuum, quod in Cypro, ex certa terra, in monte Olympo extrahitur; formamque & colorem sanguinis concreti habet, sed nostratibus incognitum.

3. Sal Anatron.

℞. Calci viu. ℥. iv.

Alumin. ℥. ij.

Vitrioli ℥. ij.

Salis commun. ℥. iij.

F. Lixiuium cum vino albo digere

per dies aliquot (9.

Postea

℞ Stiriari. salis petrę, ℥. x. affunde lixiuii tantum, vt operiatur sal in aheni. Misce benę ac solue, coque ad medias, cola ac repone ad concrendum.

Vires. Metallici hoc sale vtuntur ad purgationem fusionemque Metallorum.

Sumitur & Anatron, I. profelle vitri. 2. pro terra Sarracenica, cuius sunt species, nigra, rubra, & cerulea. 3. pro excrescentia alba ac lapidea, quę in petris crescit, in modum vsneę alba, à quibusdam Sal nitrum vocata. Vide vnt. Zer. de Sale.

4. Borrax.

℞. Sal. ammoniac.

Nitri

Tartari calcinat. à ℥ i.

G. arabic.

Sal. commun. a ℥ i.

Mastich.

Alumin. roch. ana ℥ β.

Puluerisatis. affunde Vrinam, filtra accoque, donec materia in salem concreuat.

N. Alij consciunt ex ∇ & vrina puerorum inuicem commistis & coagulatis. Alii Borracem nostratem ex peculiari lapide (Borracis nomine) eoque calcinato extrahi volunt, monente Tholdio in Halographia.

Vires. In medico vsu facit ad menstrua, ac partum prouocandum, venenemque stimulantam.

CAP. LXXX.

De Sapone Odorato.

SApo odoratus, Sinegma odoratum
odoramenti formula est, constatque
ex sapone, (potissimum Veneto, cui
res *ivases* subtilissimè puluerisatæ im-
miscentur, adhibita ∇ fragrante, v. gr.
rosarum.

Formula sint, ex D. D. VVeickhardo.

1. *Sapo Moschatus.*

℞. Sapon. Venet. ℥ij.
Styrac. calam. ℥ij.
Rad. Ireos fl. ℥j.
Nuc. moschat. ana ℥℥.
Cinamom. ana ℥℥.
Santal. alb. ℥i.
Ass. dulc. ℥ij.
Garyophyll. ℥j.
Mosch. gran. i v.

Incorporentur in mortario cum
∇ rosarum.

Vires. *Habet vim abstergendi & conci-
liandi gratum odorem, simulque confor-
tandi nervos.*

N. *Loco cinamomi nucistaque licet
olea stillatit. adhibere.*

2. *Alius.*

℞. Caryophyll.
Macis ana ℥i.
Benz.
Rad. Ireos fl. ana ℥℥.
Mosch. gran. x.
Ambr.
Zibett. ana gran. v.
Sapon. Venet. ℥. ij.

Distemperentur cum ∇ rosarum, adii-
ciendo Ol. stillat. cinam.

3. *Sapo ad impetigines.*

℞. i calcinat. ℥.
O. calcinat. ℥j.
Flor. ☿ ℥ij.
℞. g. v.
Ass. dulc.
Storac. liquid. an. ℥j.
Calamit.
Lithargyr. an. ℥℥.
Rad. lapath. acut. ℥j.
Or. Garyophyl. g. iij.
Saponis veneti q. f.
F. Globuli.

CAP. LXXXI.

De Spiritibus.

SPiritus vt diuersi sunt volatilitate ac
fixitate, ita & diuerso caloris gradu, di-
uersisque destillatoriiis destillantur. Fixio-
res scil. Retortâ, igneque fortiori, arenæ
scil. vel nudo. Volatiliores atque igne
blandiori, scil. **W. M.** vel cinerum.

Fieri possunt spiritus ex *mineralibus,
vegetabilibus ac animalibus.*

Spiritus MINERALES singuli ferè
peculiares sibi vendicant modos, quos
vide suis locis.

N. *Qua ratione sine vasis destillatoriiis
spiritus minerales destillari queant lib. 1.
c. 20. delineamus. Conscripsit & de eo-
dem peculiarem quandam Tractatulum Ioh.
Glanterus, titulo Furni Philosophici.*

Spiritus VEGETABILES eliciuntur
naturæ volatiliores; è foliis, floribus, fru-
ctibus, seminibus, aromatibus: fixiores;
è lignis, corticibus, viscis.

Modus eliciendi spiritus volatilio-
res non discrepat à destillatione vrum
stillatitia

stillatitiarum, quippe inter has & spiritus hoc solum discriminis intercedit, quod aquæ dictæ maximam partem phlegmatis contineant, spiritus minorem; unde & rectificando spiritus ab aquis sequestrantur.

N. I. Res fermentata siquidem promptius ad copiosius spiritum halant, si res destillanda fermentari apta fuerit, fermentationem præmittere suadeo, quippe quâ præter dictam faciliorem exhalationem, spiritus in quintam Essentiam exaltantur, persuasum autem tibi habeto, fermentationem feliciter in vasis ligneis v. gr. quernis, procedere, quam in vasis aliis.

N. 2. Fiunt quoque spiritus quorundam vegetabilium cum vino, ut spiritus liliorum conuallium, &c. Verum cum pars maxima ¶ debeat, præstat huiusce generis cognominare, ¶ cum adiectione dati vegetabilis, gr. ¶ m' liliatum, vel ¶ m vita liliatam.

I Sic fiunt ex herbis & floribus.

R. Herbas aut flores recenter (tempore sicco collectos) contunde atque in vas terreum vitreatum, vel dolium quernum (præstant enim ad fermentationem vasa lignea,) intermisto sale comprime, clausoque vase in cellam reponere (per mensem vnum vel plures) donec fermentando acidiusculum ac vinosum acquirant odorem. Hinc destilla per vesicam, (aut ¶ M, (usque ad siccitatem, destillatum affunde, si liber, parti destillandæ residuæ ac destilla denovo. Tandem rectifica.

Aliter.

Exprime succum, eumque cum comcontusis herbis recentibus mixtum ad fermentandum colloca.

N. 1. Si minus succolenta res fuerint

aqua feruente irrorari ac perfundi volunt.

2. Fermentatio promouetur adiecta aliqua portione ¶ (is, (quæ & putrefactionem præcauet) ¶ , secum cereuisia, vini, fermenti dissoluti (in ¶) vel sacchari.

3. Poterit & ex fermentatis succus exprimi, atque cum nouis herbis denovo fermentari; sic copiosior extilla spiritus.

II. Ex fructibus & baccis succulentis.

R. Succum expressum, enmque clauso vase debite deferuere sine, ac destilla: sic fiunt spiritus pomorum, pyrorum, mespilorum, citoniorum, &c.

II. Ex fructibus & baccis minus succulentis.

R. Fructus vel baccas, conquassâ ac affunde ¶ m feruentem, vel ebullire parum permitte, hinc colloca, vase clauso in fermentationem, addendo si placet nonnihil secum vini vel cereuisiæ, & simil. sic fiunt spiritus baccar. iuniperi.

IV. Ex fructibus carnosiss, (i. e. qui pulpam exprimendo præbent.)

R. Expressam carnosam substantiam, v. gr. ceraforum, nigtorum, (exemptis nucleis,) reponere ¶ (14) ad fermentandum cum ¶ , &c. destilla, sic fiunt spiritus, seu quintæ Essentiæ, baccarum sambuci, fragorum.

N. Licet initio, si ita visum fuerit, aliquid & a feruentis addere.

V. E. seminibus colidioribus ¶ cum oleo ascendit, quæ rectificando exhibet spiritum, præcipue si fermentatio fuerit præmissa. Vide supra de Oleis.

N. 1. Spiritus hi aquarum nomine ut plurimum veniunt.

N. 2. Si loco ¶ a vinum in maceratione adhibueris, spiritum itidem nanci-

Hh 2 sceris,

sceris, sed compositum ex *Vi* i seminisque
dati spiritu, prestat itaque hunc ad diffe-
rentiam spiritus simplicis scilicet cum *va*
destillati, appellare spiritum compositum,
seu *Vi* cum adiectione dati seminis
(e. gr. anisatum, vel *vm* vita amsatam,
vide supra.

VI. E frumentis parari possunt
Quintæ Essentiæ, si in Cerevisiam
reducta ea fuerint; qua ratione magnam
spirituum copiam exhibent.

VII. Ex aromatibus spiritus, quo-
modo eliciantur, vide cap. 38.

VIII. E lignis prodit vna cum o-
leo per destillationem liquor acidulus
(vide supra cap. 70.) qui rectificatus,
spiritum refert.

N. Rectificatio fieri potest super col-
chotare aut sale marino, vel cineribus
propriis; sic exit primo phlegma insipi-
dum; hinc spiritus acidus seorsim colli-
gendus.

Ex ANIMALIVM familia exhi-
bent spiritus; cornua, ossa, sanguis, urina.

Cornua, ossa, ungula, fundunt spiritum
acidulum mediante destillatione, (vide
de oleis) hunc rectifica in *M*.

Sanguinis itidem spiritus beneficio
destillationis elicitur, (vide in oleis &
vis, estque liquor ab oleo separatus
& denuo rectificatus.

N. Coronidis loco addo: si oleum ali-
quod stillatissimum cum *Vi* rectificatissi-
mo digeratur, oleum illud à spiritu ab-
sorberi, ut sub forma spiritus deliteat,

Spiritus minerales usitatores,

Spiritus Aluminis

Coralliorum

Mercurii

Salis ammoniaci

communis

gemmæ

nitri

Saturni

Succini

Sulphuris

Tartari

Vitrioli.

Huc *va* spirituosæ compositæ: *V*
R. O *A* tea. v. l. 3.

Spiritus vegetabiles.

Spiritus Absynthii

Aceti vini

Angelicæ

Anisi, id est, *va* cum vino
destillati.

Spiritus Cardui benedicti

Centaurii minoris.

Ceraforum nigrorum

Cochleariæ

Cydoniorum

Ebulæ ex granis

Fœniculi

Fragorum

Guaiaci

Iuniperi

Liliorum conuallium

Melissæ

Rorismarini

Rosarum

Saluæ

Sambuci

Thymi

Tiliæ flor.

Veronicæ

Vini.

N. Compositi spiritus ferme sub titulo
aquarum recensentur, ut spiritus theria-
calis, id est, *va* theriacalis, &c.

N. 2. Spiritus oleaceos quare sub Oleis,
ut spiritum Terebinthina, & similia.

Huc

1. Spiritus Antapoplecticus

S. Cloß.

℞ *Q* sang. cervini lib.

Infusionis florum lauend. in aq.
peron.

pæon. fact. ζ iv.

M. & destilla ad medias per Ψ ; spiritui extillato adde infusionis nouæ florum lauend, eandem quantitat. destilla denuò idque tertium repete tandem adde huic Ω Rectificat. ζ ij.

Dof. à gutt. vj. ad xij. & xx. in insculo, aut aq. appropri. Inuat Paralyticos, Apoplecticos, Pleuriticos, Asthmaticos, omnes eos quorum pectus sanie aut pure occupatur, anacatharsin enim promouet egregiè.

2. Spiritus Nephriticus.

Ψ Ouum struthionis, puluer. asuæ Ω , & in digestionem relinque, donec probè soluta appareat

corticum ouorum substantia, atque tum per chartam filtretur, serueturque.

Vires: Est $\nu\tau\tau\omega\iota\varsigma\omega$ nulli ferè secundum à Casareis medicis S. Clossao communicatū

Dosis gutt. vj. viij. ex vino opt. vel aq. florum fabar florum acac. malu. veron. addito syr. dialth. Fernel. Insigniter aperit, incidit & commouet arenulas, calculum, urinam, nonnunquam etiam menses & sedes atque etiam serum in hydropicis.

N. Fit & insignis spiritus nephriticus \square a spiritum à \odot destillando Vid. I. Agricola in Popp. p. 1. pag. 585. Loffelium in Scrutinio Remim. Confer cum Querc. in Querc. Rediut. 3. p. 704.

C A P. LXXXII.

De Succis.

Succi ex vegetabilibus potissimum depromuntur, rarè ex animalibus. E vegetabilibus putantur non omnibus.

Inidonea enim sunt, 1. nuclei, semina, & reliqua oleosa, qualia sunt amygdalæ, pistacia, semina lini, (de quibus egimus in oleis expressis.)

2. Minus apta sunt aridiora, ut fruges, nisi decocta harum, succos appellare libuerit.

Modus fiendi.

\mathcal{R} . Vegetabilia succulenta, (minus succulenta, macerari, in solari, elixariuè antea volunt ∇) conuassâ & exprime, hinc clarifica, (cum albumine oui, filtrationeque vel digestionem quod melius,) si opus est Δ l. inspissa, atque ne empyreuina contrahat, continuo agita; sic fiunt succi.

I Ex poribus. \mathcal{R} . Flores virides imple Ψ , premendo, collocenturque ad dige-

rendum, s. putrescendum in M. satis profunde, donec in mucilaginem abiisse videantur: Hinc exprime succum, clarifica calb. oui, & in spissa lentè ad consistentiam mellis; sic fiunt succi, (Essentia dicta,) borag. bugloss. pæon. verbaſc. violar. & simil.

N. 1. Si flores minus su costi fuerint, affundatur parum ∇ a sic fit extractum, s. succus inspissat. stor. tuncæ, calendula, Keyri¹, Cyani, rorismar. rhead. salu. & simil.

N. 2. Præstant flores primum erumpentes.

N. 3. Expressum succum si recentibus floribus affuderis, maiorem succi copiam colliges.

II. Ex fructibus. \mathcal{R} . Succulentos exprime, vel coque antea; hinc exprime traiceque per setaceum, liquidioresque ad mellis consistentiam inspissa.

N. *Succi* è fructibus alio ferè nomine gaudent, mellis scil. si dulce sapiant, ut mel iuniperinum passularum, & simil. alias Roob. Sapa; ut rob de berberis, de ribib.

III. Ex radicibus & lignis, interueniente coctione, (in γ ,) & expressione succi eliciuntur, adsciscuntque nomen Extractorum, vide supra cap. 57.

Succi officinales, tùm liquidi prostant, tùm inspissati.

Liquidi qui per se conseruentur pauci sunt, quippe præter succos, acidulos & fermentatos illos potulentos, (qualis vinum, vinum pomorum, pyrorum, & simil.) nulli ad tempus durabiles sunt: hinc fit ut addito saccharo, melleue, in syrupum coquantur, vide de Syrupis, c. 84.

Quin imo vel ipsis succis acidulis nonnihil sacchari ferè additur, cuius vitum parum fermentantur, tùm ab iniuria corruptionis conseruantur.

N. *Dantur* & succi è vegetabilibus, tùm per seruptis, tùm incisis sponte stilantes, (lacrymas vocare expedit.) Verum hi partim natiuis accensentur, partim non. vsuales sunt.

Talis est succus betula, qui in Suecia & Finlandia, mensibus Martio & Aprilis collectus & fermentatus, mulierculis nobilitibus porus suppetit; succus inglandis arboris, liquor sc. qui in quercuum stipitibus coacernatur, lacryma vitis amputata. Huc opium & simil.

Succi Officinales Liquidi, qui & Vina dicuntur, sunt

Succus Berberum
Citri
Cytoniorum
Granatorum acidorum
Limonum.

N. *Succi* recentes tot ex tempore

parari queunt, quot vegetabilia viridia succulenta exhibentur, verum quia gramineum sapiunt saporem, minus in usum veniunt, licet sapor ille saccharo corrigi queat.

Succi inspissati.

Succus Absynthii communis.

Acaciæ nostratis.

N. *Verus Officinis habetur inter natia.*

Agrimoniæ.

Aloë

Cardui benedicti

Chermes granorum

Centaurei minoris

Cydoniorum

Enulæ

Eumariæ

Glycyrrhæ

Gratiolæ

Hyperici

Hopscjami

Ireos nostratis cæruleæ.

Liquiritiæ

Mercurialis

Myrtillorum Germanicorum, *Heidelbeersafft.*

Nicotianæ

Papaueris domestici

erratici

Plantaginis

Rosarum incarnatarum

rubrarum

Scrophulariæ

Solatri

Huc pertinet.

Rob de Berberis simplex.

de Ribib.

Mel Ebulinum

Sambucinum

Iuniperinum

Passularum.

} consistentiam E-
le&tuarii ferè ob-
tinent.

C A P. LXX XIII.

De Suppositoriis & Pessis.

Suppositorium formandorum ratio in hoc sita est, vt fiat ex materia duriuscula, glabra, adeoque in anum intrudi apta, siue illa aptitudo per se rebus insit, siue mixtione, coctione uè concilietur.

Prout igitur indicatio fuerit, ita suppositoriis materia eligenda, anodyna sc. detergens, consolidans, exicans, aluum irritans, &c.

Vsitatissima tamen sunt suppositoria deiectoria, eaque pro ratione operationis triplicia.

1. Lenia, quæ solo ferè tactu materiali mouent. Talia fiunt ex lardo, ficu inuersa, seuo hircino, bubulo, (candela seuina,) cera, farina aquæ incocta, (ex qua fiunt suppositoria in sole exiccanda,) caulibus, & radicibus, verbi gratia betæ, brassicæ, bliti, mercurialis, petroselinii, & simil.

2. Mediocria, quæ aliquali acrimonia stimulant. Talia parantur ex melle ad crassitiem cocto, sapone, terebinthina cocta. Quibus adduntur interdum & alia, v.g. muscerda, sal, saccharum.

3. Fortiora, quæ vi purgante lacefsunt. Talia fiunt ex purgantibus, lenioribus, ac fortioribus, agarico, aloë, hiera picra, puluere ad suppositoria, elleboro, scammonio, & simil.

Modus parandi.

Mel coquitur lentè ad spissitudinem, vt digitis tractari possit, sine inquinatio-
ne, experiri id licet guttula in laminam frigidam, vel stanneam effusa,) hinc ef-

funditur in dictam laminam, oleo illitam, dumque frigescit, formantur suppositoria, oleoque illinuntur.

Si qua addendo fuerint, ante effusione ea puluerisata admiscere oportet, vel & formatos cylindros iisdem inuoluere, vt obducantur.

Proportio mellis $\mathfrak{z}i$. puluer. (ad purgantiam mitiora) $\mathfrak{z}i$. præter propter, (ad fortiora) \mathfrak{ss} . $\mathfrak{z}i$. vel. $\mathfrak{z}i$. \ominus aut \mathfrak{v} .

Vt \mathfrak{z} . Mellis, q. f. ($\mathfrak{z}i$) salis gemm. \mathfrak{ss} . aut \ominus \mathfrak{d} j. muscerd. \mathfrak{ss} . F. suppositorium.

\mathfrak{z} . Agaric. \mathfrak{d} j. sal. gemm. \mathfrak{ss} . mellis, q. f. F. suppositorium.

\mathfrak{z} . Pulu. ad suppositor. commun. $\mathfrak{z}i$. mellis, q. f. suppositorium.

De Pessariis.

Pessaria, pessi, nascalia, ad digiti formam ferè formari consueuerunt, fiuntque ex rebus medicinalibus vterinis quæ vel suscipiuntur, sacculo lineo oblongo, lana concepta, gossypiouè, vel incorporantur cum melle, ladano, galbano, cera, succo, similiuere, formanturque ad dictam formam digiti.

M. *Figurâ suppositoriis similia sunt, nisi quod longiora & crassiora.*

Exemplo sint.

\mathfrak{z} . Myrrhæ $\mathfrak{z}i$.

Spec. hier. pic. compos.

benedict. laxat. ana $\mathfrak{z}i$.

Cum melle cocto F. pessarium, quod panno raro obductum, immittatur vtero ad menses ciendos.

Veickhard.

\mathfrak{z} . Sterco

℞. Stercoris asini, q. s. deficca & pulverisa, inuoluaturque pulvis panno de serico, pro pessario hæmorrhagiam vteri sistente.

℞. Burf. pastor. M. β. contunde &

inde panno pro suppositoio menses sistente. &c.

N. Possunt itidem radices certæ, v. gr. rubia tinctorum, cyperi, Iridis, & simil., loco pessarii adhiberi.

C A P. L X X X I V.

De Syrupis, Mellibus & Robis Syrupisatis.

Syruporum materia principalis est liquor quidam medicamentosus; decoctum, infusum, succus, aqua stillatitia, acetum uè. Seruilis, est saccharum clarificatum, melue depuratum, cum quibus liquor ad consistentiam mellis liquidiusculi coquitur.

N. Saccharum & mel adduntur præcipue ut liquorum corruptibilitatem arceant, tum quoque ut qualitatem in gratam mitigent, saporemque medicamento gratiorem concilient. Hinc non abs re foret, loco sacchari aut mellis aliquando gratiores alias adhibere melligines, cum liquore syrupisando qualitatibus conspirantes; quales sunt, verbi gratia, mel passularum, rob pomorum redolentium, succus glycyrrhizæ depuratus, &c.

Syrupi sunt simplices vel compositi.

Simplices, qui ut plurimum ex simplici vnaque re medicinali cum saccharo aut melle parantur.

Compositus, qui ex pluribus.

Modus fiendi.

℞. Liqueorem clarificatum, (decoctum, infusum, succum expressum, acetum,) adde saccharum, vel mel, & simil. coque, clarifica. (si opus,) inspissa ad mellis consistentiam, ac reponere pro usu.

N. Guttulâ in tabulam frigidam ef-

fusâ consistentiam experiri licet.

Proportio liquores ad saccharum aut mel est ferè dupla vel tripla.

Verbi gratia.

℞. Decocti. ℥. iij. sacchari. ℥. ii. vel i. prout crassior, vel dilutior syrupus expetitur, vel prout durationis longiori, breuiori uè destinatur.

Virium ratione sunt syrapi alterantes & purgantes.

Syrapi alterantes vsitationes.

Syrupus de absinthio maior, A. C.

Acetositis citri, s. è succo citri. A. C.

de succo acetosæ.

acetosellæ.

Acetosus simplex, id est, ex + & ∇. A.

Acetosus compositus, (è radicibus + & ∇. A.

Acetosus Diarrhodon, A.

Adiantinus Fernelii, A.

de Agrestis, A. C.

de Althæa Fernelii, A.

Renod.

Anisi simplex Querc. *infr.* 1.

Antepilepticus Querc. 2.

Aquilegiæ flor.

Arantiorum è succo

è corticibus

è floribus

de Artemisia Fernelii, com-
pos. 3.

è succo Betonica

de Betonica compositus.

de succ. Berberum.

Bizantinus simplex s. Dy-

nari è succ. Endiu.

Ap. Lupul. Buglofs.

Bizantinus composit 9 A. C.

de Borragine, s. Infusionis

de Buglosa è floribus

de Calamentha Mesuæ,

A. C.

Calendulæ Quercetani, fit

è succ. vel Infus. flor.

è succ. Chamæmeli

Capillorum Veneris sim-

plex, ex decoctione.

Capillorum Veneris comp.

Cardiacus, 4.

de succo Cardui benedicti.

Ceraforum acidorum: è

succo.

Cichorii simplex: è succo.

de Cinamomo, A.

N. *Quercetanus parat cum Vino*

maluatico. Augustani ▽ *cinamomi.*

de Cortice citri.

N. *è succo citri dicitur syrupus ace-*
rositatis citri.

Coralliorum, v. l. 3. c. 6.

Cytoniorum è succo

Cytoniorum vinosus sim-

plex, s. Miua cytonio-

rum, quæ simplex & a-

romatica.

de Endiua simplex.

compositus.

de Eryfimo Lobelii, 5.

de Eupatorio Mesuæ, A. C.

de Farfara; è succo

N. *Renodæuss compositum exhibet.*

de fragis è succo

de Fumaria simplex; è succ.

de Glycyrrhiza Mesuæ, A. C.

Granatorum dulcium: è

succo

Granat. acidorum: è succo

cum aceto

Oxysaccharum composit.

Antihecticus, 6.

de succo Hederæ terrestris

de succ. Hyperici

de Hyssopo Mesuæ, A. C.

de Iuiubis Mesuæ, A. C.

de Limonibus: è succo

de succ. Melissophyll.

de Mentha minor: è succo

Menth. granat. dulc.

vel acid.

Syrupus de Mentha maior, Mesuæ

A. C.

de succ. Mercurialis

Myrtinus compositus Me-

suæ

Nephrocatharticus Iou-

berti. A.

Nicotianæ seu de Peto sim-

plex, Quercet. 7.

Nicot. compositus, 8.

de Nymphæa: è florum in-

fusione. A.

de Nymphæa compositus.

Pedemontani, 8.

de Papauere albo simplex,

A.

de Papau. alb. composit 9 A.

de Papau. erratico, è florum

infus. A.

de Floribus Paralysis.

de pede cari, s. Hispidula

siue

de Æluropo simplex: fit ex

infusione summitatum

de Æluropo compositus 9.

Flor. Pæoniæ

de Pilosella : ex infusione
 summitatum floridarum.
 de succo Plantaginis.
 de Pomis : è succo.
 de Portulaca Mesuæ.
 de Præssio Mesuæ.
 de duabus radicibus.
 de quinque rad.
 Refectius Cord.
 Ribium è succo.

Syrupus Rosatus regius , seu Iulepus
 rosatus.

de Rosis siccis
 de Rubo Idæo.
 de Scabiosa
 de Scordio è succo
 compositus Mer-
 curialis, A.

de Scolopendrio Fernelij,
 A. C.

de Semperuiuo è succo
 compositus

Siliquarum
 de Stæchade simplex, A.
 compositus, A.
 Fernelij, A.

de Symphyto, Fernelij, A.
 de Testudinibus, 10.

Flor. Tunicæ
 de succo veronicæ
 Violatus simplex

compositus Mesuæ
 regius, f. Iulepus
 violatus.
 ex succo.

Huius loci sunt & Syrupi melliti,
 mella vulgò dicti.

Vt

Mel Anthosatum
 Emblicorum , id est , mel
 in quo Emblici my-
 rob. conditi, vel de-
 coctum Emblicorum

inspillatum.

Mel Menthe, è succo & mell.
 ana.

Mercuriale è succo &
 mell. 1.

Rosatum simplex, ex in-
 fusione triplici &
 mell. 1.

Vide
 Disp.

Rosatum citratum
 Mesuæ, ex gem-
 mis & mell.

Violatum simplex ex in-
 fusione triplici &
 mell. 1.

Sic Oxymel simplex
 compositum
 diureticum
 scylliticum simpl.
 compos.

Huc pertinent & Rob composita.

Rob de Agresta
 de Berberis } ex succ. & fac-
 de Cornis } char. 1.
 de Ribib. }

Diamoron simplex, ex succ. 1.
 & mell.

compositum
 vsitatum Gal.

Nuccum ex succo cort. virid.
 iugl. & mell. 1.

Syrupi purgantes vsitationes.

Syrupus Flor. Acaciæ Aug.
 de Carthamo, A.
 de Cichoreo cum Rhabarba-
 ro, A. C.

Diaferos, Andern. A.

de Epithymo
 de Fumaria comp. f. maior.

Syrupus Hellebor. minor. Querc. 1.
 Helleborat. maior.

Holagogus, 2.

Flor. persicorum
 de polypodio, A. C.

de

de pomis regis Sabor, A.
cum fena Querc.
de Rhabbarbaro solutius,
Aug.

Rofatus solutius simplex
f. Mucharum, è Dama-
fcenarum 3. infuf.

Rofatus laxatius compofi-
tus, f. Helleboratus.

Rofatus compofitus, fine
Helleboro.

de Senna.

Violatus solutius, f. infufio-
nis.

Vomitius, 3.

Mel Rofatum laxatium, } ex infuf.
Violatum laxa- } & mell.
tium. } 1.

Oxymel Helleborum Gefner. A. C.

Oxyfaccharum vomitium, 4.

1. *Syrupus Anisi, cum Vino : Querce-
tani.*

℞. Anisi conqualfati, ʒiij. maceretur
in vini generofi, lb. ij. per tres dies, cole-
tur: Colaturæ adde Sacchari, lb. ij. & co-
que ad fyrupum.

N. Eodem modo concinnari poffunt Sy-
rupi, & ex aliis feminibus, veluti ex fe-
min. feniculi, pœonia, ex baccis lauri, iuni-
peri, & fimil.

2. *Syrupus antiepilepticus : Querce-
tani.*

℞. Rad. pœoniæ

Vifci querni, ana ʒß.

Cinamomi opt. ʒij.

Flor. calendulæ.

Lilij conuall.

Tiliæ

Lauendul. à p. i.

Rofat. rubr. p. ij.

F. Extractio cum fpiritu Iuniperi, vel

Vj, ad eminentiam digit. 4.

Decantetur.

℞. Tincturæ ʒx.

Sacchari candi puluerifat. ʒiij.
aut iv.

M. & accendantur, flagrentque con-
tinuò agitando, donec fyrupus fatis co-
ctus, aut plus minufuè fortis videatur.
Tum enim extinguendum erit incendiu.

Vires. *Præftantiffimus est Syrupus,
tam præcautioni, quam curationi infer-
uiens.*

Dofis cochlear f.

3. *Syrupus de Artemifia Fernely*

℞. Summit. Artemif. M. ij.

Rad. Iridis

Helenij

Rubiæ

Pœoniæ

Leuiftici

Fœniculi à ʒß.

Herb. Pulegij

Origani

Calaminth.

Neper.

Meliffophyll.

Sabinæ

Sampfuchi

Hysfopi

Prælij

Chamædryos

Chamæpityos

Parthenij

Betonicæ à M. j.

Sem. Anif.

Petrofel.

Fœnicul.

Ocymi

Dauci

Rutæ

Nigellæ ana ʒiij.

Contufa macerentur horis 24. in hy-
dromelit. lb. viij. Coquantur ad lb. v. &
cum facchari. lb. v. F. Syrup. qui condia-
tur Cinam. ʒi. Spic. ʒiij.

Vires. *Insignium est virium in uteri affectibus, a viscida mucilagine subortis, pronouet menstrua, uterumque repurgat.*

4. *Syrupus Cardiacus, F.F.*

℞. Vini albi generos. ℥iij.

Aqu. Rosar. ℥iij.

Cinamom. ℥ij.

Zinziber.

Caryophyll. ana ℥ij.

Ligentur omnia in petia, addaturque Sacchar. ℥i v℥.

Coque ad consistentiam syrupi postea adde

Ambr. gryf. gran. iij.

Mosch. g. i. in syndone.

Vires. *Conuenit in lipothymia, aliisque cordis affectibus.*

N. *Præstat sola infusione, vel in MB parare.*

5. *Syrupus de Eryfimo Lobelii.*

℞. Erysim. totius recent. M. v i.

Rad. Enul.

Tussilag. succo adhuc prægnantium.

Glzcyrrhiz. ana ℥ij.

Herb. Borrag.

Cichor.

Capill. ♀ ana Miß.

Flor. Cordial.

Anthos

Stœchad. vel Betonic. ana

M. ℥.

Sem. Anis ℥v i.

Passular. mundatar. ℥ij.

Incisis & contulis f. omnium decoctio s.a. in f. q. aquæ hordei, hydromelitis & ℥v i. succi Erysimi, ad ℥iij. vel. iij. exprime, inque Colatura dissolue sacchar. q. s. f. syrupus.

Vires. *Efficacissimus est ad mucilaginem pulmonum incidendam, & educendam, adeo ut beneficio eius iuuen-*

las decennio rauedine laborantes, se percurauisse, testatur Author libr. obseruat.

6. *Syrupus Antihecticus Rinierij Med. Regij.*

℞. Testud. lacustr. aut fluuiat. in frusta dissect. ℥ij. cancor. fluuiat. viuorum contract. ℥iij. sem. quat. frig. maior. ℥i v.

Limacum per medium sectorum Mij.

Succi veron. mar.

Melon. ana ℥ij.

Vini alb. ℥v i.

Succinicot. ℥ij.

Vuarum Corinth.

Passul. ana q. s.

Ponantur omnia in magno matraccio bene obturato & sinantur digeri per ♂ 2 postea destillentur excineribus, & ex liquore destillato & sacch. cand. ℥i v. F. syrupus. Cap. ℥ij. pro dosi paulò ante pastum bis aut ter in die, adde vsus tempore

Lactis sulph.

Perlarum an. gutt. vij. M. & exhibe

Lac perlarum fit terendo eas super marmor in Alcool. irrorando aq. ros. paulatim, deinde iterum terendo in mortar. marm. cum succo limonum statim perlæ dissoluentur, filtra, colatura seruetur.

7. *Syrupus Nicotiana, s. de Petro simplex Querc.*

℞. Succ. Peti ℥i v.

Hydromelit. simpl. ℥i.

Oxymelit. simpl. ℥i v.

Omnibus simul mixtis, fiat digestio in MB. ♂ 2. vel 3. vt defecetur; hinc decanta, ac digere iterum vt supra donec materia ab omni sæculentia depurata fuerit, adde postea sacchari ℥iij. & coque in syrupum.

N. Succu

N. Succus Peti opus habet perexquisita & ingeniosa digestione, qua vis vomitina, ac deiectiona corrigitur, atque insirupum abit praestantissimum, aduersus omnes affectus asthmaticos, in quibus pulmonum bronchia pituita crassa ac viscosa adeo infarciuntur, ut intercepta respiratione suffocationis periculum immineat, in quo casu syrupus hicritè praeparatus & administratus mira praestat. Cerebrum insuper à catarrhis, sine fluxionibus serosis & frigidis liberat, simulque per inferiora educit.

Dosis cochlear. s. ubi tamen à principio summa opus est circumspeditione, postea vero dosis augenda erit.

8. Syrupus de Nicotiana compositus Quercetani.

℞. Succi Peti (Nicotianæ) depurati (vt supra) ℥iij.

Hydromelitis simpl. ℔. 1.

In quibus macera per ☿ 2. vel 3. M.

Fol. Hyssop.

Polytrich.

Adiant.

Flor. Tussilag.

Stachad.

Violar.

Bugloss. ana p. ij.

Sem. Bombac.

Mitic.

Card bened. à ℥1.

Follicul. senæ ℥iij.

Agaric. rec. trochisc. ℥1.

Cinamom.

Macis

Caryophyllor. à ℥1.

Dein fortiter exprimantur, digerantur denuo ad perfectam fecum depurationem. Colaturæ ℔iij. adde tantundem sacchari, coquantur in syrupum.

Vires. Ad anhelosos & asthmaticos aliosque affectus omnes pulmonum à fri-

gidis & crassis humoribus subortos, qui pulmonum bronchiis inhaerentes, vel rufsim antiquam, vel ipsam dyspnoeam pariunt, excellentissimum est remedium, alium leniter soluendo.

Dosis ℥iij. vel. ℥ij. ad summum.

9. Syrupus de pede cati compositus.

℞. Dactylor. mundat.

Iuiubar.

Sebesten.

Ficum recent.

Passul. maior. enucl. à ℥1 v.

Vngul. caballin. c. toto.

Pulmonar. maculos. c. flor. à Mij.

Pedis cati.

Ceterach. ana M. 1.

Glycyrrhiz. raf. ℥1.

F. Decoctio & exinde cum sacchari ℔ij. syrupus perfectè coctus.

Vires. Pectoralis est ac nutritiua, unde his qui phthisi laborant, solamini magno esse poterit.

10. Syrupus de Testudinibus Resumptiuis Renodai.

℞. Carnis testudinem. ℥1 v. (abiectionis cauda, collo & pedibus.

Hordei mundat. ℥ij.

Carnis daetylorum, ℥1.

Passularum, damascenarum.

Glycyrrhiz. raf. ℥1 v.

Sebesten.

Iuiub. ana num. 111.

Sem. Bombac.

Melonum.

Cucum.

Citrull. ana ℥1.

Sem. Lactuc.

Papau. alb. ana ℥ij.

Herb. Vngul. caballin.

Pulmonariæ ana M. 1.

Flor. violar.

Nenuphar. à ℥1.

I i 3

F. Decoctio.

F. Decoctio. In colatura clarific. ad
℔. i v. adde Sacchar. alb. ℔. ij.
facchar. rosati & diatragacanth. frig. ana
℥ v. F. Syrupus.

Vires. *Confert his qui à morbo chro-
nico resurgunt, macie confectis, tabidis,
phthisicis, & simil.*

Syrupi purgantes.

1. Syrupus Helleboratus minor

Quercetani.

℞. Fibrarum hellebori nigri. ℥ ij.

Agaric. rec. trochisc. ℥ ij.

Fol. sen. mundat. ℥ iij.

Turbith.

Hermodaetyl. ana ℥ i.

Sem. Anisi

Fenicul.

Cort Citri à ℥ ℔.

Caryophyll.

Macis

Cinamom. à ℥ ij.

Macerentur in Oxymelitis sim-
plicis, Vini maluarici, & aquarum Me-
lissæ ac Fumariæ ana q. s. vase vitreo
clauso, hinc leuiter bulliant ac expri-
mantur. Depuratæ per digestionem co-
laturæ addantur.

Syrupi de pomis redolentibus

solutiui

de succis rosarum pallida-
rum.

Sacchari rosati & violati ana

℥ i v. F Syrupus.

Vires, *Omnibus morbis à materia
tartaræa, crassa ac tenace, à phlegmate
adusto, bile aut melancholia dependen-
tibus, in capite, thorace, ventriculo, he-
pate, vtero, ipsisque articulis mirum in
modum confert.*

N. *Habet & idem Quercetanus Sy-
rupum helleboratum maiorem, sed suffi-
cit hunc in Officinis paratum asseruare.*

2. Syrupus Holagogus, F. F.

℞. Rad. Polypod. querc. rec.

Cappar. ana ℥ i.

Fol. Scolopendr.

Ceterach.

Meliss.

Betonic.

Rutæ murar. à M. i.

Flor. Triumcordial.

Cuscut. ana M. ℔.

Fœnic.

Anis. à ℥ ij.

Carthami contus. ℥ i.

F. Decoctio in s. q. aquæ, ad rema-
nentiam quantitatis, cui species infra
scriptæ infundi queant. Decoctio hæc
ita stet horis 24. tùm fiat colatura, &
in hac infundantur.

Fol. Semn. mundat. ℥ i v.

Agaric. albifs. ℥ ij.

Hermodaetyl. alb. ℥ v i.

Rad. Hellebor, nigr. in aceto præ-
parat. ℥ i.

Epithymi

Zinzib. alb. ana ℥ ij.

Caryophyllor. ℥ ij.

Macis ℥ j.

Bulliant parum & stent in infu-
sione horis 24. hinc exprimantur.

℞. Expressionem integram (ad
℔. ij. & ℥ iij.

Succi rosar. incarnatar. ℥ i x.

Sacchari albifs. ℔. iij.

Coque ad ℔. i v. circiter.

Vires. *Conuenit omnibus humoribus
expurgandis, præcipue atra bili, ac exin-
de morbis oriundis.*

3. Syrupus Vomitiuus.

℞. Aqu. Vomitoria s. benedictæ.

(sive illa ex croco sit, sive
ex vitro ℥ ii.) ℥ v i.

Aqu. Rosar. fragrant. ℥ ℔.

Pulu. cinamom. ℥ ij.

Digerantur

Digerantur vase clauso horis 24. postea cola: In colatura dissolue Sacchari ℥viij. coque ad consistentiam syrupi.

Dosis à ℥j. ad ℥ij.

4. *Oxyfaccharum vomitium.*

℞. Vitr. ꝑ ii puluer. ʒβ.

Acet.vini albifs. ʒvij.

Infundantur in $\text{M}\beta\text{l. } \Delta$. per horas
xv. colaturæ adde sacchari albiss. iv .
reduc in patina vitrea ad consistentiam.

Vires. uti eo possumus pro vomitorio
aduersus febres continuas, pestilentes
& intermittentes, paulo ante
paroxysmum, Item, contra venena,
Exanthemata, antequam scilicet pro-
dierint.

Dosis à Zj. ad vj. Sala.

N. Loco Vitri ꝑ in his compositionibus sumere quoque licet crocum metallorum, vel etiam flores ꝑij.

C A P. L X X X V.

De Tincturis.

Tincturæ, tùm liquidioris, tùm solidioris consistentiæ in usu sunt.

Liquidioris consistentiæ Tincturæ
nihil aliud sunt, quàm extractiones si-
ne abstracto menstruo.

Solidioris consistentiæ Tincturæ sunt pulveres, sine combustione, ex liquidioribus tincturis abstracto menstruo residui. Et hoc iuris sola mineralia sibi vindicare videntur.

Modus fiendi fit ad modum, quem de Extractis dedimus. Conueniunt nimirum Tincturæ cum Extractis in plurimis, adeoque non rarò confunduntur, quam confusionem vti in aliis, ita & hoc cè in loco remouere, non absque comodo foret. Hinc fiunt Tincturæ.

1. *Ex fructibus.*

℞. Rob, affunde , ac extrahe.

Vel R. Baccas seu fructus exiccaros,
affunde ∇ conuenientem stillatitiam, ac
extrahe, &c.

N. Si Tinctura lentè inspissetur, Extractum dicitur. Quercet. P. R. cap. 26. Sic fiunt Tinctura cerasorum, baccarum

sambuci,ebuli,& simil.

II. *Ex floribus.*

℞. Flores siccos, infunde in Vap-
propriata, (propria,) vel fontana tepida,
additis guttulis aliquot spirit. Si, vel
℥is.

Famosiores Tincturae sunt.

Ex Mineralibus.

Tincturæ⓪

☾
 ♀
 ♂
 ♀
 ♂
 ☉ i
 ♀ is

*vide libro
tertio.*

Smaragdi.

Ex vegetabilibus, & maximè ex floribus.

Tinctura Alkekengi è baccis.

Essentia croci, vid. l. 4.

Ceraforum nigrorum.

Fragorum.

Hypericonis, vide c. 57.

Flor. Pæoniæ.

Rhæados.

Rhæados.
 Rosarum,
 Violarum
 Granorum Sambuci
 Ebuli.

Ex animalibus.
 Tinctura fellis tauri, vide
 libr. 5.

1. *Tinctura Parac. diaphoretica correctâ*
à S. Cloß.

3. Zedoar.

Angel.
 Calam', arom.
 Galang.
 Macis
 Zinzib.
 Cinnam.
 Gran. parad.
 Piper. nigr.
 Garyoph.
 Sassafr.
 Sarsapar.
 Vlmaz, an. 3j.
 Aloës
 Mastich.
 Myrrh.
 Thur.
 Camph. an. 3ß.
 Mosch. ʒj Infund. in
 &

Aq. ros. moschat. an q. f. vt superemi-
 neant digitos 4. Adde ad maturandam
 putrefactionem

☿ per camp. 3ß.

Salis iuniperini 3ij.

Stent in loco calido per 14. ʒ.

Dof. ʒ. in formâ qualibet. Eliquat
glaciata, resinosa diffundit, fuliginosa ef-
flat, balsamicâ suâ vi. putredinem arcet,
& soporiferis morbis auxiliatur.

2. *Tinctura Cathartica S. Cloß.*

Arch. Mediomatricum.

✥ Scammon. 3j.

Turbith.

Agar,

Hermodaët.

Rhabarb. an. 3iij.

Puluerisata indantur lagenæ vitreæ
 addendo

☿ per 40. ʒ circulari, vt acrimo-
 niam deponat (veleius loco aq. cin-
 nam. alb. i. exstillat.) ʒß.

Infundantur per 8. ☿ in ciner. & agi-
 tentur bis aut ter singulis diebus, tin-
 ctus ☿ aureo colore depleatur serue-
 turque. Eius cochl. j. M. cum 3ß. syr.
 ros. pallid. viol. aut limon. acfacti cum

☉ li.

Benigne admodum corpus à saburrâ phleg-
maticâ aut serosâ vindicat & repurgat

C A P. L X X X V I.

De Trochiscis.

Materia Trochiscorum sunt omnis
 generis Medicamenta, quæ pul-
 uerisata, liquore conueniente, (viscoso)
 suscipi, compilariac impastari queunt.

Parantur autem in Officinis Tro-
 chisci, partim vt pulueres viscoso ali-

quo liquore compacti ab iniuria aëris
 eò melius asserventur, exigenteque ne-
 cessitate adhiberi queant, partim quoque,
 vt per se applicentur, e. gr. Trochisci
 bechici, sublinguales, prophylactici,
 trochisci pro fumo, & simil.

Modus

Modus fiendi

℞ Medicamenta subtiliter pulueri-
fata, redige in massam cum liquore con-
ueniente mucilaginoso, e. gr. cum mucil-
agine aliqua (Tragac.) cum succo, sy-
rupo, & simil.

Ex massa impastata formantur
trochisci, seu parui pastilli, (quibus
character pro libitu imprimitur,) vel
fiunt inde bacilli oblongi.

*Trochisci visitationes alterantes.**Trochisci.*

de Absynthio, Mesuæ, *August.*

de Agno casto, Rhafis, *Aug.*

Alexiterij s. contra pestem, 1.

Aliptæ moschatæ, cum ambra ac
moscho, A.

Aliptæ moschatæ, sine ambra &
moscho.

de Alkekengi, cum opio, A.
sine opio.

de Aniso, Mesuæ, A.

Bechici albi, cum moscho, A.
sine moscho.

nigri.

rubri, siue è bolo.

de Benzoin

de Berberis

de Camphora, Mesuæ.

N. *Renodæus alios è Myrepso
substituit.*

de Capparibus, Mesuæ.

de Charabe, s. succino, Mesuæ

de Corallio, Nicol.

Diacoralliu, Gal.

Cypheos Damocratis

de Eupatorio, Mesuæ

pro fumo vulgares, 2.

optimi, s. cum moscho, 3.

de Gallia moschata

Gordonij

Hedychroi

de Violis, Nicol.

de Lacca, Mesuæ

Moschardini, 4.

de Myrrha Rhaf.

Pectorales. Baculi pectorales, 5.

Prophylactici cum mithridatio, 6.

Ramich, Mesuæ

Diarrhodon, Nicol.

de Santalis, Mesuæ

Diafermaton, Gal.

de Spodio

de Terra sigillata, Mesf.

de Vipera, Gal.

de Xyloaloe, Mesuæ.

Huc referendi sunt. 1. Throchisci
ophthalmici, quibus imponitur no-
men Sief. 2. Candelæ pro fumo. 3. Sa-
po odoratus, ac 4. Poma Ambra, de qui-
bus partim suis locis, partim hoc loco.

Collyria sunt visitiora.

Sief. album cum & sine Opio

album Galeni.

citrinum Mesuæ

de plumbo Mesuæ

de rosis siccis

de thure Rhafis.

Vide

Di-

spen-

iator.

Trochisci purgantes.

Trochisci de Agarico, Mesuæ.

Agaricus Trochiscatus,

Alhandal, f. de Colocynthide.

de Rhabarbaro.

de Violis solutiui.

1. *Trochisci Alexiterij, Renodæi.*

℞. Rad. Zedoariæ

Gentianæ

Tormentillæ

Rad. Ireos flor. à ʒj.

Angelicæ ʒij.

Cinnamomi.

Caryophyllor.

Macis, ana ʒʒ.

Zinziber ʒj.

Coriandri præp.

Rosar. ana ʒj

Cort.citri sic. ʒij.

F. Pulvis subtilissimus, & cum succr. Glycyrrhizæ ʒvi. f. pasta molis, de qua formentur trochisci, vel potius bacilli oblongi.

Vires. Pesti præcauenda multum conferunt, si in ore detineantur, vel & in ventriculū demittantur.

2. Trochisci pro fumo vulgares.
F.F.

℞. Santal. citrin.

Rosar. rubr.

Caryophyll.

Cinnam. à ʒvi.

Benzoin. ʒiʒ.

Styrac. calamit. ʒi.

Sacchar. pulu. ʒxii.

Cum mucilag. Tragac. in ∇ ros. fact. f. trochisci.

3. Trochisci pro fumo cum moscho,
F.F.

℞. Benzoin. lb. i.

Styrac. calamit. ʒvij.

Rosar. rubr. ʒi.

Ligni aloës ʒ.

Caryophyll.

Santal. citr. à ʒij.

Sacchar. alb. ʒviij.

Mosch.

Zibett. ana ʒʒ.

M. & cum infusione tragacanth. in ∇ rosar. formentur trochisci.

4. Trochisci moschardini, aliàs confectio moschardina: corpus sine anima.

℞. Moschi ex rosar. dissolut. ʒj.

Sacchari albiss. ʒvi.

Amyli ʒv.

Atterantur pistillo, & cum mucaliginetragacanth. (ex 21.) in ∇ rosar. facta, f. grana instar hordeaceorum, quæ exciccentur in umbra, pro vsu.

N. Sunt qui sanguinem Draconis ʒij addunt.

Vires Graueolentiam oris emendant, si pastillus unus ac alter in ore detineatur.
5. Baculi pectorales.

F.F.

℞. Spec. Diatragac. frigid.

Diairecs simpl. ana ʒi.

Rad. Liquirit. ʒʒ.

Sacchar. albiss. ʒvi.

Cum mucilagin. tragacanth. F Bacul.

- *Vires. Tuss. m leniunt, asperitatem demulcent.*

6. Trochisci Prophylactici cum Mithridatio, F.F.

℞. Boli armen. in succo citri infusi & excicati ʒi.

Corall. rubr. præpar. ʒij.

Rasur. c. c ʒi.

Succin. alb. ʒij.

Rad. Tormentill.

Pimpinell.

Imperator.

Angelic.

Zedoar. à ʒij.

Cinamom. ʒij.

Croc ʒj.

F. Pulvis subtilissimus

℞. Huius pulueris ʒij.

Mithridatij opt. ʒi.

o o Cinamom.

Angelic. ana gutt. i.

Sacchar. albiss. ʒiij.

Cum infusione G. Tragac. in ∇ angelicæ facta F Trochisci.

Vires. Frequenti hic in vsu sunt ad pestem præcauendam.

Huius quoque loci sunt, candela & baculi fumales, quæ sunt ex pulueribus odoriferis, impastatis mucilagini Tragacanth. Styrac. & simil. ut trochisci pro fumo, à quo non differunt, quoad modum fiendi.

Sic sunt

7 *Candela females, F.F.*

℞. Benzoin. ʒxvi.

Lign. aloës.

Rhod.

Santal. citrin.

Ladan. ana ʒiv.

Oliban.

Mastich.

Garyophyll. à ʒiij.

Sacchar. alb. lb. ij.

Carbon. tilia. lb. vi. β.

F. Omnium puluis subtilissimus
& cum mucilagine tragacant. in ∇rosar. maioran. & cort. citri facta, for-
mentur candela, addendo parum sty-
racis liquid. & terebinth.8. *Massa seu baculi pro fornace,*

℞. Benzoin.

Storac. gal. à ʒi.

Ladan. opt. ʒvi.

Balsam. indic. ʒiij.

Lign. aloës ʒiij. (præstat Extract.

Mosch. Alexandr.

Zibert. ana ʒj. M. f. a. f. Massa.

Formenturque instar ceræ Hispani-
cæ baccilli fornaci affricandi.

CAPVT LXXXVII.

De Balsamis Inunctoriis, Linimentis, Vnguentis.

Balsami Inunctorij, Linimenta &
Vnguenta, vix præparatione & fe-
rè, non nisi consistentia inter se diffe-
runt, quam illi liquidiores habent in-
star mellis; ista paulo duriores, ac vix
fluidam; hæc crassiores adhuc, minus-
que fluidam: vbi tamen notari velim,
in praxi plerumque Linimenti ac Vn-
guenti nomina confundi.

Materiæ ex quibus parantur, sunt
olea, butyrum, adipēs, seu a, medullæ, re-
finæ, mucilagines, succi; vt & res aliæ,
quæ aptæ sunt dictis materiis, vel sub
forma puluerum immisceri, vel in iis-
dem colliquari, &c.

N. 1. } ʒj vel iiij. in linimentis
Sumitur ad } ʒi vel β. in balsamis
Olei ʒj. pin- } ʒj β. vel. ʒβ. in vnguentis
quedinis ferè } addita n. super pulueris.
ʒi. & c.

N. 2. Balsami ob molliusculam consi-
stentiam Cera carent. Linimenta vel
nihil, vel parum admittunt, (scil. ad
Olei ʒj. Cera ʒj.) Vnguenta vērò uti

consistentiam requirunt crassiorem, ita
& materiam volunt duriores, adeoque
Cera copiosiorē & nonnunquā gūmata.

Modus parandi.

Recipiuntur Olea, hinc adduntur
quæ crassiorem inducunt consistentiā,
idque vel sola mistura, vel, si opus sit li-
quefactione interueniente.

N. 1. Fieri potest quoque linimentum
vnguentumque ex pulueribus, melle, oxy-
melite, syrupo. & similisusceptis, in for-
ma scil. Electuarij.

N. 2. Succique aequi si addendi sint, co-
quendi illi sunt cum oleis ad humiditatis
illius aqueæ consumptionem, cuius indi-
cium est, si instilletur guttula super pru-
nas sine strepitu.

Balsami vitiatores sunt.

Balsamus Balsaminæ. 1.

Hispaniæ, 2.

Hyperici magistralis 3.

Mirabilis f. compof. 4.

Vterinus, 5.

Vulneratus. 6. 7. 8. 9. 10.

Linimenta vſtatiora ſunt.

Linimentum Hi, id eſt Balsamus
Hi, dictus, 11.

Linimentum de Amianto,
dentificium, 13.
Errhinum, 14.

Vnguenta vſtatiora.

Vnguentum

Agryppæ Meſuæ, Aug.

Ægyptiacum, A.

Alabaſtrinum, A.

Album. Auicenn.

Album Camphoratum, A.

Vnguentum

Althææ ſimplex, Dialthæa, 1.
compoſitum, A.

Anodinum, Cord.

Anodiaum, 15.

Anodin. Padagricum, Croll. 16.

Apoſtolicum Auicenn. A.

Aregon. A.

Arthanitæ maius
minus

Aureum Meſuæ

Baſilicum

de Bdellio

Butyraceum neruale. 17.

de Calce

ad Carunculas penis.

de Ceruſſa Auicenn.

Citrinum

Comitiſſæ

Cardiacum 18.

Cordiale, 19. 20.

de Cyclamine

de Cynogloſſa

Fuſcum

de Glycyrrhiza.

ad Hæmorrhoides

Noribergenſe.

Infrigidans Galeni

Louis ſ. de Verberna

de Lithargyrio

Martiatum magnum
paruum

Mercuriali

de Minio camphoratum

Narcoticum. 21.

Neruinum

Vnguentum

de Nicotiana

Nihili ad Oculos.

Ophthalmicum, 22.

Pectorale

Pedicularum

ad Perniones. 23.

Pomatum

Diapompholygos ſ. Nihili,
Nicolai, A

Populeum

potabile

Reſumptiuum

Rofatum

Rubeum camphoratum

ad Scabiem, 24.

Spleneticum,

de Succ. Arantij.

Sympatheticum, 26.

Terebinthinæ, 27.

ad Tineam

de Turia

ad Vermes

Violatum

Viride Regiæ.

Viride potabile. Butyrum Viride,
28.

1. Balsamus baſamina ſic fit.

℥ Fol. florum & fructuum baſamin.
ana ℥iv.

Rad. conſolid. maior.

Ophiogloſſ. an. ℥ij.

Ariſtol. rot.

Zedoar. an. ℥ß.

Viſci in folliculis Vlmi reperti
℥iß.

Succi astacor,

Fol. per vinc. &

Sanic. an. \mathfrak{z} j.

Infund. in Ol. oliu. q. f. & insolentur.

Colato oleo ad libr. sing. adde Ol. vernic. liqui. \mathfrak{z} j.

Hic balsamus inseruit nervosis partibus vulneratis aut ambustis, dolorem hemorrhoidum sedat & mammillarum inflammationum, addito camph. tantillo, cicatricibus dolendis prodest cum ol. ouorum mixtus.

2. Balsamus Hispania,

R. Olei vetustiss. \mathfrak{z} iv.

Hyperic. \mathfrak{z} j.

Terebinth. puræ, \mathfrak{z} viii.

Fruenti integr. \mathfrak{z} ib.

Rad. card. bened.

Valerian. à \mathfrak{z} i.

Thur. puluerizat. \mathfrak{z} j.

Radices & Herbæ crasso modo confusæ, ponantur in olla; infundanturque in Vini albi generosi, q. f. vt omnia in Vino mergant, per \mathfrak{O} (2.) hinc adiciantur oleum & frumentum, coquanturque omnia ad Vini consumptionem. Mox facta forti expressione, addatur Terebinth. & Thus, & iterum parum ebulliant, feruenturque in vase vitreo.

Vires. Sanat vulnera partium etiam nervosarum spacio, vt aiunt, viginti quatuor horarum.

Modus utendi talis est.

Abluto prius vulnere Vino albo frigido, statim inungitur totum vulnus oleo prædicto calente: quod si hoc commodè fieri nequeat, per syphonem intra vulnus, tamquam per clysterem immittitur & confertim labra vulneris ad mutuam contactum adducuntur ligatura, aut futura aut glutine: deinde partes circumstantes prædicto oleo similiter inunguntur. Supra vero vulne-

ris labia iam reducta, linteum imponitur, prædicto oleo madens, & supra hoc aliud Vino nigro expressum, mox alia lintea sicca: deinde fascia superligatur. *Vide Hieronymum Fabricium ab Aquapend. secundo Opere Chirurg. part. 2. c. 7.*

3. Balsamus hyperic. Magistralis.

soleum hyperaci magistrale.

\mathfrak{z} Ol. oliu. \mathfrak{t} b. i.

Vinl. rubr. \mathfrak{t} b. β .

Lumbricorum sale comuni asperforum \mathfrak{z} iv.

Therebinth. Venet. \mathfrak{z} j.

Graniorum matur. Matrifylu. septembri colle& Mij.

Florum hyperic. p. iv.

Insolentur per æquinoctium æstiuum aut paulò post, colato liquori adde spiritus thereb. in quo salis \mathfrak{N} ni quantum capere poterit solutum sit \mathfrak{z} j

Ol. myrrh. \mathfrak{z} j. M.

Per se vulnera curat.

4. Balsamus mirabilis siue Compositus.

\mathfrak{z} Balsam. Momord. seu Balsamin. sequent. \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{A} per Ω um thereb. extract. \mathfrak{z} ib.

Ol. hyperic. magistral. seq. \mathfrak{z} j.

Tinctur. \mathfrak{O} tis

Magnetis alb. pulueris. ana \mathfrak{z} i.

Digerantur per mensem. Instillantur guttulae aliquot in vulnus calidè, apposito desuper Empl. dia \mathfrak{A} Rulandi *Ex communicatione. S. Closs.*

5. Balsamus Vterinus,

R. Galban. puriss.

Serapin. elect. ana \mathfrak{z} vi.

Al. fœtid. \mathfrak{z} ib.

Ammoniac. \mathfrak{z} i.

Dissolue in oleo destillato Iuniper. & Therebinth. addendo olei Lauri stillat. \mathfrak{D} . succin. \mathfrak{z} ib. M.

Kk 3 Vires.

Vires. Vteri suffocationes insigniter
fistit, menstrua ciet si umbilico inunga-
tur, vel abdomen deorsum eo confricetur.

6. Balsamum vulnerarium,

Crollij.

R. Flor Hyperic. lb. 1.

N. Colligitur cum Solis ortu, balsa-
micotempore, in exaltatione, videlicet
circa Festum Iohannis ante nouilu-
nium.

Flor. Cheiri.

Centaur. min.

Chelidoniae

Prunell.

Chamomill.

Rad. Aristoloch.

Consolidæ mediæ vel maioris,
à ʒiʒ.

Rosar. rubr. ʒiʒ.

Mumiæ transmar.

Myrrh.

Thuris à ʒiʒ.

Mastic ʒi.

Storac. liquid. ʒij.

Incisis incidendis & tritis teren-
dis F. infusio in V boni, lb. viij. & ali-
quot, hinc decantetur cum forti expres-
sione. Spiritui huic tincto, (nisi velis
maioris efficaciam ergo reiterare infusi-
nem florum,) addatur olei oliuarum re-
centris quod supra ramenta pingua ab-
ietina per octo dies, indigestione stetit,
lb. v. Terebinth. claræ commun. & resi-
næ laricæ lotæ in V hyperic. lb. iʒ.

Iterum per C 14. omnia digerantur:
ultimo abstrahatur V in MB. tunc bal-
samum manebit in fundo rubeum, instar
sanguinis.

Vires. Balsamum est ad vulnera &
punctiones sanandas efficacissimum. Con-
fert & omnibus, tumoribus, inflamma-
tionibus, contractis & contusis membris,
rupturis ossium.

Vfus idem qui precedentis esse po-
test.

7. Balsamus vulnerarius.

R. Galbani

Ammoniac.

Bdell. à ʒiʒ.

Macerentur in F per C 3. hinc
colentur & inspissentur ad consisten-
tiam mellis.

Postea.

R. Myrrh. rubr.

Mastic. el. à ʒiʒ.

Oliban. ʒi.

Puluerifata solue, coquendo igne
lento in Ol. Oliuar. lb. 1. oleum sc. per
vices affundendo, semperque agitan-
do donec posteriora hæc bene fuerint
eliquata.

Tandem gummata illa priora in-
spissata (vti dictum,) admisce simili
modo agitâdo, & dein recens oleum oli-
narum per vices affundendo, donec &
altera quoque lb. olei adiecta fuerit, &
Balsamus aliquid flauedinis cōtraxerit.

Vulnera recens punctum & cæsum
facta, citissime curat.

Vfus idem est qui precedentium.

N. Fortior erit in mundificatione vul-
neris, si arguinis ʒj. addideris, & per
mensem in solaueris, qua ratione feces
subsidentes reiciunt. Hartim. in praxi.

8. Alius Balsamus Vulneratus.

R. Ol. oliuar. ʒiv.

Terebinthin. ʒv i.

Mastic. ʒv.

Thur. ʒi

Myrrh. ʒv i.

Galban. ʒj.

Ærugin. ʒij

Camphor. ʒj.

Acet. opt. ʒiʒ.

Sp. vini ʒiʒ.

Coq. ad consumptionem aceti.

Cola

Colatura seruetur pro vsu.

9. *Balsamus Vulnerarius Metensium.*
 ʒ Ol oliu.

Sem. lini purif. an. ℥℥.

Laurini ʒj.

♂♂ Baccar. iunip. still. ʒ℥.

Garyophill. ʒj.

Aloës succotr ʒij

Thereb. Venet. ʒij

Virid. æris ʒijj.

♂ alb. ʒi℥.

Puluerifanda puluerifentur & coquantur simul Δ lento dum virorem acquirat oleum. F. Balsf.

Lauetur vulnus recens siue cæsim, siue globulo sclopetico inflictum vino tepente, deinde Balsamus ex tomento lineo, quantum fieri potest calidè instilletur & Empl. stictico Croll. obtegatur pars vulnerata. Breui admodum tempore curat. symptomata vulnerum, inprimis verò Synoniam arceat, morsuum veneratorum malitiam corrigat. Ex cōmunicatione S. Clo.

10. *Balsamus vulnerarius Samaritanus.*

℞. Ol. oliuarum, vel hyperic.

Vini alb. generos. an.

Coquantur ad ignem ad consumptionem vini.

Vires. Insignis est ad vulnera recentia mundificanda, & considerata.

11. *Linimentum de H. Balsamus*

H

Solue Sal H in X, vt optimè eo imprægnetur, hinc abstrahe aliquantulum X, miscéque huius ʒviij. cum olei rosat. ʒiv. vi. &c. agitâque vt f. Linimentum.

Vires. Confert inflammationibus, & ambustis illitum.

12. *Linimentum H composutum, seu Linimentum de amianto.*

℞. Amiant. ʒiv.

Plumb. vst. ʒ. xij.

Tut. præparat. ʒij.

Calcinentur, deinde puluerifata macerentur cum X, ac quotidie per mensem materia agitetur semel: post mensem ebullienda est vnus horæ quadrante, ac quiescere finitur, donec clarescat.

Deinde

℞. Aceti huius clari.

Ol Rosac. ana.

Misc optimè, donec F. Linimentum.

Vires. Miraculosum est; ad tineam puerorum, & ad ulceratibiarum sananda. Inungitur scil. pueri caput totum ad scabiem. Ulcera vesperi inunguntur. Boëthius de Boodt.

13. *Linimentum dentifricium.*

℞. Rad. Ireos ʒi.

Pumic. ʒi℥.

Alum. vst. ʒ℥.

Oc. ʒ.

Corallor. rubr. ana. ʒi.

Puluerifata excipiantur melle rosato. F. Linimentum.

14. *Linimentum Errhinum.*

℞. Succ. Ireos;

Cyclamin.

Maioran.

Betæ ana ʒij.

Ol. Irin. ʒvi.

Elaterij gran. vij. cum Cera.

F. Linimentum. Crato,

15. *Unguentum C.C. Anodynum Guilhelmi Simonidis.*

℞. C.C. dimidium minutim incisum ponatur in cacabo vino pleno, addito semper vino q. f. bulliant ad vini consumptionem. Deinde abiecta crassiore C.C. parte, medulla remanens frictur nanibus, adde postea

Kk 4

Ol.

Ol. Abrotan.

Hyperic.

Aneth.

Scorpion.

Lumbric. terr.

Nucum

Laurin.

Rut.

Spic.

Sabin. an. ʒiʒ.

Axung. human. ʒiʒ.

Castor. ʒii.

Nitri ʒiʒ.

Euphorb. ʒ.

M.F.l.a. Vnguent.

Vites. Summè prodest in doloribus
scorbuto-colicis atrocissimis, tum & in pa-
reticis & podagricis, aliisque torminibus.

16. Vnguentum Anodynum in
Podagra.

R. Flor. Rosar. sylvestr. M.x.

Hebr. & Cortic exterior. hyoscyam.
recent. M.vi.

Concisa coquantur in Vini mensur.
f. hinc exprimantur & colentur. Cola-
tura 1. Δ ad mellis consistentiam in-
pissata, adde pingued. suill. castrat. lb. ij.
misce optime ad Δ, tandem vbi pa-
rum refrigerata fuerint: admisce

Opj in vino solut. ʒi.

Croci pulu. ad magnitudinem
auellonar. duarum.

Extract. flor. verbasci. ʒʒ.

F. Vnguentum.

Vires. Singulare est in sistendo dolo-
re Podagrico & Nephritico, si calide af-
fectus illo inungatur.

N. Vbi dolori nephritico velis appli-
care, opera precium feceris, manipul.
duos vel tres baccharum Iuniperi ab ini-
tio compositionis cum hyoscyamo teras &
exprimas. Croll.

17. Vnguentum butyraceum vernale

S. Cloß.

R. Herb. absynth. virid.

Maioran.

Sisymb.

Hyssop.

Meliss.

Calamenth.

Orig.

Basilic.

Hyperic.

Rut.

Calend.

Sabin.

Tanac.

Arthemif.

Abrotan.

Flor. Chamæm.

Melil.

Hyperic.

Bethon.

Agrimon.

Centaur. min. a. M.i.

Concidantur minutum & in magno
fistili bull. in butyr. Maial. lb. vii.

V lb vi.

Percoctis herbis & consumpto V
exprimantur per torcular & coquantur
simul cum butyro, admiscendo succo
nicot. depurat. lb. ii.

Thereb. lb. i.

Cera ʒvi. F. Vnguentum.

Tires: Valet ad omnes affectus frigi-
dos nervorum, spasmus Cynicum, præser-
tim si spondyli cervicis & partes illæ qua
mouent musculos faciei eo inungantur,
si verò totum pectus & cartilago Xypheu-
des, tunc sedat singultum, tuncque sic
prescribitur.

℞ Bals. Peruvian. ʒi.

Butyrosi nostri ʒii.

V ʒi. M. omnia ad exhalationem
vsque V.

18 Vnguentum Cardiarum, Herzge-
span

ſpan Salb! F.F.

℞. Herb. Cadiac.
Chamædr.
Malu.
Senecij
Iaceæ
Amar. dulc.
Scabioſ.
Semperviu.
Morſus gallin. ana. M. ij.

Incidentur & coquantur in ℞. viij.
butyri recentis, ad. conſumptionē a quo-
ſitatis, dein exprimantur, & F. Vnguen-
tum.

Vires *Frequentis uſus in affectu infan-
tum, quem Cardiacam appellant. Fricant
eo hypochondria & locum cordis, &c.*

19. Vnguentum Cordiale, D.D. Ar-
nold. VVeikhardi pro Officinis
F. F.

℞. Vng. roſar. Meſ. ℥ iij.
Ol. Scorpion. ſimpl. ℥ i^r,
Nuciſt. Expreſſ.
Stillat. cort. citri.
camphor. ana. ℥ i.
Antidot. Matthiol.
Theriac. Andr. ana. ℥ iſſ.
Aloës roſar. ℥ ij.
M.F. Linimentum.

Vires. *Corroborat Baſamum vite,
languidiſque viribus ſubuenit. Cordi
inunctum.*

20. Vnguentum Cordiale Cl.
Ludou. ab. Hornig.

℞. Vng. roſ. opt. loti ℥ iij
Baſam. Apoplect. ℥ j.
Ol. Nuciſt. expreſſ. ℥ j.
Still. cort. citri. ℥ ſſ.
Cinam. g v.
Roſar. g. vi.
M. optimè.

Uſus idem qui prioris.

21. Vnguentum Narcoticum.)

℥ Sacchar. ℥ ni ℥ ij.

Opij ℥ j

Camphor. ℥ j.

ⷑⷐ expreſſ. nuc. moſch. ℥ j.
nucleorum perſic. ℥ ij.

ambr.

Moſch. an. ℥ j. F. l. a. Vnguentum.

Vires. *Non tantum tolluntur ardores
& dolores Capitis, ſed etiam ſuaniter
conciliatur ſomnus, ſi utraque tempora
eo illinantur.*

22. Vnguentum Ophthalmicum, F.F.
D.D. de Spina.

℞. Tut præparat. ℥ ſſ.

Camphor. ℥ j.

Aqu. roſar. Alb. ℥ i.

Butyr. rec. ℥ i.

Virid. æris parum.

M.F. Vnguent.

Vſus. *Applicatur ciliis, in inflam-
matione ac rubedine oculorum.*

23. Vnguentum ad perniones mi-
randum.

℥ Cer. flau.

Picis reſin.

alb.

Ol. oliu. &

Sem. lin. ana ℞ ſſ.

Sæui bouini

Veruec. liquat. ana quart. iij.

Thur. albiff. ℥ ij.

Minij ℥ i officinarum ℥ iij. F. Vn-
guentum.

*De quo illinatur calidè cum plumâ
pernio ulceratus ſuppoſito linteolo mun-
do. Nō ulceratus v. fortiter petroleo ante
Δ confricetur. Tanta utilitatis eſt, ut
quotannis plures iſtius Vng. libras in
pauperes erogat. S. Cloß. Fiſſuras in ſuper
mamillarum & Eryſipelata leniora ſu-
nat præcedente fotu cum V.*

24. Vnguentum contra ſcabiem.

℞. Lithargyr.

L i

Ceruf.

Cerus. alb. an. \mathfrak{z} i \mathfrak{b} .Acet. rosac. \mathfrak{z} i \mathfrak{b} .Ol. rosar. \mathfrak{z} v i. \mathfrak{L} is v i v. \mathfrak{z} v i.Sal. comm. \mathfrak{z} i j.Butyr. recent. \mathfrak{z} i j.Terebinth. \mathfrak{z} i \mathfrak{b} .

M. f. a.

25. *Vnguentum somniferum, F. F.* \mathfrak{R} . Opij thebaic. \mathfrak{z} i j.Croc. \mathfrak{z} \mathfrak{b} .

Vng. rosar.

alabastr. ana \mathfrak{z} i j.Ol. nucist. \mathfrak{z} v. \mathfrak{z} j.

Acet. sambuc. parum.

F. l. a. Vnguent.

Vires. *Inungitur temporibus, fronti, & cernici pone aures, ad conciliandum somnum.*26. *Vnguentum spleneticum.* \mathfrak{R} . Ol. Amygdal. amar. \mathfrak{z} i.Cappar. \mathfrak{z} i j.Nucl. persic. express. \mathfrak{z} \mathfrak{r} .

Succ. Rad. Bryon.

Cyclamin.

Cicut. ana \mathfrak{z} i j.Gumm. Ammoniac. in \mathfrak{H} dissolut.Bdell. ana \mathfrak{z} i \mathfrak{b} .

Pulu. Cort. cappar.

Tamarisc. à \mathfrak{z} \mathfrak{b} .Fraxin. \mathfrak{z} v i.

Ceterach.

Summ. centaur. min. à \mathfrak{z} \mathfrak{b} .Sem. Cymin. aceto macerati, & iterum exciccati. \mathfrak{z} i j.

Cera noua, q. f. Vnguent.

Vires. *Uim habet calfacientem, emollientem, resoluentem, aperientem, roborantem.*N. Penetrandi gratia potest addi \mathfrak{z} j. vel ij. Ol. spic. vel. Ol. stillatit. absynth. \mathfrak{z} i \mathfrak{b} .27. *Vnguentum Sympatheticum, Crollij.* \mathfrak{R} . Adip. Verris aprugn.Vrsin. ana \mathfrak{z} iv.

Bulliant per horam dimidiam, in Vinorubro, fundanturque super aquam frigidam, colligaturque pinguedo supernatans.

Dein

 \mathfrak{R} . Lumbricorum lotorum pulueris.

Cerebri aprugni

Santal. rubr.

Mumia

Hæmatit. ana \mathfrak{z} i.Vfnea è cranio hominis interempti, \mathfrak{z} i.

F. l. a. Vnguentum cum pinguedinibus illis.

N. 1. *Animalia illa quò seniores, eò adeps melior.*N. 2. *Vfnea colligenda (crescente, & in bona domo existente, ♀ scil. si fieri possit non ♂, aut Hi. Parandumque Vnguentum in libra existente.*N. 3. *Sunt qui omittunt Vfneam & Mumiam.*

Vfus.

Hoc Vnguento sanantur omnia Vulnura, (modò nerui, arteria, &c. non sint læsa.) Vngatur telum, quo vulnus inflictum, quotidie semel, si necessitas urgeat, & vulnus sit ingens, alioquin sefecundo vel tertio die inunxisse sufficit.

N. 1. *Telum seruetur in linteolo mundo, & loco nimis calido, ne damnum inferatur Patienti. Cauendum etiam ne pulvis super telum cadat, nec ventus afflet in loco frigido, alioquin Patiens mirè affligeretur.*N. 2. *Si Vulnus punctim inflictum, vngatur telum versus mucronem descendendo.*N. 3. *Si telum desit, sanguis ex vulnere lignello suscipiendus, quod dein et de telo*

de telo dictum, tractandum. Hac ratione dolor dentium mitigari quoque potest, si nimirum lignellum sanguine Ginuarum imbutum, eodem vnguento inungatur.

Operatio huius Vnguenti perficitur identitate Balsami, siue spiritus illius Balsamici, qui in homine & cruore idem est. Inter hos enim spiritus non alia est differetia, quam quod in homine Spiritus ille adhuc vitali actu vigeat, in cruore autem coagulatus sit. Quare cum experiamur, affinitatem sanguinis tantum poste, ut vno fratre vel consanguineo proximo, peste correpto, & alter et si longo via intervallo absit eadem afficiatur; quid non fieri posse, autumabimus, sanguinis identitate?

28. Vnguentum Terebinthina, vulgò
Eyerſalbichen.

Terebinth. ℥.ij

Vitell. ouor. num. vi.

Mastich.

Myrrh.

Oliban. ana ʒi.

F. Vnguent.

Vires. In vulneribus generationem puris promouet.

29. Vnguentum Viride potabile, Butyrum viride, F.F.

30. Herb. Salu.

Hyssop.

NB. Cum maturante prælo sequentia medicamenta suis locis non fuerint inserta, ea hic subiungere placuit, quod ne ægrè feras, Lector optime, te amicè rogo. Referatur igitur ad Caput XXXIX. de Aquis reliquis.

1. Aqua ophthalmica.

31. Aq. rosar. alb.

Lil. alb.

Fœnicul. an. ʒx.

Bacc. Laur. contr. ʒij.

Prassij

Menth.

Betonic.

Scolopendr.

Scabios.

Cichor.

Fœnicul.

Melesifs.

Veronic.

Matrisylu.

Aquileg.

Rut.

Petrosel.

Millefol.

Centaur. min.

Agrimon.

Aristoloch. rot.

Plantag. c. toto ana M.ij.

Butyri Maialis, ℥. viij.

Infunde herbas omnes recentes suam quamlibet collectionem tempore in butyro, stentque donec omnes collegeris & infuderis, postea exprime; expressum coque ad consumptionem aquositatis, F. l. a. Vnguentum.

Vires Expetitur à vulgò, assumiturque ad sanguinem coagulatum resoluendum, dolores leniendos, pulmonum mucilaginem demulcendam & expellendam. Quin & extrinsecus ad dictos affectus adhibetur.

32. i alb. ʒij.

Camphor. ʒij.

Bulliant. in diplomate & stent per noctem bene clausa, manè colentur & conseruentur pro vsu.

Ll 2 ad Cap.

Ad Cap. I L. de Decoctis p. 176.

2 *Decoctum laxativum P.**de Spina.*

℞. Rad. Sarf. parill. ℥i

Alth.

Borrag. an. ℥℥.

Glycyrrhiz. ℥i℥.

Digerantur hor. 24. in lb. iv. ∇ æ
feruentis. Dein coquantur ad lb. iij

Postea adde

Rad. Polypod. ℥℥.

Epithym. ℥iij.

Fol. Sen. el. ℥℥.

Agaric. troch. ℥i℥.

Mechoacan. opt. ℥ii.

For. Borrag.

Bugloss.

Violar. an. p. i.

Tamarind. ℥vi.

Passular. min. ℥℥.

Dactyl. recent. N. iv.

Sem. Cartham. contus. ℥ij.

Anis.

Fœnicul. an. ℥℥.

Caryophyll.

Zinzib. an. ℥i

Coque adhuc parum s. a. dein exprimantur & colentur pro potu.

Vires : Blande mouet aluum, acrésque humores obrundit, adeoque couenit quā maximè in doloribus colicis.

Dosis. ℥iv. manè, & si libet post meridiem.

Ad Cap. L X X I I I. de Pilulis, p. 255.

3. *Pilula hysterica, Greg.**Horstij.*

℞. Aloës succotr. ℥iij.

Myrrh. opt. ℥j.

Extr. cal. ar.

Card. bened. an. ℥℥.

Croc. g. iij.

Rad. Gentian.

Aristol. long.

Dictamn. an. g. v.

Cum Rob. sambuc. f. Massa

Vires : In impuritate uteri, mensum obstructione à crassis & pituitosis humoribus proveniente, cum successu exhibentur.

Dosis : ℥℥. per dies aliquot continuando.

Et sic Finis esto Libri Secundi.

P H A R M A C O P O E I A E

MEDICO-CHYMICÆ,

LIBER III.

DE

MACROCOSMOLOGIA,

SEV MINERALOGIA.

C A P. I.

De Mineralogia in genere.

LIBRIS superioribus medicamentorum tractationes generaliores fuerunt cum subiunctis compositis, quæ non passa sunt speciali alicui certæve natiuo accenseri, qua ratione Pharmacopœia generalis dici posset: specialior sequitur, qua natiua singula cum annexis præparatis perstringuntur.

Pharmacologiæ specialis partes sunt, Macrocosmologia, Phytologia & Zoologia. Tot enim numerantur Mundi vniuersi regna: macrocosmicum scilicet vegetabile & animale, eaque inter se summa cognatione coniuncta.

N. Regna hæc vocat Hippocrates; (lib. de Dieta,) tres concentuum harmonias, similitudine ex musicis desumpta. Nimirum sunt instar trium sonorum, perfectam & absolutam vniuersitatis harmoniam constituentium. Basim Macrocosmus perhibet, qui reliquis duobus

substernitur cœu fundamentum, sine quo ea nec concordare inuicem, nec subsistere queunt. Regnum vegetabile refert tertiã in musicis dictam, videlicet, ut latitudo huius semitono inter tertiam maiorem & minorem circumscribitur, ita & in regno vegetabili latitudo deprehenditur, qua alia ad naturam macrocosmicam propius accedunt, alia longius ab eodem recedunt. Latitudo hæc vegetabilium iuxta Moses triplici terminatur classe. Prima continet germen pumilum, sponte nascent (רשא) Secunda herbam seminificam (עשב) Tertia, plantam lignosam (צב). Regnum porro animale, quintam & sextam exhibet. Hæc enim uti longius à basi recedunt, ambitumque integri toni continent: ita & regnum animale non modo longè à natura macrocosmi distat, sed & latitudine maiori circumscribitur. Sunt nimirum in hoc regno animalia aquea, (כנפס היחטום id est, anima, seu spiraculum viuens aquarum.) Sunt & ter-

rena (נפש היה האדָם i.e. anima seu spiraculum vivens terra.) Est & Homo אדם ex Adama, i. e. terra & aqua exaltatis creatus. qui praterquam quod est cum reliquis animalibus נפש היה i.e. anima vivens, inspiratum habet insuper נשמת הוּם spiraculum vitarum, adeoque reliqua omnia antecellit.

Macrocosmologia est rerum macrocosmicarum enodatio.

Res macrocosmicas voco; quaecumque extra familiam vegetabilium & animalium collocantur, siue primariae sint, i. e. macrocosmi membra, siue secundariae, i.e. ex perittomate macrocosmico productae.

N. Constitutionem rerum macrocosmicarum generalem libro primo passim descripsimus, quò Lectorem remittimus.

In usurpatione generaliter hîc pensandae veniunt vires, ut & modus utendi.

Vires, mineralibus fortiores, ac magis radicales inesse quàm reliquis, ex eo convincitur, quod primae origini sint propiora, idcirco & unitiora, & consequenter fortiora. Virtus enim unita fortior.

N. Fortitudo hac secundum latitudinem demetienda est, qua à primo illo principio distant. Sunt enim è mineralibus, quae vel ad naturam vegetabilium progressa sunt. Horum virtus ut magis est explicata & extensa, ita minus fortis. Sic sunt bitumina.

Sunt e contra, quae à natura Universalis hauri ita longè recesserunt. Horum igitur virtus unitior, ita & fortior. Sic sunt Salia, Metallum, & sim.

N. 2. Habent & vires mineralia superfluiarias, quae facile in actum deducuntur, e.g. sal vires habet, quas exercet in substantia, interna enim Omnis vires non apparent, nisi sal sit innersum, e.g. in spiritum redactum.

Modus utendi mineralibus, tam internus; quàm externus esse potest.

N. Sunt qui usum internum mineralium precipue mercurialium, metallicorum & salinorum ex medicina deturbant. 1. Quia sint venenata. 2. Quia sint acria & corrosiva. 3. Quia idcirco perniciosam post se relinquant.

R. Ad 1. Non adhibentur quatenus venenata, sed quatenus saluti conferentia, siue hoc sit acquisitum veneni ablatione siue correctione, &c. Constat nimirum rem, quo nobilior primitus fuit creata, eo deteriorem postmodum vi corruptionis evasisse: Corruptio autem quia accidentalium est, essentiam & radicem profus non abstulit, sed occultat ac detinet sub suo dominio. Exemplo sit serpens venenatus, qui sub veneno salutarem circumfert antidotum: adde quod nec omnia quae veneni accusantur, venena reuera sint.

Ad 2. Non adhibentur quatenus acrimonia illa noxia est. sed quatenus reliquis mista intentioni Medici convenit, vel & quatenus mitigata est eadem & emendata: Sic ingreditur Theriacam chalcitis, sic allium culinam, &c.

Ad 3. Particulariter concluditur, & non nisi aduersus ea de quibus constat, quod perniciosam dispositionem introducant. In his autem constituendis uti iniquum esse duco limites transcendere: ita temerarium reputo, mineralibus vel solis, vel citra necessitatem velle inherere.

Res macrocosmicae seu minerales sunt tum primariae, i.e. ad naturam Elementorum ceu macrocosmi membro- rum propius accedentes, ut Terrae & Aquae: tum secundariae, i.e. è perittomate macrocosmi prognatae, ut: Lapides, Metalla, Metallis finitima seu semimetalla, metallica excrementa, Salia, Sulphura.

C A P. II.

De Terris.

DE Terraincipientibus, non quatenus Elementum audit simplex, soloque conceptu comprehensibile, sed quatenus macrocosmico semine imprægnata est. Mortua enim recte à Paracelsio perhibetur, viuere autem Elemento inuisibili. i.e. vapore seu spiritu vniuersali infuso: quippe huius virtute, terra aliàs mortua viuificatur, sterilis fœcundatur, vegetatur, inque naturam variam, tum mineralium, tum vegetabilium, tum animalium facessit. Ex mineralibus sunt, quæ terræ faciem adhuc quidem retinentes, à communi tamen terra quodammodo recedunt, atque medicarum terrarum classes subeunt. Hæ pro diuersitate matricum, colorum, proprietatum, regionum vel aliarum etiam circumstantiarum, diuersa nomina fortiuntur. Sic dicitur 1. Ratione soli natalis; Terra Lemnia, Turcica, Armenia, Chia, Melitea, Strigensis, Brundusiaca, seu Bohemica, Labacensis, siue VVeterauica. 2. Ratione proprietatū & colorum: terra, Oris, (Oris ♀ rea, ♂ialis, ♀ nina, & 3. ratione signi impressi; Terra sigillata, &c. Nos reliquis Terrarum speciebus omissis, Officinarum nostratum terras solummodo enodabimus.

N. Dicitur Arabicè Teri, Græcè *Ter* vel *Ti* German. *Erd*.

Vires. Terram in genere frigidam communis statuit opinio, nixa Elementorum quadruplici combinatione, quippe quâ terra per frigiditatem ad aquam accedit, aqua per humiditatem ad aërem,

aër per calorem ad ignem, ignis per siccitatem ad terram. Verum, licet hac de Terra dici queant, quatenus Elementum simplex illa consideratur, id est, quatenus cum reliquis Elementis, Elementorum generationem ingreditur; Atamen quatenus nobis terra offertur, minime talis censeripoteroit, quippe (teste Hippocrate libro *πεὶ σαρκῶν*, potius *πεὶ ἀρρῶν*) multum calidi (spiritus illius, de quo supra) terra inest, cuius vigore fœcunda ipsa redditur. Fœcunditas enim non nisi à principio spirituosoprocedit, eoque calido, licet in caliditate ea, maxima scilicet latitudo ac diuersitas deprehendatur. Quoad qualitates reliquas astringentis censeretur natura ac putredini resistentis.

PRÆPARATA.

Præparationes quibus Terræ subitici possunt, & inde Medicamenta producta sunt.

1. Purificatio seu Lotio: vnde Terra lota.

2. Preparatio officinarū: vnde præparata

3. Præcipitatio: vnde Magisterium.

4. Destillatio: vnde Spiritus &c.

1. De Lotione,

Quia Terræ, vt plurimum sabulo ac calculis scatent; lauari communiter solent, id est, in aqua dissolui, quâ solutione sabulosa, ac lapidosa substantia, vt pote quæ terrâ vtili ponderosior est, subsidet. Hinc aquam terrâ turbidam decantant, exhalandquæ exiccant: verum lotio hæc, meo quidem iudicio citra aliqualem, imò magnam virium iacturam

iaceturam fieri vix poterit; Nimirum pars quædam subtilis (qua magna ex parte terræ perfusæ sunt) lotionem illam recedit: Volatilis itidem terræ pars (quæ imprægnata terræ sunt) exhalando euanescit. In præparationibus itaque præstat terram crudam non lotam recipere.

N. *Non improbamus imbibitionem seu impregnationem, qua terræ succo aliquo medicamentoso iteratis vicibus humectantur, rursus excitantur, atque ita viribus confortantur nonis.*

2. Præparatio.

Præparandi modus non est diuersus à modo præparandi generali, c. 76. Læuigantur nimirum terræ, subindeque irrorantur aquâ appropinuatâ (v. g. Tormentillæ,) redigunturque in pulpam per se exiccandam.

3. Præcipitatio:

vnde

Magisterium.

Soluitur Terra in Spiritu aliquo acido, e. g. Spiritu ☉, vel simili, solutio decantatur, præcipitaturque cum oleo ☿ per del. vel cum ♀, communi largiter effusa, præcipitatum edulcoratur aquâ fontana.

4. Destillatio ac Sublimatio,

vnde

1. Spiritus simplex.

℞. ☿ orbiculos formatos ac destillat igne nudo ex Retorta. *Vide infra de Terra sigillata.*

Spiritus cum Vino.

℞. Terræ, e. g. Strigenis, (de minera antequam lauetur,) q. v. affunde aquam destillatam: inde Retortæ, ac destilla lente, vt aliquantulum aperiatur corpus. Hinc superfunde ♀, digere & destilla.

3. Spiritus Alcalisatus seu Balsamus.

℞. Terra Strigenis, (crudæ non lo-

tæ,) q. v. affunde aquam tonitrualem, macera aliquot septimanas ad putrescendum. Hinc destillata per ☿. Ex materia superstita extrahe ☉ idque destillato liquori iunge, circula per mensuram. Postea destilla iterum. Sic liquor secum rapiet Sal, nanciscerisque subtilem Balsamum.

Aliter.

℞. Terræ crudæ vel lotæ, e. g. lib. xx. &c. destilla per curcubitam vitream loricatam ad latus inclinantem (vel per Retortam) calore sat forti gradatim adhibito. Primum extillat Aqua, hinc Spiritus; Spiritibus animaduersis augeatur ignis, & sublimabitur Sal: Coniunge salem hunc aquæ destillatæ, ac destilla denuo semel ac iterum, vt post destillatum liquorem Sal sublimetur: vel digere simul sic Balsamum habes preciosum, Conrad. Kunrath, in Medulla destillat.

N. In copia ☿m destillare oportet, alias parum ☿ nancisceris.

I. TERRÆ ARGILLACEÆ, SEU SIGILLATÆ.

Omnibus Terrarum generibus laudem merito præripit argilla, quæ à sigillo quo ferè notata venditur. sigillata dici solet, Arabicè Terimacchim. Germ. Siegel Erd. Hanc varij generis Officinæ exhibent.

Sunt enim Terræ sigillatæ, 1. Turcicæ (Turcicis Characteribus insignitæ) quas pro Lemniis terris communiter venditant, cum veræ terræ Lemniæ Galeni minimè respondeant. Verum enim verò sibi qui Terram sigillatam in placentuliscinerice coloris Constantinopoli aduectam, pro vera Terra Lénia usurpare velint, vt pote quæ inter modernas præstantissima sit, ipsis bellum propterea non indicam

2. Est Terra Melitea, sic dicta, à Melita seu Maltha Insula. in qua eruitur, aliàs Terra sigillata Sancti Pauli.

3. Est & officinalis, terra sigillata Germanica, eaque duplex, vna dicitur Strigenfis lutei coloris, quæ in Scaprensula auri Suenicensi reperitur, dicitur Officinis Terra sigillata Strigenfis, à Striga Silesiæ Oppido, vbi præparari ac sigillari cæpit: dicitur & Medulla vel axungia Ois, eò quòd ☿ re Solis imprægnata credatur: Altera Lignicenfis vocatur, estque triplex, coloris scilicet rubei, albi & cinerei. Hanc vocant axungiam Lunæ, quippe quæ ☿ e (æ sit perfusa; Item Vnicornu minérale, quod viribus vero Tnicornu respondeat.

N. Similiter & reliquorum metallorum cuniculis inueniuntur terra. Sic & in VVetterania, haud longe à Lacabo oppido, species quadam terra datur, quæ ad axungiam Ois accedere videtur:

Delectus; Præstantissima omnium, quæ modernis in vsu sunt, censetur Lénia, rubri, hinc cineritij coloris, quæ Constantinopoli ad nos peruenit. Huic succedere potest axungia Solis, in affectibus cordis, vel axungia Lunæ, in capitis & Epatis morbis: Ex Lunari autem antecellit ea quæ cineritij coloris est.

Nota Bonitatis in terris est, 1. si lingue adhæreant, si salina aut humore humectata, in bullam sese eleuent, vel in ∇ m coniectæ bullas excitent.

Vires Exciccat, astringit, resistit putredini venenæque, resoluit sanguinem grumosum, confortat cor caputque, sanguinem dilatat, adeoque ciet sudorem. Vtus præcipui in peste, febribus malignis, Diarrhea, Dysenteria, in morsibus animalium venenatorum, Extrinsecus in

vulneribus malignis mundificandis, in ictu venenato.

N. 1. Terra Labacensis, Terra sigillata vires emulari videtur: sudores largiter mouet nec vi adstringendi reliquias cedit.

N. 2. De axungia Solis experientia comprobanit; 1. Quod cruda, (qualis sc. ex minera eruitur) sæpissimè Epilepsiam curauerit, 2. Quòd in Philtris maxime profuerit.

Dosis à ʒʒ. ad ʒij.

PRÆPARATIONES ET PRÆPARATA TERRARVM ARGILLACEARVM AC INPRIMIS SIGILLATÆ.

1. Terra sigillata præparata.

N. Vt plurimum terra sigillata sine præparatione vulgari in vsum venit.

2. Magisterium.

R. Solue in Spirit. ☿, præcipita ol. ☿. p. d. vel ∇. comm. ita Magisterium sub colore terræ natiuo nancisceris.

Dosis à ʒʒ. & ad ʒʒ. ultra.

3. Spiritus ∇ æ sigillata simplex.

Destillatur terra, per se ex Retorta: Nimirum.

R. Terræ Silesiacæ flauæ (optima est, quæ duobus monticulis insignitur) lib. i. frange in particulas duas, ac destilla per Retortam, igne nudo, hor 6. vel plures, (ad ☿. integrum,) in Receptaculum capax. Primum extillat Phlegma, dein Spiritus albicantes in parua quidem copia, sed grati acoris, ac fa-poris.

N. Terra restans, eiusdem etiamnum figuræ extrahitur, sed quæ non amplius linguae adheret, nec salina humectata in bullas exurgit.

Vtus: non opus habet rectificatione, sed in vsum venit vna cum Phlegmate,

Mm Dosis

Dosis ℞. *Vide* Horstium in *Problematis*.

4. *Spiritus* ∇ & sigillata cum *Vino*.

Fit macerando ∇ am cum ∇ & destillando. Hinc digerendo eandem cum ∇ atque destillando. *Vide supra*.

5. *Spiritus* ∇ & alcalisatus, seu balsamus ∇ &.

1. Fit si cum. ∇. maceretur ac destilletur, & postea cum sale suo alcalifetur. *Vide supra*.

2. Destilletur sine ∇, floresque forti calore populi, cum liquore destillato coniungantur.

Vires. *Vires externa viribus indicari poterunt, præter quas vim quoque habet arthriticos dolores summe mitigandi, malignitatem scabiei corrigendi, &c.*

N. Soluit quoque ☉.

6. *Oleum Terræ Strigoniensis.*

℞ *Terræ Strigoniensis*. ℥. i. Affunde aq. pluuialem destill. colloca in locum temperatè calidum per mensem vel amplius, & oleositas à corpore suâ sponte separabitur, & aquæ innabit. Aquam separa per iusundib. & oleositatem cum part. vi. ∇ destilla & egrediatur *Oleum* aurei coloris. Qui innatans. Materiam autem instar perlæ albam infundo relictam extime, cum aq. pluuiâ ☉ em vt moris est extrahe, hunc oleo redde, maiorumque virium ergò circula, & ex 6 vitreâ ☼ destilla.

Dosis gutt. vi. in vehic. conuenient. in febribus malignis, variolis, calculo.

Q. Et terræ sigillata vide in *Hodegetico* Popp. p. 120.

II. BOLVS

Bolus terræ genus est, ex pallido rubrum, vaporibus salibus imprimis imprægnatum.

Dicitur Medicis Bolus armena, vel

orientaris, eò quod ex Armenia finitimisque locis, præcipue aduehatur. Præcipue dico, ne excludam & alia loca in quibus ea foditur, & ad nos transportatur, quibus nec Germania nostra caret, vnde nobis VVirtebergica vsualis est.

Delectus. Præstat pura (non arenosa) quæ in læuorem calcis instar effuso humore, promptissimè soluitur ac commanducata butyri modo liquescere videtur. Reliquis tamen præstantior censetur, quæ ex Armenia vel locis finitimis apportatur.

Vires. Valde siccatur, astringit, roborat. Hinc vsus eius saluberrimus est in fluxu sistendo, in humore inspissando, in putredine arcenda, veneno obrundendo, &c. quâ ratione conuenit in Diarrhæa, Dysenteria, fluxu menstruo; Catarrho, spuitatione sanguinis, Hemorrhagia narium & vulnere, &c. Externus eius vsus creber est in Cataplasmatibus, pulueribus astringentibus, &c.

PRÆPARATA.

1. Bolus armena præparata, sit modo generali.

N. Vt de Terra sigillata monuimus, cruda potius quàm præparata terra armena in vsu est.

2. Magisterium fit vt Magisterium terræ sigillatæ.

III. CRETA.

Creta, Kreyd, à Creta Insula sic dicta, vbi in copia inuenitur, (licet & aliæ regiones quam plurimæ eâ scateant) terræ species nobilissima est, durior & candida.

N. Renodaustriplicem huius facit speciem, candidam, virescentem & nigricantem; Verum, nobis non nisi candida in vsu medico est, eoque rarissimo.

Vires.

Vires, Siccatur, abstergit, emplastica *scantias reprimunt.*

Usus eius internus nonnunquam in ardore Stomachi est, externus in vulneribus, ulceribus, &c. siccandis.

IV. TERRA IAPPO- NICA.

Est & terræ genus, &c. huc referatur ex fine huius libri pag. 172

V. MARGA.

Marga, est portio quædam pinguis & quasi medulla, in faxis nonnullis, dum frangantur reperta, unde & medulla Saxorum dici solet Gem. *Steinmark.*

Vires, Siccatur, abstringit, consolidat, sarcotica est, tartarum sanguinemque coagulatum resoluet, (intus exhibita.)

VI. OCHRA.

Ochra terræ species est durior, coloris flauo seu lutei. Germ. *Ochergeel.*

Vires Siccatur, abstringit, discutit, excre-

scantias reprimunt.
Usus eius rarissimus est, non nisi externus ac præcipue in vibicibus & collisitis, tum quique in tumoribus duris discutientiis (Emplastris).

VII. RUBRICA.

Rubrica terræ species est lapidosa rubea, &c. dicitur & rubrica fabrilis, quod fabris lignariis crebro inferuiat, in ducendis lineis, German. *rothe Kreide, Rætelsstein.*

Vires abstringit.

Usus eius Medicus est in Emalastris vulnerariis & siccantibus.

VIII. TRIPOLIS.

Tripolis terra est coloris Citrini intense, speciesque videtur Ochra.

Vires. Usus eius in Pharmacopæia vel nullus, vel rarus est, nisi quod pro destillandis Spiritibus salinis, salibus admisceatur, quò minus ea fluant.

C A P. III.

De Aquis.

Aquæ natiuæ; quæ vsui Pharmaceutico inferuiunt, tum simpliciores sunt, tum minerales.

Præparationes vtrarumque sunt: 1. Purificatio. 2. Destillatio. 3. Inspissatio. Hinc aquæ depuratæ, destillatæ & salia.

1. Purificatio

Sciant nonnunquam aquæ crassissæ & heterogeneis fecibus, unde depuratione opus habent. Depurationis huius modi sunt. 1. Filtratio per chartam bibulam. 2. Digestio, qua partes crassiores ad fundum secedunt.

2. Destillatio.

Destillatio aquarum in genere, pro

variante volatilitate, fixitate uel eliciendi liquoris, erit instituenda in *VR.* *MB.* cinere, tum quoque in arena, conuenientiora autem hîc sunt destillatoria vitrea.

3. Inspissatio.

Inspissatio partem fixiorem reddit conspicuam, quæ si salinæ naturæ fuerit, elixiuari potest, i. a.

Vires. Aqua quatenus aqua seu liquor est, summè humida censetur, frigida remissè. Verum quatenus artis rebus immixtis vehiculum præbet, eatenus pro harum diuersitate qualitatibus præditandis indicatur.

Mm. 2 A Q V Æ

AQVÆ SIMPLICIORES.

Aquæ simpliciores sunt aqua 1. fontana, 2. putealis, 3. fluuiialis, 4. palustris, 5. pluuiialis, 6. niuea. Ex his vſitatio fontana & pluuiia, quibus quoque 7. ros maialis addi poterit.

1. *Aqua fontana* est omnium purissima & vſitatissima. Purissima est, quia per terram ceu colatorium colatur. Vſitatissima est, quia ad omnia recipitur, ad quæ aqua sine peculiari mentione alterius, e.g. puluix, &c. recipi iubetur.

N. *Præfertur inter fontanas qua fluit ab Oriente ad Occidentem, que decurrit à montanis locis altioribus, item que Visu, Gustu, & Olfactu, pura clara, tenuis, levis ac sincera deprehenditur, ut & que citò incalescit, & citò refrigeratur, que Hyeme calidior; Æstate frigidior. Aquam hanc iniecto pane toſto corrigerè, ægrotiſque, loco potùs ſat grati concedere noſtrates conſueuerunt.*

2. *Putealis* fontanâ vilior & crudior vt plurimum habetur, eò quòd ponderoſior plerumque ſit ac linguaam magis feriens (*ein har Vvaſſer.*) Verùm ſi ex viuſ ſcaturiat ſcaturiginibus, reliquiſque bonitatis ſignis abundet; illius vires ſubire haud ineptæ ſunt.

3. *Fluuialis*; quòd radiis Solaribus expoſita fuit, magis habetur digeſta quidem quàm putealis: verùm tamen in uſurpatione eius, non erit inutile, ſpectare, vnde originem trahat, quòque perlabatur.

4. *Paluſtris* peſſima omnium cenſetur, adeòque è Medicina eliminanda.

5. *Pluuialis*, eſt aqua levis, linguamque minus feriens, (*iſt ein vveich Vvaſſer*) fontanæ vicaria, vt imur ea vt plurimum deſtillata. Sunt qui præferunt imbres à meridie aduolantes, vel ab Oriente, vt pote quas radiis Solaribus

magis imprægnatas & digeſtas arbitrantur.

6. *Niuea*, pluuiali affinis eſt, magiſque penetrans, adeòque & ad ſudorem mouendum non inefficax, quas vires naturæ ſalinæ acceptas refert, quâ præ reliquis abundat, vi frigoris condenſata.

N. 1. *Præfertur collecta circa ſolſtitiũ Hybernũ & Æquinoctium Martij.*

N. 2. *Odontalgiam pertinaciſſimam aquea niuea fuiſſe domitam, vide Zacut l. 1. Hiſt. med. obſeru. 46. De uſu vid. d. l. dub. 42.*

7. *Ros*. reliquas omnes ſubtilitate, adeòque & penetratione antecellit: Conſtans liquore volatiliori, ſalẽque acriori, præfertur maialis.

PRÆPARATA.

Aquæ fontanæ plerumque crudæ in uſum accerſuntur. Meteoricæ autem plerumque deſtillatæ. Præter has ſunt qui & Eſſentiam ſeu Spiritum alcaliſatum indeparant, idque mediante deſtillatione & ſaliſicatione.

Deſtillatio.

℞. Aquæ pluuiæ. vel niueæ bonam quantitatem, deſtilla ex cucurbita vitrea leni MB calore, vt ſolummodo pars ſpirituosa colligatur, hinc ſubſiſte. Alij, vt eò felicius pars ſpirituosior à reliqua ſequeſtretur, præmittere ſolent digeſtionem ſeu putrefactionem, (per menſem 1. aut 2.) in vale Herm clauſo, qua ſit vt non modo feces ſubſideant, ſed & liquor quodammodo ad ſequeſtrationem diſponatur

Hinc paratur.

Spiritus alcaliſatus, ſeu Eſſentia

℞. Spiritum iam elaboratum; adde
 Θ, circula ſimul vaſe Herm. clauſo, per menſem.

Salifi

Salificatio.

R. Aquæ quantitatem maximam (mensur. 20. 30.) exhalet aliquantulum, (si opus sit interposita filtratione,) hinc reponatur, euaporétque ad siccitatem: sic nancisceris feces falsedine imprægnatas. Elixivia crebris solutionibus, habebis sal purum.

N. 1. *Sunt qui feces calcinant, sed metuo ne quid pereat. Continet enim & volatile.*

N. 2. *Sunt & qui volatile ex spiritu sibi spondent, sed successu mihi irritum.*

N. 3. *illa residua ex euaporatione, si per pellatur, oleum quoque supernatans exhibet, sed parum.*

*Tartarum Philosophicum**S. Clos.*

Ros vel aq. pluuiæ leui artificio reducitur in subalbam, si scil. matrarium rore semiplenum H. S. immergatur in Aq. Thermalem calentem vel retrò cli- banum aut in hypocausti ergastulo digeratur longo temporis interuallo, sic n. de die in diem vi Δ lenti atque continui generantur Atomi splendentes, quæ ad fundum vasis agglomerantur, & à cæruleâ aq. supernatante separari debent.

Spiritus aq. pluuiæ acidus & ardens

Ioh. Fabri.

Imbibe hanc ∇ am decima parte alterius aquæ pluuiæ, digere dum spissescat, idque septies reitèra, habebis materiâ pinguem & ad syrupi consist. accedentem, è quâ Δ Ξ primo Ω um acidum, deinde ∇ \therefore Ω um igneum propelles. Vtrumque rectifica & super Φ siue gummi restans pluries coho-

ba, intercedète sèper digestionè, quod supererit calcina Δ reuerberij ad albedinem, & ex calce hac Sal naturæ extrahe. Iam liquores illos sal fixo re-affunde, digere, congela in \mathcal{N} , tandem sublima in salem crystallinum, quem in matraccio H. S. furnoque secreto in terram fixam rubentemque figere non dubitabis.

Hanc pro Panacæâ Vniuersali habent plures Philosophi.

Aquæ minerales.

Sub aquis mineralibus comprehendimus acidulas & thermas, quæ nihil aliud sunt quam aquæ mineralibus essentis in terræ abyssò imprægnatæ

Duo ergo & his insunt; Mineralis sc. substantia, ceu pars potior, & Phlegmaticus liquor, seu aqua, substantiæ illi Minerali vehiculum præbens

Mineralis illa essentia nihil esse videtur aliud, quam Spiritus mundi in terræ gremio conceptus, inibi pro varietate matricis vel locorum in hanc vel illam naturam minèralem, prout illa à naturata naturante natura fuerit, trāsplantatus, aqueoque liquori ceu vehiculo commixtus.

Estque substantia hæc mineralis varij generis metallina, salina, bituminosa, terrestris, &c. tum ratione volatilitatis; fixior, volatilior, &c.

Vires. *Vires aquarum mineralium. pro diuersitate commixtorum mineralium decernendæ, in quibus tamen, cum impossibile sit, in accuratam earum denominationem mixtionem, experientia potiores partes danda sunt,*

CAP. IV.

De Lapidibus in genere.

L Apides sunt corpora terrea, dura, inducilia, vi lapidifica ex materia lapidescente, id est, viscosa terrestri seu tartarea, coagulata.

N. *Generantur lapides ex peritomate salino-terrestri, quod in nutritione rerum redundat, vique sua lapidifica in duritiem lapideam coagulatur.*

Suntque vel preciosiores, vel minus preciosi: Illi gemmæ nomen adsciscunt, præcipue si diaphanæ fuerint; hi nomen lapidis retinent.

PRÆPARATA.

Præparationes seu operationes, quibus lapides in usum Medicum veniunt, præcipuæ sunt. 1. Pulverisatio & præparatio in specie sic dicta. 2. Calcinatio, cui subiunguntur. 3. Solutio, Coagulatio & Purificatio seu Edulcoratio. 4. Liquatio seu Deliquium. 5. Destillatio volatilifatio. His accedit interdum 6. Syrupisatio.

N. *Integrum & insignem tractatum de lapidibus conscripsit Nobiliss. Anselmus Boëtius Boodr, Medicus Rudolphi Secundi, quem in describendis lapidibus potissimum sum secutus. Præter hunc inseruit Conradus Kunrath, medulla sua destillatoria, integrum ferè Tractatum de Lapidibus preciosis ac minus preciosis, utrorumque præparationibus, ac facultatibus part. I. tr. 10.*

I. Pulverisatio & Præparatio.

Pulverisatio lapidum commodissima fit primò tritura, quam dein suscipit læuigatio. Præparatio fit si inter lauigandum ∇ conueniens stillatitia aspergi-

tur, inque pulpam massâ redigitur, in vmbra exiccandam.

II. Calcinatio.

Calcinatio cui lapides subiiciuntur, vel ministri est, vel principalis. Ministra est, qua lapides ad principalem illam suscipiendam, disponunturque stricte loquendo calcinatio. Principalis est, qua lapides propius in usum Medicum veniunt, dicitur solutio potius quàm calcinatio, adiunctamque habet coagulationem, cum annexa edulcoratione.

Calcinatio qua lapides ad solutionem disponuntur, perficitur vel ignitione tum simplici, tum restinctoria, vel corrosione, eaque aut cum Θ , aut Δ , &c.

Ignitio simplex fit, si lapis vi ignis nudi, tum liberi, tum reuerberio inclusi comburitur, donec incalcem redigiqueat. Exemplo fit calcinatio illa vulgaris lapidum calcinatorum, unde calx viua murariis expetita

Ignitio restinctoria: quando lapis ignitus in liquore aqueo extinguitur, idque vicibus repetitis, donec in calcem redigatur.

N. Est & alius modus calcinandi: Nimirum pulverisati miscentur cum duplo carbonum pulverisatorum, (præstant faginei), inque fornace figulina \oslash

24. \oplus bulo cooperulato cremantur.

Corrosio 1. cum \ominus : Lapis grosse (saltem) ad minimum contusus, miscetur cum \ominus portione æquali, duplo, triplo, plus minus ignique committitur fortissimo;

tissimo, vt Φ fundatur & concremetur.

N. Peragitur & hoc modo: Nitrum funditur primum, hinc fuso superiniicitur paulatim lapis calcinandus puluerisatus.

Corrosio 2. cum Δ : Lapis cum Δ is duplo, triplo, ter quater, pluriésue in Φ bulo aperto ad Δ is exhalationem vritur.

N. Præstat Δ r vinum, vel flores Δ is adhibere.

De Calcinationibus hîc notandum in genere.

1. Siquidem calcinationes id finis præferunt, vt lapides fiant solubiles, parum interest, utrum uno pluribusue calcinationum modis finem dictum consequaris. Sic perficiunt calcinationem alij uno calcinationis genere (verbi gratia Basilius ignitione sola Corallia calcinat:) alij duobus, sic calcinat Crollius gemmas, &c. 1. Cum Δ e. 2. Cum Φ e. Kunrath è contra, 1. Cum Φ . 2. Cum Δ i: alij præmittunt quoque calcinationem ignitionis, & præcipue reſinctoriam.

2. Si quid indissolutum remanserit, denuo calcinandum est, idque vicibus toties repetitis, donec tota substantia, reiectis fecibus sit dissoluta.

III. Solutio.

Solutio Lapidum tam preciosorum, quam vulgarium variis potest administrari menstruis, quibus lapides vt plurimum calcinati iniiciuntur, locoque tepido reponuntur, ac subinde f. a. id est, toties repetitis noui menstrui affusionibus & decupelationibus, donec opus fuerit, & nihil amplius soluitur.

Menstrua idonea solutioni videntur in solutione Coralliorum, præci-

pua tamen sunt \times vulgares ac inprimis alcalisatum, terebinthinatum, \times mellis, Spiritus Φ i, Φ is, Ol. Δ per C. &c.

Coagulatio.

Coagulatio solutorum lapidum fieri potest, vel menstrui abstractione vel solutionis præcipitatione.

Abstrahitur menstruum, tùm euaporando, tùm destillando.

Præcipitatio fit instillatione Φ fusi, Ol. Φ p. d. &c.

Edulcoratio fit iteratis solutionibus, ac coagulationibus, vel ablutionibus.

N. Purificatio, quo sæpius iteratur, eo sal præstantius ac purius euadit.

IV. Liquatio.

Liquatio seu dissolutio per deliquium fit, quando Sal lapidum in vitrea marmoræue patina, vel simili, in locum humidum exponitur, vt in liquorem dissoluatur.

V. Volatilisatio.

Volatilisatio fit: si salia sæpe soluantur coagulenturque; atque tandem cum ∇ (vel ∇ . dest. appropriata seu quod melius cum Spir. herbæ appropriatæ) ϕ ρ 14. in fimo equino digerantur, multotiesque per cucurbitam humilem vel retortam destillantur, quippe post quamlibet putrefactionem aliquid Φ is cum menstruo ascendit.

M. 1. Destillatum hoc constans ex Menstruo ac Essentia lapidis, (id est, ex sale lapidis volatilifato) dicitur Elixir: verum si menstruum calore (leni) abstractum fuerit, remanet Essentia in fundo.

N. 2. Præstat Vini Essentiam cum salis liquore coniunctam, sine separatione asseruare, quippe vtraque sese mutuo perficiunt,

ficiunt, adeoque vis salis resolutiua, qua calculum seu ♀m resoluit, Essentia vinosa viribus exaltatur; quin & Vini Spiritus fit magis penetratiuus, & ad calculi resolutionem operatiuus.

IV. Syrupisatio.

Syrupisatio fieri potest, si resolutionem (factam cum succo assumptioni internæ idoneo; v. gr. succo citr. berber.) cum saccharo in syrupum redegeris, affusa si libet aqua stillat. conueniente.

Operationibus hisce fiunt ex Gemmis.

I. Gemmæ Preparata.

Præparantur modo dicto; leuigando, subindèque irrorando, cum ∇. cordiali rosarum, buglossæ, & sim.

I. Sal.

Gemmæ calcinatæ soluuntur interueniente digestionem in ✕ vulgari (vel terebinthinato;) solutiones filtrantur: hinc abstrahitur menstruum, salque relictum purificatur eluendo cum ∇ destillata. Croll.

N. 1. Sunt qui malunt ✕ à sexta parte cineris herbe Kaliternis cohobis destillatum. Nimirum hoc subdulce nec adeo mordax est. Harim. in Croll.

N. 2. Calcinatio hic fit, vel sola ignitione, scil. vstione; vel corrosione. Placet hic modum Crollij inferere, qui est: Gemmæ lenigata cum ♀ an (flor ♀) ter quaterque comburuntur, idque igne rota ✕ buloque operculato: ultimo tegitur totum crucibulum carbonibus. Calx gemmarum latione à ♀ re repurgata miscetur cum (D) ana & calcinatur denuo in tigillo clauso igne rota vt fluant. Tandem abluitur optimè (D), calxque gemmarum exiccatur. Sic parata est ad solutionem.

N. 3. Si quid indissolutum manserit, id noua calcinatione comburendum & soluendum, idque toties, donec tota fere gemmarum substantia dissoluta sit.

3. Magisterium.

Præcipita solutionem dictam cum Ol. ♀ p. d. vel Spir. ♂ i.

N. Fiunt quoque Magisteria gemmarum, soluendo eas in spiritu ☉, vel Salis Natura, & præcipitando cum Ol. ♀ i. Vide Quercet. in Pharmac. rest. cap. 24. & 26.

4. Oleum gemmarum seu liquor

Sal Gemmarum optime solutionibus ac coagulationibus purificatum reponitur in cellam supra marmoream tabulam, vt lique scat.

N. Felicius fit mensibus Iulio & Augusto, Croll.

5. Tinctura seu Essentia: Sal gemmarum exaltatum.

Liquori siue Oleo (Magisterio) gemmarum affunditur ∇ alcolifatus. F. Extractio s. a. separatur solutio, abstrahiturque menstruum ad formam vsque crassiore: Harim. Quercet. in Pharmac. rest. c. 24.

6. Oleum per destillationem: Essentia elaborator.

A liquore gemmarum evoca ∇ cumque recentis ∇ atque ✕ terebinthinatiana destilla denuo per retortam: post euocatum mēstruum prodeunt sales in forma Olei. Hariman. in Croll. sect. de liquoribus gemmarum.

7. Extractum Gemmarum, crystalli & lapidum S. Cloß.

℞. pulu. impalpabilem cuiuscumque gemmæ, lapid. aut crystalli, tere cum tantumdem ☉ mar. decrepit. & reuerbera vase recto in furno figuli per 24. horas materiam resoluere in aqu. font. calidâ, agita aquam fortiter & quod solutum erit, effunde per inclinationem in vas aliud vitreatum, ita vicissim procede aliam aq. calidam affundendo & decantando, donec calix in fundo restet insolubilis

lubilis, quæ nouæ remixtioni & reuerberationi erit submittenda. Decantatas a. aquas residere permitte, & separa à limo subsidente in illas proice guttatim ☉ ☿ ut lactescant, filtra per charitam, crassamentum illi adhærens separa, & limo superiori permisce, idemque de nouo age præcipitando colando, dum nullum amplius limum dederit. Omnes has viscosas substantias in vnum iunctas per ablutiones plures à falsedine vindica, iisque ✕ affunde, digere

donec dulcescat ✕ abstrahæ ad siccitatem, restabit sal griseum, è quo Tincturam trahes cum V opt. eoque reuocato per destillationem apparebit sapia siue Syrupus Lapid. aut gemmæ dissolutæ vltèrius in Essentiam (si velis) prouehendus.

8 Syrupus.

Fit dicto modo ex solutione & Saccharo. Vide Syr. corall.

Et hæc de Lapidibus in genere, sequuntur iam Gemmæ.

G A P. V.

De Gemmis.

I. Chrysolithos.

Chrysolithos (veterum) Topasius (Grammatorum modernorum) est gemma aurei coloris. German. Chrysolith.

Duo ipsius sunt genera, Orientalis & Europeus; ille vt colore, ita duritie Europeum superat: hic enim instar Chrystalli mollis est, & cum aureo colore vel multum vel parum nigricat.

Inueniuntur in Bohemia passim.

Vires. Natura solaris ex signatura indicatur. Proinde creditur timores nocturnos & melancholiam minuere, intellectum confortare, molestisque insomniis aduersari, (sinistro sc. brachio allegatus, aut collo suspensus, auròque inclusus) alij commendant eius assumptionem ad morbum comitialem.

II. Granatus.

Granatus est Gemma pellucida, ex flauedine rubens, ignis instar, minique natiui vel factitij colorem ferè referens.

Germ. Granat.

N. Sunt diuersa genera Gemmarum

quæ colorem ignis amulantur, adeoque sub Carbunculis, (quo nomine à Carbonibus sumpto, Gemmas illas in genere vocant,) comprehenditur verbi g. Granatus, Hyacinthus, Rubinus, &c. Hinc sunt; qui Granatum faciunt Rubinum colore obscuriore, expositus enim luci aut soli, carbonis imaginem ostendit dilucidius quàm ipsemet Rubinus.

Sunt Granati alij (vel aliæ) Orientales, alij Occidentales. Orientales, vt meliores ita & preciosiores, proinde prouinciam officinalem solis Occidentalibus relinquunt. Hi sunt tum Hispanici, tum Bohemici, tum Silesiaci, E quibus Bohemici reliquos antecellunt.

Vires. Exiccant, corroborant, medentur cordis palpitationi, melancholiæ resistunt & veneno, spuitionem sanguinis sistunt, ☿ in corpore resoluunt, collo suspensi iisdem virtutibus vulgo celebrantur.

PRÆPARATA.

1. Granatus preparat. Fit l. com.

2. Magisterium.

N D

Ignium

Igniuntur Granati & in Spir. ☉ saliquoties extinguntur, donec solvantur. Soluti, oleo ☐ in lactis cremorem coagulantur, atque ▽ calida dulcorati postmodum v sui adhibentur.

N. 1. Fieri quoque inde possunt & alia preparatorum formula ad modum generaliter datum.

N. 2. Sulphur granatorum Bohemicorum describit Agric. tomo 2. p. 261.

III. Hyacinthus.

Hyacinthus est Gemma pellucida, ex flauedine rubens, ignisque flammam imitans. Gem. *Hiacynth.*

Sunt alij (vel aliæ) Orientales, alij Europei. Hi inueniuntur ad Iheram fluuium, in confinibus Silesiæ & Bohemiæ, suntque Orientalibus ignobiliores. Quoad colorem, referunt alij colorem minij natiui, aut sanguinis admodum bilioli: & hi sunt præstantissimi: alij rubedine Croci flauescunt, alij exactè ostendunt succini colorem, & hi viliores: alij albi pellucidi succini colorem referunt; & hi omnium vilissimi habentur.

Vires. *Vim habet cor corroborandi, & à peste tuendi: Singulare quoque est specificum contra spasmodum & contracturas. Amuletum quoque antipestiferum habetur collo appensus, aut annulo inclusus Quercet. in Ph. Rest. cap. 26. B. de B.*

PRÆPARATA.

1. *Hyacinthus præparat.*

2. *Sal & Magisterium.*

N. Hartm. in Pract. Calcinat cum aqua parte ☐ vini (minera adhuc coniuncti, non magdaleones redacti, (in ✚ gebulo forti, cum operculo tecto, (non lutato) ▽ circulari: 1. lento. 2. fortiori, tandem 3. fortissimo, donec ☐ omne exhalet, nec amplius ☐ is odorem spiret. Hinc eluit optime & denno cum ana. ☉ cal-

nat ▽ circulari, donec in massam abeat in ▽. metalli instar rubescentem. Hinc iniicitur in Δm calidam, eluiturque optime donec non amplius ☐ sapiat. Huic pulueri affundit ✕ terebinthinatum, soluitque sc. a. donec hyacinthi sint soluti relictis exiguis fecibus in fundo. Solutionem filtratam exhalare permittit ad siccitatem pulueremque optime edulcoratum exhibet, (☉ hyacinthi) aut cum Oleo ☐ i precipitat (Magisterium.)

Dosis ʒss. vel ʒj.

IV. Lapis Nephriticus.

Lapis Nephriticus est lapis opacus, variegatus, ex colore viridi, aliisque permistus. Germ. *Grieststein.*

Raro hic Lapis in se duos colores habet, semper que viriditatem refert; alius scil. viriditatem ex albedine, alius viriditatem subflauam, interdum subcæruleam; plerumque ex viridi albo, flauo, cæruleo nigroque colore mixtio est, Poliri exactè non potest, semper enim ipsius superficies pinguis apparet, quasi Oleo immixta esset.

Adfertur ex noua Hispania. In nonnullis etiam Hispaniæ locis, & in Bohemiâ reperitur. Tanta inuenitur mole, ut pocula inde fieri possint. Quin imò fructum hic Francofruti conspiciere licuit, ultra libras 50. pendens.

Vires. Commendatur aduersus nephritidis aut stomachi dolores, sed eius præcipua laus est ad nephriticos dolores, calculumque, & arenulas expellendas. Meditur his affectibus brachio, vel coxendici alligatus, aut de collo suspensus, Cuius rei gratia armillas inde factas gestare solent.

V. Rubinus.

Rubinus est Gemma diaphana rubilans, rubensque, (exigua portiuncula est cærulei coloris) ac limam respuens.

spuens. Græcè *Αρδαζ*. Arabicè *Iacut*. Latinè *Carbunculus*, καὶ ἐξοχιν. Germ. *Rubin*.

N. *Rubedo ipsius est instar sanguinis, lacca indica aut coloris coccei Ker-mesin.*

Nobiliore rubini in Insula Zeilan nascuntur, alij (aliæ) qui minores in Coria, Calecut, Cambaia, & Bisnagar. Optimi in flumine Pegu. Exploratur bonitas ore & lingua. Nā frigidiore & duriores, meliores reputantur. Nascuntur in lapideam matrice rosei coloris, primumque candicant, deinde paulatim maturescences ruborem contrahunt. Hinc albi immaturi. Nascuntur plerumque in eadem fodina, ubi Saphiri reperiuntur.

Vites. Tradunt rubinum gestatum, vel ebibitum venenis resistere, ac à peste præseruare, tristitiam arcere, libidinem coercere, malas cogitationes, & terrentia somnia auertere, animum exhilarare, corpus incolume conseruare, ac si homini infortunia instent, ea maturatione coloris in obscuriorem significare, isque præteritis iterum pristinum colorem recuperare.

PRÆPARATA.

Rubinus præparat. more communi.

VI. Sapphirus.

Sapphirus est Gemma cæruleo colore, pellucida & diaphana, German Sapphir.

Sunt aliquæ colore cæruleo albidæ, aliæ cæruleo saturo: hæc mares, illæ foemellæ appellantur, aliæ omni colore carent, albæque vocantur.

Orientales inueniuntur in Calecut, Cananor, Bisnagar, Zeilan, & præstantissimæ in regno Pegu.

Occidentales, variis in locis reperiuntur, Confinia Bohemiæ, & Silesiæ.

fatis præstantes ferunt. Præstantiores tamen sunt Orientales.

N. Color igne facile aufertur.

Vires. Est frigida & sicca, adstringens, consolidans, alexipharmaca, cordialis, ophthalmica. Proinde oculorum humiditates exiccat, inflammationem arcet & extinguit (in collyriis adhibita, aut butyro loto excepta, palpebrisque oblinita superioribus,) valet ad omnia alui profluvia, dysenteriam, fluxum hepaticum, hæmorrhoidum sanguininiisque reiectiones (assumpta cum ∇ plantag, tormentill. &c.) Ulcera interna & vulnera sanat, cor corroborat, & latificat, pesti omnique veneno, febribusque malignis, aduersatur: cardiacos ac melancholicos affectus quosuis lenit, tollitque, (intus exhibita.) Integra Sapphirus fronti adhibita, hæmorrhagiam sistit, ac inflammationibus applicata eas extinguit. In orbiculum redacta pisi magnitudine ac perpolita oculis imposita, pulveres, culices, & quicquid in oculum deciderit, aufert, oculos à variolis & morbis tutatur, &c.

PRÆPARATA.

1. Sapphirus præp. fit modo comm. lauigando, cum ∇ cordiali.

2. Sal.

3. Liquor seu oleum.

N. 1. R. Sapphirum duplo pondere Δ is commixtam calcina, calcem ∇ a stillatitia sapius ablue, rursusque exicca. Postea spiritu Vini perfunde ac macera, tum rursus exicca, quodque in fundo remanet, iterum calcina, destillatæque toties, donec in Vino liquecat, niuis instar, tandem abstrahæ, & prouenit sal, quod in loco humido in liquorem soluitur. Boët. de B.

N. 2. Alij soluant Sapphiri pollinem in \times & succo limonum, solutionemque cum alto cordiali exhibent mixtam.

Nn 2 4. Es

4. *Essentia seu Tinctura.*

Calcinatur Sapphirus bis, ac postea oleo \odot soluitur; abstracto dein oleo \odot i.eum ∇ Essentia extrahitur B. de B.

VII. *Sardius Lapis.*

Sarda, Sardius Lapis est Gemma semiperspicua, loturæ carnis seu carni sanguinolentæ similis, vnde & Carneolus, vel corruptè Corneolus vocatur, Germanicè *Carneol*.

Non omnes vnus modi inueniuntur coloris, alij enim sunt rubri, alij exigua sanguinis rubedine tincti, alij subhaescentes ex rubedine.

Laudatissimus Carneolus in Sardina inuenitur, hinc in Epiro & Ægypto, sed Babylonius cæteris præfertur. Indici & Arabici etiam non contemnendi, vt nec Europei. Nam in Bohemia, Silesia, aliisque Regionibus præstantes inueniuntur.

Vires. Pulvis ad omnem sanguinis fluxum propinatur. Gestatus fertur animum exhilarare, timorem pellere, audaciam præstare, fascinationes prohibere, ac corpus contra venena quævis tueri. Imprius autem sanguinem vnde cumque fluentem peculiari proprietate sistere: ventræ que alligatus partum conservare.

PRÆPARAT.

Sardius præparat. modo communi.

VIII. *Smaragdus.*

Smaragdus est Gemma pellucida & diaphana, grato suo virore pulcherrima, omnium gemmatum fragillima. Arabice Zamarrut, nonnullis Prasinus, Germanice *Smaragd*.

Sunt alij (aliæ) Orientales, alij Occidentales.

Orientales, vti sunt virore amœnissimè, ita præstantissimi,

Occidentales sunt, tùm Peruviani,

tùm Europæi. Hi reperiuntur in Cypro, Britannia, aliisque in locis, sed reliqui sunt ignobiliores,

Vires. Omnem alui sanguinisque fluxum, & præcipue dysenteriam ebibitus sistit, nec refert vtrum à mordaci humore, à veneno ortum ea habuerit: venenatis item morsibus, pesti, febribus pestilentibus medetur.

Dosis gran. 6. 8. 10.

Inter amulcta præcipuè commendatur ad Epilepsiam, partum accelerat, (alligatus coxæ) eundem retinet, (impositus ventri) Hemorrhagiam sistit, (ore conditus) dysenterias omnes, ac hemorrhoidum fluxum indubitato compefcit, (ventri, adhibitus, teste (uainerio.) Timores ac Terribilia arcere fugareque ac hamitriteam febrem tollere, creditur, (è collo pendulus,) &c.

N. Frangi Smar. in coitu quandoque experimento comprehensum dicunt. Card.

PRÆPARAT.

1. *Smaragdus præparat.*

2. *Sal. & Tinctura Smaragdi.*

Smaragdus puluerisatus, ac per linteum traicitur, hinc superfunditur Spirit. Vrinæ, qui aliquid phlegmatis adiunctum habet, vt colorem extrahat; spiritu dein iterum destillatione abstracto, in fundo remanet Extractum (sal gryseum, è quorandem (citra edulcorationem) vi ∇ extrahitur color seu Tinctura summe viridis: abstrahe igitur ad aliqualem consistentiam & serua.

Dosis gran. 10.

B. de Harim. in Practic. de Dysent. Tenzel. in Exegesi sua sua, Finck. in Enchirid.

Vires. Dysenteria & fluxibus aliis quibuscumque mirifice prodest, nec minus

nus utilis est in cordis & capitis affectibus, Palpitatione, Melancholia, Paraphrenitide, Syncope, &c.

N. 1. *Urina* quicquid potest, vi sui salis facit: hinc non errabis, si ∇ Stillatitiam conuenientem \ominus *urina* acuatam loco menstrui adhibueris. Imprimis quo-

que, quia *urina* simpliciter destillata, nisi sale suo acuatam sit, laborem irritum facile reddere potest.

N. 2. *Tinctura* hac nihil aliud esse videtur, quam *Elixir*, constans partim ex *Smaragdi* substantia, partim quoque ex sale *Urina*, partim substantia comixto.

C A P. VI.

De Corallis.

Lapidibus preciosis subiungimus Corallia & Margaritas, utpote quæ non modo substantiâ & viribus, sed & præparationibus, & inde resultantibus præparatis. Gemmis adsimulantur.

Corallium est frutex sub aqua marina generatus, Græcè *κοράλλιον* & *κόραλλος*. Arabicâ, Bassâd, Mergen siue Morgian, Besd, Latine, Corrallium, Corallium, Corallum. Germ. Corallen.

N. Corallia generari ex succo lapidescente certam est: utrum autem succus ille per se in fruticem lapideum prorumpat, vel amplius ligneam suscipiat figuram, subindeque in lapideam vergat, vel denique an plantam (emortuam) sub marina aqua repertam, penetret, transmutet, adeoque huius figuram retineat, dubium. Dubitandi occasionem præbet, quod frutices Coralliorum dentur, qui ex parte ligni adhuc referunt substantiam, partim Coralliorum. Nos posth. bitis eiusce farine dubitationibus, qualis præter hanc, & illa est, quam habent de fructibus Coralliorum granulatis, quos alij negant, alij perhibent: Item de induratione, quam alij fieri statuunt, simulac Corallij frutex extra aquas esse incipit, alij etiam in ipsa ∇ Corallia indurari volunt: utpote quas parum est emolumenti, ig-

rare parum detrimenti, pergitur ad ea, quorum Medici interest, differentias scilicet, vires & præparationes.

Differentia.

Corallij variæ sunt ratione colorum differentia: aliud enim rubrum est, aliud nigrum, viride, subflauum, cinereum, fuscum, alioue mixto colore ornatum. Cæteris omnibus præfertur rubrum minij natiui colore, quod masculi nomen obtinet: & hoc recipiendum quoties simpliciter corallium præscribitur sine coloris mentione. Pallenscens fœminæ nomen habet. Huic succedit corallium album: deinde nigrum. (Antipathes olim dictum.) Nam quod alio colore est, neque in usum adhibetur; neque pro corallio vulgò habetur.

Rubrum, in India & Siene, teste Plinio, reperitur, nunc in Mari Tyrcheno & Siculo passim inuenitur. Neapolimque adfertur, vbi politur. Hoc antequam rubescat, & quodammodo maturum fiat, videtur variis coloribus tingi. Nigrum reperitur in Gallicia Hispaniæ. Album reperitur rarò, solidumque est, & cavitatibus caret, quibus signis distinguitur à specie quadam, Hispanis Polodicta, quæ in Catalonia ab iis qui

corallium rubrum quærunt, inuenta pro corallio albo precio viliori diuenditur. Caret hoc cortice, crescitque in fundo maris, non in saxis, vt rubrum corallium.

Vires. Corallium omne exiccat, refrigerat, adstringit, cor precipue, deinde ventriculum & iecur roborat, sanguinem purificat, ac proinde pesti, venenis, febribusque malignis aduersatus, hilarem hominem efficit, (nigrum tamen Corallium homines melancholicos reddere perhibetur,) sistit fluxus quoscumque alui, vteri, penis, (Gonorrhæam, Epilepsiam infantum præcauet, (si recens nato ante omnium cibum in lacte materno gran. 10 exhibeantur.) Extrinsecus commendatur ad ulcera, qua carne explet; ad cicatrices, quas extenuat; ad oculos quorum etiam lachrymas sistit, visumque recreat in collyris.)

Dosis à ʒj. ad ʒj. j.

Rutilantia Corallia ex communicatione Paracelsi amuletum exhibent celebre contra terribula menta, fascinationes, incantationes, venena, Epilepsiam, Melancholiam, Damonum insultus, fulmina. Album appensum, vt pectus contingat, hæmorrhagiam sistit mulierum.

PRÆPARATIONES.

Operationes, quibus Corallia elaborantur, sunt 1. Præparatio. 2. Calcinatio. 3. Solutio. 4. Coagulatio. 5. Liguatio. 6. Sublimatio.

I. Præparatio.

Præparatio nihil à regula communi diuersum habet.

II. Calcinatio.

Calcinatio Coralliorum est vel Ignitionis, vel Corrosionis.

Calcinatio Ignitionis est tum minor, tum violentior, tum restrictoria.

Calcinatio minor.

Fit igne reuerberij, dando tamen calorem secundi gradus, ne tinctura seu color ipsorum ignis violentia exhalat. *Quercet. de præparat. Medic. Spagyric.*

Ignitio violentior.

R. Corall. integror. q. v. calcina Δ reuerberij primum lento, vt saltem viua flamma corallia in furno reuerberij posita, superficie tenus lambat. Corallia hoc modo, primo gradu albescentia, tamdiu Δ gradatim aucto fatiganda sunt, donec ex albedine in flauedinem, ex flauedine in rubedinem summam reducantur, corpore toto reddito spongioso ac leui, id quod plerumque biduo vel triduo absoluitur.

Sic Corallia facta sunt habilia ad deponendam in ∇ tincturam. *Hart. in Croll. Sen. inst.*

N. Si \ominus Coralliorum proprie sic dictum desideras, vehementi vssione eadem in cinerem redige, moreque solito, lixiuium inde faciendo, saltem elexiuiando extrahere.

Calcinatio Ignitionis extinctoria.

R. Corall. grosse trit. candescant in igne, extinguanturque multoties in \times vt soluantur. Filtra dein abstrahere \times & consequeris sal corallorum per deliq. resolubile. *Med. destill. part. 1.*

Calcinatio Corrosionis.

1. Cum \odot .

R. Corallior tritor. atque \odot ana crema, vt duodecim horis fusa, liquoris modo fluant: vel combure ad consumptionem \odot , deinde duas horas candētia in igne consistent. *Kesl. 1. cap. 8.*

Aliter.

R. Corall. subtiliter trit. ac \odot ana M. iniice per vices in retortam tubulatam

lata in candefactam cum Excipulo appoſito. Tubulum ab iniectione ſtatim obtura, & cum penitus materia iniecta fuerit, continuo Δ e hor. 18. corallia probe calcina.

Hac adſcribitur Harmanno, unde Tincturam feciſſe dicitur.

2. Cum Δ re.

R. Corall. trit. p. iij. Δ p. i. (aliq an.) calcina Δ circulari per hor. 2. Poſtea ignita adhuc infunde in \times (ad corall. 3j. \times lb. 1.) vas mox operculo claudendo. Hinc digere per ϕ 14. abſtrahe, &c. *Sennert. Inſtit.*

3. Cum pumice.

R. Corallia groſſe contuſa F. cum pumice uſto S. S. S. cementaque in vaſe clauſo, reuerberij, ſpatio ϕ 3. Quo opere finito pumex, relicto corpore albo, coralliorum tincturam imbibitſſe creditur. *Gans de Corall. verum impugnat idipſum Tentzel, in exegeſi p. m, 512.*

III. Solutio.

Liquores, quorum beneficio corallia ſolui poſſunt, varij occurrunt. Præcipui tamen ſunt \times commune & radicatum: ſuccus, berber. Melon. citri. ros maialis, (ſpiritus ei uſdem cum ſuo ϕ acuatus:) liquor betulæ: ſpiritus mellis, terebinthinæ, ligni guaiaci, buxi, iumiperi, quercus, ſummitatum alni, forbi ſylueſtris, ſpir. ϕ , ſpir. ϕ , ſpir. ϕ , ut & \vee iſdem acuatus, ſpir. corallior. ardens, Phlegma Hj , &c.

Quinimò corallia cum Δ e calcinata, ſimplex ſoluit ∇ .

Modus ſoluendi nihil peculiare habet: Nimirum corallia in liquoris ſ. q. ſoluuntur ſ. a. donec penitus ferè ſoluta ſint.

Purificatio & Edulcoratio ſalis & Magiſterij ſit plerumque ∇ deſtill.

vel ſi placer, adhibere poteris rorem maialem è tritico collectum & deſtillatum, aut aquam aliquam cordialem: *coagulantur* dein vel liquoris abſtractione, (tùm deſtillatoria: tum Euaporatoria) vel præcipitatione.

Præcipitatio perficitur inſtillatione Ol. ϕ . p. d. ſpir. ϕ i, vel ∇ deſtillatæ. vel Ol. Δ . p.

Reliquæ operationes ex ſequentibus facile innotefcent.

PRÆPARATA.

I. Corallia præparata.

Fiunt cum ∇ cordiali (roſarum (l. a. N. In uſu ſunt præparata rubea ac alba.

II. Pulvis Corallorum ϕ latus.

\times corall. rubr. præp. 3ij. Ponantur in cucurb. affundendo aq. roſ. 3vj. ∇ li 3ij. Statim ebullient & eleuabuntur in bullas, quibus ceſſantibus reponatur vas in M per horas aliquot, effundatur aq. per inclinationem, quæ erit inſipida, in fundore peries calcem albam cum acore aſtriſtorio, ſed acrimoniâ carentem.

III. Sal Corallorum.

Fit ex rubr. corall. i. Viſitatiùs per \times ut moris: vide ſupra.

2. Per ſuccum berber. & limon. *Quercetian. in Pharmacop. reſt.*

N. Nonnulli R. Succilimonum expreſſi ϕ depurati lbj . liquoris betula menſe Aprilicoſlecti lbviij . coquunt ad caſum lbviij . cui denuò addendo ſucci Limon. lb. i . deſtillant aliquoties reſtificando, in hoc ſoluunt corallia, perlas, & ſimil. ſolutionemque propinant. *Hartm. in Croll. de perlis.*

3 Per ſpiritum ſeu liquorem acidum Guaiaci. Sic purgat optime ſanguinem in lue venerea. *Hartmann. in præſt.*

4. Per

4. Per spiritum Θ i.5. spiritum Θ is.

N. 1. *Solutiones cum spiri. Θ i aut Θ is factas, si citra menstrui separatione in usum vocare volueris, circula aliquamdiu & magnam acrimonia partem amittent, precipue si quoque Ψ m affuderis.*

Vires. Ex superioribus repete.

Dosis à gran. 6. ad 20.

N. 2. *Paracelsus calcinat primo corallia leniter in reuerberio cum Θ ana: hinc soluit degerendo cum Ψ . Postea Ψ abstrahit, salquerelictum per deliquium soluit. idque vocat Magisterium, libr. 6. archid.*

VII. Sal duce corallorum.

Calcinentur per biduum in furno figuli ad albedinem summam, soluantur in \times sequenti loco tepido per octiduum, Rubescet solutio, menstruum abstrahelento Δ ad siccitatem vsque sal hoc resolue pluries in Rore maiali, filtra & coagula, tandem siccatissimum & albissimum salem detine per 3. septim. in \ddagger calidis, vt maiorem acredinis suæ partem deponat.

N. \times pro hac solutione bis aut ter cobobandum est super herbam Kali, ita minus sit mordax & tamen non minus corallorum, vt & perlarum solutium.

V. Magisterium.

1. Magisterium Θ scinarum.

Instilletur in solutionem corall. (cum \times factam) Ol. \ddagger per d. precipitatus pulvis edulcoretur ∇ a destillata.

N. Alij precipitant cum spir. Θ i.

Vires. Vt Magisterium à sale non differt substantia: ita nec viribus, nec dosi.

2. Magisterium butyraceum.

Solue corallia in spiritu magico, (id est, spiritu roris maialis, vel quod idem

in \times) precipita cum Ol. \ddagger per C. precipitatum edulcora ac digere aliquamdiu cum Ψ i, quo iterum abstracto habes magisterium in ore instar butyri liquefens.

Huc referri potest & Galreda Coralliorum. $\&$. Corall. præparat. & \star Fiat destillatio ex \clubsuit sic ascendit Sal, romanebitque in fundo massa instar Galredæ.

3. Magisterium plumaceum.

Solue s. a. corall. in spiritu non dephlegmato, destillato ex Θ is & Θ ana lbj . formati sc. cum argilla lbij . vel ijj . in globulos, videlicet vel per vices iniciendo corallia in spiritum vel è contra corallis spiritum eundem per vices superfundendo: decanta solutionem, filtra, affundendo, vt eo commodius filtrari possit, ∇ destillatam rosatam, si placet: precipita cum Ol. \ddagger p. C. vel spirit. Θ i edulcora ∇ cordiali & exicca.

N. 1. *Cum corallia velut ascendere, desinunt, menstruum debilitari incipit, subsiste igitur & inspissa aliquantulum.*

N. 2. *Menstruum superius si tandem igne fortissimo fatigaueris, ascendit materia salina rubescens.*

Aliter.

Solue s. a. corall. in spir. Θ . filtraque [affundendo ∇ pluui. destillatam,] hinc precipita cum Ol. \ddagger p. C. edulcora & exicca.

N. Hoc modo in magisteria præstantia redigi possunt & perla, ossa, cornua, (e. gr. C. C.) ungula. nec non crustacea.

En candide Chymicæ cultor insignes plumaceorum magisteriorum processus gratis tecum communico, magni aliàs emptos, quos cum plurimis aliis ex communicatione ebtinui Viri solertissimi Dn. Iohannis Salzvedelij

Vvedellij Pharmacopœi apud Menoftrā-
cofurtenſes celeberrimi.

N. *Querc. ſoluit in ſpirit. ſalis Na-
ture Pharm. reſt. c. 24.*

VI. Oleum ſeu liquor corallorum.

N. *Oleum Corallorum propriè oleum
non eſt, ſed liquor, vel per deliquium fa-
ctus, vel per deſtillationem prolectus, de
priori hic agimus, de poſteriori paulò
poſt in ſpiritu.*

Fit liquor ex Sale.

R. Sal corallorum reponere, vt liqueſ-
cat per deliquium.

N. 1. *Liqueſcit feliciter menſibus Iu-
lio & Auguſto.*

N. 2. *Liqueſcit promptius, ſi ſolutio
aliquamdiu (♂ 14.) digeratur, (vt ru-
beſcat) ac dein (⊗ abſtracto) optime
dulcorata, deſecata & purgata fuerit,
(ſolutionibus ac coagulationibus iteratis
vt moris) imò ſi ulterius cum Vi cir-
culetur. Verum hoc Oleum appellandum
eſt potius Eſſentia, de qua vide Cun-
rad. Kunrath, in Medull. deſtill. p. 1.
p. 215. 218.*

N. 3. *Alij R. Corall. trit. ſij. Lapid.
prunell. ſij. vel ſij. 1. calcinant funden-
do & 3. materiam illam tritam po-
nunt in cellam ad liqueſcendum.*

Dofis gran. v.

*Vires. Præter vires corallorum ſupra
deſcriptas confert & in calculo.*

Dofis à gran. 4. ad 15.

N. *Vide & ſolutionem Corallorum,
c. 15. in Bezoard. O compoſ.*

*VII. Eſſentia ſeu Tinctura Co-
rallorum.*

R. Salem corallorum [purificatum
optimè per iteratas ſolutiones ac coa-
gulationes, vel magiſt.] volatilifanimi-
rum cum V digerendo, ac deſtillando,
[vide volatilifationem lapidum in ge-
nere.] Poſtea abſtrahe leni MB calore.

Vm, ac remanet Eſſentia corallorum,
quam ſi placet ex arena per retortam
propelle.

*Vide Quercetan. in Pharmac. reſtit.
c. 24.*

N. 1. *Nihil intereſt utrum ſal rece-
peris per X factum, vel per ſpirit.
vel per ſpir. plogiſton X.*

N. 2. *Vt feliciter eſſentiam corallo-
rum ſecum der X transferet, ſi addide-
ris aliquid camphora, e. g. ad Vi, men-
ſur. 1. camphor. 3ß.*

N. 3. *Cunrad. Kunrath, ſoluit & di-
gerit. 1. cum X, quo iterum abſtracto,
ſoluit & digerit 2. cum V. plu. deſtil-
lata (NB.) recentiſſima, 3. cum ſpir.
Vini.*

*Vires. Vt preparatio Tincturarum ope-
roſior eſt, quam ſalis ac magiſteri; ita &
virtus earundem fortior.*

*Dofis, gutta aliquot: vj. ad xv. &
ultra.*

2. Tinctura Baſily.

R. Salis corall. (per ſpir. ⊖) edul-
coratiſſimi 3vj i. 1. 4 is 3ß. mixta leni-
ter comburantur, donec 4 r conſum-
ptum ſit: Poſtea contere tantillum
camphoræ cum corallis, idque accen-
ſo Δ e abſumes, hinc edulcora & ex-
trahe tincturam l. a. cum V, abſtrahe
V ad conſiſtentiam Olei.

N. *Mamaci & Melancholici hac
Tinctura curati ſunt, Dn. D. Gans.*

3. Tinctura Quercetani.

*Extrahe tincturam ſa. ex coralliis
calcinatis, (e. g. ignitione mitiori,) di-
gerendo vaſe H. cl. cum menſtruo cœ-
leſti, deſtillato ſcil. cum proprio ſuo
ſaccharo, (id eſt, cum rore maiali, qui
cum melle aëreo deſtillatus,) ad emi-
nentiam digitor. 8. affuſo Menſtruo
demum abſtracto, remanet Tinctura in ſu-
do. Querc. lib. de prepar. Med. Spagyr.*

4. *Aliter.*

℞. Magister. Corall. extrahe cum
 △ re bezoardico ex re vegetabili pro-
 lecto. (id est, cum V i rectificatissimo)
 in vase H. cl. ad ignem cinerum. Po-
 stea separa & in perfectam Tincturam
 decoque. *Querret. Pharmacop. capite*
 24.

5. *Tinctura Hartmanni 1.*

℞. Sal corall. per ☒ purificatissi-
 mum, imprægna ☒ tantisper, donec
 nihil istius spiritus amplius retinere ve-
 lit. Sal ita imprægnatum digeratur,
 (♂ 20.) ℞. Postea destilletur per Ret.
 Reuerberio clauso vel Balneo sicco, ita
 tamen, vt prius Phlegma inutile eua-
 poret. Postea prodeuntes spiritus albi-
 cantes seorsum capaci recipiente ex-
 cipiantur, continuando destillationem,
 donec omnes spiritus cum oleo rubro
 instar sanguinis prodierint: separetur
 spiritus (qui ardens instar V) per Re-
 tortam ab oleo rubro, quod in Retorta
 manebit.

Hoc menstruum (spiritus scilicet hic
 partim ab ☒, partim à corallis produ-
 ctus) extrahit ex recentibus coralliis
 impositis tincturam rubicundissimam,
 quæ si rursus ab hoc spiritu per destil-
 lationem liberata, & tandem cum V,
 vel alia aliqua ▽ cordiali appropriata
 digesta perque cohobia volatilis facta
 fuerit, elegantissima euadit corallorum
 Tinctura, suauissimi saporis, fragantissi-
 mique odoris.

N. *Imprægnatio illa fit hoc modo,*

℞. ☉ Corall. ℔. i. ☒ opt ʒij. destilla
 leniter vt extillet solum Phlegma in-
 sipidum; secunda vice affunde ☒ ʒij.
 iterumque destilla, atque ita perge tri-
 gulis vicibus ☒ ʒj. plus affundendo, do-
 nec tam acre ☒ inde prodierit, perinde
 ac affusum fuerit. *Hart. in Croll.*

6. *Tinctura Hartmanni, 2.*

℞. Corall. calcinat. ignitione violenti-
 ori, q. p. iniice in V, vel in alcohol.
 spiritus roris maiialis, ac paulo post ex-
 trahitur tinctura, fecibus, (sine vlla vir-
 tute) in fundo remanentibus: Tinctura
 hæc aliquantulum coagulata, fit rubi-
 cundissima, cum quadam dulcedine.

Vires. *Est tantarum virium, vt post
 eius vsum aliquoties repetitum, impossi-
 bile sit, vllam imperitatem in sangui-
 ne totius corpori, superstitem esse posse.
 Exhibetur in vehiculis conuenientibus,
 à gut. 3. ad 10.*

N. *Hæc sane tinctura medico com-
 mendatissima esse debet, ob stupendas ei-
 us vires, vt qua cum spiritibus homi-
 num magnam conuenientiam habeat.
 Hart. in Croll.*

7. *Alia Tinctura, per acetum
 Coralliorum.*

℞. Corall. contul. ℔ij. eliciatur per
 retortam acetum, id est, liquor acidu-
 lus, quo prolecto vrantur corallia ve-
 hementer, donec redduntur albissima:
 Exempta dein redigantur in puluerem,
 ex quo s. a. cum aceto illo digestionem le-
 ni, extrahe T. donec ☒ nihil amplius
 soluere valeat, vniuersisque corallis dis-
 solutis, nihil præter terram inutilem re-
 maneat. Decantatos liquores destilla in
 arena ad siccitatem, vt separetur phle-
 gma: Dein recipiente mutato, fac vt
 igne auctiori & spiritus sublimis per
 ☒ propellatur, qui diligenter colli-
 gendus. Tandem relictam puluerem
 album spiritu ☉ penitus solue, eundem
 spiritum ☉ igne forti abstrahe; coral-
 lia relictæ fortissimo igne vre, donec
 colorem ferè natiuum recipiant. His
 affusus proprius ipsorum spiritus tin-
 cturam prolificere dicitur.

N. ☒ ex corall. ℔ij. dest. vix solutioni
 dictæ

dicta sufficiet.

8. *Tinctura per spiritum coralliorum ardentem.*

℞. Corall. trit. q. v. extrahe tincturam f.a. digerendo cum spiritu corall. arden- te, [vide infra,] adstrahere menstruum; atque extrahe denuo cum ℥. Gans.

9. *Alia per spiritum seu*

▽ mellis.

℞. Corall. cum ∅ calcin. extrahe f.a. cum spiritu mellis, (vide de melle,) decanta & abstrahere in , donec in fundo spissus relinquantur succus, huic edulcorato, extrahe tincturam cum ∇, habes Tincturam coralliorum veram. Hartm. in Crell.

Dosis à gran. 4. ad 10. vel 12.

10. *Alia per Aquam*

Temperatam.

℞. Sal corall. (per spiritum ∅ i) extrahe f.a. cum temperata, (ex ∅ i & spirit. ∅ i, vide l. 4. in Vino.) decanta filtra & abstrahere.

11 *Alia per Phlegma Hi.*

℞. Corallia calcinata , superfunde Phlegma Hi, cum spiritu acuto Hi, digeratur vase cl. & rubescet menstruum: abstrahere in ∇, affundéque ∇, digere- que denuo, ac pelle per retortam, sic ex- tillabit essentia corallorum rubicunda: abstrahere ∇ ad consistentiam. Ioh. Agri- cola.

Vires. Insigne est cordiale, balsamum- que nativum summe exaltat. Vfusque precipui est in terrore infantum, Epile- psia, & smil.

Dosis gran. 3. 4. 5.

N. Eodem modo possunt solui corallia cuncta. Sed tardius.

12. *Tinctura corallorum Holsatica.*

1. Fiat tale Menstruum: ℞. ∅ i crud. pulueris, ℥ iv. phlegm ∅ i (spir. suo volatili adhuc grauidi) ℔. iij. ∅ ung.

℔. i. stent in digestionem ∅ ∅ (3). Dein destilla ex ∞ pur gradus ∆ aperto, donec nihil amplius exeat. Rectifica optimè.

2 ℞. Corall. subtiliss. pulueris, q. v. Superfunde præcedens mēstruum, mis- ceque diligenter: Stent in digestionem, sic rubescet saturatò. Filtra & abstrahere ad siccitatem in arena, & remanet pul- vis rubeus. Ex hoc extrahe Tincturam per ∇ temperat.

N. 1. In preparatione ∇ a tempera- ta unio iteratis sapius rectificationibus peragenda est.

N. 2. In preparatione menstrui prio- ris verum ∅ i ∅ r ∞ bico adhæresce- re solet.

N. 3. Ex Colcothare elegans ∅ ius ∅ atus chr, stallinum parari potest.

Hac habet lector ex communicatione viri celeberrimi Dn. D. Langelots, Chy- miatri in aula illustriss. Holsatiae dignis- simi, cui T. ctura hac fan. i. rariss. ma est, adhibet, que in omnibus affectibus, ab im- puritate sanguinis ortis.

13. *Per oleum citri.*

His iam addi poterit Tinctura per oleum citri, quod è corallis rubris, cru- dis etiam tincturam elicit. Huic si dem- pto oleo vehiculum aliud præbere po- teris, tincturam coralliorum non con- temnendam habebis.

14. *Tinctura Coralliorum S. Clost.*

Resolve corallos in f. q. ∅ ∅ ∅ sol- utionem filtra & abstrahere ∅ ∅ forti ∆ ita ut ∞ omnes separentur à calce, cui affundes ∞ ex querebus novellis mense Martio detruncatis , ad extra- hendam Tincturam, quæ erit coloris hyacinthini, euoca menstruum & re- manebit pulvis subtilis cui superfun- des ∇ circularum, agere, decanta, fe- ces separa à tincto ∇, quem iterum

Oo 2 digerēs,

digeres, vt nouas feces (si adsint) depolat ad fundum, tandem filtra & √ ad medias abstrahe. Parum habebis sed magnarum virium aduersus Contricturas.

Dosis ʒβ. per se.

N. 1. *Potest etiam parari Tinctura modo Glauberiano cum sale ☐ri instar Tinctura Silicum.*

N. 2. *Fit etiam sublimando corallum cum * & tincturam extrahendo cum √, ut est in Myroth. Iob. Fabri.*

VIII. Flores.

Flores coralliorum parantur ad modum, quo perlarum flores parari dicimus.

N. *Fieri quoque possunt flores corallorum sublimatione cum * instituta.*

IX. Spiritus seu Oleum.

1. *Spiritus corallorum ardens, supra in quinta Tinctura Hartmanni descriptus est, videturque compositum quid esse ex + & corallis, arderetque ratione spiritus + vinosi.*

2. *Oleum itidem d.l. descriptum est.*

3. *Spiritus Corallatus, Spiritus terra Corallatus.*

Fit ad modum quo perlatus spiritus cum terra sigillata *Vide ibidem.*

4. *Oleum Corallorum succinatum.*

℞. Corall. rubr. puluerifat. ℥. i. succin. ℥. f. M. & destilla per retortam vel cucurbitam, sic succinum Tincturam corall. per ☐ attrahet, in forma coloris sanguinei. In fundo vasis resistet puluis corallorum colore albus.

Vires. *Oleum illud valet in Epilepsia & Apoplexia.*

Dosis gutt. 4. ad 8.

N. *Huic similis est modus quo Corallia sale subdulci salita, pinguedineque aromatica saginata, destillationi subiiciuntur, atque ita tincturam suam dictis co-*

mitibus committunt, cum iisdem per Retortam pelli aptam.

X. Syrupus Corallorum.

℞. Corall. rubr. grossè contus. q. v. solue in succo Berberorum vel Limonum optimè depurato, coralliis ad eminentiam digitorum, 3. 4. 5. superfuso. Hinc. ℞. Succi illius Essentiâ corallina imprægnati part. ij. Sacchar. cand. (vel comun.) part. i. coque ad consistentiam.

N. 1. *Colorem dilutiorem si expetis, affusa ∇ destillata conueniente, pro lubitu conceliare poteris.*

N. 2. *Poterit similiter fieri solutio cum liquoribus acidis destillatis, Luniperi scil. aut Guaiaci.*

N. 3. *Quercetanus mouet solutionem instituere, 1. In vitro subere vel cera Hispanicâ ocluso, ne Essentia Corallina separetur. 2. In √.*

N. 4. *Si quid restiterit nondum solutum, huic recens succus affunditur, donec pœnitius solutum fuerit.*

N. 5. *Similiter fieri possunt & Syrupi margaritarum & lapidum preciosorum.*

N. 6. *Artificium Quercetani ad concinnandum hunc Syrupum, nullum est aliud quàm euaporatio lentissima in tepido solutorum corallorum in succo berb. adiectis ʒvj. sacch. ad libras singulas solutionis, ita ut spatio horarum 10. non exhalet ultra spissitudinem thaleri aut macrocollonis densioris, aliàs certo certius soluta corallia à menstruo separantur.*

Syrupus Corallorum compositus

D. Sam. Cl. & D. de

Mayerne.

℞ Corall. rubr. subtil. in mort. marm. laugat. ʒ iv.

Succi limon. depurat. ʒ x i.

Aceti.

Aceti quercin. $\text{℥} \text{ i.}$

Digerantur in B. per octiduum, quotidie vas bis vel ter agitando deinde fltrentur per chartam

℥ solutionis colatæ $\text{℥} \text{ x.}$

Succi berber. depurat. $\text{℥} \text{ v.}$

Tinctur. ros. $\text{℥} \text{ iv.}$

Sacch. alb. $\text{℔} \text{ iij.}$

M. & mediante cocturâ blandâ in vase argenteo F. Syrupus, cui inter coquendum infundatur Nodulus continens.

Santal. citrin. $\text{℥} \text{ ij.}$

Ligni aloës $\text{℥} \text{ i.}$

Ambr. gris. gr. xv.

Mosch. gr. vi.

Dosis cochl. i. manè ac vespèri longè à pastibus.

Vires. Ex viribus Coralliorum supra allatis & succo Berberorum vires censende sunt. Laudatur valde in Diarrhœa, Dysenteria, fluxu hepatico, ad restaurationem facultatum naturalium, &c.

XI. Species Diacorall.

XII. Trochisci Diacorall. Galen.

XIII. Troch. de Corall. Nicolai.

CAP. VII.

De Margaritis.

Margaritæ, Perlæ, (Vniones, si magnæ, sint) sunt Lapides rotundi, conchis nonnullis ex perittomate eodem quo testæ generantur, producti. Arab. Lulu, Germ. *Perlen*.

Duplices censentur, Orientales & Occidentales: Illæ splendidiore sunt, adeoque cæteris præferuntur, & præsertim Persicæ. Hæ lactescunt, minúsque sunt splendidæ. Inueniuntur etiam in Europæ locis multis, vt in Scotia, Silesia, Bohemia, Frisia, locisque maritimis aliis, sed vilioris eæ sunt notæ. Maiores itidem & quæ perforatæ sunt, censentur minoribus, & non perforatis maturiores & præstantiores.

Vires. Cordiale præbent nobilissimum, quo balsamus vitæ oppressus, viresque exolutæ insigniter recreantur ac confortantur, proinde venenis, pesti & putredini resistunt, animum exhilarant. Et huius rei gratia in tantum ascenderunt honorem, vt vel agonizantium extrema recreatio communiter inde expetatur.

PRÆPARATA.

Perlarum præparationes iisdem fiunt operationibus, quibus corallia, calcinatione autem ignitionis haut indigent. Super vacanea igitur illarum extincto in ∇ vitæ ardentissima, quam vult Quercetanus in Pharmac. rest. c. 26.

Solutio Perlarum iisdem perfici potest liquoribus quibus coralliorum.

Purificatio quoque & Edulcoratio nihil à coralliorum purificatione peculiare habent.

Præcipitatio, iisdem cedit liquoribus, quibus coralliorum præcipitatio.

Hinc

I. Preparata Perla.

Præparantur more vulgari, super porphyrio lapide læuigando, subindeque ∇ cordialem, (verbi gratia, rosarum, melissæ, & simil. aspergendo.

II. Sal Perlarum.

Fit vt in corallis dictum: Soluendo perlas, vel [quod vsitatus] in acceto, vel in succo Berber. & Limur. &c. solutionem

tionem filtratam ad remanentiam salis inspissando, inspissatamque ablutione, ut dictum, vel solutione iterata purificando ac dulcorando.

N. 1. Nam opus habent tritura, quippe vel integra atque citra digestionem \otimes obediunt.

N. 2. Solutionem in succo Limonum ac Betula Destill. vide Corallis.

N. 3. Fit quoque Sal Corallorum, in quouis liquore dissolubile, beneficio succi citrei mali, digestionem depurari. Nimirum perla & si placet contusa, in eodem illo succo ad eminentiam 4. digitorum affuso, digestionem interueniente solvuntur, solutioni affunditur ros maialis destillatus, vel ∇ Melissa, decantaturque solutio: hinc affunditur novus succus citri depuratus, digeritur, affunditurque iterum ros destillat. vel ∇ Meliss. atque decantatur, &c. Et hic labor toties repetitur, donec perla penè tota soluta sint, relictis per paucis fecibus. Demum solutio lento igne inspissatur, ad remanentiam pulueris.

Dosis à gran. 6. ad ʒʒ. Ex aqua rosis maialis cum manna destillata, vel ex aq. Cinam. cum ∇ ros. &c. Hartm. n. in practic.

N. Paracelsus, Sali perlarum, ut & reliquis inde paratis maximas vires attribuit. Processus, inquit, harum etsi simplices, tamen crede experto, mirifica operatio ipsarum (perlarum) est, Non tamen fit per artem hac virtutum actio, sed in natura ipsarum est, quæ in grossa substantia occultatur, & non potest operari, sicut mortuum corpus. sed resolutione facta, vivificatur corpus eius, lib. 6. archid.

Huius finitimum est.

Sal sine. Magisterium Perlarum Rinerij.

ʒ. Perlar. subtiliss. tritar. q. v. impasta cum succo citri vel aurant. & relinque aliquamdiu. Postea solve cum \otimes f. a. donec perlæ ex toto ferè fuerint solutæ. Collectum acetum misce cum tertia parte ∇ fluviæ, destilla in arena igne primum lento, dein fortiori. Destillatum reafunde capiti mortuo restitanti, & denuo solve, postea filtra, evaporaque admodum lentè, & rases erit perlarum Magisterium.

Vires. Præter vires supra allatas summum est præservativum Arthritidis.

Dosis ʒj ad summum. Hartman. in pract.

III. Magisterium Perlarum.

1. Commune fit solvendo cum \otimes & præcipitando cum ol. \square .

2. But. raceum eodem modo fieri potest, quo Magister. butyraceum corallorum.

3. Plumaceorum præparatio eadem ex corallis repetenda.

Vires. Vires ex viribus perlarum descriptis facile colligi possunt.

Dosis à gran. 6. ad 15.

IV. Oleum seu liquor Perlarum.

Fit per deliquium modum: ex superioribus repete.

V. Essentia, Tinctura, Arcanum Perlarum.

ʒ. Perlas q. v. solve cum \otimes & parafal: salica paratum iteratis in \otimes solutionibus ac coagulationibus [reiectis semper fecibus, purifica, donec nullæ amplius feces ab ultimis solutionibus restiterint, atque adeo ipsæ perlæ ab omni immunditie liberatæ sint. Hinc solve cum ∇ pluviæ, vel rore maiali, destillandoque abstrahere humiditatem, idque toties repete, donec interueniente destillatione perlæ sint edulcoratæ,

[id

[Id quod ostendit aquæ postremo destillatæ dulcedo.] Hoc salita defecatum, digere vase clauso in **MB**,) **♂** **♀** 8. vel 10.) cum **Vi** rectificatiss. ad emimentiam 2. digit. affuso. Sic Perla cum tempore Essentiam suam instar olei spissâ superficiem **Vi** remittent, quam caute laborem repetere, quoties visum fuerit. Conuertitur enim totum ferè sal, relictis paucissimis feculis, in Essentiam. Hanc de nouo cum **V** aliquandiu circula, postea leni destillatione **MB**. **Vi** separa & serua.

N. Eadem perlarum Essentia cum **V**. per Retortam, vel per **MB**. seu reuerberatorium siccum, institutis cohobis tandem orn. is transit.

Vires : De usu constat ex viribus margaritarum, fortissimarum autem virium est propter summam subtilitatem.

Dosis à gran. 6. ad 14. Hartman. in Croll.

Arcanum per spiritum Guaiaci.

℞. Perlar. subtiliss. trit. q. v extrahe f. a. tincturam rubicundissimam cum spiritu Guaiaci rectificato, residem puluerem calcina leniter, atque extrahe iterum bis aut ter cum nouo spiritu Guaiaci. Postremo calcina fortius, atque iterum extrahe. Extracta coagula in **V** ad appareritiam cuticulæ versicoloris, quippe quæ signum est abstracto phlegmate, solum arcanum seu Essentiam perlarum cum spiritu Guaiaci, in forma coagulare restare.

N. 1. Hac Essentia ac spiritus vix à se inuicem separari poterunt.

N. 2. Eadem Essentia seu Arcanum

perlarum, cum **Vi** melissæ, & similibus q. s. subito soluitur, inque rubentem pellucidum colorem vertitur saporis elegantis.

Vires. Optime sanguinem mundificat, magnarumque virium est in lue venerea.

Dosis à gutt. 6. ad 14. Hartman. in Croll.

Alia Tinctura.

Perlar. $\frac{3}{4}$ lb. spir. **Θ** is q. s. solue f. a. decanta; abstrahere, vt fiat pultricular, quam elue & stillat. Circula cum **V** septimanas 6. tandem **V** abstrahere, leni **ME**. calcere. Libau. in Syntagmata.

V. Flores Perlarum.

Soluuntur perlae cum **X**, solutio digeritur aliquandiu (per mensem) dein abstrahitur **X**, & tandem fortiori igne eleuantur flores. Libau. in Syntagm. lib. 2. c. 25.

N. 1. Sublimari possunt quoque Margaritæ & Corallia beneficio *****.

N. 2. Flores perlarum per solutionem in **℞**ui describit Hartm. in Croll. p. 474.

VI. Spiritus perlatus, seu spiritus terra perlatus.

℞. Sal. vel Magisterij perlarum $\frac{3}{4}$ v. i. Terra sigillatæ $\frac{1}{2}$ lbj. M. ac imbebe cum f. q. olei perlarum, & fac globulos, quos exiccatos, destilla per retortam, vti destillatur spirit. **Θ** is. Rectifica & serua pro vsu.

Vires. Summum est secretum in Prodigra.

N. Eodem modo fieri potest & spiritus Corallatus.

C A P. VIII.

De Lapidibus minus preciosis : qui sunt,

I. ÆTITES.

ÆTites Lapis est veluti prægnañs cum quatitur, alio in vtero sonāter huius genera pro diuersitate superficiei, (scabræ, scil. vel læuis,) colorum, tum materiæ inibi contentæ ; constituuntur quatuor.

1. Est exterius scabrum colore vario. plerumque nigricante: continet in se lapidem Collimum dictum.

2. Cinerei coloris est, ac in se argillam vel margam continet.

3. Terram in se concludit.

4. Præter hos addit Plinius : Taphusium nomine, qui nostratibus incognitus.

N. 1. Dicitur lapis Aquila, quod in aquila nido reperiatur, ad promouendum partum, ab aquila eò deportatus. Gem. Adlerstein, Klapperstein.

N. 2. Primus Orientalis est, raroque pruni magnitudinem superat.

Secundus & tertius etiam in Germania reperiuntur, pugni que magnitudinem sæpe æquant.

Vires. Partum promouet, si scæmoribus alligetur, sin brachio, eundem retinet : obseruare autem expedit, statim à partu esse remouendum, ne vterum ad se trahat.

II. ALABASTRITES.

Alabastrites, *Alabastritis*. Alabastrum, Onyx, lapis candidus notissimusque est, Germ. *Alabafterstein*.

Species statui potest Marmoris, verum accuratè pensitatus, ipso mollior

est, proinde Marmor incoctum & imperfectum, si ita vis, appellare poteris. Hic si ita mollis sit, vt cultro scindi possit, gypsum rectius dixeris, est id lapidis, è quo varia torno finguntur vasa.

Vfus rarioris Officinis est, nec ingreditur vsualia, nisi solum vnguentum alabastrinum.

Vires. Combustus resina aut pice exceptus durities discutit, stomachi dolores cum cerato lenat, ginginas comprimit, *Dioscorid.*

III. AMIANTHVS.

Amianthus (*ἀσβηστος*) alumen plumosum, est lapis alumini scissili nō, absimilis, adèd vt nonnullis inter se confundantur, Germanic. *Federweiss* (, *Steinflachs*), quippe sunt, qui telas ex eo conficere norunt,) *Steindacht*, quòd elychnia ex eodem fiant incombustilia.

Differt ab alumine scissili, quod hoc combustile sit, saporisque adstringentis, illud non item.

Vires Veneficiis resistere creditur omnibus, præcipue tamen venificarum. Præterea abstergit, scabiem sanat; si cum ∇ vita & saccharo soluiatur, mixturaque eius egigua portio quotidie mane detur album fluxum mulieris mox tri sanatum aiunt.

PRÆPARAT.

Præparata Officinalia, quæ amianthus ingreditur, præter vnguentum citrinum, nulla sunt. Commendant tamen nonnulli supra modum Linimentum ad tineam puerorum, & ad vlceratibiarum,

abiarum, quod vide lib. 2.

IV. LAPIS ARMENVS.

Lapis armenus est lapis maculis viridibus, cæruleis & subnigris relucens, sicut lapis lazuli punctis aureis, adeoque non differunt inter se, nisi sola maturitate, vterque enim in vnis iisdemque scaptenfulis reperitur. Lazuli tamē lapis ceu maturior, crebrius inuenitur in fodinis aureis; armenus in argenteis.

Dicitur lapis armenus seu armenis *apud* quod olim ex Armenia solum ad nos translatus sit, hodie tamē & in Germania prouidetur, verbi gratia, in Comitatu Tyrolensi sub nomine Melochites. Dicitur Arabicè Hager seu Hagiar, Germanicè *Armenierstein*, *Berglauv*.

N. Praefertur colorato cæruleus.

Vires. Desiccatur mediocriter, extergitur cum leuicula acrimonia & leuissima adfrictione. Internè propinatus purgat sine noxa humorē Melancholicū, *dyo x, xatw*. Verum si multoties, (12. aliis 50.) lotus fuerit, purgat solum per inferiora. Hinc conducit in Mania, Melancholia, Epilepsia, & similib.

Dosis in substantia ℥j. ad ℥iv. Extrinsecus miscetur Medicamentis ocularibus, vti & Psilothris palpebrarum.

PRÆPARATA.

1. Lapis creberrimè lotus, quem præparatum vocant.

2. Pilula de Armeno, vide *Disp*.

3. Magisterium: fit l. commun. Lapis calcinatur per fl. Δ is, hinc soluitur calcinatus in aceto fortissimo alkalifato aut mellito. *Querc. Ph. restit.*

N. Matiem equidem lotum adhibere lapidem, vel solutionem cum V perficere, quippe vis purgatrix acciditatem infringi apta est.

V. LAPIS CALCARIVS.

Lapis Calcarius, est lapis ille græseus, ex quo violentia ignis conficitur calx muraria, Germanicè *Kalchstein*.

Officinalis non est, nisi in PRÆPARATIS, quæ sunt.

1. Calx viua, Græcè *doçsds*. Arabicè Herach, Nure, Nura.

Vires. Est ignea, mordax, adurens, cūque progressu temporis crustam gignens.

2. Calx lota, (è qua sal optime selixiuatum.) Exicat sine mordacitate, adeoque valet ad contumacia vlcera, (verbi gratia, venerea,) vti & ad ambusta, & alia quæ, non facile curationem admittunt.

3. Lixiuum. quod conducit ad vulnera putrida eluenda. Quin imò ex eodem fit ∇ ophthalmica insignis, quam vide lib. 2.

4. Spiritus. Ψ q. v. læuiga minutissime, imbibèque cum V i alcolifato, (qui ab omni Phlegmate purus sit, aliàs incassum laboratur,) quantum scilicet imbibere illa potest, non ad eminentiam) abstrahere V leniss \mathcal{M} calore, cum cohibitis (8. vel. 10. repetitis) sic fortificatur vis ignea Ψ .

\mathcal{R} . Huius Ψ læuigata, \mathcal{Z} x.

Θ Ξ i puriss.

Θ Ξ i probè prius igniti \mathcal{Z} x i.

Misc. ac destilla ex Retorta lutata, infra medietatem repleta, in excipula duo quorum vnum (in quo sit parum V rectificatiss.) destinatum sit suscipiēdo spiritui, adeoque capacius, alterū (Quod vacuum) extillanti phlegmati.

Excipulum prius connexum sit cum canali ex alterius illius excipuli collo deducto posterius sit collocatum, ut phlegma rectè delabi possit. Accenso igne stillat primum phlegma, quod de-

Pp. labitur.

labitur in excipulum vacuum; dein auctiori igne prodit spiritus albicans, qui per canalem in alterum illud excipulum ad ∇ rectà tendit, eique sese commiscet, ut separari ab inuicem difficulter possint.

Rectifica aliquoties & separa leniss. calore ∇ in phiola, vel accende Ψ qui efflagrabit remanente spiritu Ψ in fundo.

N. 1. Nisi Ψ initio cum ∇ , ad modum dictum fuerit imprægnatâ, adeoque exaltata, incassum laborabitur, quippe defluit in excipulum minus, vique phlegmatis commixti nullius euadit valoris.

N. 2. Spir. primo flauus est, rerum leniter in cin. rectificatus, clarescit.

Vires. Summum est arcanum in atterendo radicitusque pellendo calculo, cuiuscumque speciei, aut loci. Confert & Podagricis.

In usu Pharmapœtico soluit Chrystallus, oculos Θ , lapidesque durissimos. Kesl. l. 1. c. 80. spiritus minerales volatiles figit. Basil. in rep. L. P.

N. Alij miscent Ψ cum bismutho, ac destillant ex Γ in receptacululum capaciss. aliquod (sex) mensuris ∇ adimpletum.

§. Hinc spiritus Ψ alcalisatus.

R. Sal Ψ , solue in spitu Ψ , ac forma globulos cum argilla, vel misce cum puluere laterum destillâque per retortam.

VI. LAPIS CALAMINARIS.

Cadmia lapidosa, cadmia metalli expers, est lapis fossilis, subflauus, non admodum durus, luteum dum accenditur fumum eructans, Germanicè *Galmey*, *Galmeystein*.

Reperitur sæpius in metallorum fodinis.

Vires. Siccat leniter, extergit, adstringit, ulcera carne replet, cicatricem inducit. Adhibetur solum externe, creberrimoque usu infantum excorticacionibus exciccacionis ergo inspergitur.

N. Vixit ureo & ararij ad conficiendum aurichalcum, cuprum enim pallere facit.

PRÆPARATA.

1. Lap. Calamin preparatus.
2. Emplastr. è lapide calaminari, vulgo Zeltensflaster, August.
3. Empl. Gryseum de lapide calaminari. August.

Vires cum lapide calaminari communes habet.

4. Magisterium lapid. Calaminar.

S. Cloß.

Soluitur in part. x. Σ us Θ , deinde præcipitatur puluis rubeus cum Ol. Γ more vulgari & dulcoratur sæpius aq. calidâ.

Euocant per vomitum & successum, mitius quàm Γ præparatum.

VII. CALCULVS

HVMANVS.

Calculus humanus est, qui in hominum corpore generatur, hoc etsi variis accidat in locis, tamen maximè in renibus & vesicâ, è qua eximitur sæpe lapis, lapidi Bezoar figurâ non adimilis. Dicitur & *Ludus*.

Vires. Summe valet ad tartarum in omnibus corporis partibus, imò ad calculos etiam grandiores resoluendos, expellendos, adeoque ab obstructiones inde ortas referendas.

PRÆPARATA.

1. Sal Ludi crystallinum.

Ludus cum carbone calcinatus ebulliat in ∇ feruente: quod indissolutum manet, calcinetur iterum ebulliatque, idque toties repetitis vicibus, donec

nec

nec ludus penitus fit solutus. Solutiones filtratas coagula, & habebis Sal.

Hoc Sal quia sulphure scatet impuro, denuo cum carbonibus (anat.) calcinarum solue vt prius, filtraque : hinc pereuaporationem coagula, vel si lubet aliquot solutionibus & coagulationibus purificatum atque in crystallos redactum, serua.

N. Kerlerus solutum adhibet ☒, l. 4. c. 26.

Calcinatio.

Calculus puluerisatum primo leniter ∇ circulari, postea reuerberij per gradus, calcina, donec planè videatur in calcem abiisse.

Vel misce ludum cum duplo carbonum, (præcipue fraginorum,) ☩ buloque regula operro in fornace figulina calcina hor. 24. Hartmam. in pract. Sennert. Institut.

Aliter.

Ludum calcina hor. (6.) cum ☉ trahe ☉ cum V. Vini spiritum iterum abstrahere, remanetque sal in fundo.

2. Oleum s. Liqueur ☉ a p. d.

3. Elixyr ac Essentia.

Elixyr ac Essentia Sudiex ☉ parari possunt admodum, qui in genere de lapidibus descriptus est. Videlicet interueniente volatilisatione cum V, cum quo ☉ illud optime calcinatum digeritur, perque ☿ torcohobis destillatur, donec penitus ☉ cum V transierit. Sic habes Elixyr, à quo si Vm in Mb leni separaueris, Essentiam in fundoreperies.

Dosis huius Essentie gran. s. 6. ad 12. singulis diebus in liquore conuenienti. Harum. in pract. Senn. Inst.

VIII. CRYSTALLVS.

Crysellus, lapis transparens est, atquam in glaciem congelatam, omnino

referens. Dicitur Crystallus, à κρύς id est gelu, & τένω id est contraho, Germ. Cristall.

N. Gemman, si vocare libet, licet modo omnium molissimam dixeris, vel à similitudine coloris, qua gemmas colorata Crystallus refert, pseudo-gemmam verbigratia, pseudo-berillum, pseudo-topasium, pseudo-saphirum, pseudo-smaragdum; qua veris gemmis molliores sunt, Sic & Iris vocata gemma à calore quem fronti applicata exhibet, Crystalli species est.

Inuenitur variis in locis, etiam in Germania, Bohemia, Vngaria, Cypro & Lusitania, & nonnunquam in agris.

Delectus.

Quanquam colorata minimè negligenda sint, ac præcipuè pseudoadaamas, quæ aliis nobilior, attamen in præparationibus Chymicis recipitur Crystallus propriè sic dicta, quæ eligenda est purissima, pellucidissima, ac eximie intensa.

Vires, Facultatis est adstrictoria, adeoque confert dysenteria, diarrhae, caliacæ, cholera, fluxui uterino : præbet lactis abundantiam, atterit calculum totius corporis, hinc prodest & podagricis.

Si pulueris ʒij. vel ʒj. pondere cum amygdal. dulcium exhibetur, curat eos qui ☿m hauserunt. Boët de Boët. Matthiol.

N. Sunt qui Crystallum radiis solaribus obiciunt, hisque concentratis cutem inurunt, loco cauterij.

PRÆPARATIO.

1. Preparata, in specie sic dicta.

Fic leg. commun. ☉

2. Sol Crystallorum.

Crysellus calcinata soluitur in ☒ vulgari, vel Terebinthinato, s. a.

P p. 2 solutio

solutio filtratur, abstrahiturque ad siccitatem. Materia remanens. Θ , Chryſtallorum, purificatur vt moris.

N. 1. Alij calcinant Chryſtallos primo cum Δ re, dein cum ∇ . Alij è contra priorem calcinationem cum ∇ operant, posteriorem cum Δ re. Alij alterutra ſaltem calcinatione Chryſtallum ſolubilem reddunt. Exempli gr. Quercetanus & Boëtius de Boodt, cum Δ re.] Quidam pramittunt ignitionem, vel ſimplicem, vel reſtinctoriam. Quæ diuerſitas neminem moueat, modo Chryſtallus ſolubilis fiat. Vide Notas de Calcinatione Lapidum in genere.

N. 2. Calcinatiõ vera cryſtalli extat in Nuiſemant, de leſprit de l'univers. p. 140. Ex hac calce elicitur Sal nephriticum perebullitionem in aqu. vrtic. maior. fortificata ſuo proprio ſale & ζ y ſpiritus ſalis marini.

N. 3. Si Salis huius uſum ſine mora expetieris. \mathcal{R} . Chryſtallos groſſè contuſ. candefac ac extingue in ∇ . Raphani. Ononid. Petroſelin. & ſimil. acuata ſpir.

Θ i, vel \circ Δ i, idque multoties (decies repetatur: filtratura ſi libet adde ſacchari q. pl. ac habes ∇ ononidis, & ſimil. Cryſtalliſatam. Boëtius de Boodt.

N. 4. Alij loco \times adhibent ∇ deſtillatam Vrticæ minoris, Boëtius de Boodt.

N. 5. Neque confertim, neque continuò Sal Cryſtalli exhibere licet, præſertim ubi Natura languidior extiterit. Hartman Croll.

Dofis Salis à gran. 6 ad. 16.

3. Magiſterium Chryſtalli.

Solutioni [cum ∇ vrtic. factæ, &c.] inſtilla Θ fuſi aliquid & præcipitabitur, decanta, elue, exicca.

4. Oleum ſeu Liquor Chryſtallorum. Soluitur Sal Chryſtallorum per de-

liquium, vt moris. Sennert. Inſtitut. libr. 5. part. 3. ſ. 3. cap. 6. Medall. deſtillat.

Dofis gran. xv. ad xx.

5. Elixyr Chryſtalli.

Fit volatilifatione Salis Chryſtallorum. Nimirum.

\mathcal{R} . Salis Chryſtall. optimè [iteratis ſolutionibus ac coagulationibus, purificati, q. v. digere in ſimo equino, vel eius vicario \mathcal{M} , cum ∇ vel cum ∇ vrticæ, [vel potiùs cum ∇ ſupra vrticam deſtillato,] ϕ ρ 14. Dein deſtilla per curcubitam humilem, retortamue, ſic menſtrum ſecum aliquid Θ transferet, remanenti materiæ afunde recens menſtrum; idque toties, donec Θ ferè totum aſcenderit. Serua pro vſu.

Boëtius de Boodt, Beguin.

6. Eſſentia Chryſtalli.

Deſtilla Eliyxr. Chryſtalli & abſtrahere menſtrum lento \mathcal{M} calore, ad conſiſtentiam mellis, vel ſi placet inſpiſſa.

N. Keſlerus Elyxir Cryſtallorum parat hoc modo.

1. Cryſtallos calcinat ignitione reſtinctoria in \times .

2. Calcem banc comburit cum ∇ , horis duodecim.

3. Huius maſſæ ζ iv. affundit \times ζ x. digerit ϕ ρ 2. vel. 3. i. \mathcal{M} abſtrahit ad ſiccitatem \times remanentiam reſoluit per deliquium, oleumque rubrum ſeorſim colligit. (neglecto albo quod à ∇) rubrum illud digerit ϕ ρ 3. cum vino, fecesque ſubſidentes reiicit. Claram ſolutionem cum liquore, e. gr. cum exhibit, idque quotidie ter. Keſler. lib. 3. cent. 44.

7. Cremor Cryſtalli.

\mathcal{R} Cryſtall. in Arcool redacti, Θ ∇ i deſecati ana ζ ij. calcinetur in furno Anem. vel in fornacè ſigulinâ, in te-

ita vitreâ cum operculo foramine per-
tuo, donec vasa figuli perfecta sint, po-
stea in aqu. Vrtic. minor. proiciantur,
& omnia soluentur in aquam luci-
dissimam viridis coloris, si quid pulueris
in fundo manet, abiiciatur, liquori
vero prædicto immitte parum ☉ fusi
puluerisati, vbi puluis fundum peter.

Cuius edulcorati dosis erit à ℥ss. ad
℥j. vel solitariè, vel cum cremore ☿. In
hydropse & calculo commendatur. Ha-
buit S. Cl. ex commun. D. Gregor. Horstij
fel. memor.

IX. Hematites.

Alb. & alpalitus. Lapis est, vel terra
duriuscula, sanguinem colore æmulans.
Arabice Scedenigi. Germ. Blutstein.

N. 1. Lapis Hematitidis nostratibus
Officinis vsitatus, differt à veterum hæ-
matite.

N. 2. Interdum niger est, interdum fla-
uus, interdum ferri colorem habet.

Reperitur Lapis Hæmatites Offici-
narum in variis Germanicæ locis. Sæ-
pè inter rubricas & ferri fodinas, qua-
les propè Ioachimicam vallem Bohe-
miæ, item circa Breslam, aliquando ex
Ostracite nascitur, vt propè Hildeshei-
mum contingit. Excoquitur in ferrum
lapis hic, adeoque ferri materia existit.
Fit etiam hæmatites ex magnete vsto.

Optimus habetur friabilis, saturato
colore niger, qui per se durus est & æ-
qualis nulla sorde admista, aut sepro in-
termedio, habetque cinnabari similem
colorem, sed saturatiorem; loci natalis
ratione Hispanicus præstat.

Vires. Refrigerat, exsiccat, adstringit,
glutinat, adeoque conuenit ulceribus ocn-
lorum & pulmonum, oculis lacrymanti-
bus, sanguinis expuitioni medetur, proflu-
uia, v. gr. hamorhagiam vteri, alui, &c.
compefcit.

Datur pollen internè à ℥j. ad ℥v.
Externè medis variis adhiberi potest.

PRÆPARATA.

Hæmatites præparatus fit leg. c. cum
v adstringente, verbi gratia, Plantagi-
nis vel Tormentillæ.

N. 1. Hematites per ☿ exhibet
spir, odore ac sapore spiritum ☿ i emulan-
tem.

N. 2. Hamat. cum ☿ t. Quis puluerem
præbet insigniter diaphoreticum, coloris
aurei valde incundum.

N. 3. Pollen. cum aqu. diaphoretica ma-
ximo cum fructu podagricis exhibetur.

Ex communicatione Clariss. Dn. D.
Langelots.

X. Lapis Iudaicus.

Lapis Iudaicus oliuæ, specie subro-
tundus, tener & friabilis est, striis secun-
dum longitudinem discurrentibus &
æquidistantibus, ac si arte (torno) fa-
ctæ essent, colore est albo & subci-
nereo.

Reperitur in Iudæa, vnde Iud. aux. di-
citur, hinc & in Silesia.

Dicitur Aetio Lapis Syriacus, aliis
Phenicites, Tecolithos. Arabice Hager
alieudi, sed Agiar aliheud. Germanicè
Indenstein.

Aliqui sexum distinguunt, minorèf-
que fœminas vocatas, ad vesicæ lapidem
commendant. maiores masculos, inter
quos aliqui sunt longiores minimi di-
giti quantitate, ad renum lapidem ex-
pellendum.

Vires. Medetur difficultati vrinae,
calculos vesicæ, præcipuè quæ renum rûpit.
(tritum exhibitum.)

PRÆPARATA.

1. Preparatus fit lege c.

2. Sal. &

3. Magisterium.

Calcina cum ☿ re, soluè que in ☿
P p 3 mellito

mellito, vel spirit. Θ , hinc abstrahe, habes sal, vel præcipita cum Ol ♀ i, habes magisterium, edulcorando.

Dosis gran. aliquot. Quercetan. P. re-stituit. cap. 26.

4. Oleum seu Liquor: fit per deliquium.

N. Oleum lapid. Iudaici, Lyncis &c. per deliquium reperies in Cistâ med. p. 112.

XI. Lapis Lazuli

Lapis Lazuli, est lapis opacus Saphiri colore, aut florum Cyani, aureis punctulis aut flammulis exornatus, armenio durior.

Dicitur $\Lambda\delta\alpha\varsigma\ \kappa\alpha\upsilon\alpha\varsigma$ Lapis cæruleus. Arabicè Hager. Azul.

N. Ex hoc fit color ille cyanæus, quem ultramarinum vocant; asurum verò ex lapide armenio, vel cyano germanico faciunt.

Genere tantum duo sunt, fixus, id est, colorem in igne non mutans, qui ferè ex Oriente affertur, & non fixus, qui in Germania reperitur, ac vulgò *Lasurstein* vocatur, unde color dictus *Asurblau*.

Vires. Viribus convenit cum lapide armenio, sed imbecillius eas exercet. Purgandi facultate prædictus est, præcipuè contra Melancholicos omnes affectus, quartanam, apoplexiam, morbum comitiale, lienis vitia, aliòsque complures, à melancholico succo originem ducentes.

Dosis ʒj. in polline subtilissimo.

N. Pro amuleto etiam de collo gestatur, ut puerorum terribilamenta arceat, oculorum aciem roboret, syncopem & prægnantium abortum præcaueat. Verum parum appropinquante, ne fœtum retineat, auferendus est. Boëtius de Boodt.

PRÆPARAT.

1. Lapis multoties, (in Δ) lotus quem præparatum dicunt. Lauatur autem ut acrimonia, visque exurendi loturâ auferatur.

2. Magisterium.

Fit Spir. Θ is.

N. Quercetanus Ph. R. calcinat cum ♀ e. & soluit cum \times Vini optimo; hinc præcipitat cum Ol. ♀ i.

Dosis ʒj. &c.

3. Elixir.

Calcinator Lapis Lazuli in fornace laterum, deinde Aq. vitæ soluitur calcinatus.

Fiorouantus hac solutione multos morbos & febres malignas se curasse scribit, & ulcera etiam pessima in optimum statum ad miraculum usque redegit.

4. Oleum seu liquor, qui illitus dolores podagricos, inflammationesque leuat.

5. Essentia extractum.

℞. Lapis Lazuli q. pl. igniatur 6. vel 7. extinguiturque in V , tandem in puluerem redigatur, & cum ∇ melissæ, ipsius recrementa terrea eluantur, (abschleichen) redigantur in puluerem tenuissimum, & cum V , digerantur in calore septim. 3. vel 4. dein abstrahatur V , & remanentiam serua.

Dosis à ʒss. ad ʒj. Hartm. in præst.

CrySTALLI purgantes Lap. Lazuli.

Calcinetur forti Δ donec albescat, teratur in marmore, bulliat in s. q. \times per v. aut vi. horas. Decantatum \times iniiciatur in vas fictile non vitreatum, strictique orificij, 5. aut 6. vnciarum capax, os testæ cerâ occludatur, reponatur in cellâ, & transudabit, lanugo crySTALLINA intra paucos ♂ , vasque te-

staceo

Itaceo adhærebit, hanc collige, aliam expecta, &c.

Dicitur hoc Sal si uel flos Lapidis Lazuli acuerit panchymagogi vel aliorum Extractorum vires, si illis permisceatur.

XII. Lapis Lyncis.

Lapis Lyncis, Bellemnites, *ὄν τὸ* *Γελέμνις*, à sagitta, cuius effigiem refert seu dactylus Ideus, à figura dactyli & Idamante Creræ Insulæ, ubi inuenitur,) est lapis teres, pyramidalis, sub variis coloribus repertus. German. *Albschofs*, *Schofslein*, *Lachsstein*, *Tappenstein*, (si niger sit.)

Inueniuntur albi nigri, cinerei, pelucidi, falerni instar. Et hic forsan est quem veteres LINCVRIVM appellarunt, quem suceini speciem fecerunt, ob colorem quo succinum refert, quemque ex vrina Lyncis, simulac ea excernitur, coagulari, nonnulli fabulantur.

N. *Vetus hic lapis graue olet, & ne vstus quidem odorem deponit.*

Reperiuntur multis in locis Germaniæ, in Borussia, Pomerania, Episcopatu Hildesienfi, Heluetia, Ducatu VVürtembergensi, (Göppingæ)

Vires. *Adhibetur ad calculos frangendos, non aliter quam lapis Iudaicus, curat vulnera. Putatur etiam ad pleuritidem, (quia mucronem habet,) valere.*

N. *Putant lapidem hunc potum contra Ephialtis suppressiones, noctis que ludibria valere, ac fascinationibus succurrere.*

XIII. Magnes.

Magnes est lapis, qui ferrum vel alium magnetem ad se trahit, ac plagas mundi ostendit. Græcè *Λίθος μαγνήτις*. L. Heracleus, *Ἡρακλεῖς*. Lat. Hercules, sideritis, s. magnethis, Germanicè *Magnetstein*.

Reperitur circa ferrifodinas in diuersis locis Germaniæ, Nouergię, Sueciæ, Italiæ.

Delectus.

Vegetior plerumque cæteris esse solet, qui ferri colorem habet.

Vires. *Vires habet hamatidis, teste Galeno, adeoque adstringit, sanguinemque sistit. (vstus) crassos & melancholicos humores educit, sed vsus est rarioris.*

PRÆPARATA.

Vnguentum Magneticum, seu Sympathicum, vide libr. 2.

N. 1. *Sunt qui ex magnete vsto & cera Emplastrum conficiunt, idque summe ad podagricos dolores leniendos commendant.*

N. 2. *Corroboratio magnetis institui potest, si cum $\Psi \Delta$ mediocriter ementetur, ac postmodum in solutione vel oleo ♂ extinguatur.*

XIV. Marmor & Ophites.

Marmor lapis est insigniter durus ac ad splendorem suscipiendum, si poliatur, ita aptus, vt statuae vel columnæ egregiè nitentes inde sculpi possint Græcè *Μαρμαρ* (à splendore) German. *Marmelstein*.

Genera multa sunt, cum nec certa illis figura, nec color certus sit. Alia sunt alba, v. gr. Alabastrites. Alia rubra, Alia nigra, vt Lydius Lapis. Alia variis coloribus, vt Porphyrites, Ophites, de quo hic,

Ophites est marmor instar porphyritæ durissimus, colore viridi saturato, dilutis eiusdem coloris maculis quasi aspersus. Græcè, *ὄφις*: Latine Serpentinus. Germanicè *Serpentinstein*.

N. 1. *Roëtius de Boodt, cinereum quoque constituit Ophitem, eumque durissimum, tum & nigriustulis maculis aut punctulis*

punctilis variegatum, & hunc mollitiem alabastrita:

N. 2. Veteres Ophite genera fecerunt.

1. Negricans durum. 2. Cinerum punctis distinctum. 3. Lineis quibusdam candidis interstinctum, candidum molle. Hinc apparet veterum Ophiten à nostrate esse diuersum.

Foditur noster in locis variis, Italiae & Germaniae, verbi gratia in Misnia, quod tamen ob mollitiem, rectius alabastris accensetur, diciturque Zeblicium.

Vires Vterum Ophite omnes alligati contra capitis dolores, & serpentum ictus (ex signatura) prosunt, teste Dioscoride. Qui Lineas habet, Lethargo & capitis doloribus auxiliari dicuntur, arceréque pestem petechialem (ex signatura) Galeo lithonripticus est intro assumptus.

N. Ophite nostrati multa vulgus tribuit, videlicet, poculum inde factum, si venenum susceperit, id sudore prodere. Conducere colicæ, pleuritidi, torminibus, ac ventriculo refrigerato, doloribus podagricis, nephriticis, si calfactus ophites loco affecto applicetur. Opitulari quartanis, tertianis, phthisicis, hepaticis, si poculum quotidiano vsui destinetur.

XV. Ostiocola.


Ostiocola lapis est albo cinereoque colore, ossisque figuram æmulans. Dicitur lapis Ossifragus, Lat. Sabulosus, Ostirites, Osteolithus, Holoosteus, Morochtua Matthiolo. German. Beinbruch, Bruchstein, Beinrvell, Walfstein, Sandstein, Steinbein.

Nascitur in Palatinatu, locis arenosis, (an der Bergstrass.) item in Saxonia, in Silesia, &c. crescit per arenam forma Coralli.

Vires. Celebratur ad ossa cito glutinanda, quippe materiam callo idoneam

citissimè suppeditat, adeoque glutinationem maturat. Adhiberi potest internè à ʒj. ad ʒiʒ. & externè in catapl. Emplastris &c.

PRÆPARATA.

Ostiocola præparat. laeuigando cum  geranij.

XVI. Pumex.

Pumex lapis est erosus, porosus, spongiosus, exiguisque cauernulis, seu foraminibus plenus. Græcè Κίονις. Arabicè Tanech. Germ. Bymstein.

Inuenitur ad confluentiam Germaniae.

Probantur, qui candore minimoque pondere, vt qui quam maximè spongiosi, aridique sunt, tritique faciles, nec arenosi in fricando, &c.

Vires. Refrigerat, siccatur, extenuat, ulcera leniter purgat, cicatrices explet, & emendat. Farina adhibetur saepe medicamentis oculorum, & verendorum. Immiscetur item dentificiis & sternutatoriis.

PRÆPARATA.

Vruntur trina vstione, ita vt torreatur carbone puro, ac toties vino restinguantur albo. Lauantur deinde & siccantur conduntur quam minimè vliginose loco.

N. Quidam tertia vstione refrigeratos porius quam restinctos terere malunt ex vint. Boëtius de Boodt.

XVII. Lapis specularis.

Lapis specularis est lapis fossilis, instar Crystalli pellucidus ac in bracteas tenuissimas scissilis. Dicitur communiter Selenites, aliis alumen Scaiolæ.

Inuenitur in Moscouia, copiose item in Hispania, in Saxonia, Thuringia, Marchia, Misnia, &c. Etsi autem vt plurimum candidus sit, attamen reperitur & variis coloribus, melleus s. niger, fuscus.

N. Vets.

N. *Veterum Selenitem*, (aphroselectem) quia noctu lucebat, à nostrate diuersum esse, nemo non intelligit.

Vsus est rarioris, nec adhibetur facile, nisi ad mulierum faciem dealbandam, & rugas depellendas.

PRÆPARATA.

Calx & Liquor.

Combuitur igne in puluerem candidissimum, qui per deliquium oleum seu liquorem præbet. Vide *Talcum*.

XVIII. *Silex*.

Silex durissimum genus saxi est, vel marmore durius, extrinsecus leue. German. *Kiesling*, *Kieselstein*.

Differentiæ eius plurimæ sunt.

Nam alij liquabiles sunt, & plerumque foris albi & pellucidi, Germanicè, *Fluszsteine*, *weisse Kiesling*, *Bachsteine*.

Aliqui prorsus diaphani sunt.

Aliqui ita duri, vt ex iis ignis excutiat, unde & Pyrites dicuntur. Germ. *Feuerstein*.

Aliqui prorsus opaci sunt.

N. Qui molliores sunt marmore, non silices, sed lapides simpliciter appellantur.

Vires. Silicum communium vsus int rimus esse potest, ad tartaream mucilaginem incidendam, calculum resoluendum, ac prout ad obstructions referandas. Extrinsecus frequenti vsu in dentificiis adhibetur.

Pyr. vim possidet calfaciendi, siccandi, discutiendi, digerendi, adeoque Emplastris digerentibus admiscetur.

PRÆPARATA.

I. Sal fit leg. comm. calcinatum solvendo in $\bar{\Gamma}$.

Dosis gran. 6. ad 10. vel 20.

N. 1. Calcinatio fit eodem modo, quo Crystallus calcinari diximus.

N. 2. Si ex tempore adhibere volueris, restingue silices ignitos in vino generoso, idque toties, donec planè in puluerem fuerint redacti ac exhibe vinum. Hartm. in præct. Medull. de Still.

N. 3. *Querc. soluit cum* \times *mellis Ph. R.*

2. Oleum fit per deliq.

Dosis \mathcal{D} j. Medull. de Stillat.

3. *Cremor silicum & crystalli* paratur etiam facillimè, ex liquore Silicum descripto in parte secundâ furnorum Glauberi p. 136. si scilicet liquor ille diutius in cellâ feruetur, tandem Galredam quandam demittit ad fundum, $\circ\circ$ \square ri supernatante, quod tam diu euacuandum erit à dictâ Gelatinâ quandiu aliquid liquoris sursum fertur, deinde edulcandum est.

Cremor hic de facili in quouis vehiculo dissoluitur. S. Clossai experientiâ.

XIX. *Lapis Spongia*.

Lapis Spongiæ est lapis prorsus, friabilis, in spongiis concretus, colore candido vel gryleo.

Dicitur *Cysteolithos*, (ab vsu.) German. *Schwammstein*.

Vires: Extenuat absque insigni caliditate, ad calculos renum vesicæque frangendos utilis est. Valet etiam ad strumas discutiendas, si nempe omni manè fiat haustus propria urina, & postea in vltima (æ quadra singulis diebus sumatur in vino, cum Θ e, \square i & γ . Vide Gluckrath.

PRÆPARATA.

I. Sal.

Calcinatur cum Δ e calcinatione leui, soluitur in \times , vel spirituiis is. Item; ignitus toties in \times extinguitur, donec in calcem resoluatur.

XX. *Talcum*.

Qg.

Talcum.

Talcum Officinis lapis est, speculari lapidi similis, magis tamen tenuis, squamosus, viridiusculus, igni resistens ac fixus. Dicitur à nonnullis Stella Terræ. Germ. *Talck*.

N. Inuenitur & Talcum rubrum ac nigrum (Parac. in Chronic. Carinthia) verum Officinis minus id vsitatum est.

Electio.

Optimum censetur, quod venetiis ad nos transportatur. Musco viticum tamen eque bonum est probatur autem præcipue viridiusculum.

Vires ac Vfus: Potissimus eius vsus est externus & cosmeticus, adhiberi tamen nequit, nisi vinculo suo liberatum, præparatum, ac in liquorem redactum sit.

PRÆPARATIONES.

E præparationibus Talci præcipua est Calcinatio, reliquæ enim operationes qualis est destillatio & liquatio, per se notæ sunt.

Calcinatio igitur tum est sicca, tum humida.

Calcinatio sicca.

1. Contunditur in pollinem tenuissimum pistillo ferreo. postea forti ollæ committitur, operculo addito, imponiturque furno vitriariorum, figulorum vel calcariorum (in eodem *Kalckofen*), ubi maximæ flammæ sunt. Post triduum aut quadriduum eximitur, & si in calcem redactum sit, seruatur; sin minus, repetitur labor, donec perfectè calx dealbuerit.

2. R. Talc. opt. q. v. contunde in mortario candenti, sic melius teritur Talcum, (donec nullum amplius splendorem referat, puluerem traice per cribrum setaceum, ac cum carbonum Tiliæ ana. Misc. calcinaque in fornace figulina ♂ ♀ 2. vel. 3.

3. R. Talc. subtilissimè puluer. Itj. ♀ i. per ☉ calcinat. ana F. S. S. S. ac cementa in ☩ clauso ! ♂ vt ☩ candeat. Dein exime ac edulcora.

4. R. Talc. opt. in laminas tenues redacti, q. v. candefac ac extingue aliquoties, (duodecies vel pluries) in ☉ ☩. donec fiat candidum instar niuis. Edulcora ▽ pluuiali, & exsicca. Hinc impasta cum albumine ovi, ac forma globulos, quos in calce viua reconditos, atque ☩ clauso impositos, calcina ♂ ♀ 3. in fornace figulina vel vitriaria & fiet Talcum, instar Chrystallorum; exime.

5. R. Talc. opt. part. 1. ☉ p. ij Misc. & calcina per quadriduum, postea tere & ablue, puluerem exsiccatum panno involutum, obducito luto crasso, ac sepe li in ☩ o crudo calcinaque ♂ ♀ 15. tere ac solue in ▽ vite, solutum coagula.

6. Calcinatur cum Metallis; nimirum iniice Talcum argento vel cupro, ad ignem fuso horam dimidiam (hor. aliquot.)

Calcinatio humida.

R. Talc. Venerian. opt. scinde cultello in particulas subtilissimas, digere in sole feruentissimo, vel fimo equino per mensem, cum accerrimo Vini Hispanici, quotidie aliquid ☩ i superaddendo, donec acetum fiat q. mucilaginosum.

Hinc

PRÆPARATA.

1. ☉ Talci destillatum, Cosmeticum Hartmanni.

R. Talcum calcinatione humida, (cum +,) in mucilaginem redactum, destilla per retortam lutat. ▽ nudo, in excip. capaciss. Primò prodit ☩ po. stea oleum album. Hæc separa.

N. Alij

N. *Alij Talcipollinem cum cochleis olla immittunt, vt Talcum deuorent, vbi deuorauerunt, cum testistusas vitro imponunt, ac iis aquam extillant, promulierum mangonio.*

Vires. *Acceto Accio possunt manus alui* ☉ *o vero fieri inunctiones.*

N. *Aut, si primo facies fuerit diligenter ab omnibus sordibus purgata, fucum integrum mensem durare posse.*
Hartm. in Croll.

2. ☉☉ *Camphoræ Talcatum.*

R. Talc. crud. (præstat calcinat.) optimè puluerisati part. 1. ☉☉ Cāphorat. p. ij. digere vt albescat ☉☉ *Vide de ☉☉ o Camphoræ.*

3. *Liquor Talci, siue ☉☉ per deliquium.*

R. Talc. optimè calcinatum, (calcinatione 12. vel alia,) F. Extractio cum ☒ filtra & coagula. Edulcora ac reponere postea ad liquefcendum in cella.

N. *Alij progrediuntur ulterius, atque ☉☉ cum ☒ circulant, abstrahuntque aliquot cohobis.*

Liquor Talci S. Cloß.

1. Talcum in pollinem terendum est, id quod fit, 4. modis, vel enim Talcum exfoliatum calculis fluuiatilibus integris permiscetur, sacco oblongo includitur, & ministerio duorum hominum successiuus vicibus agitur fortiter, vel lapidi pumicis continuè affricatur, puluisque decidens colligitur, qui tamen minus sincerus est, vel in mortario calentissimo contunditur. Ego illud longè facilius, beneficio limæ leuigatoriæ (vne lime douce) aurifabrorum in scobem attero, cuius lbß. confundo cum lb. 1. ☉ Prius in furno venti per hor. x i calcino, calcinatum repono in cellâ, quod liquefcit separo à non liquefcente, calcem hanc sicca-

tam denuò calcino in tigillo Δ vehementissimo cum part. 4. ☉: Ita Talcum colliquabitur in massam albam pellucidam, quæ in cellâ reposita defluit in liquorem glutinosum.

Vires, lentigines ☉ maculas faciei exest. cutem dealbat, verum non diu relinquendus est liquor, sed aqu. florum fabarum, nenuph. ☉ c. abluenda facies est, ne Epidermidem arrodât.

Alius liquor atque Magisterium Talci.

R. Talci grosse triti (subtilis puluis separatur) q. v. infunde in ☒ ☉☉ (3. 4.) Hinc supericiatur plumbo fuso, calcineturque ad friabilitatem. Hoc solvatur in ☒ Solutioque abstrahatur. Soluatur iterum aliquoties in aq. destillata, purificeturque à facibus. Tandem præcipita cum sp. ☉ i, edulcora & exicca.

N. 1. *Solutum ante præcipitationem per deliq. solui potest, vnde liquor.*

N. 2. *Calcinari itidem potest super aliis metallis, v. g. ☒ are ☉ c.*

Ex communicatione amici cuiusdam Hamburgensis.

Cremor Talci.

Puluerisetur, vno è modis 4. supradictis, affunde ☒ bis terue, Bull. lento Δ in patinâ vitreâ, spuma pinguis superpernatans colligatur cum cochl. desputatorio, dum dabitur, ☒ cremori mixtum euaporet, cremor a. resoluatur in phlegmate ☉ vel pomatæ alicui permisceatur.

Inseruit dealbanda faciei. Ex comm. S. Cloß.

4. *Tinctura Talci.*

R. Talc. optimè puluerisat. q. v. digere cum ☒ ☉ i philosophico,
Q q 2 in fi

in fumo equino mens. 3. 4. sic soluetur Talcum, protrudeturque ad superficiem nonnihil instar pinguedinis.

Huic affunde **V**, digere ac abstrahere cum repetitis cohobis, & transibit tandem **XX**.

Alia.

R. Talc. calcinat. extrahe cum **℞** tu **Θ** is viridi, decanta, abstrahere, ac cohoba aliquoties, sic ascendit tandem & Tinctura, transireque alembicum sub colore rubicundo. **j**

Vires. Praservatiuum est efficax in peste, quotidie sumptum. Dosis gran. vj.

N. Praestat hic rubrum Talcum sumpsisse, si haberi possit.

Tincturam Talci rubri, vide in Agric. pag. 787. tom. 2.

XXI. Unicornus fossile.

Unicornu fossile. Cornu fossile. Ebur fossile. Lapis Ceratites, est lapis colore & leuore cornu referens, interdum etiam forma ipsa, gegraben Einhorn, gegraben Elffenbein.

N. Sapius tam crassum ac magnum reperitur, ut à nullo unquam animali produci potuerit. Substantia lapidea semper & vel dura vel mollis est. Exterius ut plurimum dura, intrinsecus plerumque mollis, alba, lenis, friabilis, compacta, absque poris, lingua firmiter adherens, odore nonnunquam grato. Cortex exterior interdum flavescit, cinereus, albus & subniger est.

Inuenitur in variis locis Germaniæ,

prope Elbingerodam Oppidum Comitatus Stolbergenfis, prope Heidelbergam, Hildesheimium. Item in Moravia, Silesia, Saxonia, Hassia, multisque locis aliis.

Materia huius creditur Marga, aqua subterraneâ lapidescente irrigata & fluida reddita, quæ pro diuersitate matricum in qua fluit, vel & pro diuersitate rerum, quibus sese innuat. sc. lignorum vetustorum, cornuum, ossium subterraneorum, varias quoque suscipit figuras & odorem.

Vires. Non omnia habent eandem facultatem, aut eque validam, sed differunt pro diuersitate originis, reique commixtae. Vt plurimum exiccant, adstringunt, proindeque sistunt alui profusio, gonorrhæam, menstrua alba, hæmorrhagiam narium, hæmorrhoides. Quod si insuper odor medullis accedat gratus, cordi inprimis grata sunt, idque roburant, Epilepsiam arcent. Quæcum rebus aliis sunt commixta medulla, pro earum facultatibus natura mixta censentur. Extrinsecus ulcera ad cicatrices perducunt, oculorum lacrymas sistunt, (in Collyriis.)

N. Frustum huius generis Cornu non longè Marpurgæ Hassiæ à terra erutum oblatum mihi est, haud ita pridem, brachium crassitie aquans, ebori simillimum, nisi quod corticem arboris extrorsum figura referret & pro mediano destitutum esset,

CAP. IX.

DE METALLIS.

Et primum de Auro.

Metalla sunt corpora dura, ductilia ex succo salino siue mercurio, vi sui sulphuris in terra coagulato.

N. Libro primo diximus, res secundarias ex perittomate rerum primariarum fieri. Perittoma ergo macrocosmicū veniens in matricem, siue locum metallificum, id est, metallorum generationi aptum, si ibidem substituerit, suscitatur spiritus seu ignis illius perittomatis, subindeque vi matricis metallina in naturam metalli facessit. Duobus ergo ut omnia, ita & metalla constant; humiditate, scilicet: quæ ♀ius dicitur & spiritu seu igne, qui ♂r. Duo hac in sale fundata sunt vitriolato, id est, in naturam talem transmutato, qualem natura ad generanda metalla proximè requirit. Hoc sal alteratur ulterius paulatim, nec enim statim metallum euadit perfectum. Quare, cum in natura constitutum sit, ut partes diuersæ inuicem misceantur, atque insuper mixtio & maturatio fiant successiue, particulis scilicet nonnullis, citius ad maturitatem peruenientibus, aliis tardius, aliis crudis aliquantulum manentibus; & in hac metallorum generatione varietatem quandam esse necessarium est, quæ particule aliæ maturiores, aliæ minus mature. Maturiores ergo partes id esse suspicor, quod Philosophi sub titulo feminis metallini eliciunt. Licet enim in Metallis partes adeo compactæ & vnitæ

sint, ut difficulter inuicem separari queant, unde fateri conuenit, plerâsq; laborationes, maximè vulgares, non separatorias, sed solum preparatorias seu exaltatorias esse, id est, quibus metalla citra separationem puri ab impuro, solum alterantur, ut eo melius à calore nostro superari, inque actum deduci queant: attamen separationem illam contra multorum experientias hinc inde annotatas, impossibilem statuere, pertinacium potius est, quam virorum cordatorum. Quin imo non modo cuidam ex amicis meis, sed & mihi fors fauit, ut oleum rubicundissimum, aquæ supernatans ex ☉ elicuerimus.

De viribus Metallorum in genere nihil addo, nisi quod tanta inibi à maioribus deprehensa sint, ut principalioribus macrocosmi stellis, microcosmique membris principulroribus & dicarint, & nomina communia imposuerint, vti patet partim ex sequentibus, partim ex lib. I. cap. 9.

Metalla non inepte in classes tres collocantur, idque tam secundum conformitatem disparitatēue duritiæ, quàm secundum conuenientiam preparationum.

Prima continet Metalla nobiliora, ☉ & ☿.

Secunda ignobiliora duriora, ♂ & ♀.

Tertia, Ignobiliora molliora, ♀ & ♄.

Qq 3 Pre

Preparationes Metallorum sunt.

1. Purgatio.
2. Calcinatio. 1. Immerſiua. 2. Vapo-
roſa ac illinitio. 3. Amalgamatoria.
4. Commentatoria. 5. Reuerberatoria.
3. Volatilifatio: vnde Metallum vola-
tilifatum, id eſt, in ſpiritualem natu-
ram redactum.

4. Extractio: vel potiùs maturatio, ſ.
exaltatio; vnde Tincturæ.

5. Sublimatio: vnde Flores.

6. Salificatio: vnde Sal.

7. Mercurificatio: vnde ☿s.

AVRUM

Aurum Metallorum cunctorum eſt
nobiliffimum, ſolidiſſimum, colore ful-
uum, compactum ex principiis ſumme
digestis adeoque fixis.

Dicitur Chymicis. 1. Sol, quia ſoli-
tùm macrocoſmico ſeu celeſti. tùm mi-
crocoſmico, id eſt, cordi ſympatheticè
reſpondere creditur, vnde & ☉is ſigno
notari fœuit. Germanicè *Goldt*.

2. *Rex Metallorum*, quod principa-
tum inter metalla ſibi vindicet,

Præſtantiſſimum cenſetur Arabicum,
hinc Vngaricum, tandem Rhenanum.

Vires *Balsami ſeu calidi nativi*, cor-
diſque ſummum corroborans eſt, vnde ☿
in omnibus morbis, in quibus vires reſi-
cienda ſunt, cum ſucceſſu exhiberi pote-
rit. Mundificat inſuper ſanguinem, no-
xiorum ſcil. humorum diſcutione ac dia-
phoreſi.

N. *Crudum aurum foliatum veteres*
multis commiſcuere compositionibus. Ve-
rum, me hercle, cui bono, præterquam quod
oculos paſcat, non video; ſolidior enim ☿
compactior eius ſubſtantia eſt, quam ut
à calido noſtro reſolui, in qua actum de-
duci queat. Nec ſufficit, quod nonnulli
mutua cordis ac auri eſtluvia ſympathi-
ca ſtatuant, atque ea propter aurum fo-

liatum exhibent. Et enim præterquam
quod eadem facilitate id deſtrui poſſit
qua citra rationes adſeritur, applicari
poſſet extrinſecus maiori in copia, atque
dubio procul maiori cum vtilitate, mi-
norèque vel nullo cum diſpendio.

PRÆPARATIONES.

I. PURGATIO.

Purgatio Solis fit, vel à ſordibus ſu-
perficietenus adhærentibus vel à metal-
lis imperfectioribus commixtus.

Purgationi à ſordibus ſufficit lotio
ex ▽, præcipuè quæ ☿o vel ☾e
imprægnata eſt, vel ex ▽ minus ſpiri-
tuofa, id eſt, aquoſiori.

Purgatio ab imperfectis
Metallis fit.

1. *Per calcinationem immerſuam:*

Soluitur ☉ in ▽, quæ ſolum ☿m
ſoluat, reſectis reliquis intractis, hinc
depletur ſolutio, præcipitatùrque calx;
illa denuo fuſa, parum exhibebit
aurum

2. *Perfuſionem* 1. cum ☿: Fiat re-
gulus Solaris, modo quem habes de re-
gulis in ☿: regulum hunc Solarem
†bulo impoſitum, colloca in anemiũ,
adde Δ carbonum circularem, (ſup-
preſſionis quoque ſi vis) adhibe ſi ☉
pus follem, donec totum ☿ effumarit,
& non niſi ☉ penitus purificatum re-
manſerit. Vocant, *vor dem Balge ver-*
blaſen, ſic purgatur ☉ ab omnibus me-
tallis.

2. *Cum H.* ſiteundem modum, quo
☿m purgare docemus, capite ſequenti.

2. *Per cementationem.*

☿. ☉. Laminatum. F. in olla cemen-
tatoria, S. S. S. cum cemento vulgari
vel regali, committe igni gradatim horis
aliquot,

aliquot, vt metalla imperfecta comburantur.

Cementum vulgare.

R. Farin. laterum. $\text{℥} \text{v} \text{ i} \text{ i} \text{ i}$.

⊖ preparat. $\text{℥} \text{ i} \text{ v}$.

℞i: *Ærugin. ana* $\text{℥} \text{ ss}$. M.

Cementum Regale, quod soli ⊖ *parcit.*

R. Farin. later. $\text{℥} \text{ iij}$.

*. ♂. ⊖ preparat. à $\text{℥} \text{ i}$.

Misc. humectando Vrinā.

Cementum optimum.

R. ⊖ p. i. ♀ p. ij. fundantur simul, hinc fac lamellas tenuissimas instar papiri. Deinde per horas 40. vel 50. Δ forti cementa; stratificando sc. cum cemento mixto ex farina later. ⊖ colchotare, virid. aris & * irrorāque cum \times forti, sic perit cuprum. Bequin.

Cementum aliud.

R. Alumin. plumos. $\text{℥} \text{ j}$.

⊖ calcinat. $\text{℥} \text{ j}$.

⊖. $\text{℥} \text{ ss}$.

Alum. crud. $\text{℥} \text{ i ss}$.

Terr. ⊖ i $\text{℥} \text{ ss}$.

Cun. \times F. pasta, cui inuoluatur ⊖ laminat. m.

Primum stratum fieri poterit ex ⊖, calcinat. farin. later. cui ⊖ priori cemento inuolutum imponatur. Tandem ultimo finiri poterit stratum cemento priori: cementetur gradatim primo Δ lento hor. tres, plus minus, dein auge ignem, vt \dagger bulum candescat hor. 4.

N. Hac ratione probari possunt floroni, quippe qui integri manent euanescentibus metallis imperfectioribus.

II. CALCINATIO.

Calcinatio ⊖ est. 1. Immerfua 2. Vaporosa. 3. Amalgamatoria. 4. Cementatoria. 5. Reuerberatoria.

Calcinatio immerfua.

Calcinatio immerfua actus duo sunt: solutio & coagulatio, seu Præcipitatio.

Solutio fit per R. per \odot ij glaciali, per \cap m Obezoardicum, per ∇ s ⊖ vel \ominus e acuatas per \cap m ⊖, alcalif. per \odot hi, Liquorem seu Balsamum ⊖ is, \cap m alcalifat. \times , per ∇ alcalifat. per spiritum bolarem ♂, *, spiritum ⊖ li volatilem, ♀ ri, sanguinis, \square ne calcis viua, mellis $\text{℥} \text{ ii}$, $\text{℥} \text{ ii}$, minerarum ⊖, ♀, ♂, hni, roris Maialis. & simul.

Coagulatio fit, vel humiditatis diffusione, vel soluti ⊖ repercussione seu præcipitatione.

Præcipitatur ⊖ instillatione \odot . ♀, p. d. iniectione cinerum clauellator. vel salium ex vegetabilibus elixiuatorum.

Præcipitatur itidem solutio Solis per ♀ iniectum

Præcipitatio fit etiam cum soluto * co, \cap u \square æ Dissolutio cum menstruo aqueo insipido vix est possibilis. Potest tamen acrimonia \cap us ⊖ soluentis aliquo modo occultari. Sic multi asserunt \odot ⊖ ferè insipidum euadere, si lateres candentes sæpius in eo extinguantur, & postmodum destilletur spiritus dulcescens, in quo postea Solem soluunt. Alij Balsamo ⊖ dulci vtuntur, quod fit ex ⊖ per vices x i i. \cap u \times imprægnato, deinde destillato, flores ⊖ collo 6 ræ adherentes soluuntur in cella in \odot auri solutium.

Hinc

⊖ *Sclopetans seu fulminans.*

R. ⊖ laminati & in frusta incisi, q. v. solue digerendo in R. (ex ∇ $\text{℥} \text{ i}$. * $\text{℥} \text{ i} \text{ v}$.) solutioni infunde guttatim bonam

bonam quantitatem $\odot\odot i$ ♀ i, p.d. (vel
 cōtra solutionem \odot , infunde in bo-
 nam quantitatem $\odot\odot i$ \square i, p.d.) donec
 solutio clara & alba euadat, sic præcipi-
 tabitur \odot instar limi, \odot le omni ex par-
 te præcipitato, elue falsedines ∇ com-
 mun. calcemque \odot is calore hypo-
 causti lenissimo exicca vel sponte sua
 exiccati permittit; sic paratum est \odot ful-
 minans.

N. \odot hoc fulminans caute tractes, ne
 flammam scil. concipiens detrimentum
 inferat, concipit enim promptissimè ac
 deorsum vergens, quicquid substratum
 non sine adstantium periculo, in frustilla
 disiicit. Lauigaturus itaque memento
 singulis vicibus parum sumas, vel Au
 \odot is, aut ♀ is guttatim affuso, vim pho-
 ris ac fulminantem adimas. Figitur quo-
 que vis fulminatoria, si calx illa in X
 l. ∇ per horas aliquot (24.) continua a-
 gitatione coquatur.

Vires Sunt qui huius gran. iij. vel. iv.
 ad sudores ciendos exhibent.

Hinc & Diaphoreticum.

Rz. Calcis \odot [V maluat. aliquo-
 ties irroratæ; atque iterum exiccata]
 § .

Croc § .

Ambr. Gryf. & mosch. or. ana gran.
 Misc. & serua.

Vires. Cum Vino maluatico, vel alio
 liquore exhibitum, multos affectus do-
 mare dicitur, præsertim ex obstructione
 ortos: cordiale quoque insigne est, at hy-
 stericis minus utile, ob moschum, & Am-
 bram.

2. Calcinatio vaporosa.

Fit similiter vaporibus ex liquore
 aliquo corrosivente, (vti dictum,) eleua-
 tis. Paracelsus libr. 5. de morte rer. natur.
 hanc habet; crocūque acquisitum \odot m
 \odot is appellat.

Rz. \odot lamin. suspende super Vrinam
 pueri, mixtam cum vuarum pressarum
 exuiis, (mit *VVeintrester*) Aludele sat
 amplo firmiterque clauso. Hinc pone
 in exuias vuarum calidas ♂♀ (14.)
 & adhærescet laminis crocus pede lepo-
 rino abstergendus.

3. Calcinatio amalgamatoria.

Rz. \odot laminat. p. 1. ♀ crudi puri p.
 vi. circiter F. aāa nimirum \odot lamina-
 rum (& si vis ignitum,) cum ♀ o ad Δ
 calefacto, vt fumare incipiat, misce: mi-
 sturam in ∇ infunde, vt mistura ea vn-
 dique fere similis euadat.

Hinc tere cum duplo ♀ is, continuo-
 que ad ∇ lentum agitando calcina, do-
 nec ♀ & ♀ sine liquefactione ac con-
 cretione exhalarent, calxque \odot is colore
 calendulæ remanserit. Sic calcinatur
 Basilio ad conficiendam Tincturam,
 vide infra.

N. 1. Felicius procedet calcinatio si
 [ante combustionem cum ♀ idem ♀
 cum \odot toties amalgamatus, & ab eodem
 demper retortam abstractus fueris, do-
 nec sese invicem amplius amplecti recu-
 sent. Vide Hartmann. in pract. de Dy-
 sent.

N. 2. Beguinus separat ♀ um super-
 fluum per corium, post separationem mi-
 scet restantem massam cum duplo \odot de-
 crepitati, reuerberatque sine fusione \odot is
 in X bult lutato, & non nisi paruo fo-
 ramine aperto \odot em ita calcinatum (&
 edulcoratum,) amalgamat denuo cum
 ♀ io, massam traiectione in corio restan-
 tem miscet cum duplo ♀ is vini, super-
 funditque V optimum, vna cum ♀ e ef-
 flagrandum, sic relinquitur \odot spongiosus
 valdeque attenuatus.

4. Calcinatio cementatoria.

1. Fit quando \odot , vel cum ♀ e, vel
 \odot e quopiam stratificatim mixtus, in
 Δ re

Δ reuerberij adhibito coloris modera-
mine, ne ☉ fluat, subtilissime puluera-
tur. *Sala de ☉.*

2. *Cum C.C. Cūsto.*

R. ☉ limat. q. v. tere diligentissime
cum C. C. vsto, dein reuerbera (quod
in furno figulino quoque fieri potest)
donec colorem acquirat incarnatum.

Vires. *Medicina est virib. suis effi-
cassima, dosi proportionē CC. (qua re-
cipitur fere octupla) est ; que grana ☉
3. 4. & c. contineat. Finck. in Enchir.*

3. *Aliter cum C. C.
crudo.*

R. ☉ laminat. & C. C. in similes
laminas redactum. F. S. S. S. collocetur-
que clausa lutataque pyxide in Δ calci-
nationis gradualem tandemque horis
4. auge Δ m, vt pyxis incandescat; hinc
exime, atque itera calcinationem nouo
adhibito C. C. donec ☉ reddatur fri-
abile. (fit vice tertia.) Tandem ☉ hunc
calcinatum denuo cum C. C. vsto tere
ac verbera Δ mediocri, vt colorem ac-
quirant laterum. Sic optimum habes
Solis puluerem.

N. *Expedit fundum pyxididis arena
vel alum. plumoso tegere, ac stratum eo-
dem claudere. Ioh. Agric. de Sol.*

5. *Calcinatio reuerberatoria.*

Reuerberari Sol dicitur, quando in
puluerem purpureum seu summe brun-
neum. subtilem ac leuem redigitur, id
quod fit per se ignitione sola, vel etiam
flores ☿ is calci ☉ admiscendo & com-
burendo.

N. *Supplere reuerberationis vices pos-
sunt iteratē ☉ calcinationes, siue illa per
āāā siue per R facta fuerint.*

III. VOLATILISATIO.

Vnde ☉ spiritualisatum.

Volatilisationem voco ☉ is per ☿
destillationem, qua ☉ velut in spiritua-

lem naturam redigitur, idque fit be-
neficio volatilis alicuius, eiusque de-
biti vehiculi, seu menstrui; nimirum
hoc ipsum à ☉ soluto toties coho-
batur, donec secum in liquida forma
eundem Solem euehat. Vehiculum au-
tem commodum præbet, 1. R. 2. ☉ 5
glaciale, (vide paulo post) 3. ☉ Be-
zoardici, (vide ☉ portabile per ☉ m
☉ Bezoard.) ☉ ☉ rectificat.

N. *Loco ☉ communis, haud sine com-
modo substitui poterit. ☉ ex sale alicu-
ius vegetabilis, v. gratia Cardui bene-
dicti.*

IV. EXTRACTIO.

Vnde ☉ portabile, Tinctura ☉.

N. *Tincturas plerasque Solis solutiones
& exaltationes potius esse, quam extra-
ctiones, non diffiteor; attamen quia vul-
gariter Tinctura nomine efferuntur, &
nobis visum fuit idem retinere. Aurum
itaque portabile communiter dicitur au-
rum in liquorem redactum, internōque
usu idoneum, de quo loqui videtur Hip-
pocrates lib. 1. de Dieta, text 47. Qui
aurum, inquit, ac opus adhibent, tundunt,
lauant, blande igne liquant, (neque enim
vehementi coit,) quod ubi elaboraue-
runt, ad omnia vtuntur. Scias tamen &
Extractiones genuinas non esse impossi-
biles. Nimirum & Amici cuiusdam mei
& propria mea experientia didici,
quod ex Sole oleum rubicundissimum
aque supernatans extrahi possit. Id quod
hic repeto, ne de certitudine dubites.*

1. ☉ Portabile per V sale urinae
acuatum.

R. Calcem ☉, (per R factam, & re-
uerberatione in summam porositatem
& brunnitatem redactam, affunde V
microcosmic. digerel. calore per men-
strum vase H. clauso, donec sanguinis in-
star rubicunda tinctura euadat. Hinc

R r decan

decanta, & affunde nouum menſtrum, idque toties repete, quoties opus. Solutiones collectæ per octo & duodecim dies digerantur. Hinc leniſſimo calore menſtrum, (in ſimiles rurfus referuandum,) in **MB** ſeparetur. Sic remanet tinctura in fundo forma \odot i rubicundiffimi, in quolibet liquore ſolubilis, quæ vicem \odot potabilis ſupplere poteſt.

Eandem ſolutionem ſi loco **MB** in arena per curcubitam vel retortam deſtilles, tandem \odot tinctura ſimul per **X** tranſit, rubicunda inſtar ſanguinis, relictâ in fundo terrâ acidâ, nigra, ſpongioſa. Tinctura è menſtruo ſuo in **MB** ſaltem tepido liberata vterius exaltari poteſt, ſi aliquoties in **V** ſoluatur, ac ſpiritus idem per deſtillationem à tinctura abſtrahatur.

Dofis à gran iij. ad viij. imo vel vltra. Hartm. in Croll. & in Praſt. Senn. Inſt. Keſl. 1. Cent. 2. Gluckr. in Beguin. libr. 3. cap. 2.

N. Sala, Scheunemanus & alij, loco ſalis volatilis vrina, ſalem naturæ recipiunt, i. e. Macrocoſmi Elementorumne ſpiritum, in terra ceu Macrocoſmi Generatorio, (vt inibi in ſectũ terreſtrum nutrimentum faceſſat,) in corpoream ſubſtantiam transplantatam. Hunc arte ſpargyrica ſumme depuratum, animatione exaltatum, vocant Φ m Philoſophorum.

Conſule Hartman. in Croll. pag. 399. Salam de \odot potabili. Tentzel. in Exeg. pag. (mibi) 491. Scheunemani Hydromaniam, &c.

2. Aliiter, cum **V** acuatoper Θ , vel γ .

Alij **V** acuunt, vel ſale volatili, ſeu floribus Θ , aut γ , vel Chryſtallis ſalis dulcibus, vel ſpiritu \ast , aut \odot i, atque vt dictum, cum hoc **V** acuatoper,

calce \odot ſumme brunna & potofa, Tincturam digerendo extrahunt: abſtracto menſtruo remanet tinctura in fundo, quam circulando fixare licet

Vfus.

\mathfrak{z} . Huius Tinctur. \mathfrak{z} j. ∇ theriac. \mathfrak{z} j. M. pro ſudorifero aliquot dies continuando.

Dofis \mathfrak{z} j. Vide Quercetan. in libr. de Medicam. Spargyric. praparat. Salam de \odot potabili. Keſler. ib. 3. c. 31.

3. Aliiter cum **V** alcolifato, \odot vite Quercet.

Primò calcina Solem laminatum per cementat. (cum Θ) & reuerbera Secundo, cimenta per Sacchar. \mathfrak{H} i: ſuper hac mixtura accende aliquoties **V** alcolifatam. Relictam materiam circula (\mathfrak{S} ρ 14.) cum **V** alcaliſat. abſtrahe & affundendo nouum **V** alcaliſat. iterum circula & abſtrahe, idque repete, donec tota \odot ſubſtantia per **X** effertur. Separato menſtruo remanebit \odot vitæ præſtantiſſimum in fundo. Quercetan. Sala.

4. Aliud per Ol. \mathfrak{S} ij glaciale.

\mathfrak{z} . Calcin. Sol. reuerberat. coniunge cum Ol. \mathfrak{S} ii glaciali rectificato, digerendoque per menſem, extrahe tincturam rubicundam: quod ſi illud oleum viciffim ſeu ſecunda vice deſtilletur, aurum eleuatur in **V** ſolubile, & hoc eſt \odot potabile.

Vires. Valide per diaphoreſin mouent.

Dofis gutt. 3. 4. vel. 5.

N. Oleum \mathfrak{S} ij quod prima hac deſtillatione ab auro prodiit, purgat leniter ſoluitque omnes obſtructiones, & multa alia præſtat. Hartm. in Croll. p. 226.

5. Aliud per Ol. \mathfrak{S} 11. Saccharatum, Baſilij Magiſterium Solis.

\mathfrak{z} . \odot . volatilif. affunde oleum \mathfrak{S} ii Sacchara

Saccharatum, cum tantillo spirit. \odot ,
& extrahetur tinctura, relicto corpore
 \odot intacto. *Basil. in Triumph.*

Aliud per spirit. \odot

Bezorardicum

\mathcal{R} . \odot foliat ac calcinat. Solue in spiritu \odot Bezoardico rubicundo, abstrahéque menstruum calore lenissimo, (ne spiritus nimium prodeant,) per \mathbb{X} , vel phiolam oblongioris colli, usque ad pelliculam seu oleositatem. Hinc recens rubicundum menstruum affunde, solue, abstrahé, similiter procedendo tertia vel quarta vice. Tandem hæc ipsa soluto \odot ex retortat Δ fortiori destilletur, ut & spiritus prodeant, quos affunde iterum cohobando, donec ipsum aurum rubicundum instar rubini apparuerit.

7. Aliud \odot potabile per \odot .

hi.

\mathcal{R} . Calc. \odot (per \mathcal{R} vel \mathcal{F} &c.) circula per aliquot dies cum Ol. \mathcal{H} i flauo; sic compagem \odot in liquorem solutam videbis.

Vires & Dosis. *Vsus eius est contra venena non contemnendus, imo saepe visum est, gutt. iv. ad viij. in vino exhibitis, etiam eos, qui existimabantur morti proximi, refocillatos fuisse. Multum etiā præstat in Caduco, Apoplexia, Paralyssi, & ceteris morbis capitis. Harim. in Croll. pag. 474. Kesler. libr. 4. Num. 57.*

8. Aliud per spiritum

\odot is.

\mathcal{R} . Calcis \odot , [solutionem Solis in \mathcal{R} Basilij præcipit. cum \mathcal{F} ,] q. v. affunde spirit. \odot is opt. rectificat. digerendo extrahe tincturam, corpore \odot albo remanente in fundo, [quod est reducibile in \mathcal{C} am fixam] tincturam exalta cū \mathbb{V} circulando, totiesque cohobando, donec cum \mathbb{V} per \mathbb{X} deducatur;

Kesler. lib. 4. cap. 71.

9. Aliud per ol. Δ .

\mathcal{R} . Calcis \odot q. v. affunde ol. Δ p. c. ad eminent. digit. 7. abstrahé cohobando aliquoties, donec \odot solvatur. Solutotandam \odot i affunde \mathbb{V} rectificatiss. ad emin. dig. 4. oleo Δ is non separatot. Digere septim. (6.) Hinc abstrahé per \mathbb{X} \mathbb{V} , idque reitera, donec \odot per \mathbb{X} eleuetur. Hoc facto abstrahatur lenissimè \mathbb{V} , ut maneat in fundo liquor rubicundus.

N. 1. *Post tertiam vel quartam cohobationem separandum est phlegma, novumque etiam affundendum.*

N. 2. *Reiteratio cum \mathbb{V} opus est secundarum aliquot (10.*

Hinc fit.)

Aurum Diaphoreticum compositum

Poppi.

\mathcal{R} . Calcis \odot (à qua Ol. \odot is abstractum) \mathbb{Z} j. Ol. \mathcal{F} ij. (ex cinnab. natiua) \mathbb{Z} ij. Ol. \mathcal{J} is (ex scorii \mathcal{J}) \mathbb{Z} j. Superfunde \mathcal{F} vini, aliquoties id abstrahendo, & remanet pulvis paulatim Δ calcinandus & figendus.

Prodest in contracturis. Dos. g. viij. Popp. in Thesaur.

10. Aliud per Essentiam

\odot is.

\mathcal{R} . Optimè calcinat. (per \mathcal{A} a, &c.) affunde QE. seu oleum (Balsamum) \odot , ac extrahe, (solue) s. a. Decantatis extractionibus, (solutionibus) affunde \mathbb{V} opt. rectificat. sic \mathbb{V} animam Solis ad se trahet, relicta Essentia \odot in fundo, quam separa; Tincturam \odot in \mathcal{M} B à \mathbb{V} libera. *Sala de \odot potab.*

11. Aliud per spir. \mathcal{M} anna.

\mathcal{R} . Calc. \odot fulminantem, redige in flores per peculiare aliquod instru-

\mathcal{R} 2 mentum

mentum argenteum deauratum : Ex floribus extrahe tinctur. cum spiritu mannæ : abstrahæ ad consistentiam prohibitu.

Vires. Sudorem, eumque fœdissimum pellit, felicissimè morborum quorumcunque malignorum & venenatorum seminarium secum vehens. Cl. Helu. Diete-rich.

Dosis gutta aliquot.

12. Aurum potabile cum ☿ u

☉ is ☐ ri primo.

F. āāā ʒj. ☉ cum ʒ v i. ☿ morte vulg. superfluum ☿ ium per corium exprime, globulum restantem tere cum ana ☉ fusi, fac euaporate ☿ ium mediocri Δ, salem abluæ aqu. calidā, calcē ☉ tere fortiter cum ʒiij. ☿ communis, pone in tegulā fulminatoria (eine Treibschergen) coopertā cum foramine, cimenta per 3. horas ad totalem vsque ☿ euaporationem, idque cmentationis opus 4. aut 6. cum pari quantitate noui ☿ reitera donec sc. ☉ in spongiam rubicundam attollatur. 2. Extrahatur tinctura per seq. Menstruum ☿ spiritus ☉ ☐ ri parati, vt indicabitur cap. de ☐ ro vini part. i. ☐ part. xii. Destilla simul ex cucurb. Hunc ☐ ☐ fatum affunde calci siue floribus ☉ sublimatis & tingetur rubro colore, abstrahæ ☐, remanebit puluis coccineus, cuius vires innumera.

N. Si calcem spongiosam aliquoties ☐aueris cū part. 8. ☐ci donec sandaracino colore eleuetur & postea admix-tione ☐ vindicaueris, felicius & citius extractio fiet Tinctura. Ex commun. S. Cloß.

13. ☉ potabile Franc.

Antoni.

☉ Purgetur (bis) per ☿. Hinc calci-

netur cum ☿. & ☐. Extrahæque cum ☐. Hi.

N. Licet ☿ vice secundā cum ☉ marino fuzo ac tertiā cum ☉ ☐ i calcinare.

Dosis g. 6. 7. 8. & c.

N. Hoc est genuinum illud adeò decantatum ☉ potabile Londinense, cuius descriptionem mihi seruare constituerā. Verum cum à diuersis locis, quin etiam ex aulā quadam illustrissimā transmitteretur, vt communicaretur, nolui hac in re expectationem frustrari.

14. Aliud Quercetan. ☉ vite dictum.

Ex calce ☉ leuissima & spongiosā, elice Tincturam digerendo in ☐ per ☐, Tincturam hanc exalta circulatorium ☐.

Vires Ad innumerabiles morbos ferè incredibilis videtur virutis. Quercetan. in Scolopet. Et ex hoc Sala in ☉ potab.

15. Aliud Landanum ☐riale Bayeri.

☐. ☉ per ☐ i & ☐ m optime calcinat. ʒi. Olei ☿ aliis ʒv. (forßan ol ☐ i) Digerantur colore ciner in phiola H. C. ☐ octo. sic extrahitur tinctura ☉ rubicunda hanc (relieto albo corpore) in phiola H. C. digerendo coagula (in Athanore) in lapidem rubrum, quem super porphyretico humido solue; reiectisque fecibus denuo coagula; tertio eandem operam repete.

Dosis gran. 2. ad 5.

16. Aliud Billichij.

1. Calcina cum ☐ ac præcipita.

2. Reuerbera cum flor. ☐ & ☿, vt euadat puluis instar boli armen.

3. Solue cum ☐ rectificatiss. digerendo ac cohobando multoties, (20.) & vltra; dein coagula abstrahendo.

4. Sol

4. Solue in spirit. Θ , digere dies aliquot (3.) hinc abstrahere, *Bilich, in Exere. th. 102.*

17. *Tinctura Θ is.*

\mathcal{Z} auri fulminatis probè edulcat. part. 1. spiritus Θ li volatilis part. 1v. (sunt qui Oleum Θ causticum, in quo salis proprij pars 3, resoluta sit adhibet, sed tale menstruum naturæ nostræ inimicum est) Digerantur in B. repenti per 40. \mathcal{Z} . Tinctum \mathcal{N} um rubicundissimum & clarum separa per inclinationem, abstrahere ad siccitatem, affunde è vino hispanico factum & \mathcal{F} saturum, & in calore lenissimo fiat Extractio instar Rubini, tinctos spiritus destilla & ad aliquam consistentiam redige, vel pulueris formam, quem etiam à sapore \mathcal{V} poteris eluere aqu. still. vel dissoluere in quocunque liquore approp. r.

N. Si desit spiritus Θ li volatilis, tuncius loco seq. Menstruum excellentissimum substitue.

\mathcal{R} . Θ communis \mathcal{B} . 1. Θ \mathcal{Z} vi. destilla \mathcal{L} a.

\mathcal{Z} huius aqu. fortis part. iij. \mathcal{V} tantundem, infunde \mathcal{V} in magnâ cucurb. quam statim occludes \mathcal{X} suo, ebulliant enim illicò commixti \mathcal{L} us & hauescunt, deinde durante ebullitione rubedinem acquirunt, tandem eadem cessante menstruum sub viride euadit, quod quidem nil peculiare possidet, nisi quod illius acredo facili negotio ab auro soluto eleuatur, id quod adhibitis alijs \mathcal{R} fieri non potest.

Ex communic. S. Clost.

18. *Tinctura Fratris Basilij*

\mathcal{R} . Θ per \mathcal{A} calcinat. p. 1. Solue digerendo in \mathcal{R} ara, (vide in Θ \mathcal{R} m Basilij,) vel in \mathcal{R} salinâ, (id est, Θ acuta) p. iij. hinc depleatur solutio, restitanti- que Θ calci denuo ∇ illa soluens

affundatur, &c. donec penitus soluta calx sit: Solutiones digere in \mathcal{M} , vt subsideant feces, quas separa. Solutionem defecatam digere iterum in \mathcal{M} \mathcal{S} \mathcal{P} (9.) Hinc abstrahere \mathcal{R} ad oleitatem, abstractam aquam affunde vicissim, imprægnâque calcem cohobationibus tantisper repetitis, donec liquor ferè insipidus extillarit. Tum affunde nouam \mathcal{R} , imprægnâque denuo vt dictum, in arena, idque tantisper donec Θ per \mathcal{X} penitus transportatum sit [N. Cum singulis destillationibus ignis est augendus, tandem abstrahere per \mathcal{M} ad oleitatem, reponaturque ad Crystallifandum, s. a.

Hinc

\mathcal{R} . Crystall. Θ p. 1. \mathcal{Z} ii viui purg. p. iij. agitato optimè, sic apparebuunt colores, subsidebitque \mathcal{A} \mathcal{A} . Exhalet \mathcal{Z} & restabit puluis Solis purpureus in \mathcal{X} solubilis; qui tingit subito instar sanguinis.

Ex hoc puluere extrahe s. a. tincturam rubicundam cum \mathcal{W} i, qui cum spirit. Θ mixtus & dulcificatus sit, (vide spirit. Θ dulcem ac ∇ temperatam Basil. in \mathcal{V} i,) donec menstruum vltcrius non tingatur, & corpus album reliquum sit.

N. 1. *Menstruum nisi cautè & rite preparatum sit, pro tinctura rubicunda, extrahit viridem, vel alterius alicuius coloris.*

N. 2. *Corpus illud album in extractione tincturae residuum, inseruit Sali & \mathcal{Z} io conficiendo, de quibus infra, videatur Tholdij Halographia, ubi ex testamento Basilij Monachi, prolixè elaborationes hasce describit.*

19. *Paulo secus ex manuscripto testamento Basilij.*

1. Purga Θ per \mathcal{S} .

\mathcal{R} 1 3

2. Cal

2. Calcinā, i.e. solue purgatum ☉ in
 R. coagulāque.

3. Volatilisa cum spirit. ☉ acuat
 per spirit. draconis, (☼) vide supra.

4. Præcipita cum Ol. ♀, vel quod
 melius per abstractionem lentam.

4. Reuerbera cum flor. ♀. vide supra

6. Extrahe ♀ Solis per Wigneum
 & spirit. ☉. vide ▽ temperatam in V

7. Digere extractum ♀, & solue
 denuo in ♀ Philosophorum, vel in R
 dicta.

8. Volatilisa cum V.

N. Basl. reper. lapid. Phil. volatilisa
 ☉ per spir. ☉ is, hinc coniungit extra-
 ctum ♀ cum spir. ☉ i ru beo (corrosiuo)
 per digestionem cum V dulcificato sol-
 uit & digerit aliquandiu; tandem co-
 bobat, donec nihil in destillatorio residui
 remaneat. Sic acquiritur liquor solaris
 seu ☉ potabile maximarum virium.

20. Unicornu Solare, seu Manna
 Solaris,

R. Calcem Solis optimè reuerbe-
 ratam, imbebe aliquoties, menstro
 solari, id est, affunde aliquantulum so-
 laris menstrui (ad eminent. dimidij
 digiti,) vasēque H. clauso digere, l. Δ
 vt siccescat.

Hinc iterum affunde, ac digere, to-
 tiēque repete, vt Sol in puluerem
 fubrubeum transmutetur.

Dosis à gran. 1. ad 5.

N. 1. Menstruum solare destillatur
 per cornutam ex minera, repetitis ali-
 quoties destillationibus. Mynsicht.

N. 2. Felicius forsā processeris, si
 Menstruum hoc sale suo alcalisaueris,
 calcem cum alcolifato hoc menstro cir-
 culaueris, ad modum, quo alias tincturas
 nomine mannas fieri diximus.

Hic non possum non monere, quod non-
 nulli tincturam Solis, beneficio oleorum

aromaticorum sibi imaginentur. Nimi-
 rum calcem Solis optimè elaboratam im-
 pastant cum oleo, (e. gr. Garyophyllor. Ci-
 namomi, &c.) hinc V rectificatissimum
 affundunt, atque intercedente digestionē
 tincturam extrahunt.

Verum, mehercle, loco tinctura Solis
 aromaticorum oleorum tincturam nan-
 ciscuntur, qua V rectificatissimo, cen suo
 simili, (accedit enim ad naturam oleagi-
 neam) admixta acquiritur.

V. SVBLIMATIO.

Vnde Flores Solis.

R. ☉ optimè calcinat. (per spirit. ☉,) part. 1. ✱ depurat. p. vii. Misc. & subli-
 ma. Sic eleuabuntur Flores Solis, quos
 eluendo ab ✱ libera.

Dosis gran. 6. & 9.

Fiat peculiare instrumentum argen-
 teum aut cupreum, (pyxididis instar com-
 plicatilis) constans ex duabus partibus
 superiori ac inferiori, vt aperiri possit.
 Instrumentum hoc in latere tubulum
 habeat, per quem ☉ solopetans iniici
 possit. (paulatim id fieri necessum est)
 tubulum statim obturando. Sic eleuabi-
 tur ☉ fornicique superiori adhæref-
 cit.

VI. SALIFICATIO.

Vnde 1. Sal. ☉.

R. ☉ fini p. 1. ♀ purificat. p. v. vel vii.
 F. āāā. abstrahaturque ♀ per retortam.
 Hinc F. iterum āāā ex relicta scil. Solis
 calce, & abstracto ♀, idque reperatur
 toties, donec ☉ assumere ♀m amplius
 nolit. Tunc affunde ✱ optimum,
 [vel & spiritum ☉ acuatum,] digerē-
 que l. Δ, decanta ac abstrahē men-
 struum ad siccitatem, & remanebit ☉
 Solis.

N. 1. Cum relicto ☉, eodem modo pro-
 cedere potes amalgamando nimirum
 ac abstrahendo, donec totus ☉ in ☉
 conuer.

conuertatur, Kesler. lib 1. c. 4.

N. 2. Alij idem meditantur ex ☉ per *R* calcinato, ac per mensem reuerberato.

2. Aliter.

R. ☉ foliat. vel quod melius calcinat. $\text{z}\beta$. ☉, ☉, O, ana $\text{z}\beta$. Misc. ac impone phiolæ cera Hispanica obturata, digeréque calore arenæ, sic soluetur ☉. Hinc affundendo ∇ . calidam præcipitabitur ☉ in forma pulueris purpurei, [maximè si O ☉ z instilletur,] Pulueri optimè edulcorato affunde *V* rectificatiss. stentque aliquandiu, (mensēs aliquot, vase clauso,) vt *V* sale Solis imprægnetur. Hinc decantetur *V* & abstrahatur, efflagrétue. Sic relinquitur Sal ☉ albiſſ. in fundo.

Vires. *Inſigne eſt Diaphoreticum.*

Dosis gran. 2. 3. 4.

3. Sal Salis Basilianum.

R. Corpus illud album, in extractio-
netincturæ ☉ Basilianæ residuum; re-
uerbera leniter per mediam horam, vt
aliquo modo corporale fiat. Hinc af-
funde ∇ mellis corrosiuam, digere,
extrahéque Sal f. a. (laboreſt dierum
10. circiter.) Aquam mellis sale Solis
imprægnatam ſubiice deſtillationi *MB*
vt abſtrahatur. Sal Solis residuum edul-
cora, aliquoties ∇ commun. deſtilla-
tam affundendo; atque deſtillationibus
repetitis abſtrahendo; tandem cum
V clarifica.

Dosis gran. 2. 3. 4. &c.

N. In hac extractiōe Salis remanet
materia vilis pro z io Solis confici-
endo

VII. MERCVRIFICATIO.

R. Materiam in confectiōe Salis
Solis Basiliani residuam, affunde ſpirit.
 z i, digere per mensem, ac deſtilla à ſcoriis
 z per retortam (vitream) in recepra-
culum ∇ æ frigida aliquota parte adim-
pletum, & habebis z m Solis.

*Tholdius in Halographia ex Testa-
mento Baſily Monachi.*

*z*ius Solis Paracelſi.

Paracelſus generaliter hunc modum
præſcribit, quo ſingula Metalla in z
uiuum redigi poſſint.

Nimirum:

1. Calcinat Metallum fumigando, i.
e. per fuliginem, z rii. *Vide libr. 1. cap.*
14.

2. Calcem Metalli amalgamat cum
 z digerit, abſtrahitque.

3. Abſtractum z m iterum cum cal-
ce eadem amalgamat, digerit & abſtra-
hit tories, ſcil. iterando, donec calx me-
talli ſupra candelam inſtar ceræ liqua-
ri poſſit. Hinc digerendo calcem illam
in z m conuertit, *Vide lib. de reſuſcita-
tione rerum natural, vt & lib. 6. Ar-
chidox. vbi tempus amalgamandi ob-
ſeruare monet, quo Planeteæ cœleſtes
correſpondentes coniunguntur. De quo
legi poteſt libri huius primi cap. 22.*

C A P. X.

De Argento

Argentum Metallum est nobilius candidum, Auro imperfectius.

Dicitur Chymicis Luna vel Cerebrum, eò quod in Macrocosmo Lunæ, in Microcosmo, cerebro sympathicum sit. Germ. Silber.

Vires. Capitis corroborans perhibetur specificum, spiritusque animales confortare, unde & omnibus capitis affectibus peculiaris efficacia censetur, quales imprimis Epilepsia, Apoplexia, & simil.

PURGATIO à sordibus superficiariis.

Coquatur, laueturque cum ∇ , in qua solutum Γ ac Θ .

I. PURGATIO, ab alienis Metallis.

1. Per calcinationem immersuam.

Solve (per ∇ , quæ solummodo soluat Γ , reliquis Metallis intactis.

2. Per fusionem cum Ho.

Immitte plumbum in + bulum ignitum, ut lique scat, quo liquefacto, superiniice Γ m, continuando ignem, donec cum plumbo metalla illa imperfecta vi ignis, partim in fumum abeant, partim quoque scoriarum nomine discernantur, relicta Γ in fundo.

N. 1. Ignis sat fortis requiritur unde è re erit, furnum anemium adhibere.

N. 2. Nus hac purgatione in spumam cum argenti recrementis concretus, dicitur Lithargyrus, de quo infra.

3. Per nitrum.

Fluat Γ ad ignem, hinc superiniicia-

tur per vices Θ , & purgabitur (Γ a. II. CALCINATIO.

1. Immersua.

Solve (Γ m laminati in liquore aliquo corrosivo, coagula inspissando vel præcipitando, ac edulcora. Præcipitatur autem (Γ soluta, per muriam salfam, ∇ salfam, vel per particulam æris iniectam.

N. Liquor ille corrosivus, vel est ∇ [vide in Θ ,] vel spirit. Θ vel his finitimus humor, (ut patebit infra in tincturis, seu (Γ a potabili,) recipitur autem in quâtitate tripla, quadrupla, sextupla, &c

N. 2. (Γ hac ratione soluta, si more solito ad crystallisandum reponatur, concresci in crystallos, quos vitriolum (Γ a vocant.

2. Calcinatio Amalgamatoria.

R. (Γ pur. ac Φ . ana F. aââ. admisce $\frac{1}{4}$ Θ , vel Θ i Exhalet Φ ad Δ , residuum eluatur.

Calcinatio Cenentatoria,

Fit, per Φ Θ lat. per Ψ , per, Ψ per Θ , & simil.

N. Calcinatio hac fieri debet sine fusione.

E.gr.

R. (Γ æ lamin. p. 1. Φ ∇ . p. ij. Misc. exhaletque Φ ad ignem, & remanet (Γ a nistar resinæ. Senn. Instir.

Sic cementatur quoque cum duplo Ψ , vel cum quadruplo Θ , hor. 4-5-6-7-8.

Aliter.

R. (Γ limat. p. 1. fl. ∇ r. p. ij. Θ p. fl. Misc.

Misc. sublimaque (septies) vt flores
 Δ is sublimari solent, sublimatum re-
 stanti materiæ semper addendo, vlti-
 ma vice sublimatum abiice, restantem-
 que materiam aquâ elue.

Calcinatio (æ cæmentatoria fit e-
 tiam vt supra dictum est de ☉ potabili
 cum ☿ u ☉ ♀ ri.

Calcinatio Reuerberatoria.

Quia ☿ facilius igni ac calcinatio-
 ni pareat, quam ☉, vltius operosare-
 uerberatione opus non habet, nihilo-
 minus tamen, cui ita visum fuerit, am-
 plius ☿ calcinatam elaborare poterit,
 denuo illam cum Δ, vel cum ☉,
 (☿) vel simul cum Δ re & ☿, vel
 cum ☿ & *, &c. aliquoties prolubitu
 cémentando, ac dein ablutionibus à sal-
 sedine liberando.

E. gr.

R. Calc. ☿ (per ☿) 3j. ☿ 3ij. *
 3ij. Misce & reuerbera per ☿ 8.

III. SOLVTIO ET EXTRACTIO
 vnde ☿ potabiles & Tincture.

N. Luna vt mollior est Sole, ita faci-
 lius quoque in potabilem formam reduci
 potest, adeo vt si optimè calcinata fuerit,
 soli ☿ i, optimè tamen rectificato obe-
 diat. Quia tamen labor iste aliquo mo-
 do laborosus ac diuturnus est, loco ☿
 simplicis, idem ille ☿ acuat, vel aliud
 aliquod menstruum recipi solet, vt pa-
 bit in singulis.

1. ☿ potabilis per ☿ simplicem.

R. ☿ calcinat. (cum ☿ in quo ali-
 quid * sit solutum (extrahe cum ☿
 cohobando aliquoties.

Dosis gran. 3. vel 6. Gluckrath.

Aliter.

R. ☿ calcinat. (per ☿, seu liquo-
 rem corrosiuum destillatum ex Minij
 p. i. * p. ij. extrahe cum ☿ optimè
 rectificato. Kesler. 1. cap. 1.

2. ☿ potabilis per ☿ sale vrina acua-
 tam, & simil.

R. ☿ calcinat. (per ☿, ☿, cum
 cohobiis, vel per ☿,) extrahe per ☿
 rectificatum acuat, sale vrinæ vola-
 tili, [i.e. per ☿ microcosmicum,] filtra
 & coagula. Vide de ☉ Kesler. 1. cap. 7.
 Sennert. Institut. Begum.

Aliter.

R. ☿ calcinat. (scilicet miscendo cum
 fl. Δ p. ij. ☿ p. i. & sublimando sep-
 ties, vide supra cémentat.) p. i. Vs opt.
 p. ij. ☿. Vrin. p. i. digerantur in vase
 benè clauso per dies aliquot.

Hinc destilla per retortam vitream
 aliquoties, (8. 9. aut tantisper) donec
 materia ascendat cærulei coloris. Sin
 minus hæc successerit, calcinetur denuò
 ☿ pluries, & procedatur, vt dictum.

Dosis gran. 5. 6. 7. & c.

N. Eodem modo fieri quoque potest.
 ☿ potabilis per ☿ acuat, Sale Na-
 tura, de quo in ☉.

3. Alia ☿ per ☿ saturum

R. Calcem ☿ reuerberatam, (cum
 Δ r. (affunde ☿ opt. ☿ saturum, ab-
 strahere cum septem cohobiis, sic solue-
 tur ☿, circula per mensem in ☿, & ha-
 bebis liquorem cæruleum, Kesl. lib. 4.
 c. 44.

4. Alia, per ☿ ☿ latum.

R. ☿ calcinat. q. v. extrahe s. a. tinctu-
 ram cæruleam cum ☿ ☿ lato (vide
 Vinum) decanta ac abstrahere

N. Præstat reliquis in Epilepsia.

5. Tinctura ☿ Basiliana.

Habeatur in promptu.

1. ☿ ter cum ana ☿ calcinatum,
 vide calcinat. ☿ is.

2. Ad manus sit calx ☿.

3. Paretur ☿ ex ☿ i & ☿ ana.

Ergo.

R. Calcem ☿, misce cum ☿ cal-
 cina

cinato, & inde phiolæ vitreæ, affunde
 ☿m, eamque abstrahē destillando,
 cohobaque vice tertia, vltima vice
 ignem augendo, vt materia in vitro
 fundatur. Sic ☿am nancisceris pellu-
 cidam, ex qua cum ☿ fortiff. extraha-
 tur f. a. tinctura sub colore vltrema-
 rino.

N. Remanebit corpus ☿a in extra-
 ctione hac residuum, quod Sali ☿a confi-
 ciendo reseruetur.

*Videatur Tholdius in Holographia
 Testamento Basilij.*

N. Plures modos tincturas ☿a confi-
 ciendi, ad imitationem modorum, qui in
 Solis tincturis descripti sunt, ipsemet
 Lector colligere poterit.

E. gr.

Tincturæ cum ☿ acuato per ☿m
 naturæ, &c.

Essentia ☿a, vt lapidum & crystal-
 li Extracta Clossæana fiunt, parari po-
 test. *Vide c. 4.*

Luna potabilis S. Closs.

Luna potabilis fiet si primo ☿am
 laminatam pluries cum ☿ calcinaueris,
 & inde per affusionem aqu. com-
 munitis ☿ lum elicueris, quod resolu-
 endum erit in Spiritum compositum
 ex ☿ ☿ & ☿ præscripto Art. de Tin-
 cturâ Solis, feces segregando per di-
 gestionem, tincturam caruleam cogen-
 do in puluerem, è quo demum per ☿
 vera Essentia exurgit aduersus Epilep-
 siam optima.

Ex communic. S. Closs.

Alio modo.

Primo āāā, &c. pars vna ☿cum part.
 8. ☿ij exprimatūrque per corium, se-
 cundo globulus restans teratur cum
 quadruplo ☿ decrepitati & prunis
 ardentibus calcinetur per horas 4. in
 pyxide camentatoriâ, si quid non

probè calcinatum superfit, cæmente-
 tur iterum addito nouo ☿, & calx à
 ☿ per ablutiones liberetur. Tercio
 sublimetur huius calcis ☿j. cum ☿iv.
 ☿ci idque 5. repetatur 4. liquore aci-
 do potabili primum (☿) dein ☿eo
 vegetabili (☿) extrahatur Tinctura,
 quæ ad siccitatem reducta sal dabit in
 cellâ diffuens in Oleum, quod itidem
 spatio 80. ☿ fixati poterit in Medi-
 cinam morbis cerebri specificè dica-
 tam.

Ex communicat. eiusdem.

IV. SALIFICATIO.

☿a in salem ☿ tum quomodo con-
 uertatur, ex iam dictis innotuit. Da-
 bimus igitur modum salificandi Basi-
 lianum, quem ex testamento eius ma-
 nuscripto verbotenus cum plurimis
 aliis transtulit Tholdius in suam Ha-
 lographiam.

Nimirum.

☿. Corpus illud ☿a in extractione
 tincturæ Basilianæ residuum, affunde
 ☿ mellis corrosiuam f. a. abstrahē &
 edulcora, vt dictum in Sale Solis.

N. Supererit materia, ex qua extra-
 hi potest ☿.

Vires. Conductibile est morbis capi-
 tis, & inprimis Epilepsia, Hydropicam
 aquam exiccat, &c.

Dosis gran. 4. 5.

Spiritus. Lunaris S. Clossai.

Prima opera sit in parando ☿ lo
 ☿a, quod fit per ☿ instar li ☿ ☿is,
 verum ad minus calcinationibus 20.
 iteratis indiget. Longè faciliiori ac me-
 liori methodo extrahitur è limaturâ
 ☿a subtilissima beneficio aqu. lilij con-
 uall. ☿iij. fortificatâ cum ☿j spiritus
 ☿li ☿is (vel cum ☿) tenendo per
 mensem in digestionē cinerum, sic spi-
 ritus ☿eus imprægnabitur Tincturâ
 ☿ ex

Tex cyaneo subuirescente, quâ seposita alium spiritum \oplus li Q ei substitue, totiesque extrahe, donec tota ferè (soluta sit, tandem solutiones euapora ad cuticulam vsque, collige crystallos, è quibus siccatis per G more solito pri-

mo phlegma & spiritum Q is pelles, quæ seorsum seruanda, deinde auctiori Δ spiritum Cæ & vltimò Oleum.

Spiritum hunc Lunarem Idiopathicam Epilepsia παζότομον esse expertus est author qui supra.

CAP. XI.

De Ferro.

Classis secunda, Metalla ignobiliora duriora continet, Ferrum scilicet & Cuprum.

Preparationes precipue.

1. Purgatio. 2. Calcinatio. 3. Sublimatio. 4. Destillatio. 5. Extractio. 6. Salificatio. 7. Liquatio.

FERRVM.

Ferrum Metallum est ignobilius, constans ex Mercurio & A re minus liquabili, crudiori, seu si mauis ex A re, ac Sale, quæ partibus terreis crudioribus immixta sunt.

Vires. *Diuersis* Q dotatum est viribus; adstringendi scilicet & aperiendi. *Vis* aperiendi in volatiliori potissimum residet parte, ac proinde in Sale: vis adstringentia infixior, adeoque in terra latitat. De his qui ulterius erudiri cupit, adeat problem. Horst. Decad. 7. q. 2.

PURCATIO Q à sordibus superficialibus.

Purgatur Q is limatura à sordibus quibus forsan scatet, tum ventilando, tum abluendo ∇ communi.

1. Purgatio Q Gradatoria: unde Chalybs.

2. Q is in lamellas vel virgulas, (dignitatis maioris crassitudine) redacti, p. 1. Carbonum salis vel fagi puluer. Ralur.

cornu bouis, p. 1. stratifica, ac in vase clauso igni committe furni anemij fortissimo, hor. 4. aut 6.

N. Calybs igitur nihil aliud est, quam Q optimè purgatum, ideoque loco Ferri Chalybem præstat recipere.

II. CALCINATIO:

unde Crocus.

1. Calcinatio Reuerberatoria, unde Crocus Q obstructiuus.

Limaturam Q is igne fortissimè couisusque reuerbera, donec in Crocum eleuetur leuissimum & rubicundissimum.

N. 1. Sal commune vim habet reuerberationem hanc accelerandi. Hinc sunt, qui citioris reuerberationis gratia limaturam initio aliquoties vrina puerorum (vel ∇ salsa, acetosè) conspergunt, iterum exiccant, postmodum reuerberationi subiiciunt. Sic reuerberatione unius atque alterius diei Q in florem surgit rubicundissimum, qui quotidie, (ne vi ignis pereat vel nigrescat,) colligatur. Hartm. in præf. Gluckr. in Beguin.

N. 2. Si qua pars nondum satis reuerberata sit, elaboratiorèmq; separare velis, affunde ∇ m, agita, atque antequam penitus subsideat, ∇ m leniore scilicet & magis elaborato Croco turbidam, in aliud vas effunde, parte grauiore, quæ sub-

subsidet, in priori vase relictâ: Abstractâ vel decantatâ dein aquâ, habes Crocum leuiorem, crudioribus suis ac granioribus portionibus spoliatum.

Alij ℞. Limat. ♂ ℥.ij. ☉. decrepit. ℥.ijj. (vel ana) mixta reuertebant per diem. Hinc ♂ iterum edulcoratum subtilissime laeuigant, denuôque reuertebant, [dies octo vel decem] donec eleuetur Crocus subtilissimus, quem quotidie auferunt, atque ∇. plantaginis præparant.

Vires. Obstructiuus hic Crocus est, ac siccatus, confert in Dysenteria, Lienteria, Gonorrhœa, & similibus.

Externus eius Vsus est in exiccandis vlceribus & vulneribus. Quercetan. in Pharmacop. restituit. Sennert. in Instituit.

Dosis à ℥ss. ad ℥j.

N. Adhaerescit & Crocus ♂ is baculis ferreis furni destillat.

2. Calcinatio fusoria: unde Crocus
♂ aperitiuus.

Laminis ♂ seu Chalybis ignitis adeo vt scintillent optimè admoue magdaleones ☿ris: sic liquefcit ♂ instar ceræ, deciditque granulatim in frigidam suppositam, teratur subtilissimè & seruetur pro vsu.

Vires. Virtutem habet reserandi, aperiendi & attenuandi. Querc. in Pharm. rest. Beguin.

N. Maximus requiritur calor, ideôque præstat officinam fabrilẽ adire.

3. Calcinatio Cementatoria: unde

⊕ m ♂ is.

Lamin. (Limatur.) ♂, cementa cum ☿pulu. igne paulatim adhibito per horam, ita ☿re accenso calcinatur ♂: Materiam exemptam ac tritam calcina iterum per se, [non secus ac calcinatur

♂ in præparatione vitri,] vt ☿r penitus efflagret, diligenter mouendo, donec ferro adhærere incipiat.

℞. ♂ huius calcinati ac triti ℥.i. ☿r. ℥.℥. Misc. exactè, ac calcina iterum per hor. 1. Dein tere iterum, ac adde tantundem ☿, idque repete quinques vel pluries. *Croll.*

Ex hac ♂ calce fit ⊕ m ♂ is.

2. *Aliter.*

℞. ♂ laminatum cementa cum ☿re & ☿ana, Crocum laminis adhærentem absterge. *Parac. l. de morte rer. natur.*

4. Calcinatio Immersua.

Solutio ♂ fit in quolibet liquore corrosiuo, etiam minori acrimonia prædito. Vt sunt ∇ vulgaris ∩ ⊕ i, ⊕ i, ☉ is, ☿ris, ☉ is, ☿ iaci. Coagulatio fit, vel inspissatione, vel præcipitatione, sed raro.

E. gr. per ∇.

℞. Limatur. ♂ ℥j. affunde sensim ∇ ℥vj. i. digere per noctem, & abstrahere ∇ in arena. Sic relinquitur Crocus rubicundissimus, per deliquium solubilis.

Per ∩ m ☿ris.

℞. ♂ laminat. vel limat. (vel croc. ♂ aperit. cum ☿re præparat.) affunde guttatim ☉☉ ☿is, (simplex vel ∇æ mixtum,) solutioni affunde ∇. calidam, filtra, coagula aliquantulum, ac repone ad ChrySTALLISANDUM, s. a. CrySTALLOS purifica soluendo, ac coagulando. *Hartm. in pract. Beguin. Gluckyrath. & Kessler. libr. 1. cap. 13. Tentzel. in Exeg. loco de ☉☉ ☿.*

N. 1. Similiter fiunt & CrySTALLI ♂ cum ∩ u ⊕ p. 1. & ☿ p. 3.

N. 2. Eodem modo fiunt & CrySTALLI ♂ cum ∩ u ⊕ i. Et hi dicuntur Sala Magisterium Chalybis ⊕ latum.

Nimirum

Nimirum.

℞. ♂ purgatum solue in ☿ u Bi
rectificatiss. coagula. Sic habes Magi-
sterium Chalybis ☿ latum in forma
Vitrioli viridiusc. *Sala in ☿ log. ca-
pire 8.*

5. Calcinatio Vaporosa.

Laminas ♂ supra ☿ in cucurbita
clausa suspende, cucurbitamque in
arenam calidam colloca, sic vi vaporum
adhærescet paulatim laminis crocus
pede leporino abstergendus.

N. Labore repetito maior copia cro-
ci colligi poteris. *Senn. Inst. Harum. in
dissut. Chymiatr.*

6. Calcinatio Illinitionis.

℞. Laminas ♂ illine ☿ ☿ i, vel
☿ ris, (vel limaturam ♂ eodem liquo-
te consperge,) & reponere in cellam.
Postea ablue aqua, & subsidebit crocus,
qui parum ad rubedinem solummodo
calcinandus.

N. *Querquetanus infundit ☿ ☿ is,*
ac ☿ ana in cochlear ferreum: omnia
bullire sinit ad ignem lentum usque ad
consumptionem: Hinc reponit per ali-
quot dies, pulueremque croceum abster-
git, qui facile liquefcit. Hunc verum
Epatis restauratum appellat, eumque
in Tragea hepatica ceu basin recipit.
Vide Pharm. rest. c. 26.

Vires. *Utilissimus est hic Crocus in*
Cachexia, insigne est aperituum.

Dosis gran. 3. 4.

Eodem modo fieri quoque potest
Crocus ♂ beneficio ☿ O. ✱, ☿
Paracels. l. de mort. rer. natur. Verum
hic Crocus non nisi extrinsecus adhi-
bendus est.

Aliter.

℞. ☿ (ex ☿ i calcinat. & ☿ ana
cum argilla destillata, (infunde in
cochlear ferreum, ut euaporet. Sic sta-

tim relinquatur crocus tenerrimus, qui
abradendus & in vitro (quia facile
liquefcit,) referuandus est. *Glucky.*

III. VOLATILISATIO ac DESTILLATIO.

Vnde 1. Aqua ♂.

℞. Limatur. ☿ is, expone aëri humi-
do in cella aliquandiu, (septimanas ali-
quot) hinc destilla, vel ex humili Alu-
dele, vel ex Retorta. Sic nancisceris
aquam ☿ is salr edolentem, sed paucā.

N. 1. *Destillatco hac feliciter pro-*
cedit ☿ a crescente, & circa plenila-
num.

N. 2. *Post abstractionem reponi de-*
nno potest, ut soluatur; dennoque de-
stilletur ut prius.

2. ☿ is.

℞. Mineram ♂, destilla per Re-
tortam: liquorem destillatum reafun-
de; digere ac iterum destilla.

3. ☿ Martiale album.

℞. ☿ q. v. solue in ☿ u ☿, solu-
tio destilletur per retortam, sic ☿
prodit, Essentiā ☿ is imprægnatus sa-
pore subdulcis.

Vires. *Aperit obstructions præsertim*
Epatis, Lienis, venarum mesaraicarum.
ac Vteri.

Dosis gran. aliquot.

4. ☿ ☿ iale rubrum.

℞. Solutio ♂ præcedens, impræ-
gnetur cum crem. ☿ i, destilleturque
△ fortissimo, ex cucurbit. vitrea humi-
li, varios intus videbis colores instar
caudæ pauonis. extillatque primo li-
quor: igne dein fortiori. ☿ graue cum
CrySTALLIS, quos per del. solue & iunge
prioribus.

Vires. *Leuiter adstringit & roborat.*
Hinc in Dysenteria & fluxibus alut.
℞ 3 aliisq.

aliisque maximi commodi existit. Clariss. Dn. D. Helvicus Dietericus, Archiater Sereniss. Elect. Brandenburg.

Dosis gran. 3. 4. & ultra.

5. \odot \odot \odot Sulphureum.

R. Mannæ \odot (Tinctura) circula cum ∇ rectificatiss. & supernatabit \odot , destilla per \mathbb{X} , vt transeat & oleum.

N. Fragrantissimum hoc \odot perhibetur ac pingue.

Vires. Maximas vires habere censetur in obstructione ac debilitate Lienis, &c. D. D. Paulus Keller.

6. Ol. \odot Præstans.

R. Croc. \odot per Reuerb. Spir. \odot i philosoph. q. f. Digere, extrahe aliquoties recenti spiritu rubedinem. Spiritus tinctos iunctos abstrahe ad mellaginem. Hanc extrahe cum ∇ Sal verò cum ∇ comm. Spiritus tinctos abstrahe ad oleaginositatem, cui sal purificationem per digestionem adiunge.

Vires. Summum est obstructivum.

Dosis gran. 4. 5. &c.

Clariss. D. D. I. C. Facis.

7. Vitrioli \odot is destillatio.

Destillatio \odot i ex \odot confecti nihil peculiare à destillatione \odot i vulgaris habet iisdem enim modis perficitur, omnesque Medicamentorum formas, quas ex eodem illo vulgari \odot lo descripsimus, exhibet, felicioris tamen est operationis, in morbis ad \odot is affinitatem accedentibus.

IV. EXTRACTIO:

unde Tinctura.

R. Limatur: \odot lb. β . candefiat, & extingatur aliquoties in vini maluatic. lb. iv. sic Essentia \odot \odot lata communicatur maluatico.

Dosis ab \mathbb{Z} β . ad \mathbb{Z} j. in iusculo vel haustu aqua cichoret, Hartm. in pract.

Aliter.

R. \odot limat. \mathbb{X} ana lb. i. coque in sartagine ferrea l. Δ . semper agitando, donec \mathbb{X} consumptum sit, (quò sapius, eò melius) infunde postea in vino maluatico lb. 4. 5. 6. digere, quotidie aliquoties agitando, (\odot \odot 14.) postea depleto & adhibeto.

Vires. Prodest ad omnes affectus Splenis; item ad menstrua, tum prouocanda, tum inordinata corrigenda.

Dosis \mathbb{Z} β . ad \mathbb{Z} j.

N. Potest aromatizari Caryophyll. & simil. Finck.

2. Tinctura ex \odot crudo.

R. Limat. \odot extrahe rubedinem cum \mathbb{X} acerrimo s. a. decanta & abstrahe. Dein extrahe cum ∇ . Quo tandem iterum abstracto, relinquitur Tinctura seu Essentia \odot in fundo.

Dosis ad \odot j. unde Senn. Inst.

Aliter.

R. Limat. Chalyb. q. pl. irroretur \mathbb{X} aliquoties & exiccetur. Hinc extrahe cum ∇ \odot ato. I. C. F.

3. Alia ex Croco \odot Quercetani.

R. Croc. \odot [per ∇ facti,] extrahe Tincturam digerendo cum ∇ vulgari, donec rubescat, decanta à fecibus, & abstrahe ad oleositatem.

Dosis: Præmissis vniuersalibus, propinantur mane ac vesperi gutt. 9. vel 10. indecocto iuniperi. Hartman. in pract. loco de Hemorrhag. & de Hydrop.

4. Alia ex Croco \odot .

Sic & ex croco \odot per reuerb. fit Tinctura cum ∇ , cuius eadem Dosis.

5. Alia, quæ Basilij est.

R. Limat. \odot solue in sp. \odot i rubr. p. i. ∇ . fontan. p. ij. fil. filtra calide & crystalli

crystallisa, s. a. Crystallos exicca sub regula continuo agitando, habebisque crocum purpureum : affunde ☒ & extrahe s.a. Hinc abstrahe in MB ☒, ac elue, ☐m font. aliquoties abstrahendo. *Tholdius.*

N. 1. Eodem modo ex ☉o ♂ ad summam rubedinem reuerberato extrahitur Tinctura seu ☐ beneficio ☒ s.a. Que abstracto ☒ in forma pulvisculi rubicundissimi asseruanda.

N. 2. Ex remanente terra extrahitur ☉ per ☐m mellis corrosiuam.

5. Alia ex Scorriis cœruleis.

℞. Scorias ♂ cœrul. vitrescentes puluerisa, (alij calcinant prius hor. 24.) extraheque tincturam rubram digerendo cum ☒ acerrimo, filtra & abstrahe, restantem Tincturam edulcora aliquoties ☐ pluuiat. Tinctura hæc liquefcit sponte in cella.

N. Efficacior habebis Medicinam si per ☐, Tinctura solutionem ac extractionem denuo iteraueris.

Vires. Longe efficacior est, quam Crocus vulgaris reuerberatione factus. Vim habet sistendi omnes fluxus, siue sint Menstrua, siue, Gonorrhœa, Dyssenteria, Diarrhœa, Hemorrhagia, &c.

7. Alia ex floribus Croci ♂.

℞. Croci ♂ (per reuerber.) sublima cum ☒, ex floribus edulcoratis extrahe Tincturam cum ☐, abstracto iterum ☐, relinquitur Essentia in fundo.

N. Dicitur precipitare ☐m, Kessler. lib. 3. c. 71.

8. Alia ex Calce ♂.

℞. ♂ Limat. à quo ☒ sexies vel pluries sublimatum sit, extrahe cum ☐, decanta & abstrahe aliquoties cohobando.

N. Pulvis ille ante extractionem in

liquorem resolui potest, qui ☐ elota etiam intrinsecus exhibetur.

9. Alia.

℞. Croc. ♂ probè calcinat. q. v. irrota cum spir. ☉ digeréque in ☐ calida donec spir. ☉ exiccatus fuerit: hinc tere super marmore affusaque ☐ fontanâ macera in ☐ calida per ♂ (3.) postea filtra per chartam; filtraturam inspissa & extrahe cum ☐ Tincturam.

Ex communicatione Affinis mei dilecti Iacobi Holkappfel, Pharmacopæi nostratis laboriosissimi.

10. Alia Tinctura, Manna ♂is dicta.

℞. ♂ Laminat. q. v. extrahe cum ☐ u ☐ alcalisato, filtra & abstrahe, sic habes tincturam ♂.

11. Balsum ♂ & ♀is seu Tinctura extemporanea S. Closs.

Compara tibi ☉ ex viridis æris. (distillierten Brünspan) pelle per ☐ Δ ☐ quicquid phlegmatis & spiritus volatilioris exire poterit. Hoc affunde super limaturam ♂ in vase striatiori. Intra quadrantem horæ absque adiuuamine Δ sanguine ♂is ♀us imprægnabitur, abstrahe phlegma atque fusibili croco ☐ superfunde, denuoque extrahe.

12. Sal saccharinum & Tinctura flaua ♂ eiusdem.

℞. Croci ♂ parati cum ☐ q. v. Affunde aq. restantem post precipitationem butyri ☐ij, quam Spiritum ☉li Philosophicum vocant: vna cum phlegmate (si hic desit cape ☐ cum ☐ ☐ diuretica ut cap. de ☉ indicabitur) sine extrahere in ☐ tincturam flauam cum fœtore quondam ☐eo, qui mox euanesceat. Hanc coagula post filtrationem in ☉ saccharo auleius

dulcius, & maioris virtutis gratiâ cum
 V circula.

Vires. Hepar roborat, unde hydropicis, isque qui diffuentia intibis ulcera patiuntur prodest, menses superfluos & hemorrhoides siccatur, dysentericos inuat sumpta cum ther. rec. lienem deobstruit.

Dos. salis ℞. cum ol. nuc. mosch. Tinct. gutt. vj. viij. in vino. aq. linariae.

13. Tinctura rubra ♂.

Laminas ♂ subtiles stratifica cum pumice & reuerbera per 24. horas. Rubescet pumex, è quo cum ☒ tincturam poteris elicere & in sal rubrum coagulare.

Ad calcinationem reuerberatoriam pertinet seq.

Limaturam ♂ calcina absque vllâ præparatione aut commixtione Δ reuerberij, donec ex rubedine summâ in calcem albam transierit.

Dosis ℥ss. in vino alba. Frater D. Rondeletij hoc medio ab Ischuriâ curatus est. Ex communic. S. Cloff.

14. Tinctura alia & inde.

Magisterium ♂is albißimum.

Limatura ♂is Δ fortiss. eousque reuerberetur, donec eleuetur in crocum leuiss. & rubicundiss. Irroretur cum Sp. + i atque siccet. Repetendo hoc (4.) Dein tantum affundatur Sp. + i q. s. ad extractionem. Digeratur vsque dum colore rubicundo tingatur, sæpius vero agitetur. Extractio lento calore redigatur ad mellaginem, quæ soluta aq. pluui. destillata & filtrata præcipitetur cum Sp. ☉ i. Sic habebis magisterium albißimum, quod probè edulcorandum.

Vires. Ex ipsa descriptione cuius patebunt, prodest in morbis quam plurimis hypochondriacis, hepaticis, &c.

Ex commun. Cl. D. Ioëlis Langelot.

V. SVBLIMATIO.

Hinc

1. Flores ex ♂ crudo.

Sublima limaturam ♂ cum ☼. (vide in ☼.) & eleuatur quoque portio ♂. hæc à ☼ elota, habere vim sclopetantem, æque ac ☉ fulminans dicitur, sed erroneè.

2. Flores ♂ ex Crystallis.

℞. Crystall. ♂ (cum V nitrosa fact.) sublima cum ☼, & habebis flores rubicundos, quos edulcora. *Kest. lib. 1. cap. 63.*

Vires. Vim maximam habent in lienis & mesenterij obstructione.

VI. SALIFICATIO.

Sal ♂ duplicis videtur esse fortis, subdulce scilicet & ☉ latum.

1. Sal ♂ subdulce.

℞. Limatur, ♂ irroretur ☒ optimè, vt pasta inde fiat, quæ siccescat: siccatam tere ac irroretur iterum, &c. idque repetere multoties. Tandem effunde phlegma aceti, coque bulliendo & filtra: humiditate in MB abstracta, digere cum V Crystallósque serua pro vsu.

Vires. Vim habent incidendi & aperienti, obstructiones etiam contumaces, viscerum & uteri. Vide in Epistol. Gregor. Horstij observationibus annexis, lib. 1.

2. Idem Sal assequi poteris vi ∇ simplicis, loco ☒ ac phlegmatis eiusdem adhibita, sed quantitate minimâ.

N. Succicum ferrum sale abundantissimum est, ideoque reliquis in salis huius confectioe præferendum.

2. Aliter.

℞. Calcem

R. Calcem seu croc. ♂ [per R factum] extrahe Sal cum aqua, filtra, coagula, ac repone ad crystallifandum, vel inspissa prorsus. Salem ♂licum quem nactus fueris, solue denuo aliquoties & coagula, sic habebis Sal ♂ subdulce.

Sal ♂is purgans.

R. * i. Limat. ♂is p. æq. misce, leniter terendo in marmore. inde cucurbitæ fictili & ☐ primò lento Δ. dein fortiori, sensim & per gradus Δ augendo. Tandem refrigerare sine, fractoque vase, partem superiorei albam referua, nouæ sublimationi cum recenti limatura ♂ peragenda; Partem mediam Ctoceâ similiter serua (sunt flores ♂is diaphoretici.) Denique partem quæ in fundo remansit (☉) exime & modo vulgari ☉ extrahe, idque soluendo & coagulando purifica, clausoque vitro referua.

Vires. Vm obrinet purgandi.

Dos. ʒss. ad ʒj. in cochl. i. aut 2. Syrupi violarum laxatiui, &c.

N. Quando ☉ prædictum in syrupo violarum soluitur, necessum est vt bene agitetur, donec syrupus totus spuma euadat, quæ stet per noctem, vt clarescat iterum. Tunc additur pro libitu aliquid clareti laxatiui.

Ex commun. amici Hamburg.

VII. LIQVATIO.

♂ per se minimè liquefcit, verum si in crocum [calcinatione humida,] redigatur, aliquo modo liquidabilis euadit; vnde Liquor seu Balsamus, medicamentum in vulneribus, aptissimum.

N. Filtratio siquidem fieri nequit, quin charta vi corrodeute corrodat, dilui potest solutio aquâ fontanâ, quo minus acris & filtratura aptior euadat.

3. Aliter, Sal Basilianum.

R. Materiam in Tincturâ præparatione residuam, (e. gr. in tinctura Basilij,) affunde ∇ mellis corrosiuam, ac extrahe ☉, i. a. Hinc abstrahe ∇m mellis, edulcorâque cum aqua fontan. per distillationem iteratam abstracta. Tandem clarifica cum V. Thold. in Halograph.

Dosis gran. 6. 7. 8. &c.

4. ☉ m ♂is ex cementato.

R. Calc. ♂ (cementatam cum ☉ re, vt supra,) extrahe ☉, vt moris per ∇ calidam, filtra & crystallisa, f. a. Croll.

5. ☉. ♂ ex soluto ♂.

R. Limat. ♂ solue in ☉☉☉i rub. p. i. ∇ æ font. p. ij. filtra calidè, & crystallisa. f. a. Tholdius.

N. Simili modo & per alios liquores acres crystalli ♂is exhiberi possunt, de quibus in Crocerum præparationibus, quippe nihil aliud sunt quam ipsemet Crocus, quem ipsum vel sola exiccatione ad ignem referunt.

C A P. XII.

De Cupro.

CVprum, alterum Metallum, ex
cignobilioribus duriusculis est,
constans (secundum Theophrastum) ex
Ære purpureo, Sale rubro, ac Frio ci-
trino.

Dicitur ♀, quod cum Venere Cœ-
lesti in Macrocosmo, cumque genera-
tius partibus in Microcosmo sympa-
thiam obtineat, dicitur & Æs, Germ.
Kupffer.

Vires. *Præterquam quod partes ge-
neratinas peculiariter confortare credi-
tur, variis abundare facultatibus æsti-
matur, adeo ut sint qui dicere non ve-
reantur, nullum metallorum salubriorem
spirare auram, quam Cuprum. Et hinc
Maioribus, ac præcipuè Hippocrati præ-
ter reliqua frequentissimo in usu fuit.
Nos relicto Cupro crudo, præparationes
libabimus, quæ sunt.*

I. PURIFICATIO.

Purificatur à sordibus superficialiis,
si impanatur hor. 7. 8. 9. &c. in ∇ ⊕ li
mixta cum ☼.

II. CALCINATIO:

unde Crocus.

1. Reuerberatoria.

Fit more communi, limaturam, scil.
cremando.

N. Lamina ♀is reuerberantur ca-
lore fornacis figulina in as vstum, quod
facili contritione in calcem reducitur.
Beguín.

2. Immersiva.

Solutio fit in liquore acri.

E. gr.

∇, ⊖, Δ is, ⊖ ⊕ i, & simil.

Sic:

Dissolue ♀m in ∇, ac præcipita
per ∇m tepidam infusam, vel per
particulam ♂is, Cæue iniectam.
Beguín.

3. Vaporosa: unde Erugo, seu
viride æris.

Suspendantur laminæ ♀is, ut va-
pori Vini & racemorum obiectæ sint,
sic adhærescet Crocus pede leporino
abstergendus.

4. Illinitionis.

Illine laminas æris liquore acido seu
acri.

N. 1. Quin imo sola ∇ simplex, tan-
tillo ⊕ is, vel ⊖, vel * imprægnata,
eruginem extrahit.

N. 2. Paracelsus soluit salia (⊕m
⊕m, & simil.) in vesica, atque solutum
liquorem laminis illinit. *libr. de mort. rer.
natural.*

5. Cementatoria.

Fit cum ⊖c, Ære, &c.

R. Laminas ♀is, F. S. S. S. cum
⊖ præparat. calcina paulatim le-
uiter igniendo. Postea ignitas in a-
quam iniice, atque à nigredine benè
elue, iterumque F. S. S. S. calcina, ac
elue ut prius. Tandem coque ac repo-
ne, ut subsideat crocus, quem edulco-
ra ∇a.

Vires. *Inseruit Chirurgia, ingreditur
Empla*

Emplastrum Oppodeldoch. Gluckr.

N. Eodem modo cementatur quoque cum ☿re, hor. 3. vel 4. inque as vstum reducitur Officinarum; calcinatur itidem & limatura ♀ cum ☿ simili modo quo ♂ ad exhibendum ☿m calcinare docuimus.

III. DESTILLATIO.

Destillationibus iisdem ♀ subiici potest, quibus ♂: Vnde & ∇m, Spiritum, Olea, Mannam, &c. exhibere aptum natum est, inprimis tamen destillationi subiicitur ☿m ♀is, cuius spiritus adeo famosus est, vt peculiari nomine Acetosus esurinus Paracelso nuncupetur: Virēsque quæ spiritui ☿i vulgaris adscribuntur, huic efficacius competunt.

1. Spiritus & Oleum ☿ li ♀is S. Closs.

Fiat ☿lum ♀is methodo Crollianâ. Huius lib. xi i, in 6 coniiciuntur & ∆ moderato destillatur phlegma omne, id quod horis circiter 6. perficitur: Cohobeturque destillationibus ad minimum super Colcothar proprium, vt mediante hac fermentatione ☿i us volatiliores secedant promptius, tum demum augeatur ∆ per gradus per 5. ☿ continuos minimūque corp. fixi in 6 remanet. Spiritus albos à rubris separa atque seorsim rectifica.

Vires. Spiritus ♀ summum est aduersus Epilepsiam Sympathicam remedium, præmissâ purgatione cum floribus rubris ♀ij. Dos. a gutt. 8. ad x. in iusculo acidis succis exasperato, alias vomitum excitabit.

2. Spiritus aurei coloris.

Fitex ☿ cui super funditur vel spir. ♀ extillatus, vel V ☿ satus, digerens

do donec Tincturam extraxerit, euoca menstruum, reliquum pelle per 6. egredietur aureus Spiritus.

IV. EXTRACTIO.

1. Tinctura Basiliiana.

℞. Virid. æris q. v. solue in bona quantitate ☿, filtra. Hinc abstrahere ad siccitatē (alias crystallisabitur) nanciscerisque viride æris purificatissimum, extrahe s. a. Tincturam Smaragdianam cum succo ex racemis immaturis expresso, donec nihil amplius coloris exhibeat.

N. Remanet corpus, quod reseruetur ad Salis ♀is confectionem. Tholidius.

2. Alia seu flores æris.

℞. Ærug. q. v. extrahe cum ☿, decanta & abstrahere ad siccitatem, edulcora optimè aquâ calidâ.

Vires. Mundificatiuum summum est in vulneribus, vnde & Emplastrum Oppodeldoch ingredi solet. Virtutibus Chirurgia.

N. Simili modo fit & ☿m ♀is per Crystallisationem.

3. Alia Balsamum ♀is dicta.

℞. Lamin. ♀, affunde ∇ Terebinthin. digere & colorabitur colore viridi.

Vfus eius est in Chirurgia.

4. Alia.

℞. Limat. vellamin. ♀ lib. iij. vel iv. irrota ☿ siccescat lente, idque repete multoties. Hinc affunde ∇ calidam, decanta ac filtra per chartam, (& remanebit in charta terra flaua, elij vsui reseruanda.) Filtraturam coagula l. ∆. ad mellis consistentiam.

℞. Huius Tincturæ quantitatem satus magnam, inde cucurbitæ atque

℞ leuiter imposito, da ignem lenem, & quando feruescere incipit, tolle ℞ mouéque bacillo, vt resideat, idque repete, donec amplius non feruescat. Hinc firma & annecte firmiter ℞m, (luto, & simil.) destillaque ex arena in recep. capaciss. Δ gradatim adhibito, sic prodibit primo, spiritus albus acidus paulatim flauescens, & rubescens cum nebula: vrge, donec nihil amplius ascendat, (est opus vnus diei.) Destillatum rectifica, in cucurbita oblongi colli ad siccitatem, igne moderato, ne quid flauī & rubei ascendat. Ex restante materia extrahe f. a. Tincturam cum V rectificat. Hanc destilla, & quia ascendit quoque Tinctura, cohoba, donec figatur: hinc coagula ad consist. mellis.

N. Ex materia seu terra illa remanenti, vterius calcinata, extrahi potest Θ.

Vires. Tinctur. præstantissimum medicamentum est in Epilepsia, aliisque morbis plurimis, cum liquore conuenienti exhibitum.

Alia, Manna dicta.

Manna simili modo parari potest ex Minera ♀is, &c. Sicut Manna ♂, ex minera ♂.

Quinta essentia ♀is.

⊙ post expulsionem Quis albi & rubei olei residuum, expose aëri pluuioso, vt humescat, (alias parum salis obtinebis) perfundatur phlegmate suo, eliciatur sal vt moris est, cuius pars vna confundatur cum part. duabus spir. & olei ♀is, stent in digestionem per 14. ♂. Tingetur colore rubeo.

Vires. Hæc Tinctura lenissimo Δ continuo fixata & coagulata, est summum arcanum ad morbos cerebri, sang. depurandum, febresque omnes contin.

& intermitt. S. Cloff.

V. SALIFICATIO.

1. Sal:

Sal ♀is ⊕ tum ex viridi æris elixiari potest beneficio ℞, nimitum ℞o aliquantulum abstracto, residuum frigori exponitur, sic congelantur Cry-stalli.

2. *Aliter, secundum Thold. ex Basil.*

℞. Residuam materiam, ex qua Tinctura Basiliana extracta est, exicca, & affunde ∇m mellis, vt extrahatur Sal: abstrahe tandem ∇m mellis, & digere cum V.

Vires. Sal ♀ calfacit intensius quam reliqua Metallorum salia corborat ventriculum, cruditatesque inibi emendat, proinde flatibus, aliisque affectibus inde oriundis, v.gr. colico, & simil. medetur; vterum frigidum calfacit, eius suffocationem sanat, menstrua promouet, renum quoque morbis succurrit.

Dosis gran. 3. ad 8.

3. *Aliter.*

Calcina limaturam ♀is cum ♁, (eodem scil. modo, quo supra ♂m calcinare docuimus,) hinc elixiua sal coquendo cum ∇ fontana: aqua hæc euaporata relinquitur sal, seu ⊕m ♀is.

Vires. Inferuire poterit loco ⊕ i, ac proinde eadem inde Medicamenta parari possunt, quæ in ⊕ dedimus.

VI. SVBLIMATIO.

Flores ♀.

Fac lixiuium ex lb. ij. ♁ & lb. i. * hoc coagula in sale, quem M. cum part. iij. boli communis, & spiritus albos educ instar ∇, Δ per gradus aucto. Rectificentur.

℥ Huius menstrui part. 1v. limat.

mat. Q̄is (aut quod melius Virid. Æris) part. i. pone inter **E** vase obturato, soluetur metallum insensibiliter, affunde aliud, tantisper, donec feces nigræ & leues tantum super sint, aq. soluentem abstrahæ, quod remanserit vrge Δ aperto in cucurb. ita eleuabitur metallum in flores sub diore solubiles in Balsamum viride.

Vires. *Vsus eius est in Vlceribus cantharidis, si verò eosdem à Ribus ❄ ci vindicatis, tunc securè & absque morfu*

Vulnera & vlcera quantis exiccant, Exempl. & Vnguentis permixti.

Ex commun. eiusdem S. Clossai.

Oleum Virid. Æris cantharicum eiusdem.

℥ Virid. Æris part. i. **Q** part. ij. ponantur in catillo, incendantur carbone donec deflagrarint, quod remanet soluat in cellâ per deliquium, vel in vesicâ suillâ diligenter clausâ in aqua demersa. Valet ad pustulas ♀ eas & verrucas absumendas.

CAP. XIII.

De Plumbo.

AD tertiam progredimur Metallorum Classẽ, quæ Metalla ignobiliora minus dura continet, Plumbum scil. ac Stannum.

Preparationes sunt.

1. Purgatio. 2. Calcinatio. 3. Sublimatio. 4. Destillatio. 5. Extractio, quibus addi possunt Mercurificatio, Salificatio & Liquatio.

Plumbum Metallum est vilissimum, constans ex **A**re indigesto, Sale aluminoso ac **Q**io, naturam **G**ialem æmulante.

Dicitur Saturnus, quia tũ macrocosmico, tũ microcosmico Saturno, id est, lieni consecratum statuitur. Græcè **Μέλανς** &. Germ. **Bley**.

Vires. *Refrigerat, adstringit, incrascat, & c. libidinem reprimat, vlcera carnibus implet, cicatrice obducit, excrementis liberat, vlceribus cheroniis quæ vocant, malignis, cancrofis & putredinosis, tũ per se, tũ quibusdam aliis permixtum, conuenit.*

I. PURGATIO.

Fundatur **H**, dũque fluat, iniice aliquid ceræ vel axungię aurigarum (*VVagenschmier*) vt efflagret, hinc effunde in aquam (calidam.)

II. CALCINATIO.

1. Incineratoria.

Funditur plumbum, auctoque igne vt olla candeat, continua agitatione reducitur in cinerem, seu calcem cineream.

2. Reuerberatoria.

Vnde Minium Officinarum.

Calx illa **H**i continua agitatione reuerberatur vltcrius vt rubescat.

N. In reuerberatione caue ne iterum fluat, alioquin in plumbum de nouo conuertetur.

3. Cementatoria.

Vnde Plumbum vstum Offic.

Fiat S. S. S. ex **H**i bracteis & **A**re
T r 3 pulueri

puluerisato, vraturque hac ratione H: post vstionem sapius abluatur & resicetur. Et hoc est plumbum vstum Offinarum, quod lauari potest, vt Cadmia. *Dioscorid.*

4. *Immersua.*

Etsi Hnus beneficio cuiuslibet liquoris acidi calcinari possit, quales sunt W, N, Ois, Ni, Di, & similatamen solo fere X in Officinis contenti rarissime reliquis vtimur.

Vnde

1. *Saccharum siue Sal Hi.*

2. Calcis Hi, vel minij, q.v. affunde X, stent aliquandiu, extrahaturque f. a. decantatos liquores filtra, humiditatemque abstrahendo coagula: sic habes Sal Hi, quod iteratis solutionibus ac coagulationibus, (primo in X, dein quoque in V,) purificari, & tandem ad crystallisandum reponi poterit, reiectis in operatione fecibus.

N. 1. Quidam à Sale illo Hi X aliquoties (3) cohobando abstrahunt, hinc affundunt V, cohobantque iterum vicibus tribus.

N. 2. Simili modo & ex H granulato sal elici potest, quod præstat priori.

N. 3. Si X acuaneris N u Di, vel Di, facilius negotium perficietur.

N. 4. Sal Hi crystallisatum si in cellam reposueris, liquecet paulatim, atque hac ratione Oo Hi per deliquium acquiri potest.

N. 5. Fit ex hoc Sale & Balsamus Hi, quem vide in Lithargyrio.

Aliiter.

2. Laminas aliquot Hi tenuissimas, suspende partim in cucurbita supra X, partim quoque ipsi X immerge. Hinc destilla cum cohobis: destillatum

hoc, cum eo, quod in fundo remansit, filtra, addendoque cerussam, quæ laminis adhæret, digere aliquandiu: tandem lenissimo calore abstrahere aliquotam X partem, residuumque reponere ad crystallisandum s. a. crystallos collectos purifica soluendo, coagulando. *Kesler. libr. 1. c. 17.*

2. *Magisterium Hi.*

Solutioni Hi instilla Oo □ i p. 1. & præcipitabitur.

Vires. *Saccharum & Magisterium* (vtriusque enim eadem ratio est,) intra corpus sumptum, frigiditate sua libidinem extinguit.

Dosis gran. 4. 5. 6.

Extrinfecus, arcet libidinem, si umbilicus & priapus eo inungantur. (N. Si vicissim mederi velis, viere Balneo Laconico, & inunge umbilico Oo nucis muschata destillatum.) Mira quoque præstat in ulcerib. corrosiuis, malignis, cancrofis, impetiginibus, ambastis ac inflammationibus. Dissoluit tumores duros & scirrhusos, applicatur commode contusionibus, confertque inflammationibus rubediniq. oculorum, in V rosarum & euphrasie vel ciliis quoque impositum. *Croll. Beg. Senn. in Inst.*

N. Sal Hi cum O ana in Crystallus concresecit asthmaticis proficius, vide c. 23, sub titulo Di Saturnisari.

3. *Aliud Magisterium Hi, Lac Hi dictum.*

2. Solue laminas Hi in N. Di rectificat. vel W, (ex Di & O ana) decanta: solutioni affunde V rectificat. vel aquam salisam. (i. e. aquam in qua sal solutum) & præcipitabitur Hns instar niuis, præcipitatum edulcora & exicca.

4. *Liquor lacteus Hni ad ulcera S. Closs.*

Imbibe

Imbibe ꝑ. salis hñi cum ꝑ. ol. Δ campanarij, stet per aliquot $\&$ in frigido, iterumque eadem quantitate $\circ\circ$ irroretur & sulphurari permittatur in phialâ, quam reple ꝑ. iv. aqu. comm. & agita vt lactescat.

Vires. Hoc liquore lacteo imbuantur pittacia sine splenia dupl. & applicentur bis aut ter in $\&$ calidè super ulcera dyspnotica qua citò cicatrice obducentur.

5. Calcinatio Vaporosa: unde

Cerusa.

Suspendantur lamellæ hñi supra +, vt vapores ab aceto eleuati circumueant. Sic adhærescet paulatim Cerusa, quam detade, &c.

N. Sublimationem in Mercurificatione videre licet.

III. DESTILLATIO.

Vnde

1. Δ hñi ardens.

2. $\circ\circ$ flauum.

3. $\circ\circ$ rubrum.

R. Sacchar. hñi (vel potius $\circ\circ$ hñi per deliq.) destilla per retortam vitream lutatam in excipul. capaciss. iuncturis bene clausis, Δ gradatim adhibito, donec rubræ guttæ cadant, nihilque amplius extillet.

N. Destillatus hic liquor quatuor diuersa menstrua exhibere aptus est. Spiritum scil. ardentem, $\circ\circ$ flauum, phlegma, & $\circ\circ$ rubrum: quorum separatio fit per retortam vitream in MB vel cinere, receptaculis scil. pro diuersitate liquoris extillantis, mutatis.

Cognoscitur autem diuersitas liquoris, Δ ardens prodit sine ullis venulis in collo retortæ apparentibus, $\circ\circ$ flauum, cum venulis obliquis, ceu vinum ardens: phlegma cum venulis rectis: relinqui-

tur $\circ\circ$ rubicundum in fundo: phlegma separatur ab $\circ\circ$ flauo seorsimque suscipiendum est.

Vires. Δ subdorificus est, hinc prodest in Peste, Melancholia Hypoch. Febris ardentibus, Luc venerea, & sim.

Dosis gut. 2. 3. Tentzel.

N. 1. Venerum appetitum infringit.

N. 2. $\circ\circ$ flauum $\&$ aliquot digestum rubescit.

N. 3. Cum spiritu & phlegmate soluntur & precipitantur perla ad tincturam inde consueiendam. Vide tincturam Perlarum.

Cum $\circ\circ$ flauescit. Fit solutio \circ . vide de \circ .

$\circ\circ$ rubicundum mundificat ac sanat vulnera, si illinatur.

\circ mundificat itidem vulnera.

Vide Beguin. lib. 2. cap. 4. Haromann. in Croll. Sennert. Institut. Kessler. libr. 4. cap. 57.

4. $\circ\circ$ hñi balsamicum.

R. Balsamum hñi Terebinthinatum, destilla per Δ , igne nudo gradatim adhibito. Primo stillat Δ . Terebinthinæ, tandem $\circ\circ$ hñi balsamicum; suscipe seorsim.

Vires. Maximarum est virium in cancrois, asthiomenis & ceteris malignis ulceribus.

IV. SVBLIMATIO.

Vnde

Sal hñi volatile.

R. Min. hñi q. v. solue in \times solue quoque sal fusum in ∇ . com. Vtrumque confunde. Sic extemplo ∇ bitur puluis albiss. qui probè edulcorandus & exiccandus.

N. Hoc Sal lamina ferrea rendenti impositum liquefit instar cera, neque effumat.

Ex

Ex communicatione. Closs. D. Ioëlis Langelot.

V. EXTRACTIO:

Vnde

1. Sulphur Hi , seu $\odot\odot$ supernatans.
2. Mannæ Hi , circula aliquandiu cum ∇ rectificatiss. abstrahere ∇ gradatim: sic ascendet tandem & $\odot\odot$ Hi , supernatans.

N. Si $\odot\odot$ hoc cum ∇ denuo circules tandem fragrantissimo imbuetur odore.

Vires. Maximarum est virium in affectibus pulmonum phthisi, &c. Dn. D. Paulus Keller.

2. Tinctura.

R. Crystall. Hi cum \times fact. extrahe cum $\odot\odot$ o iuniperi, ac rubescet $\odot\odot$ abstrahere, si placet, & serua, vel digere cum ∇ , iterumque abstrahere.

N. Remanet materia post extractionem salis extrahendo idonea.

3. Alia.

R. Crystall. H (cum \times factor. & edulcorator.) q. v. extrahe cum ∇ , filtra, digerendo defeca, (subsident enim feces,) abstrahere tandem ∇ , & remanet Tinctura in fundo rubra, Kessler. lib. 4. cap. 70.

Dosis gran. 2. 3.

4. Alia Tinctura Hi elaboratior

R. Sal Hi crystallif. q. v. affunde ∇ pluuiæ, sæpius (8.) destillatam, solueque quoad poteris, & decanta. Decantatos liquores destilla in MB ad siccitatem. Hinc affunde M mellis, circula per mensem, ac destilla cum cohobis, multoties repetitis. Tandem abstrahere mellis M , remanentique Essentiæ, adde \odot ex $\odot\odot$ Hi extractum & cum ∇ H sato, per mensem vnum ac alterum circula. Hinc ∇ abstrahere, remanebitque Magisterium seu

Tinctura H rubicundissima.

N. Hoc inferere placet quæ Etzlerus de H habent in Isagoge sua: Ex plumbum, inquit, conficiuntur medicamenta facientia ad longanimitatem: Calcinetur plumbum per vapidi attractionem, & per menstruum debitum extrahatur tinctura: Hæc postmodum abstracto menstruo per debitam calcinationem & circulationem convertitur in lapidem rubicundum, pellucidum.

Vfus. Præstantissima est Medicina in Mania, Melancholia, Quartana, Phthisi, Lienem aperit, in Melancholia Hypochondriaca apprimè conueniens est.

5. Alia Tinctura, Manna Hi dicta.

R. H laminat. q. v. extrahe Tincturam cum M Hi essentificato, filtra & abstrahere.

6. Cremor Hni S. Closs. & inde Tinctura.

Z \times partes x. M \odot is part. ij. mineræ Hni in alcool redact. part. i. Digere per octiduum in E , vel plus donec dulcescat \times solum filtra & inter exhalandum sæpius cochleari vitro subleua. cuticulam seu Cremorem glaciatum niuis instar splendentem, dum eius suffic. quant. habeas, reliquum crystallizetur & ad alios vsus feruetur.

7. Lapis & Tinctura.

Cremorem hunc indito vasi fixatorio H. S. in capellâ E da Δ primo leuiss. per 40. G , cauendo ne fluat materia (vt in sale H vulgari accidit incuitabiliter) quibus elapsis proba super laminam candentem, an fluat cum fumo, si sic continua Δ in eodem gradu, donec fumare desinat, & citrinari incipiat, tum Δ auge dum crocescat, auge fortius

fortius ad rubedinem vsque totalem pulu. è quo Tinctura cum **V** non difficulter postea habetur.

Vires. *Valet ad morbos Hinos.*

8. *Tinctura facilior.*

4 minij **hi** part.v. silicum calcinat. part.ij. terantur diutissimè fluant in tigillo Δ per gradus adhibito, donec in lapidem Rubini æmulum collique scat, qui tritus Tincturam suam in **V** \square factum deponit.

Ex commm. S.Closs.

N. De hoc Rubino **hni** vel sequenti vitro **hni** videtur intelligendus Glauberius primaparte furnorum p.80. ubi calcem politam **hni** miscet cum **o** \square **ri** & inde destillat Spiritum gradatorium, & liquorem viridem per deliquium ex \square excipit. Vel fiat Rubinus ex calce **hni** siue minio ut est in pag.151. secunda partis Glauber.

9. *Tinctura ex Vitro Saturni.*

Saturnus vi expressiuà Δ follium super testâ probatoriâ redigitur in gummi flauum coloris arantij, transparent, fusile non euaporans in Δ , estque aqua illa viscosa mineralis, quam Rhodianus ait omnium metallorum colores, odores & sapores ad se trahere, cum conseruatione facultatis vegetatiuæ (videfis Beguinum tit. de spiritu ardente **hni**) quod sic fit. Spiritus metallorum: Misce calcem cuiuscunque volueris metalli cum hoc Gummate Mariæ, mixturam arte fessorâ redige in Encauston siue Smalcum opacum, quod in pulu. redactum faciliè Tincturam suam \times communicat, scilicet \square & γ subflauum colorem, **h**nus ex luto virescentem, \square prasinum, γ sanguineû, \circ hyacinthinum imperitur. Soluente verò abstracto, restitans inde gummi mittitur in **6** extillaturque fumus al-

bus, opacus, tactu frigidus, quod tandem in Oleum abit naturæ vegetatiuæ. *Basil. Vigenerius.*

V. *MERCVRIFICATIO.*

Vnde

1. *¶ hni.*

Rx. \circ **hi**, q.v. \square \ast , p.d. ad emin. 2. digit. digere in cinere δ ρ 14. Dein destilla & tandem auctiori Δ sublima. Flores tere optimè cum \times S leque ac habebis \square m currentem **hi**. *Kesler.lib.1.c.29.*

2. *Aliter.*

Rx. Calc. **hi**, (per **V** ex. \square & \circ), optimè edulcorat. Crystall. \circ purif. ana, sublima per cucurbitam tubulatam, flores tere cum \ast .

N. Antequam affundatur **V**, digerenda est limatura **h** δ ρ (14) cum lixiuio, ex \ast \circ \square & Ψ in ∇ vel \times quo lixiuio dein enaporato, **h** re-rendus est supra Porphyr. *Kesler.lib.4. cap.29.*

3. *Aliter.*

Fiat lixiuium ex ciner. clauell. lb. i. ciner. sarment. vitis. lb. iv. Ψ , lb. i. silic. vst. lb. ij. cum \times . In hoc lixiuio solue **h** limat. & quando lixiuium lactescit, iniice Borrac. (scilicet respectu **hi** iniecti) ut soluiatur: dein destilla gradatim, & extillabit tandem in receptaculum \square currens.

4. *Aliter.*

γ aqu. \ast ci sublimati & in cella resolu γ ij. ol. \square , ipir. Dana γ ib. M. digere per biduum in lapidein.

4 huius lapidis pulueris. γ j. laminatum **hni** γ ij. laminæ soluantur in γ iv. γ us \circ , solutio precipietur super lapidem putrefiat per mensem aut ultra, abstrahatur γ us vsque ad liquorem

V u rem

rem cum cohobio terno, tandem detur
 Δ Δ torius vt calx H ni ascendat,
 quam digere cum V fortificato \times co
 & sale F per diem naturalem, agita
 inter digitos, & calx ad vitā excitabitur.

SALIFICATIO.

Sal H i verum.

R . Materiam quæ remansit post
 extractionem cum O iuniperi pera-
 ctam, sicca optimè, vt oleositas penitus
 consumatur: extrahe \ominus cum \times [sic
 extrahitur \ominus quod ante extractionem

impediebatur, quo minus resolui po-
 terat] abstrahere \times , ac reponere ad cry-
 stallisandum, Crystallōs clarifica ab-
 strahendo W & serua. *Basilii Test.*
& hinc Tholdius.

Vires. Refrigerat vehementer & exic-
 cat, proinde semen extinguit.

Dosis g. 4.

*Extrinsecus medetur oculorum rube-
 dini, ulceribusque totius corporis.*

*N. Si oleum seu Liquorem expetis, per
 deliquium id ex sale habere poteris.*

C A P. XIV.

De Stanno.

Stannum est Metallum molle, al-
 bum, splendens cum liuore quo-
 dam, constans ex F io puriore (in gene-
 re ignobiliorum,) molliore fugaciorē-
 que quam Metalla duriora, fixiore vero
 quam plumbum, & A re albo minus
 maturo.

Dicitur Hermeticis Iupiter, quod
 Ioui macrocosmico sympathice conue-
 niat, & proinde Ioui microcosmico, id
 est, Epatis: nonnullis, plumbum album.
Germ. Zin, VVeiszbley.

Vires. Præterquā quod Epatis conuenit,
 vteri nobis peculi. riter quoque dicatur.

I. PURGATIO.

Funditur ad ignem, atque inter fun-
 dendum superiniicitur aliquid seui,
 ceræ, vel mellis, vt comburatur. Hinc
 effunde in ∇ m calidam.

*N. Purgari quoquo potest per subli-
 mationem, vide infra.*

II. CALCINATIO:

1. Incarnationis, & 2. Reuerberationis.

Fiunt eodem modo, quo H calci-
 nare docuimus.

3. Immersionis.

Fit itidem immergendo, liquoribus
 acidis ac corrosiuis, vt in H . v. sitatissi-
 mē tamen per \times .

Vide

1. Sal Z is.

Vide Saccharum seu Sal H i, ad cu-
 ius modum vt parari & crystallisari, ita
 & cum V exaltari poterit.

*N. 1. Nisi Z optimè fuerit reuerbe-
 ratum nihil effeceris.*

*N. 2. Simili modo & ex floribus Sal
 conficere licet.*

Vires. Præstantissimum ac præsentissi-
 mū est remediū in vteri suffocationibus,
 quas ad miraculum compefcit, tam in-
 trinsecus, quā extrinsecus adhibitum.
*Commendatur itidem extrinsecus ad
 omnia ulcera fatida, fistulas, cancerum,
 & alia esthiomēna.*

Dosis g. ij. iij. .v. & c. repetitis vicibus.

2. Magisterium.

Fit quoque simili modo per præci-
 pitationem.

*N. Parari quondam Magisteriū Z is
 soluendo*

V u 2

curans.

curant inurendo profundam Escharam,
quâ sublatâ, balsamo ☿ is ad cicatricem
perducuntur.

IV. SVBLIMATIO.

℞. Calc. ☿ [e.gr. per ☿] sublima
per ollas cucurbitæ tubulatæ imposi-
tas, ad modum quo flores ☿ij paran-
tur. Nimirum calx illa per vices iniici-
tur, tubulique foramen ab iniectione
obturatur.

N.1. Parum interest, an calcem vel
limaturam ☿ is receperis.

N.2. Flores hi nihil aliud sunt, quam
☿ depuratum.

V. EXTRACTIO.

Vnde

Tinctura Basiliana.

℞. Laminas ☿is, cementa cum pu-
mice, (terna calcinatione restinctoria
in Vino,) calcinato, subtilissimèque
pulverisato, in + bulo benè lutato &
clauso, ☿ ☿(5) per gradus Δ. Deinde
derade pulverem de laminis, eique
extrahe s.a. Tincturam cum ☿. Post-
modum abstrahe ☿, & habes Tin-
cturam ☿i. *Tholdius.*

VI. SALIFICATIO.

Vnde

Sal verum.

℞. Residuum ex quo, beneficio ☿
Tinctura prior Basil. extracta est, affun-
de ☿m mellis, stentque per aliquot
☿ ☿. Sic elicitur Sal, quod abstracta
postmodum ☿a mellis, fit conspicuum.
Tholdius.

Vires. Conducit ad Epilepsiam, Me-
lancholiam, Vertiginem: Catarrhos
exiccat, præcipue qui ad oculos de-
stillant.

Dosis g.6. ad ☿j. vel ☿ij.

VII. MERCVRIFICATIO.

Missa est mihi descriptio ☿ij ☿
Monspelio pro certissima, quam in
Cent. 1. Kessleri art. 22. postmodum re-
peri, ideoque eam non adscripsi. Si
quid ☿iis metallicis tribuendum est,
hæc certè non erit momenti minimi,
cum in eâ ☿ impurum comburatur
cum ☿, deinde pars ☿alis ascendar
per ☿ationem, quæ tandem putrefa-
ctione & ebullitione in ☿um curren-
tem reducitur. *S. Closs.*

C A P. XV.

De Mercurio.

Metallis subiungimus Mineralia
Metallis finitima, quæ si Semi-
Metalla appellare libet, non magni re-
fert. Sûntque ☿ ☿ ☿.

Mercurius nihil aliud est, quam li-
quor mineralis, seu metallicus volati-

lis, metallis & præ aliis ☿i auide ad-
hærescens.

Dicitur Argentum viuum, Hydrar-
gyros. Arabicè Zaibar, vel Zibach.
Barbarè, Azock, Azoth, Germanicè
Quecksilber.

Est

Est narius (*de quo hic*) & artificialis, è metallis extractus, qui & Mercurius corporum dicitur.

Narius etsi nonnunquam per se ipsa natura operatrice, separatus inueniatur, plerunque tamen ex terra minerali, quam cinnabarium vocant, vi ignis euocatur. Vide cap. seq.

Delectus.

Mercurius non æquè bonus omnis existit, sed variat, tum ratione matricis, seu loci natalis, tum ratione inquinamentorum quibus nonnunquam per se in terrâ conspurcatus est, nonnunquam & à maleuolis adulteratus venditur.

Natali loco censetur optimus, qui eruitur è mineris vicinis auro vel argento, & hinc præfertur Hispanicus & Vngaricus.

Inquinamentorum ratione præualeat, qui minus scatet commixtione arsenicali, antimoniali, saturnina, cadmiosa, quibus nonnunquam in terræ cuniculis venenosus redditur, hinc & qui minus falsaria artificis manu adulteratus est: adulterare enim eum adeo exactè norunt, (plumbi scilicet & Pij beneficio Bismuthique commixtione, (ut quoque simul per corium transire æquè ea queant, adeoque difficile sit fucum cognoscere. Eapropter ne qua incautus decipiaris, non è re erit, hæc bonitatis signa obseruare.

1. Mercurius censetur bonus, qui per retortam propulsus nihil recrementi relinquit.

2. Qui in cochleari argenteo eua-poratori super prunis expositus maculam cochleari relinquit flauam, aut albicantem, non nigram aut fuscam.

Vires. Internè mundificat sanguinem ab inquinamento, præcipuè venereo: Fugat lumbricos, difficilem promouet par-

tum, &c. Externè inunctus, sanat scabiem omnis generis, fugat pediculos, resoluit duros tumores. De collo suspensus, præseruat à peste, & (ut nonnulli volunt,) ab incantatione, fascinationeque. Imo quoad eius præparata, nullares in Officinis est, si Excipias, ex qua maior medicamentorum supellex elici possit, quam ex P. 10. Suppeditat enim purgantia, sudorifera, mundificantia vulnera, acrimoniam, (præcipuè in Gonorrhæa,) lenientia, ut patebit in formis medicamentorum inde paratis.

Vsus P. y. crudi internus & externus est. Intrinsecus tamen rarius adhibetur, extrinsecus sapius. Modus applicandi intrinsecus est in pilulis, e. gr. Barbarossa. Quinimo cum certo quodam succo puluerisari ac exhiberi potest.

N. Si P. m, (sive crudum, sive præparatum,) exhiberi intrinsecus volueris, conuenientius in pilulis exhibetur, quam in alia aliqua medicamenti forma, ne dentes scilicet quibus noxius est tangat.

Vsus externus est in vnguentis, (in quibus penitus disparet,) in Emplastris, (quæ in scabie) complicaturis saltem arthriculorum adhibentur. Sed caue nimium adhibeas. Etenim cum salinatione oris putredinem inducit, loco quocunque applicatus, id quod de precipitato similiter obseruatum est.

Præparationes P. ij. sunt.

1. Purgatio. 2. Calcinatio & Præcipitatio. 3. Sublimatio. 4. Destillatio. 5. Extractio. 6. Liguatio. 7. Salificatio.

I. PURGATIO.

Purgatur P. 1. Expressione, per corium, qua fecibus crassis in corio remanentibus P. transit.

N. Et metalla si benè admixta sint
Vu 3 simul

simul transeunt.

2. *Lotione.*

Lauetur autem vel per † simpli-
citer aut cum Θ mixtum, vel per lixi-
uium calcis viua, & cinerum clauella-
torum, vel etiam per lixiuium saponar-
iorum, sæpius nimirum cum his agi-
tando, & vicissim à fordibus eluendo.

Quinimo purgatur quoque agita-
tione forti cum V in vitro obturato,
separatur enim nigredo ad latera.

3. *Destillatione.*

Nimirum destillatur in arena per re-
tortam igne sat forti, idque per se, id est,
sine additione, vel addito sale ¶ i, cal-
ce viua, & simil. Optimè vero purgatur
amalgamando cum metallis perfectis,
ac postmodum per retortam, à corpore
admixto separando.

N. 1. *Sequestrari quoque potest ¶ pu-
rissimus, per reductionem ex ¶ to.*

N. 2. *Purgationes quòd sæpius iteraueris
eo puriorem ¶ m colliges.*

N. 3. *Optima purgatio fit à metallis
perfectis aliquoties cohobando.*

II. CALCINATIO & PRÆ-
CIPITATIO.

Calcinatio ¶ ij communiter præci-
pitatio dici solet, voce tamen minus
accurata, & nimis stricta, quippe
quæ solam secessionem ad fundum
sonat: nihilominus tamen morem
hunc sequar, calcinationemque Præ-
cipitationis voce exprimam, adeoque
 ¶ s calcinatus nomine Præcipitati ve-
niet, qui vel sine Metallis vel cum
Metallis.

Est itaque sine Met.

1. *Præcipitatio ¶ ij. per se.*

R. ¶ puriss. ¶ ij. vel q. v. iniice in
phiolam, (peculiariter in hunc ysum

factam, infernè. scil. latam, supernè
compressam, intus rostro angustissimi
orificij in ventrem vsque producto,) vt
tantummodo fundus operiatur: phiolæ
exactè ad æquilibrium in arenam col-
locatæ, [vt ¶ æquali crassitie vbique
fundum tegat.] subdatur Δ primolen-
tus, post fortior, donec ¶ in puluerem
rubicundissimum instar cinnabaris con-
uersus sit: hunc ablue ∇ is cordialibus,
vel V .

N. *Labor est multorum dierum (30.)*

Vires. Sudores valde mouet, luem ¶
sextes vel septies exhibitus penitus era-
dicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eli-
minat.

Dosis: à g. iv. ad vj.

N. 1. *Vt plurimum vomitum quoque
mouet sal violentum.*

2. *Præstantior erit præcipitatus, si
fiat cum $\frac{1}{2}$. Ois , vel Cæ .*

Sennert. Instit. Hartman. in Croll.
Tentzel. Beguin.

3. *Potest quoque præcipitari eadem
ratione & amalgama Ois & Cæ , de
quibus Crollius. Præcipitanti aliquando,
inquit, amalgamata Ois & Cæ , seorsim
per duos annos, & quamuis puluerem
rubicundum nancisceretur, tamen nondum
erat debite fixus, nec in usum Medicum
commodè adhiberi poterat, sine ulteriori
preparatione. Hac Crollius.*

*Verum me herclè quia præcipitatus
per se exhibetur, quid vetet, quo minus
præcipitatus hic Ois , (risus exhiberi
possit, non video.*

2. *¶ præcipitatio per silices.*

R. ¶ ij. puri ¶ ij. aut ad summum
iij.

Silicum magnitud. fabar. lb. ij.

Detine in Δ e arenæ, [aliquoties
circumuoluendo, ac ¶ m lateribus
adhærentem detrudendo,] donec ¶
planè

in Hydrope, Podagra, Lue venerea, Venenis, Peſte, Febribus, Ulceribus malignis, Scabie.

Dosis à g. 3. ad 6.

Croll. Sennert. in Instit. Beguin. Vnt-
zer. de ♀.

5. ♀ precipit. per ♂♂ ⊕ i
rubic.

℞. ☿ purific. q. v. digere cum ☿
 ⊕ i rubicundo, donec sub fornaii-
 quidâ penitus ☿ lateat: Abstrahe ☿
 per ☿ in ærena, & restabit præcipi-
 tatus in fundo.

Vires. Omnes humores noxios ex-
cat, perque diaphoresin expellit.

Disput. Chymico. Med. Hartman. 7.
th. 127.

Dosis ЭБ. Э. ЗБ.

2. ♀ purific. 2m Di

℞. ♀ purific. Mm Di, optimè
rectific. ana $\frac{3}{4}$ iv. digere, vt soluatur pe-
nitus ♀. Hinc abstrahæ Mm Di in
arena per phiolam longi colli,] $\frac{3}{4}$ io
reliçto trito affunde denuo tantundem
noui M D , ac abstrahæ, idque vel
tertiâ vice, videbis in fundo $\frac{3}{4}$ m coral-
latum elegantem, quem Δ l. paululum
igniando calcina.

Dulcis est & sine corrosiva facul-
tate.

*Usus idem est qui Corallini & quidem
felicior. Croll, Hartm. in Croll.*

7. ♀ *Præcipitatus per* ∇
onorum.

N. Eodem modo poterit quoque \mathbb{F}
precipitari cum Ω u \oplus i.

Vires. Purgat omnes vitiosos humores, resoluit catarrhos, contra infirmitates ex humorum putredine remedium est, quo in morbis deploratis vix experiri licet presentius: Hinc utile est

℞. ☿ purific. q. v. affunde ∇ de-
stillatam ex ouis ad duritiem coctis,
& præcipitabitur in puluerem. Huic
pulueri affunde sæpius ∇ eandem, de-
stillatam scil. à putaminibus ouorum
calcinatis, cohobâque igne cinerum,
donec ☿ sit conuersus in puluerem
rubrum & dulcem.

N. Paracelsus vocat Balsamum.

Vires.

Vires. Curat ulcera colli vesicae,
etiam quae aestimantur incurabilia, sa-
nat vulnera & ulcera externa. Vntzer.
8. *Præcipitatus per Tincturam Smiri-*
dic, Præcipitatus miraculosus
dictus.

Calcina Smiridem Δ violentissimo, donec virescat, & lateribus + buli adhærescat, [aliquot horarum spatio fiet,] Extrahe dein Tincturam per \otimes vel V opt. decanta & abstrahæ ad oleositatem.

℞. Huius Tincturæ ℥j. ꝑij. ℥iv. con-
funde, & præcipitabitur ꝑ in momento:
ꝑm hunc, l. Δ in + bulo candefac per
horam, postea edulcora.

Vires. Purgat leniter ἀπο τῆς χύλης.

Dosis gran. 3. 4.

N. Quis hic purgat tantummodo per inferiora, si horis duabus igniatur, sin-
verò horis quinque vel sex, enadit fixus
ac diaphoreticus.

2. Aptior erit Smiris ad Tincturam
eliciendum, si aliquoties in ∇ antea ex-
tinguatur.

Beg. Gluckr. Kest. lib. 3. c. 42.

De solutione in ∇ communi.

9. *Præcipitatus communis.*

℞. ☿ puriss. p.i. ☿ p.ij. solue ac
præcipita, affundendo scil. ☿ am falsam
vel abstrahendo ☿ per distillationem
cum cohobis tribus. Præcipitatum
edulcora iteratis ablutionibus, vel re-
uebera, vt à spiritibus ☿ liberetur.

Vires. *Purgat per inferiora & superiora.*

Dosis à ʒ.6. ad 12.

Beg. Hartm. in pract.



10. *Præcipitatus albus* S.Cloff. Vomiti-
no, Catharticus.

Solve ℥ij. *ci in ꝑ℞.aq. font. & in eam præice ℥ij. ʒti in pulu. redacti ℥ij. Stent in loco calido, & intra biho-

rium fiet dissolutio integra ☿ ☿ ti, cu
guttatim superfundes ☿ ☿ deliquiosi
3j. aqua euadet lactea, sine subsidere,
aquam decanta à puluere albissimo,
quem phlegmate mellis bis aut ter
elues aut aq. communi calente dulco-
rabis.

Dosis ℞. gr. xij. cum Zj. confect. Hammech. in Siphylide, elephantiasi, tineâ, scrophulis. Decantata aquâ lauentur loci scabiosi & Erysipelata præsertim ♀ea, sic citò curantur.

II. *Precipitatus dulcis.*

Miscetur U^s crudus cum an. præ-
cipitati rubri, superfuso **V**ex arte dul-
cificati & in calore  detinentur per
20. , sic enim felenitudo coagulant
& mitescunt.

CORREGTIO seu RECTIFICATIO
PRÆCIPITATI.

1. Dissolve præcipitat. bulliendo in
❧ acris per hor. 6. &c. [vt totus dissol-
uatur,] dissolutioni superfunde V vel
oo 𐆿 & præcipitabitur denuo, ablu-
igitur & sicca.

Dosis g. 4. 5. 6. Vntzer.

2. Digere præcipitat. per diem cum spiritu \oplus_1 , hinc abstrahe Δ forti, (alij cohobant aliquoties,) super Φm affunde ∇ ad eminent. digit. 2. digere (2) δ decantâque, alium ∇ denuo affunde, idque tertia vice repetere, *Sennert. Institut.*

Vires. Purgat per inferiora.

N. Alia abstrahunt \forall & cohobant aliquoties.

3. Imbibe præcipitatum communem, flavum ve: album ∇ a rotarum aliquoties ablutum, cum ∇ opt. ac camphora ana, vicissimque ∇ l. Δ euoca.

Vires,

Vires. *Purgat per inferiora, præcipue materiam febrilem. Vtilis quoque est in Peste, morbisque Epidemiis.*

N. *Ante Paroxysmum cum Theriaca exhibetur.*

Dosis à gr. 3. ad 6. Hartmann. in Croll.

4. Vis vomitiua Præcipitatorum Forum infringitur etiam, si in Ω u fluminis soluantur, reuerberentur leniter & per aq. ouorum sæpius cohobantam figantur.

12. \varnothing præcipitatis incarnatus.

R. \varnothing ζ ij. solue in ∇ ζ ij. solutioni adde ∇ calidæ ζ ijj. ac infunde postea vrinam sani hominis recentem, & præcipitabitur \varnothing incarnatus ∇ a eluendus. *Hartm. in Croll.*

Vires. *Solum secessum mouet.*

Dosis à gran. vj. ad x.

13. \varnothing Præcipitatus luteus.

Fit, si loco vrinæ, solutioni priori instillaueris \odot \varnothing , p. d. sic præcipitabitur \varnothing luteus, quem similiter lotionem edulcora. *Hartm. in Croll.*

Vires. *Vires & Dosis eandem cum priorib. obtinet.*

14. Alius \varnothing præcipitatus \oplus latus fixus, dulcificatus.

R. \varnothing purific. solue in ∇ [ex \oplus Ib. ij. & \odot p. i.] abstrahere & cohobare tertio: Hinc affunde Ω m \oplus i rectificat. destillaque cohobando, (6) postea affunde ∇ , cohobaque eundem aliquoties (decies) præcipitatum edulcora ∇ is cordialibus ac ferua. *Kessler. lib. 1. cap. 2.*

15. Præcipitatio \varnothing u egregia.

Fac ∇ ex \odot Ib. ij. \oplus , Ib. i. \odot non calcinat. ζ x. \oplus vi. In hac ∇ solue \varnothing ij purgat. quantum ∇ soluere poris est, [alioquin non libenter fit præcipitatio,] solutioni affunde ∇ fontan. fri-

gid. ζ ij. iij. stent aliquot horas extra Δ , vt præcipitetur \varnothing post affunde multum ∇ x frigid. atque repone ad subsidentum, præcipitatum edulcora, iterata ablutione, ac digere in vitro lati orificij siue \times l. Δ . ad siccitatem. Exiccato huic præcipitato affunde denuo \times acerr. p. iv. digere in MB per diem vnum ac alterum in cucurb. probè obturata, tandemque vt ante in vitro lati orificij exicca. *Hartmann. in Croll. Sennert. Instituit.*

Dosis gran. i. ad v. vel vj.

De Præcipitatis cum Metallis.

1. Præcipitatus \odot laris.

R. 1. \odot puri & in limat. vel lam. redacti ζ ss. solue in ∇ ex \odot [sine \ast] facta.

R. 2. Vitri. ζ ij hyacinth. ζ ss. solue in ∇ .

R. 3. \varnothing ij purgat. ζ ijj. solue similiter in ∇ .

Solutiones omnes confunde, abstrahéque ∇ per \times : hinc nouam ∇ affunde, sæpiusque identidem euoca, idque tantisper, donec præcipitatus in ignita ferrea lamina nullum penitus fumum de se emittat. Postea præcipitatum totum calcina sub tegula, vt ∇ omnes dissipentur. Tandem ab eodem ∇ sexies destilla, atque denuo \varnothing m sub tegula lente igniendo calcina.

Vires. *Summum est remedium mundificatum sanguinis ac totius corporis in lue venerea. Magnum quoque fert solamen in Hydrope, pellit aquam per vrinam, & exiccat fontem. Prodest quoque in caduco, colica, quartana: ulceribus malignis ac cancris subuenit, & simil. Hartm. in Croll.*

2. Præcipitatus \odot laris regulinus, seu diaphoreticus.

R. 1. Regul. ζ . ζ ij. solu. in ∇ . vel ∇ .

X x

R. 2.

R. 2. ☉ fin. ʒij. solue in ☿.

Confunde & abstrahe ad siccitatem in arena. Hinc edulcora aqua & spiritum ☿ aliquoties (septies) desuper cohoba, subinde nouum spiritum affundendo. Tandem edulcora denouo, ac ☿ ternâ vice inde destilla, ad siccitatem pulueris flauī.

Vires. *Præstantissimum est sudorificum in omnibus morbis, qui diaphoresin requirunt.*

Dosis gran. 3. 4.

N. *Vt regulus eo felicius soluatur, imbibere aliquoties eius puluerem ☿, hinc solue.*

3. Hercules Bouij.

Huic finitimus est Hercules [potius aurum vitæ,] Bouij qui nihil est aliud quam ☿ præcipitatus ☉laris cum vitro ☿ij coniunctus.

Nimirum :

R. ☉. purific. ʒj. ☿. purific. ʒiv. vtramque soluit seorsim in ☿. Solutionem vtramque confusam destillat (Δ gradualī, & in fine, aucto) per retortam : præcipitatum quod in fundo remansit, vr & sublimatum, quod parietibus, vel collo retortæ adhæret, soluit iterum in ☿ noua, & destillat, idque repetit tantisper, donec tota materia in præcipitatum conuertatur. Postea calcinat supra ferrum ignitum ad figendos spiritus corrosiuos, & denique edulcorat.

Vires. *Ex mente Bouij omnibus aliis cataracticorum speciebus, antecellit : Estque domitor vermium, Luis ☿, Perichiarum, Pestis, Quartana, & aliorum incurabilium morborum.*

Dosis à g. 3. ad 6. vel 8. cum Saccharo rosato, & in ouo vel brodio, vel in pilulis, inprimis, si coniungatur cum Scammonio, & humectetur ☿ vitæ, quæ desu-

per comburatur. Tentzel. sect. 3. panchymag. Mercuriali.

4. Aurum vitæ, Hartmann.

1. R. ☉ purgat. ʒβ. solue in ☿ ʒij. seruando solutionem in calido.

2. R. Mercurij crud. purific. ʒvi. solue in ☿ commun. lb. i. vtramque solutionem mixtam, [qua mixtione apparebunt omnia nigerrima,] ex arena per ☿, l. Δ. gradatim aucto, destilla, donec quæ in fundo, rubescant, & cucurbita tandem subtus candeat : Exemptum dein puluerem sub capula in catillo, subinde cum ferreo baculo calcina, donec ☿ ab ☿. probe euauerint : Abluc postea ☿ a dulci omnem falsedinem & extremò ☿ correctum ab eodem sepius per cohobā destilla.

Vsus eius egregius est in Peste, ut & aliis morbis quam plurimis.

N. Fit ☿ ad hoc opus.

R. ☿tis ex ☉ : ☉ & ☉ ana facta ʒiv. * ʒj. Misc. & destilla per alemb. ex arena.

5. Aurum vitæ S. Closs.

Fac āāā ex Regulo ☿tis stellato & Mercurio, laua hunc pluries, & exprime per pannum, secundo fac aliud āāā ex ☉ & superfluum Mercurium itidem exprime, tertio ambo āāāta commisce, ita vt sint Reguli ☿tis & ☉ ana ʒβ. Mercurij ʒij. aut circiter, quarto superfunde Ol. ☉ li, digere dum colorem ruberrimum acquisierit, quinto Tincturam inde extrahe cum ☿ extractam, circula per mensem, tandemque rectifica.

Vires. *Purgat suauiter & sudores copiosos mouet.*

Dos. à gr. 8. ad ʒβ. gr. 12.

6. Aurum vitæ aliud.

R. ☿ purific. ʒv. ☉ puriss. laminat. ʒβ.

℥℥. F. amalgama quod abluatur +, donec omnis nigredo ablata sit.

Postea impone in ☉m, & affunde ☿m, [ex ☉ p.ij. & ☉ p.i.] digereque, [in cineribus vel arena,] vt soluiatur ☿ & ☉ in fundo sub forma pulueris remaneat: dein destilla augendo in fine Δm, vt fundus retortæ incandescat, omnesque spiritus corrosiui prodeant. Vasis refrigeratis, tere materiam, abstractamque ▽ fortum iterum affundendo cohoba, & inuenies in fundo puluerem rubicundum, quem collige, abiiciendo quod ad latera retortæ fortè fuerit sublimatum. Hinc candefac laminam ferream, cui oprime candescenti, insperge puluerem illum Mercurialem, non modo vt optimè exiccetur, sed & vt id quod volatile restat, euaporet. Hinc aufer & referua in vase clauso.

Vires. Purgat per secessum lente sine omni etiam vomitu, nisi scil. ventriculus, impuritatibus refertus sit. Summum arcanum est in Hydrope, Lue gallica, & omnibus cutaneis affectibus, atque defluxionibus, vt & ubi corpus scatet pituitosis humiditatibus.

Dosis à g. 3. ad 8. cum Terebinth. paulillo aut extracto aliquo. Hartmann. in pract. p. 12. confer Sennertus in Institut.

7. Præcipitatus viridis seu veneris.

℞. Mercurij purificat. ℥iv. solue in ▽ commun. in eadem ▽ solue & ☿is ℥℥. coniunge solutiones ac abstracta in arena, virgendo in fine ▽m, vt maxima pars spirituum tollatur. Præcipitatum exicca ac digere cum ☿ in MB ♂ ac ♀: ultimo fac bullire, vt purissima pars Mercurij in ☿ soluiatur. Hinc decanta & ab-

strahe atque sicca sine lotionē.

Vires. Est specificum in Gonorrhæa virulenta, quam nimiam tollit, insufficientem promouet, ideoque singulis diebus continuandus eius vsus est, donec omnis fluxus sedatus sit.

Dosis à g. ij. ad viij. Hartmann. in Croll.

N. Signum boni præcipitati est, si aurum fortiter cum eodem fricatum, non dealbetur, vt solet ex contactu Mercurij.

Huc

8. Vitrum Mercurij

Cnare.

℞. ☿ præcipit. [per ☉ ☉ i rubic.] ℥ij. (æ calcinat. & * ana ℥j. Misc. & sublima. Sic ascendit *, relictis in fundo Mercurio & (æ instar auri purissimi, inde +bulo & da ignem fusionis, vt in vitrum simul abeant. Vid. Disput. Chym. Med. Hartmann. 7. th. 127.

9. Vitrum ex ☿ vitæ, sine Succinunt ☿ij.

℞. ☿m vitæ, abstracta per ☉m partes minus fixas, reliquum fundatur igne forti in vitrum, quod transparens opacum, vel si diutius in igne continueatur, Hyacinthinum euadit.

N. I. Dicitur aliis succinum ☿ij, quia nihil aliud esse videtur quam vitrum ☿ij, non ☿ij.

2. Si abstractio partium minus fixarum fortius vrgetur, extillat vicissim liquor instar butyri ☿ialis.

III. SVBLIMATIO.

1. Mercurius sublimatus Officinarum.

℞. ☿ in ▽ solut. ☉ i exicat. ☉is decrepit. ana Misc. exacte & sublima

ex cucurbita humili. *Gluckrath in Be-*
guin.

2. *Aliter optimum pro ☿ dulci*
conficiendo.

℞. ☿ purific. ☉ rubific. ☉ decrepit. ana ℥.i. ☉ ℥iv. Misc. exactè,
aspergendo modicum ☿, sublima-
que ut dictum.

Iam denuo.

℞. ☿ ☉ti illius ℥.i. ☉ decrep. ℥xi i.
☉ rubific. ℥iv. M. sublima.

Iterum.

℞. ☿ ☉ti illius, ℥.i. ☉ decrepit.
℥xi i. M. sublima.

N. *Puriorem Mercurium ☉m si*
desideras, reitera adhuc sublimationem,
sed sine additione. *Beg. Vntzer.*

3. ☉tus Regulinus.

℞. ☿ purificat.

Regul ☉ ij ana ℥.β.

☉ i rubific. ℥iv.

☉ is fus. ℥vi.

Misc. & sublima ex sublimatorio vi-
treo, desuper fundendo ☿ : subli-
matum misce cum ☿, ac sublima de-
nuò, idque vice tertia.

Vires. *Inseruire commodè potest Mer-*
curio dulci, aliisque Medicamentis, ex
☿ ☉o, preparandis.

4. ☿ dulcis vulgaris : *Draco*
mitigatus.

℞. ☿ ☉ti ℥viii. ☿ crud. purific.
℥vi. Misc. exactè in mortario lapideo,
vel super porphyrite, donec Mercurius
vuius amplius conspici nequeat. Hinc
sublima calore arenæ in Phiola leniter
saltem obturata & sublimatur torus
ferè Mercurius, adhærescētque late-
ribus Phiolæ, remanentibus in fundo
fecibus, quas vna cum nigricante ma-
teria collo phiolæ adhærente reiice.
Hinc sublima denuo, idque vice tertia,
reiectis semper fecibus, ut dictum.

N. 1. *Si purum insipidumque secunda*
sublimatione obtinueris, acquiesce, mul-
ta enim sublimatione infringitur vis pur-
gatrix.

N. 2. *Alij addunt quoque Colchotar.*

N. 3. *Optimum Mercurium dulcem*
conficies ex ☿ ☉to regulino, & Mercu-
rio ☉ij.

Hartmann. in Croll.

Vires. *Omnes humores noxios sine*
perturbatione blandè expurgat, unde vel
infantibus exhiberi poterit.

Dosis : *Dari quidem potest ad ℥β.*
Verum ut eo citius operationes suas per-
ficiat, nec diu in corpore deliteat, acui
solet purgantibus aliis fortioribus, e.gr.
Diagrid. Trochisc. Alband. & simil. Da-
turque cum iisdem à gran. 8. ad 15. &
plur.

Hartmann. in Croll. Senn. in Institut.
Tentzel.

5. *Alius.*

℞. Mercurij in ☉u ☉ i soluti &
edulcorati.

Mercurij crudi ana.

Sublima aliquoties ut dulcis fiat.

Vires. *Lente purgat per inferiora.*

Dosis à g. 6. ad 12.

N. 1. *Eodem modo dulcescit & Mer-*
curius precipitatus luteus si per se su-
blimetur, dulcificatúsque leniter al-
uum mouet.

Dosis g. 8.

2. *De usu : Ex omnibus hisce Mer-*
curijs dulcibus potest parari ☿a utilissi-
ma ad inflammationem, fistulas & ul-
cera maligna, non tantum detergenda,
sed etiam cicatrifanda, præcipuè in Lue
venerea, valet etiam ad scabiem, sine no-
xa penitus curandam.

Nimirum :

Proiicitur ☿ recens, in aquam bul-
lientem, relinquiturque aliquandiu,
hinc

hinc filtratur, in filtraturâ lb. i. dissoluitur bulliendi Mercurij dulcis, q. s. colatur & seruatur. Fallopius vocat ꝓm aluminis. *Hartm. in Croll.*

6. Sublimatum dulce Talcosum
S. Closs.

Fit si M. cum ☉ irrorando guttulis aliquot ☉. ☉ is: hæc tria constituunt Axungiam Talcosam fluentem.

Vires. *Suauiter purgat absque vomitu, deobstruit & refrigerat, estque securum febrium intermittentium solamen.*

7. Latugo perlata siue flores ☿ argenti ex inuentione S. Closs.

1. Facta est ☿ ex ana ☉ & ☉ cum triplo boli communis ad modum ☿ 2. in lb. i. huius spiritus solutæ fuere ☿ crudi ☿ x. & abstracta ☿ ad duas tertias, collecti fuere crysalli probèque edulcati 3. perfusi sunt iidem ☿ ☿ sato ad 3. digit. supereminentiam sicque per mensem in putrefactione, ☿ sterere. 4. materiâ in ☿ coniectâ eductoque ☿ pars quædam ☿ ij sublimatur Δ auctiori, pars in rubrum abibat Præcipitatum. 5. ambobus iterum confusis ☿ affundebatur, & post digestionem vnus diei ac filtrationem calidam, tota materia soluta in floccos argenteos gossypio perlato fulgentique similes fuit conuersa in inclarescente menstruo. 6. hos flores cochleari vitreo detraxi & in chartâ bibula quadrupl. exiccaui, ita enim splendorem non amittunt. 7. cum alio ☿ super resitantem materiam coniecto nouos flores collexi, idque ter quaterve repetij.

Vires ex Vnizero repetendæ, qui longè operosior nobis methodum aliâ reliquit in Anat. ☿ ij p. 255. Vbi enim millic per grana & scrupulos abraduntur flores, hic per uncias & libras congeruntur.

Dosis eorum est gr. vj. in formâ pilul. cum pauxillo Extracti liquir. Educunt absque violentiâ humores vitiosos infebre quotid. seabie, Leprâ.

8. Mercurius ☿ rubens non torrensus, Arcanum Corallinum.

☿. Mercurij optimè purgati, lb. i.

☉, optimè purificat.

☉, ad rubed. calcinat. ana lb. ij.

Puluerisuntur & misceantur optimè, subinde irrorando & incorporando cum ☿ acerrimo, donec dispareat penitus Mercurius. Hinc sublima ex arcana, in cucurbita lutata, cum capitello, & exit primum phlegma, dein auctiori Δ, viginti quatuor horas continuare, sublimabitur, sublimatum proximè à materia rubeum, paulo altius flauum. Vtrumque rubeum ac flauum, cum ☉ lb. i. & ☉ leniter calcinati, lb. i. misce impastaque cum phlegmate +, sublimæque denuo vt prius (horis duodecim,) & ascendit iterum sublimatum rubicundum ac flauum, collige singula seorsim, rubicundum elue ☿ is cordialibus, ac ab eo efflagrare siue ☿; flauum calcina igne mediocri, vt rubescat, hinc elue similiter ac corrige cum ☿ desuper accenso.

N. Feces nigricantes cum Mercurio in capitellum ascendentes, abiiciantur in singulis sublimationibus.

Vires. *Purgat, per inferiora præciue, magnūque secretum in Hydrope, morbo Gallico, Podagra, Scabie, Viceribus, Cancro, &c. Crollius.*

9. Modus compendiosior, Laudanum Mercuriale, siue Metallicum.

☿. Salis extracti ex ☉ ☿ ☿ is. (ex ☉ & ☉ ana fa. ☿.) ☿ i.

☿ purific. ☿ ij.

☉ purific. ☿ ij.

Puluerisa ac misce optimè impa-

stando cum + sublimâque, vt dictum, sic ascendit pars, quædam alba, quædam lutea, quædam crocea, quædam rubicundissima, collige croceam ac rubicundam, abiectis cæteris, sublimâque denuo per se ex arena igne sat forti, ac omnia rubefient: hinc elue ac corrige

V supra accendendo.

Vires. *Easdem habet cum precedenti, Hartm. in Croll.*

10. *Manna Mercurij, seu Mercurius dulcis Olaris.*

R. Mercurius dulcis vulgaris, q. v. tantisper sublimationibus iteratis eleua, donec in fixos abierit Chrysallos, postmodum in liquorem soluito.

R. Huius part. 3. ☉ calcin. p. 1. Misc. ac digere per mensē, cohoba donec in cucurbita instar ceræ fluat.

Vires. *Ad summum Medicine gradum Mercurius ita redactus est, & in Epilepsia, & morbis Venereis admirande virtutis. Tentz.*

N. Ego met Mercurium dulcem ter sublimatum, miscui quondam cum ☿ foliata, sublimationēque adhuc quarta vice iteravi, quibus peractis sublimationibus, restantem materiam igni subieci fusorio, vt quid ☿ restaret colligerem, verum sine commodo, quippe ☿ penitus fuit sublimata, vis autem illius sublimati sudorifera potius fuit, quam deiectionaria.

11. *Arcanum corallinum correctum S. Closs.*

4 ☉ & ☿ ana lb. ij. O calcinati & ☿ ij ana lb. i. Omnibus arte mixtis detur ☿ ☿ mationis in fine benè fortis, quod rubescit sublimatum collige, benè edulcora, tere, & digere in ☿ ad 4. digitorum extantiam per 2. aut 3. ☿ euacua per inclinationem, aliud affunde, digere, donec nil amplius

soluatur: tandem euapora, remanebit puluis luteus, quem lauabis sæpius aq. calidâ.

Dos. mitificata huius Aquila est à gr. v. ad ʒss. cum Panchymag. Felicius adhuc operabitur, si eius gr. viij. cum auri sclopet. & croci ʒ ana gr. ij. in conf. florum borrag. aut pill. de aloë lotâ exhibeantur.

Ad ☿ ☿ pertinet quoque:

12. *Cinnabaris Officinarum artificialis.*

R. ☿ is commun. ʒij. vel iv. Huic liquefacto infunde Mercurij viui lb. i. spatulâ lignea benè agitando incorpora, donec Mercurius à ☿ e planè consumptus videatur. Hinc massam refrigeratam tere super marmore, atque sublima, ex sublimatorio lurato; igne primo leni, dein auctiori, &c. Primo ascendit fumus citrinus, paulatim rubescens. Quando itaque fumus nigro rubeus ascendere incipit, vrge igne violentissimo horas quatuor vel quinque, & sublimabitur cinnabaris, adhærescētque lateribus, quàm exime, reiectis fecibus in fundo & capitulo.

Paracelsus in Chirurg. lib. 1. manual. pag. 702. Brendel.

Aliter.

R. ☿ ʒij. ☿ ʒiv. M. ac ☿ aliquantulum efflagrare sine, vt puluis remaneat niger: hinc sublima semel ac iterum, vt cinnabarim nanciscaris rubeam.

13. *Panacea ☿ ij purgans.*

R. ☿ ij vitæ p. ij.

☿ ij viui in destill. butyri ☿ ij pro-
uenientis p. i.

Sublima vt ☿ m dulcem.

Dosis gr. v. ad viij.

N. ☿ vitæ ad hoc opus fit ex ☿
p. ij.

p.ij. ☿ optimi vel reguli p.1. destillatur
 & ☿ tur ▽ com. ut moris.
 Cl.D.D.Ioh.C.Fauf.

IV. DESTILLATIO.

I. ☉ ☿ Mercuriale, seu Butyrum
 ☿ : Liquor gummosus.

Rx. ☿ ij puriss. ☿ ☿ ti ana Misc. exa-
 ctè in mortario lapideo, & destillen-
 tur per 6 m vitream ex arena Δ pri-
 mo mediocri : sic liquor seu butyrum
 ☿ ij instar glaciei egreditur, qui si con-
 creseat in collo, ne id obstruat, admo-
 ue caute carbonem, ut lique scat. Fini-
 ta destillatione liquoris, auge Δ, daque
 ignem suppressionis, id est, supra ☿ m.)
 & sublimabitur cinnabaris ☿ ij. (de qua
 vide suo loco, in sublimatione ☿ ij.)
 Liquorem egressum rectifica per re-
 tortam vitream.

N.1. Præstat hoc ☉ Cinnabari sua
 aut rectificationem imprægnare. Nimi-
 rum, Cinnabarim tritam adde dicto ☉, o,
 stentque in digestionem (hor. 24.) vitro
 clauso in cinere, sic fiet unio, hinc re-
 ctifica per ☿ m.

N.2. Felicior procedet destillatio Δ
 aperto, sed sensim & successivè aucto. Irè
 si ☿ m cum materia ante destillationem
 in cellam per triduum reposueris.

N.3. Alij Rx. Reguli & ☿ ☿ ti ana
 singula seorsim trita miscent, & ut con-
 cretionem in collo præcaueant, ad lique-
 scendum in cella reponunt, Liqueoremque
 deinde destillant.

N.4. Beguinus eodem modo ex ☿ ☿ ti
 p.ij. 4 limat. p.1. ☉ elicit, unde pulvis
 fit præcipitatus, quem vocat ☿ diapho-
 reticum. Vide in 4.

Vires. Usus huius Olei glacialis per
 se est externus solum, in gangrena &
 phacelo, in quibus si pars mortua illini-

tionem huius Olei circumlinatur, non ser-
 pit ulterius putredo, sectioq; felicius per-
 agitur. Simili ratione Carbunculus pe-
 stilentialis oleo hoc circumlitus paulatim
 emoriendo excutitur, adeoque aptus red-
 ditur, qui postmodum Emplastris aliis
 obediatur. Usitatum itidem corrosivum
 Chirurgis existit.

Ex hoc ☉ fit & MERCURIUS
 VITÆ & BEZOARDICVM MINE-
 RALE.

I.

Mercurius vitæ.

☉ præcedenti siue Butyro ☿ ij, in-
 funde aquam ac statim pulvis albus
 præcipitabitur, qui ablatur donec nul-
 lam amplius acrimoniam sapiat, dein-
 de exiccetur.

N.1. Candidior ac purior erit. 1. Si ad
 destillationem bu yri, loco ☿ ij crudi, re-
 gulum eius receperis. 2. Si per ☿ m illud
 rectificaveris.

N.2. Appellatur & Pulvis Angeli-
 cus, Pulvis Algoreth, Aquila alba.

Vires. Totius corporis, & præcipue pri-
 mæ regionis humores noxios, per secessum
 ac vomitum expurgat, Ususque insignis
 est in Peste, Capitis morbis, Lue vene-
 rea, Ulceribus malignis, Febris, Arth-
 ritide, Hydrope, ubi & plurimum sine
 vomitu operatur.

Dosis à gran. ij. ad iv. Macerare quo-
 que licet gr. ij. ad iv. in haustu vini, eum-
 que filtratum exhibere.

Sunt qui infusionem Mercurij vitæ
 in promptu habent.

Nimirum :

Rx. ☿ vitæ Diß.

Vini generos. 3xviij.

Dosis 3j.

N.1. Vis purgatrix huius ☿ ut & vi-
 tri ☿ nunquam exhauritur.

N.2. Triduanum eius usum sape pro-
 ciduentiam

esse Gialis.

2. Bezoardicum Olare compo-
situm.

R. Bezoard. mineral. solar. ℥ij.

Sal. Rut.

Guajac. à ℥ij.

Solut. Corall. rubr. ℥iſſ.

Misc. optimè per horam in mortario
vitreo.

Hinc adde subinde.

Spir. ☿. ℥ſſ.

Tinctur. s. extract. Croc. or. ℥iſſ.

Ol. Caryophyll.

Succin.

Cinamom. ana. ℔j.

Lep. Bez. or. ℔ſſ. vel ℔j. si placet.

Stent in cinere tepido, clauso vitro,

♂ ♀ 3.

N. 1. Bezoardicum minerale solare
ad datam compositionem fit.

1. R. Butyr. ♂ ℔. ſ. ☿ factit. præpa-
rat. (vel ☿ ♂.) ℥ij. F. solutio in Phiola
obolngi colli, Δ arenæ mediocri, (vt
leuiter bulliat,) sic rubescet solutio.
Hanc ☿ta affundendo ▽ calidæ ℔b.
aliquot, & ☿bitur ☿ albus, quem de-
cantato sensum liquore flauescente
edulcora optime in ▽ abluendo, tan-
dem exicca blando calore solis vel hy-
pocausti.

2. R. ☉ Vngar. laminat. ℥ij. solue pe-
nitus in ℥ij. ☿, [destillatæ ex ☿,
cum ☉.] Hinc abstrahe ☿, cohoba-
que vicibus 4. Dein solue denuò: Solu-
tionem funde super pulueris prioris
℥iij. digere ☿ vigint. postea abstrahe
sensum, cohobaque vice tertia. Tandem
auge Δ vt ☿ ☿ prorsus euanescent.
Postmodum affunde ☿, eumque ali-
quoties iterum abstrahe: sic paratum
Bezoard. miner. solare.

N. 2. Solutio Coralliorum fit :

R. * purificati, [id est, sublimati, L. à

tantundem ☿ decrepirati. 2. sine ☿,
per se.] Corall. rubr. pulu. ana ℥ſſ. Misc.
& ☿a denuò: sic relinquetur in fun-
do ☿torij Calx Corallorum, quam
pone supra tabula vitreà ad liquecen-
dum. Residuum quod in solutione
supererit, denuò cum * purificato
submitte sublimationi & solutioni,
donec tota Corallorum substantia sit
soluta.

N. 3. Tinctura Croci fit cum ☿i
qui iterum abstrahitur ad consistentiam
mellis.

Vires. Sudores validè ciet, adeoque
confert in Apoplexia, Paralyſi, Arthri-
tide, Podagra, Tremore artuum.

Dosis à g. 4. ad 8.

Ex communicatione Affinis mei co-
lendi, Dn. IOHANNIS GRASSERI,
Chymici industrii & Pharmacopœi
huius Reipubl. meritiſſimi, qui & hoc
inter Chymica sua extare voluit.

3. Bezoardicum Solare Crol-
lianum.

R. Butyri ♂ ij ℔. ſ. solue affunden-
do sensum ☿i.

R. ☉ fin. ℥ſſ. solue in ☿.

Vtramque hanc solutionem claram
confunde, abstrahèque menstruum gra-
datim, abstractum iterum affunde, cui
adde ☿, nou. ℥j. abstrahe, idque re-
pete aliquoties.

Calx hæc dulcoranda & ignienda
est.

Vires. Vires huius Bezoardici summis
Crollius effert laudibus in Lue venerea,
Peſte, Podagra, Hydrope, Febribus, ob-
ſtruct. Lienis.

Dosis à g. 3. ad 8.

N. Hoc Bezoardicum licet ſuis hand
careat viribus, attamen ob corporeitatem,
quam ☉ adhuc obrinet præſtantius cen-
setur, quod ſequitur. Videlicet.

Y y

4. Bezoar

4. Bezoardicum Solare
verum.

Fit eodem ferè modo.

Nimirum :

Si loco ☉ illius corporei, substituat-
tur ☉ in spiritualem substantiam exal-
tatus, de qua exaltatione vide in ☉
Volatilisatione, vel Tinctura ☉.

Nempe :

R. 1. ☉ illius spiritualis ꝑ. solue
in R.

2. Solue in eadem butyri ꝑ. re-
ctific. ꝑ. iv. (vel ut alij vj.) vtramque
solutionem confunde, abstrahere men-
struum per ☉, destillationibus sæpè
repetitis : Postea per calcinationem
sub tegula (unter einem Muffel) reduc
in ☉ erem violaceum, si lenis, vel in
purpureum, sin intensior calcinatio in-
stituatur.

Vires. Vires easdem obtinet, quas prius,
sed efficaciores.

N. 1. Hartmann. in Croll. Sennert. in
Institut.

R. Aurum (per ☉ Si bezoar-
dicum,) spirituale redditum, iunge
cum butyro ꝑ. in ☉, vel R
soluto, repetitis destillationibus vnien-
turac figentur: abstrahere tandem, & ha-
bebis interueniente calcinatione Be-
zoardicum solare purpurei coloris ma-
gnarum virium.

Dosis eadem qua priorum, à gran. 2.
ad 10.

N. 2. Ventzelius solutionem illam ☉
oleiformem edulcorat, superfundendo ☉
abstrahendo aliquoties acetum forte.
Postea extrahit Tincturam, Menstruo
Basilij affuso digerendo per mensem,
&c.

Hinc

R. Tinctura huius à menstruo sepa-
rata, p. 1. Butyr, ꝑ. in ☉ solut.

p. vj. vel viij. Miscet ac vnit cohobando.
ultimo calcinat.

5. Bezoardicum Lunare :

R. Butyri ꝑ. in ☉ solut.
ꝑ. iv.

Tinctur. ☉ viri diusculæ ꝑ.

Iunge ac destillando aliquoties ad
siccitatem fige.

Vires. Bezoardicum hoc viridiuscu-
lum vrellissimamest, ad capitis affectus,
presertim ad Erysipelas capitis mu-
liercularum.

Dosis à g. 6. ad 12.

Tinctura ☉ fit.

☉ soluendo in ☉, hanc rursus
abstrahendo, & Tincturam per ☉ i
extrahendo, vide suo loco.

6. Bezoard. Lunare 2.

R. Extracti Cœrulei ☉, (ex ☉ cam
☉ calcinata per ☉ in vrinæ ex-
tracti,) soluti in ☉, p. 1.

Butyri ꝑ. itidem in ☉ soluti,
p. x.

Iunge ac destillando vel circulando
vni.

Habes Bezoardicum Lunare eius-
dem, vel etiam maioris virtutis.

st. Bezoardicum Lunare 3.

R. Extracti seu Tincturæ ☉,
(mediante ☉ extractæ ex ☉ in ☉
soluta & instillatione ol. ☉, p. d. præ-
cipitata.)

Et Butyr. ꝑ. procede ut supra.

8. Bezoard. Lunare 4.

Præstantissimum fit Bezoardicum
☉, si ☉ na cum ☉ i, in ☉
redacta & cum butyro ꝑ. l. a. in pul-
uerem fuerit fixata.

Bezoardicum venereum.

Ex squamma æris elicitur Tinctu-
ra cum butyro ꝑ. rectificato, dein fi-
gitur per ☉ i, ut in prioribus
dictum.

10. Bezoardicum *♂*iale.

Ex croco *♂* per reuerberationem extrahe cum butyro *♂*ij Tincturam dein fige per *⊖*m *⊕*i, more vsitato.

Vires. *Est specificum in omnibus fluxionibus ventris, praesertim ab Epate originem capientibus.*

Schunemann. in Hydromant.

11. Bezoard. *⊕*iale.

℞. Reguli *♂*ij sine *♂* facti *℥*ij. huic fuso, (in +bulo,) adde Iouis Anglici puriss. similiter fusi, ad *℥*ij. vt fiat de nouo Regulus, postea laeuiga, & admisce diligenter *℥* *⊖*ti. *℥*v. Destilla ex *⊖*, Butyrūque inde destillatum cum *⊖*u *⊕*i, ternis destillationibus fige, postea calcina, ignitūque in *V* extingue, & exicca, fit puluis Gryseus.

Vires. *Potentissime mouet sudores, insuper ad obstructions Epatis Polychreston non contemnendum est.*

Dosis à g. 2. ad 6. vel 8.

12 Bezoard. *℞*inum.

Cum Butyro *♂*ij non rectificat. extrahe Tincturam ex vitro *℞*i, atque cum *⊖*u *⊕*i, dicto modo fige.

Vires. *Prodest in affectibus Lienis.*

Dosis ad g. 6.

Nitrum ℞i fieri potest ex minio & silicibus.

13. Bezoard. *Mercuriale.*

Fit eodem modo quo Bezoardicum Saturni, ex vitro scil. *℥*ij vitæ & butyro *♂*ij.

De omnibus hisce Bezoardicis legi potest. Hartm. in Croll. Tentz. in Exec.

Nos ad destillata reuertimur, inter quæ sequitur.

1. *⊖* seu *⊕*o *℥*ij album diaphoreticum.

℞. *℥* *⊖*ti tenuiter puluerisati, p. 1.

Argilla rubr. p. iij. Misc. & fas cum *▽* communi globulos in vmbra exiccandos, destilla dein ex *⊖* vitrea per *⊖*m *⊕*e suppressionis, (gradatim tamen) horis duabus adhibito, prodire legans *⊖*, quem serua.

N. *Si quid ℥ij subiimetur, cum recenti argilla misce, & procede vt antea.*

Vires. *Diaphoreticus est.*

Dos. g. 1. 2. 3. vide spiritum sequentem. *Rhenan. chymotech. l. 1.*

3. *⊖* seu *⊕*o *℥*ij rubrum.

℞. *℥* *⊖*ti. tenuiter puluerisati. Limatur *♂*ana, Misc. ac resolue. per deliquium in *⊕*o flauum, quod diligenter collige. Residuo (quod non solum,) affunde *▽*m comm. ac extrahe *⊕*: Sal purificatum & coagulatum denuo *⊕*o iunge, fietque aurei vel crocei coloris. Destilla in *⊖*, ex cucurbita humili per *℞* breuis rostri, primo exhibet phlegma, quod seorsim colligatur, auctiori deinde *Δ* ascendit rubedo, quæ partim in excipulum (quod mutatum sit,) destillabit, partim in *℞*o & rostro, butyri instar adhærescet: Vrge *Δ*m, donec nihil amplius ascendant, tunc cessa.

Phlegma destillatum vna cum rubedine ad spondilia cucurbitæ eleuata, redde capiti suo mortuo, reiteraque destillationem per *℞* eundem, vix incalescente *℞* bico, (imo vel à vaporibus,) liquecet rubedo in *℞* hærens, extillabitque rubicundissime in Excipulum: postquam rubedo hæc extillauerit, mutato Excipulo suscipe phlegma subsequens, ac postea rubedinem aliquam igne auctiori, vt ante collige, idque repetere tot vicibus, quot opus fuerit.

Vires. *Viriusque huius spiritus magnus est vsus, imprimis vero rubci: expeditur*

per sudorem quodeunque in corpore no-
xium fuerit, aliisque Medicamentis
difficulter cedit. In Lue Gallica pustu-
la huius usu sponte cadunt, tubercula
minuuntur, dolores sopiuntur, ulcera fæ-
tida manantia exsicantur & consolidan-
tur.

Dosis g. 1. 2. & c. in ∇ Theriacali mi-
stura simpl. ℞ Guajaci. Decocto, &
simil.

Hartmann. in pract.

4. ☉ Mercurij diaphoreticum
dulce.

℞. ☿ t. q. v. solue in ☿ digere ac
abstrahē ☿ ad siccitatem, residuum in
☉ digere cum ∇ rectificatiss. donec
fiat crassus liquor. Hinc destilla ex ☿
Δ forti, & prodibit liquor instar la-
ctis. Lactem hunc liquorem reafun-
de materiæ in fundo relietæ, destilla-
que denuo. Sic extillat ☉ alum ac
fragrans sine corrosione. Kest. lib. 2.
cap. 30. lib. 4. c. 35. vide etiam Liquores
Mercurij.

N. Alij contenti sunt sola digestionē
ac destillatione cum ∇ peracta. Kest.
lib. 2. c. 29. lib. 4. c. 34.

Vires. Curat Ulcera maligna, cancro-
sa, præsertim Renum & Vesicæ.

Vfus, tam internus, quàm externus
est.

5. Oleum fragrans, Astrum
dictum.

℞. Mercurij septies sublimati, toriēs-
que per ☿ rectificati, q. v. solue in ☉
calore mediocri: dein abstrahē ☉ m
☉, edulcora optime coquendo in ☿,
ut corrosius sapor eluatur: postmodum
abstrahē quoque ☿, & denuo elue,
affundendo ☉ m pluuiam stillatitiam:
hinc exicca, & digere aliquandiu cum
∇ rectificatiss. ana. Postea pelle simul
per ☉ m Δ, initio leni, dein fortiori:

corpus residuum serua pro conficiendo
indè sale: Extillato vero deme ∇ in
MB. Et remanebit in fundo ☉ Mer-
curij fragrantissimum, quod est astrum
Mercurij. Basilini,

Vires. Diaphoreticum est & peculiare
curatiuum Luis venereæ: easdemque vi-
res obtinet, quas ☿ ex corpore residuo
paratum. Vide infra.

6. Aliud Oleum ☿ diaphoreti-
cum fragrans.

℞. ☿ ☉ t. p. 1. * fixi, (in liquorem,
p. d. d. redacti & mundificati), p. iij. sol-
ue p. d. Liquore imbuatur charta bi-
bula: Charta sic perfusa matraccio vi-
treo includatur cum suo ☿ & reci-
piente: destillando liquorem Mercu-
rialem Δ arenæ elice. Hunc si rectifica-
ueris, dulcissimum odorisque fragran-
tissimi ac gratissimi, moschum redolen-
tis, nancisceris oleum.

Vires. Aptissimum est in sudoribus
ciendis.

Quercetan. in Tetrad. In descriptione
Panaceæ Dialis.

7. Oleum Mercurij Saccharatum,
Spiritusque.

℞. ☿ ☉ t. p. 1. Sacchar. p. iij. Misc.
optimè ac destilla per ☿ m vitream lu-
to obductam in receptac. capax. Primo
accende paulatim carbonēs supra ☉ m,
ut calefcat: hinc accende & infra ac
continua Δ m lentum dies 2. aut 3.
Quod extillauit committe destilla-
tioni ME. Exhibit ☿ Mercurij su-
bacidus, ☉ o Sacchari remanente in
fundo.

N. Lente procedas memento, ne ope-
ram ac oleum perdas. Saccharum enim
astu nimio irritatum, vi sibi exitum
querere solet.

Vfus. In Ulceribus, Vesicæ, aut
aliis Affectibus, ex morbo Gallico reli-
etis

Hic, magni est solatij.

Dosis: spiritus exhibetur gut. 3. 4.

V. EXTRACTIO.

Vnde

1. Sulphur seu Tinctura Mercurij

Aquila cælestis.

℞. ℞. t. [cum ☉ & ☿ eleuat.] q. v. affunde ☿, stent per septimanas aliquot, vt extrahatur flauedo, s. a. Decantatos liquores destilla ad siccitatem, & habebis puluerem rubeum, qui verum Mercurij ☿.

Vires. Paracelsus maxima huic attribuit praconia, in curanda Podagra, Epilepsia, morbo Gallico, &c. Quorum radicem per sudorem expellat.

Dosis g. 3. 4.

2. *Alia.*

℞. Vitri Mercurij (quod succinum ☿ij vocatur,) extrahe cum ☿ decanta & abstrahere.

Vires. Sudorem mouet.

Dosis g. 2. 3.

N. *Vt vitrum illud, non est nisi vitrum ☿ij: Ita Extractio hac non nisi ☿ij censenda erit.*

3. Oleum Mercurij ☿ialis

Tinctura.

℞. Mercurij ex ☿ fact. part. 1. ☿☿ ☉ i rubr. rectificatiss. p. i. v. abstrahere leniter, vt ☿ cum Mercurio maneant, dein auge ☿, & sublimabitur aliquota Mercurij pars. Sublimatum redde Mercurio in fundo, tantundemque noui ☿☿ ☉ i adde, abstrahere & sublimare, idque vice tertia: tandem tere, & affunde triplum ☿ rectificatiss. circula, sic fiet separatio, & Mercurius in ☿☿ abibit supernatans. Hinc separa ☿☿, idque circula ☿☿ cum ☿ acerrimo. Sic ☿☿ recipiet ponderositatem, fundumque petet, & quod noxium in ☿ erat

☿o immixtum manet.

Vires. Basilius maximis encomiis ☿☿ hoc celebrat, vimque ei attribuit corroborandi Cerebrum, curandi Apoplexiam, imò loco Panacæ habet.

VI. LIQVATIO.

1. *Vnde Liquor.*

℞. ☿☿ ☉ ti q. v. digere in phiola vitrea calore mediocri, ☿ (40.) hinc solue per deliquium.

Vires. Curat Vlcera ac Vulnera maligna, instillatus.

Alius liquor Mercurij præcipitati.

℞. ☿ per ☿ præcipitat. q. v. affunde ☿ opt. digere, & cum acer factus fuerit, decanta. Hinc affunde alium, donec acrimonia sublata, & calx attenuata sit. Tunc affunde ☿ digere, decanta, affunde nouum ☿ idque toties, donec totus puluis in ☿ abierit: abstrahere ☿ pulueremque reponere in cellam ad liquefendum cum aqua Chelidonæ.

N. *Quod si ☿ calci huic insufficiens fuerit, de nouo calcina.*

3. *Alius.*

℞. ☿☿ ☉ r, q. v. solue in ☿, (ex ☉ i, p. ij. & ☿, p. i. destillata,) digere vase clauso, postea destilla: residuum tere, rursusque aquam affunde, idque tantisper reitera, donec omne sublimatum in fundo fixum remaneat. Fixum hoc sublimatum per ☿ in vnam ac alteram leuiter reuerbera, dein tere, digere cum ☿, abstrahere cohobando, donec in ☿☿ i formam abeat. *Vntzer.*

Vires. Confert Podagricis, lue venerea infectis, Cancro, Fistulis, & cunctis vlcerebus sordidis, puridis atque inueteratis, sine intrinsecus, sine extrinsecus adhibeatur.

N. *Sic quoque figitur per ☿☿, si-*

xúmque per Ψ dicto modo in mucosam pinguedinem abit : quæ si ex arena gradatim destilletur igne fortissimo , lateum humorem sudat , digere hunc ac destilla , accipiesque $\odot\odot$ candidum & suave.

Vires. *V*sus eius tum internus est ad Renes exulceratos atque calculum , tum externus ad ulcera.

4. Alius, $\odot\odot$ $\Phi\eta$, diaphoreticum dulce.

R. Φ ti, puriss. q. v. tere. & soive, p. d. super tabulis ferreis stanno obductis. Liquori affundatur Ψ , fiat destillari , cohobis toties repetitis , donec Ψ acessere incipiat. Tandem abstrahere leniter Ψ , manebitque in fundo $\odot\odot$ Mercurii dulce. Hartmann. in pract.

Dosis à g. 2. ad 6.

N. *A*ij pellunt igne fortiori ex arena , nanciscunturque lacteum liquorem , qui rectificatus per \odot m euadit fragrantissimus sine corrosione. Vide supra in destillatis.

5. Liquor Φ Ionialis.

R. Φ crud. \mathcal{Z} is ana \mathcal{Z} ij. F. $\alpha\alpha\alpha$. Huic adde Mercurij aliquoties sublimati \mathcal{Z} iv. Trita soluantur per deliq. Liquorem digere cum Ψ per mensem. Postea abstrahere Ψ in Δ e lenissimo in MB ne $\odot\odot$ simul ascendat. F.

cohobatio quater vel quinques. Ultimo remanebit in fundo $\odot\odot$ Φ \mathcal{Z} iale.

Vires. Potest adhiberi intrinsecus & extrinsecus.

Dosis g. 2. ad 6.

6. Liquor Φ Ω ti.

Sublima Φ ti \mathcal{Z} j. cum ana \ast ci adde Ψ , ad eminentiam 3. digitorum , digere simul per 6. \odot & per \odot pelle. Post Ψ egredietur Oleum , quod in frigido coagulabitur in massam albam , quæ in cella posita resoluetur in liquorem \odot em dissoluentem , eumque in volatilitatem adducentem.

Ex S. Gloss.

VII. SALICATIO

R. Corpus ex præparatione $\odot\odot$ Φ i fragrantis residuum (vide supra) affunde idem illud $\odot\odot$ fragrans , digereque & extrahetur sal Φ . Extractioni decantatæ , affunde Ψ quantitatem bonam , demum abstrahere Ψ in cinere , & ascendet post Ψ & $\odot\odot$ Φ ii relicto sale in fundo. Thold. ex Basil.

Vires. Summum est & efficacissimum arcanum in extirpanda Lue venerea , etiam radicata & inueterata , sanguinem mundificat , adeoque omnis generis ulceribus sine & cum malignitate coniunctis medetur , scabiei confert , impetigines sanat.

Dosis g. 1. ad 2. vel 3.

CAP. XVI.

De Cinnabari.

Cinnabaris duorum generum Officinis in usu est, factitia scilicet & nativa, siue mineralis. Factitiam descripsimus in sublimatione Mercurij. Nativa est terra mineralis lapidescens, rubicunda, constans ex ☿e & ☿io viuo cum terrestri materia instar lapidis, compactis. Germ. Zinober.

N. Dioscoridi dicitur Minium: quippe ex Minio Mercurium viuum elici, affirmat. Nec obstat, quod contrarium verbotenens dicat, nimirum suam Cinnabarim à Minio diuersissimam esse; Et enim, quid Dioscoridis Cinnabaris fuerit, nondum certo constat. Sunt enim qui sanguinem Draconis intelligunt, alij Minium Officinarum ex plumbo factum.

Reperitur in diuersis Europæ locis, in Vngaria, Germaniæque locis variis; Prope Alsheimium Palatinarus, &c. Modusque ☿m inde eliciendi, vel rusticis non ignotus est. Ollam cinnabari implent, eamque ollæ alteri, interposita pertusa lamina ferrea, ore conuerso imponunt, lutoque circumlito, vi ignis circularis Mercurium viuum ex olla superiori in inferiorem defluere faciunt, ad modum quo destillatio per descensum dicta perficitur.

Eligenda quæ grauida Mercurio & ☿e præstantioribus, adeoque Vngarica, vtpote quæ naturæ solaris.

Vire. *Vsus eius internus, præterquam quod Antiepilepticis nonnunquam*

permixta deprehenditur, quod sciam nullus est. Extrinsecus autem adhiberi potest ad sanandam Luem veneream, scabiemq; aliam, (in suffimentis, &c.)

PRÆPARATA.

Præcipitatus Diaphoreticus Hartmanni.

1. Cinnabaris soluatur in sua principia.
2. Principia illa purificata de nouo coniungantur, reducanturque in puluerem.

Processum Hartmannus satis prolixum exhibet, in fine Commentariorum in Croll.

Hunc breuioribus sic habet.

Solue sensim Cinnabarim, (Vngaricam,) in magna quantitate. ☿is supra ☿ ana Δ fortissimo cohobari: (coloris hic erit rubicundissimi,) Solutionem à ☿e combustibili supernatante, vt & à fecibus residentibus separatam destilla ex cucurbita in ☿, & extillabit menstruum principis Cinnabaris in cucurbita relictis, quæ hac operatione apta reddita separationi: Abstracto igitur menstruo, Δque aucto, Mercurius albißimus ascendens lateribus cucurbitæ adhærescet, manentibus in fundo ☿e & ☿. Collige Mercurium dictum seorsim, purificaque quàm optime, videlicet.

1. Soluetur ☿ ebulliendo in ☿ hinc

hinc solutio à fecibus suis decupelata committatur destillationi, vt ☒ abstrahatur.

2. Procede eadem ratione cum Mercurio remanente, adhibeque loco ☒ pluuiam vel rorem majalem stillatit. idque 3. vel 4. donec nimirum ☒ plane albissimus remanserit. Hunc digere cum V rectificatiss. per mensuram.

Interea separa reliqua principia, (☐ & ☉) & clarifica. Nimirum ☉ elixiuierur, s. a. affusâ ∇ pluuiâ stillatit. calida, depuratūque digeratur cum V, tandem V ad apparentiam cuticulæ supernatantis abstracto sinatur coagulari.

☐ Idem aliquoties cum ∇ stillatit. calida, lotum & exiccatum, simili modo cum V digere, eundemque postea abstrahere.

Posteaquam itaque Mercurius, in V sufficienter fuerit digestus & solutus, (rubescit enim totum illud compositum eleganter,) destilla ex ☉ in Excip. capaciss. ∇ ☒ gradatim adhibito, elicéque primo V, hinc vrge, & prodibit ☑ Mercurij (hinc inde sese extendens & sublimans instar Crystalli.) Peracta destillatione relinque per ☒ viginti quatuor. Sic soluetur ☑ Mercurij Crystallifatus; in V. Separato tandem V in MB, remanet ☑ Mercurij in fundo cinerice coloris.

Habitis his principiis, ad coniunctionem progredere.

Solue Cinnab. Vngaric. ʒvi. ☑.

☉ is cum ☒ acuato vt supra, sequestratissime fecibus solutionem decantatam destilla ad oleositatem: hinc affunde recentem ☑m, vicissimque destilla, idque fac 5. vel 6. vicibus. Postea digere in MB. ☒ (14.) Tandem abstrahere ☐ donec ☑ al-bicantes prodire inceperint, tunc mutato Excip. cape eos simul cum ∇, vrgeque ∇m, vsque ad ignitionem vas, ☑m hanc serua. In huius vā ʒvi. solue ☉ suprafacti ʒij. ac circula aliquandiu in MB. Postea imprægna ☐ is ʒß. ∇ illa, in qua ☉ solutum, idque per vices, (semper affundendo ʒiß.) donec ☉ is ʒj. cum ☐ e fuerit copulata (ex pondere id cognoscere licet,) ac ex ambobus factus sit viscosus quidam liquor. Huius ʒß. adde ʒij. ☑. Mercurij supra præparati, inque Phiola H. cl. digere in Athanore, prudenter adhibitis ☐ gradibus, donec omnia in puluerem rubicundum fuerint versa, id fiet mensib. trib. vel quatuor. Puluerem hunc corrige cum V & serua.

Vires. Est Medicina vniuersalis, in quolibet morbo exhiberi idonea, balsamum internum ad expellendum intro hostem, vel per vomitum, vel per aluum, vel per sudores mirifice adiuuans. Dosis g. i. vel 2.

C P A. XVII.

De Antimonio.

Antimonium est corpus minerale, naturæ Metallinæ finitimum.

Constans i. ex ☿e minerali, partim purissimo naturæ solaris, eoque in rubedine fundato, partim combustibili, (instar alterius ☿is.)

2. Ex copioso Mercurio metallico indigesto, fuliginoso, (coagulato tamen magisque cocto, quam est Hydrargyrum,) participante de natura Hnina.

Et 3. ex substantia quadam terrestri & salina perpauca.

N. *Quod in Officinis prostat, liquefactione ex minera est fusum, inque formas pyramidales ut plurimum effusum. Minera quoque etsi interdum proster venalis, attamen rara est.*

Dicitur Hebraicè Zadadah. Græcè *στυμν*, *στειν*. Arabicè Aitmad seu Atimad. Latinè Stibium, Antimonium. Germ. *Spießglasz*, *Ravv'spießglasz*. Barbar. Antistini, Alcofol Othi. Ænigmatice Lupus; quod scilicet omnia metalla præter Solem absumat. Proteus, quod omnes colores Vulcani beneficio induat. Radix metallorum quod omnibus metallis q. adiaceat vel quod à nonnullis minera statuatur metallorum. Saturnus Philosophorum à deuorando. tùm quod H_i, id est, Plumbi naturam redoleat, tùm quoque quod lapidem Philosophorum inde parare somnient. Magnesia H_i, eadem ratione.

Delectus.

Variis in Regionibus eruitur ☿. Nostrique Germania eius vbertatem passim præbet. Maximè tamen laudatur Vngaricum & Transsylvanum, utpote quod ☿e puriori dotatum, aurique minera imbutum est. Striis id splendidioribus & longioribus, obscuraque rubedine, (quæ bonitatem eius arguit ob ☿is abundantiam,) reperitur. Huius nimirum meminit Paracelsus sub titulo rubentis Leonis, & Basilii Monachus in Curru triumphali, sub Orientalis nomine. Et hoc maximè ad Medicamentorum elaborationes eligendum est.

Artifices insuper variis modis bonitatem Antimonij explorant. Quidam Chartæ luteo colore in Pharmacopoliis tinctæ, dentèque apti rite læuigatæ id affricant, certitudinisque notam, rubram lituram, inductione illa post se relictam statuunt: Alij fortissimo aceti ℞u drachmas aliquot, benè puluerisati Antimonij imbibunt, inque lamella ferrea vel figulina ad lentum ignem, ne ☿ fluat, euaporare sinunt: quod si post euaporationem puluis Antimonij rubens relinquatur, vltèrius de eius certitudine non dubitant. *Vide Basilic. Antimonij Philippi Moltheri, qui se Hammerum vocat.*

Vires. De viribus Antimonij audiamus Quercetan. in tetrad. cap. 51. In Antimonio, inquit, sunt sexcenta pro-

prietates, varia ac prestantes, ut prap-
rantes, expurgantes, vomitiones conci-
tantes, & id genus alia, ut nunquam sa-
tis laudari queat hoc Medicamentum.
Crudo attribuerunt Veteres vim adstrin-
gendi, exiccandi, meatus corporis ob-
struendi, excrementias carnis absumen-
di, cicatrices obducendi, oculorum vlce-
ra & sordes mundificandi, unde & ad
Collyria imprimis commendatur. Sunt &
qui ad Epilepsiam arcendam exhibent,
etiam in ipso paroxysmo.

PRÆPARATA.

Præparationes quibus ♂ subiicitur
sunt. 1. Calcinatio. 2. Sublimatio. 3. De-
stillatio. 4. Liquatio. 5. Extractio. 6. In-
fusio. 7. Salificatio. 8. Mercurificatio.

Calcinatio est tum sicca, tum hu-
mida.

1. CALCINATIO SICCA.

Unde

1. Vitrea, 2. Croci, 3. Diaphoretica,
4. Reguli.

I. VITRA ANTIMONII.

1. Vitrum Antimonij Hyacinthinum.

℞. ♂ puluer. calcinetur in vase fi-
gulino amplo ac lato non vitreato con-
tinuò scil. materiam rudiculâ mōuen-
do, ne concreseat, quod si id præter
spem euenerit, denuo puluerisare opor-
tet. Deducendus est hic labor Δ que
augendus, vel in tantum, ut vas pau-
latim igniatur, materiâque cinereum
feu griseum acquirat colorem, nec fu-
mum, (à quo diligenter cauendum.)
amplius omittat.

N. Ex hac calce sit diaphoreticum
laudabile ac singulare pestis præserua-
rium. Si ulterius in + igniatur, ut ex

albescente colore fiat puluis ad fluedi-
nem inclinans.

Dosis g. 8. infusa in vino, datur cum
succo calendulae.

Calx illa in + benè & satis fusa,
(quod immisso stylo ferreo experiri li-
cet,) effundatur in tabulâ lapideam, vel
peluim æneam, ut in vitrum abeat. Vi-
trum si adhuc nigrum ac opacum fue-
rit, reiteranda est fusio, donec pelluci-
dum ac hyacinthinum colorem nan-
ciscatur, in qua fusione aliquid Anti-
monij crudi Matthiolus admiscet.
Sed vereor ne pelluciditatem deprauet
Vide Basilium in curru triumphali
Antimonij.

N. 1. Calcinationem maturandi gra-
tia licet ♂ dimidium (vel ana) addere,
id quod post absolutam calcinationem
aqua feruente & dein X insuper affuso
ablendum.

2. Fusionem ut promoueas Borracem
addere potes, nempe ad. ℞. 1. Borrac. 3℞.
nec est quod inde periculum metuas:
Etenim posthabito, quod Borrax exha-
let, constat quod Borrax sine noxa intro
ad 3℞. exhibeatur.

3. Tempus vitrificandi eligunt non-
nulli, quo ☉ & ☾ in ♀ vel X (signis
aqueis) existunt.

4. Accenseri potest vitrificationi &
illa operatio, qua ♂ leni opera ignis, vi-
triformans, licet absque perspicuitate in-
duat, ♂io scil. in + bulo liquato intin-
guntur ferrei baculi, decurriturque quic-
quid adhaeserit, atque hac ratione totum
♂ extrahitur. Extractum & contu-
sum denuo liquatur, extrahiturque ut
ante, idque toties, donec ♂ optimè pul-
uerisatum rubicundo-purpureum colo-
rem acquirat.

Dosis & usus cum simplici vitro com-
munis est.

Rectius

Rectius tamen **℞** *u* **℞** *is*, **⊕** *i*, vel proprio aceto aliquoties cohobatum, ut euanescente purpureo colore, albicans euaserit, exhibetur. Valde enim eius vis emetica hac correctione emendatur, ut solam per aluum deturbandi vim potestea obtineat. Verum febrinum curatiuum.

Dosis g. 3. ad 5. in ∇ centaury. min. vel simili, *Molth.*

2. *Vitrum ex Minera.*

℞. Mineræ **⊕** opt **⊕** purissima calcinentur optimè ac fundantur in vitrum. *Casil.*

3. *Vitrum Antimonij flauum.*

Fit ex Regulo. *Vide suo loco.*

4. *Vitrum Antimonij rubeum.*

NB. Si vitrum antimonij miscueris cum \neq citrino, ac fuderis in vitrum, hoc ipsum rubescit. Alij fundunt cum \ominus , sed præstat ab hoc abstinuisse.

5. *Vitrum album.*

℞. Antimonij. p. i. Borracis, p. ij. vel iv funde aliquandiu, sic assumit primo colorem citrinum, postea album. Effunde vt in vitrum abeat. *Basil.*

Vires. *Vitrum Antimonij humores crassos, viscidósque eiicit, in ventriculo vicinísque locis superfluos, idque per vomitum ac per aluum. Resistit quoque venenis in peste, præcipuè si cum + propinetur, quippe hac ratione & sudorem ciat: utile quoque est in febribus putridis ac malignis, Hydrope, &c.*

Vfus & Dosis. Datur à g. 2. ad 4. in infusione à g. 3. ad 6. vide de hac infusione infra.

6. *Vitrum ⚫ nigrum extemporaneum*
S. *Closs.*

℞ mineræ **⊕** ij z ij. Liquefcat in + rum iniice per cochlearia aliquid de mixturâ ex **⊕** decrepit **⊕** & **⊕** **⊕** communis compositâ anna z ij. absun-

ptis puluer. effundatur **⊕** in peluim aut mortarium calens. Habebis vitrum nigrum purificandis metallis aptiss. Si hni z ß. addatur, repurgabit **⊕** instar Reguli z ij.

7. *Vitrum Animonij Diaphoreticum.*

Vitrum z ij Diaphoreticum euadit, si pulueratum sæpè maceretur cum \times sæpèque fundatur. *Liban. lib. 2. Alch. tract. 1. c. 23.*

8. *Vitrum Regulinum.*

Calcina Regulum puluerisatum, (continuo agitando, ne fundatur,) donec fumus cesset, hinc funde & effunde. Sic in vitrum euadet quàm elegantissimum.

N. Si **⊕**lem addideris, citrinescet vitrum.

Huius dosis maior exhiberi potest quam precedentium.

9. *Vitrum Antimonij Solare, Ⓞ*
transparens.

℞. **⊕** puriss. z ß. **⊕** Vngar. z viii. Funde ad Δ , ac effunde (cauendo ne in Regulum abeat) mixtum puluerisatam calcina per se (vt calcinatur **⊕** in præparat. vitri,) donec non amplius fumi- get. Deinde funde fortiss Δ , effundèque in peluim, vt abeat in vitrum transparens rubicundum.

N. Inuenies in fundo + buli **Ⓞ** dimidia parte diminutum.

Hartm. in Croll. Kest. 3. c. 30.

Ex hoc fit infusio cum **V**, quam Tincturam vocant.

10. *Aliud ex Regulo.*

℞. **⊕** opt. z ß. Regul. z viii. Fundantur, pulueriscentur ac calcinentur sine fusione, donec fumus cesset. Dein liquefcant ∇ fortiss. effundanturque vt vitrescant.

N. Huic calcinationi finitima est
Z z 2 *calci*

calcinatio Antimonij crudi, cum C.C. vsto. Nimirum leuigantur simul optime $\frac{1}{2}$ & C.C. vstum, proportionem anatica. Hinc committuntur igni, ut calcinentur.

Vires. Sudores prolicet.

Dosis gran. a 3. ad 5. vel 6.

Quoniam Vitra $\frac{1}{2}$ ij violentius ut plurimum operationes suas proficere, adeoque corpus anxie affligere solent, diuersæ institutæ sunt correctiones, quibus violentia ea aliquo modo infringi mitigarique queat; ideoque.

2. Corrigitur vitrum Antimonij.

Correct. 1.

R. Vitrum antimonij teratur subtiliter, aliquotiesque affundatur $\frac{1}{2}$ atque iterum exiccetur. Hinc fit Electuarium Antimoniale, seu Pilulæ Antimoniales Crolli. Vide lib. 2.

Correct. 2.

R. Vitrum $\frac{1}{2}$, digeratur aliquandiu in $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ is extractioni decantatæ, affunde $\frac{1}{2}$ commun. ac residuum $\frac{1}{2}$ sine violentia vomitum ac secessum ciens.

Dosis g. 2. 3. ad 6. Clariss. Dn. D. Petrus de Spina.

Correct. 3.

R. Vitrum $\frac{1}{2}$, q. v. solue in $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ i, per deliq. solutioni instilla $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ i, ac concresecit illico CrySTALLI exiccandi.

Dosis g. 3. 4.

Correct. 4.

Vitrum $\frac{1}{2}$ purgans.

R. Vitri $\frac{1}{2}$. pulv. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$ vel $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ i, (vel $\frac{1}{2}$ per camp.) $\frac{1}{2}$ ij. Misc. exactè ac exicca lento Δ . Reperatur id septies vel vltra, semper $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ij. admiscendo.

N. 1. Præstantior sit hic pulvis, si in

extracto Mastich. [ex Mastich. & $\frac{1}{2}$] per $\frac{1}{2}$ 3. maceretur, ac $\frac{1}{2}$ post modum desuper accendatur, penitusque exhalet. Pulvis residuus l. Δ cinerum in patella vitrea (horis 12.) exiccetur.

Vires. Purgat per inferiora.

Dosis a gr. 3. ad 5.

N. 2. Si pulueris huius $\frac{1}{2}$ ij. vel pulueris prioris non macerati. $\frac{1}{2}$ ij. in Electuario Antimonij Crolliano, vitro ibidem substituantur, præstantius id ipsum euadet.

N. 3. Fiunt C. inde Pilulæ Antimoniales ad Febres. Hartmann. vide libro 2.

Correct. 5.

5. Fit per separationem $\frac{1}{2}$ is $\frac{1}{2}$ ocalis. Vide in infusionem $\frac{1}{2}$ bened. Brendelij.

Correct. 1.

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ i purgans.

R. Vitrum $\frac{1}{2}$ pulu. q. v. affunde $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ i non rectific. ad eminent. duorum digitorum. Digerantur aliquandiu calore leni, sic fit Extractio nigropunicea.

Vires. Purgat per inferiora.

Dosis gut. 6. 7. 8. 9. 10.

Hartmann. in Croll.

N. 1. Eodem modo corrigi potest per $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ vel + proprium.

N. 2. Ex Tincturâ illa nigropuniceâ (si per $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ li extractâ) paratur $\frac{1}{2}$ album $\frac{1}{2}$ iatam purgans, quippe virtute $\frac{1}{2}$ ali impregnatum, affundendo ei duplum olei $\frac{1}{2}$ coagulumque siccando.

II. CROCI Metallorum.

1. Crocus Metallorum vulg.

R. $\frac{1}{2}$ ij Electi, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ an. sigillatim trita atque exactè m. in flammatur in +, vel mortario æneo, remanebit materia ob colorem hepaticum haud dissimili

diffimilem, Hepar $\ddot{\gamma}$ dicta. Hæc edulcorata ∇ calida, dicitur Crocus Metallorum.

N. 1. Si ∇ a, in qua Hepar $\ddot{\gamma}$ edulcoratum, acetum instillaris; precipitem dabis Crocum subtiliorem, seu ut aliis placet, auratum .

N. 2. Inflammato (quam & detonationem vocant) fieri commodius poterit, si materiam paulatim ac per vices inieceris, primæque vice vel carbone viuo, vel ferro ignito materiam incenderis.

N. 3. Ex ∇ edulcorationibus illis imprægnatâ si aliquantulum enaporauerit, Crystallus (i vel lapidem Prunella $\ddot{\gamma}$ dialem colligere potes, cuius usus idem qui lapidis Prunella dicti: Exhibet itidem insigne causticum.

N. 4. Sunt qui \bigcirc ac $\ddot{\gamma}$ inclusa, crucibulo comburunt, reliquo solo foramine, Combusta coniciunt in ∇ calidam, ut imprægnetur. Hinc decantant atque insperso $+$ precipitant. Sic Crocum Metallorum nanciscuntur subtiliorem, magis fixum, quem ulterius in ∇ macerant.

2. Crocus Metallorum Rulandi.

Crocus Metallorum Rulandi quifnam sit & quomodo conficiatur? varîe agitur. 1. Quercetanus ferè in opinione est, Crocum illum Rulandi non esse diuersum à Croco Metallorum vulgari: Hartmannus ab hoc non nisi leui discrimine distat, quod in præparatione situm est: nempe \bigcirc fluenti & ab Δ remoto, sine inflammatione admiscet $\ddot{\gamma}$ spatula ferrea continuo agitando, donec omnia probè sint mixta, quæ tandem accendit.

N. Si quæ inflammatio acciderit, subsiste, iustam \bigcirc refrigerationem expectans.

2. Tentzelius in sua Exegesi ex Libanio hunc præfert, quem & Atylius in Basilica Chym. pro sacro habet.

R. $\ddot{\gamma}$. \bigcirc ac $\ddot{\gamma}$.

Minutissimè secundum trita indantur catino, luto probè munito, (foramine tamun paruulo, in media summitate, spiritum arsenicum et halandorum, gratiâ, dicto:) in sternum anemium collocentur. Δ e folium, si libet, adhibito, donec omnia sufficienter fluant, tandem continuando quamdiu fumus per foramen prorumpere non desinit. Quando vero defuerit, Δ m probe ad $\frac{1}{4}$ horæ adauge, dein eximè ubi $\ddot{\gamma}$ forma vitri cinna-berini in fundo a salib. supereminentibus instar Reguli à scoriis sequestratum sese, malleo faciliè detrucandum atque terendum dabit. Vide Hartm. diss. Chymiatrico-Medicas.

N. Eiusdem cum superiori est usus, nisi quod deorsum colluuiem vitiosorum humorum deturbare potissimum solet.

3. Brendelius Vitrum Antimonij pro Croco Metallorum Rulandi venditat.

4. Alij Regulum, quippe qui nunquam, vel sponte sua in præparatione vitri $\ddot{\gamma}$ in globulos paruos abit. Sit ut sit: quodlibet horum haud citra magnam vtilitatem in usum Medicum vocari aptum est.

Vires. Viriusque Crocidem esse poterit usus. N mirum in doloribus capitis ab impuritate ventriculi, (qua non raro concitantur,) Epilepsia, pleuride, Melancholia Hypochondriaca, Febr. tum continuis, (ac præcipuè Hungarica dicta,) tum intermittentib. In peste, præseruatione ab Arthritide, coagulatione sanguinis, &c. In quibus omnibus cum conuenienti ∇ a exhibitus purgat per vo-

mitum, ac nonnunquam per secessum.

Vsus præterea eius insignis est in Clysterib. Nimirum ℞. vel ℥j. ebullire finitur, in aqua convenienti vel vino: Colatura admiscetur brodio vel decocto simplicium mollientium, optimūque Medicamentum in colica exhibet.

Dosis interna est à g. 3. ad ℥℥. Ego vix 6. gr. transcendendo.

Crocus ♂ ij Regulatus.

Fluat Regulus ♂ ij cum pari pondere ☉, fusaque materia remotis scoriis in lateribus eluatur à nitrosâ falsedine, postea exiccetur, & cum affusione ♀ aliquoties humectetur & decantratur. Ex comm. Greg. Horstij.

Vires. Longò minus per vomitum, magis vero per aluum moue, ad gr. x. cum Zibebis laxat. tribus exhibetur, vel cum diagrid. correcto per fenum ☿ & ♀o dulci.

III. DIAPHORETICA.

1. ♂ Diaphoreticum vulgare.

℞. ♂ ij opt. ☉ pur. ā. Exactè mixta calcinentur detonatione, [vt in Croco Metallorum vulg. dictum,] ternâ, seu donec amplius detonationem recuset, (post singulas detonationes materiam edulcorare oportet, edulcoratūque & exiccatum de uuo cum ☉ ann. miscere.) Tandem ♂ium diaphoreticum candidissimum exicca pro vsu.

N. ♀ illa edulcoratoria si enaporet, reddit Lapid. Prunellæ ♂ialem, de quo in ☽.

Modus compendiosior.

℞. 1. ♂ crud. ☉ puri ān. Immitte in + cui aliud + inuersum in fundo perforatum imponatur, luto inferiori + o annexum: ignem da circularem, quo materia accensâ paulatim calcine-

tur, fumūque per foramen expiret ignem per horam continua, qua præterlapsâ, materiam puluerisatam ♀ calida edulcora.

2. ℞. Materiæ huius edulcoratæ part. ij. ☉ puri p. i. vel ana. impone crucibulis, vt in priori operatione:

N. Sic ♂ diaphoreticum præparari aliquoties sine vlla molestia sudorem mouens.

Alij ☉ non abluunt, sed massam tritam cum pondere æquali ☉i vt ante miscent: alij addunt ♀, vel ☿ is ¼ miscent.

Basilius circulat insuper hoc ♂ diaphoret cum ♀. quem dein desuper incendit, &c. dein reuerberat, atque puluerem restitantiem per deliq. resoluit.

Vires. ♂ hoc diaphoreticum resistit corruptioni, mundificat sanguinem, conducit aduersus omnes obstructions licet inueteratas, Hepatis, Lienis, Mesenterij, aliarumque partium internarum: aduersus retentionem mensum, cachexiam virginum, Hydropem, Melanchol. hypochondriacam, Luem ♂, ulcera tam interna, quàm externa, Scabiem: præsertim confert & in febr. malignis, Exanthematib. & variolis, rumpit interna apostemata, verum non subito, sed paulatim operationes suas exerit.

Dosis à g. 10. ad 25.

2. Flores ♂ ij fixi, seu ♂ diaphoreticum.

Fit si ♂ diaphoreticum præcedens in ♀ horis aliquot coquatur, decoctūque filtretur, sic præcipitabitur nempe pulvis subtilissimus ad fundum (maximè si ✕ insperferis) virtute priorum superans.

N. Hic pulvis Basilio Valentino in currū suo triumph. dicitur Flores ♂ ij fixi, seu pulvis albus ♂ ij, quem commendas

mendat ad intericra apostemata, vt & in Lueuereasin qua cum spiritu Guajaci exhiberi poterit.

Præterea in iisdem affectibus conuenit præcedens diaphoreticum, puluis hic maiori cum utilitate exhiberi aptus est.

Dosis g. i s. quam dosin vel quinquies Valentinus singulis diebus exhibet.

3. \odot Diaphoreticum \boxplus risatum.

Flores \odot ij \boxplus sati, F.F.

R. \odot . Diaphoret. vulgar. Sal. \boxplus z iij. M. fluant in tigillo hor. 4. dein tere ac dissolue per deliq.

Hinc

R. Olei huius z ij. spir. \odot i z j. instilla guttatim & præcipitabitur puluis, quem sicca & serua.

Dosis à g. s. ad 10.

IV. REGVLI.

1. Regulus Antimonij simplex.

1.

R. \odot i ac \boxplus iana, calcinentur seu fluant in + viigni.

R. Materiæ huius calcinatæ, ac Antimonij ana misce ac committe iterum in + igni fortissimo, quo instar aquæ fluant.

Funde postea in calicem fusorium vel mortarium æneum seuo illitum, idque mouendo, Reguli separationem & subsidendam promoue. Omnibus refrigeratis Regulum à Scoriis separa.

2.

R. Antimonij elect lb . ij \boxplus i lb . iv. Fundatur \odot & postea adiciatur paulatim \boxplus lb iij. circiter, linguatur in fluxu per tempus. Dein fac Regulum, separaque Scorias. Regulum purifica, iterum fundendo, & dum fluit, re-

liquum \boxplus i addendo.

3.

R. Calcem Antimonij cineream per se factam, (vide in præparatione vitri \odot) fluat ad Δ z integra, dein moueatur ab igne & reponatur vt refrigescat. Agiterurque refrigerando, vt Regulus deorsum vergat ad fundum secedens.

N. 1. Alij admiscendo carbones pulverisatos maiorem Reguli quantitatem sibi pollicentur.

N. 2. Ex Scoriis fit \boxplus auratum; vide suo loco.

N. 3. Regulus quomodo fixetur; vide de floribus \boxplus vel in destillatione \curvearrowright Reguli.

N. 4. Tempus fusionis optimum censetur, (crescente præsertim \odot e in \odot constituto, atque insuper sereno Cælo. Experientia enim docuit tunc temporis maiore felicitate Stella fusionem succedere.

2. Regulus \odot alis.

R. \odot . z ix. circiter, apponeigni donec incipiat liquefcere. Huic adde Antimonij z vi i i. auge ignem vt fluant. Postea iniice \odot M. l. & cum cessauerit strepitus, funde in vaginam fusoriam, (Gieszpouckel,) vel in mortarium, sic \odot & Regulus simul vnici in fundo coalescent.

Fit & si in secunda fluxione, \odot is limaturam vel frustra inieceris.

N. 1. Regulus hic si aliquoties fundatur (in quibus fusionibus semper aliquid \odot vel \odot \boxplus i iniiciendum,) & à scoriis separetur, tandem stellam contrahit, solis radiantis instar, imo vel multis stellis ac si terra aquis circumdata esset Regulum signatum vidi.

N. 2. Plures regulum preparandi modos habet Sennertus in Institut. lib. 5.

lib. 5. p. 3. sect. 3. cap. 10.

N. 3. Ex Scoriiis fieri potest vitrum.
Sala.

N. 4. Si Regulum in Ω u \varnothing solue-
ris, solutionemque aliquoties maceraueris
ac destillaueris, tandemque inspissaueris,
optimum habebis catharticum $\alpha\gamma\omega$ $\epsilon\gamma$ $\kappa\alpha\tau\omicron$
blande noxia expellens.

Dosis gran. 2. 3.

Tentzel. de Ω u \varnothing .

Vide sis etiam Tincturam ex Regulo
 σ & \varnothing .

3. Regulus Ionialis.

Fieri potest, si Regulum sine σ fa-
ctum, denuo ad ignem fuderis, duran-
teque fusione Δ adieceris.

4. Regulus Solaris.

R. \odot part. 1. σ p. iv. vel vi. fun-
dantur & effundantur vt moris in Re-
gulum à scoriiis separandum. Scorias
adiecto σ io crudo, funde iterum su-
periniiciendo cum fluxerint parum de
scobe σ ac effundendo denuo, vt Re-
gulus subsideat. Sic potes vice tertia
procedere, vel donec nihil amplius
Reguli appareat.

N. Similiter fit & Regulus Caris.

5. Diaphoreticum Regulinum seu Cerussa
 σ ialis, & exinde Cerussa σ ialis
diaphoretica.

R. Reguli p. 1. Δ i Crystall. p. iij. [alij
a η fluant super carbones per γ m,
dein edulcora, separando Reguli grum-
mos, qui in fundo colliguntur. Pulvis
l. Δ . exiccatus dicitur cerussa σ ialis.
Hunc puluerem si denuo cum \odot cal-
cinaueris, vel sine fusione ad citrinum
colorem reuerberaueris, planè fit dia-
phoreticus, diciturque cerussa diapho-
retica.

Vires. Cerussa Intrinsecus maxima
cum utilitate assumi potest in curatione
ulcerum inueteratorum, scabierum aut

pustularum pertinacium, continuis 3. 4.
aut pluribus septimanis, quotidie scil.
assumendo. Diuersimodè operari consue-
uit. Nam in quibusdam duabus vel tri-
bus primis diebus nauseam aliquam
producere solet, cum crebra expuitione,
reliquo tempore insensibiliter operatur:
Aliis aluum laxat moderatè, aliis su-
dorem ciet, aliis prorsus insensibiliter
& non nisi in fine tandem manifestas
operationes edit. Extrinsecus desiccatur,
stringitque, moderatè abstergit &
aperit.

Dosis intro $\theta\beta$. ad $\gamma\beta$. 4. aut 5. hor.
ante prandium.

Cerussa Antimonij diaphoretica citra
nauseam easdem operationes, & quidem
maiori cum fructu operatur.

Dosis eadem. Vide Salam in Anat.
Antimonij.

6. Cerussa Antimonij Solaris.

R. Regul. Antimonij $\gamma\beta$. \odot purg. $\gamma\beta$.
 \odot i $\gamma\beta$ iij. calcinentur in +bulo sine
fusione. Sic Regulus abit in puluerem
citrinum, \odot vero pondere irrimutus
inuenietur. Puluerem edulcoratum, si
libet, denuo calcina.

Vires. Sudorem ciet.

N. Curiositas humana adinuenit quo-
que calcinationem per calorem Solis
Cælestis, quem magicum appellant.

Nimirum:

Concentrentur radij Solares in σ
pulueris beneficio speculi incensorij, sic
breui tempore fumus ex σ ascendet.
Antimoniũque album euadet.

N. 1. Pondus Antimonij post calci-
nationem auctum potius, quam imminu-
tum deprehenditur.

N. 2. Flores Antimonij hac ra-
tione facilius calcinantur, quam σ cru-
dum.

CALCINATIO HUMIDA

Vnde

PRÆCIPITATA.

1. ♂ Rubeum fixum.

℞. Antimonij elect. q.v. affunde ∇ stent aliquandiu in digestionem, donec calx in fundo alba appareat. Postea abstrahē ∇ per destillationem, (vel decantationem,) vel & affundendo ∇ præcipita, calcemque elue ∇ tepida, donec ∇ non amplius sentiantur. Puluerem siccātū reuerbera in ⊕ clauso hor. 6. (♂ 3. Basil.) fietque rubeus.

N. Reuerberatio hac minori molestia in fornace figulina absolui poterit.

Vires Felicissimè purgat aque deorsum quā sursum, idque non tam natura sua, quā humoris biliosi circa ventriculum stabulantis; quinimo in nonnullis per diaphoresin operatur.

Dosis. 2. 3. 4. & plura.

Basilius decantat solutionem ∇, decantatam destillat ad siccitatem pulueris, cui affundit ∇ pluuiam: digeritque vt fiat extractio rubicunda; hanc iterum filtratam destillat ad siccitatem: Ex puluere rubeo remanente extrahit cum ✕ tincturam rubicundam, abiecti; fecibus albis, ✕ iterum abstrahit, pulueremque relictum reuerberat ♂ 3. postremo extrahit tincturam cum ∇, fecibus iridem reiectis; tandem abstrahit ∇ ad siccitatem.

Vires Summarum est virium in resoluendo cruore coagulato, inrumpendis A-postematibus, incuranda Lue venerea. Basil.

2. Præcipitatum vitrum.

Soluatur vitrum Antimonij in ∇ seu in ∇ vel in ☉ ☿ is, aut in ☿ u ☉ dein menstrui abstractione fiat præcipitatio.

N. 1. Ex præcipitato illo ♂ antequam reuerberetur, extrahi possunt ☿ & ☿ Antimonij, de quibus suis locis, Sala de ♂.

N. 2. Si Antimonio grosse contuso affuderis ∇, & resposueris aliquandiu, extrahetur ☿ Antimonij, partim supernatans, partim frustala Antimonij obducens. Hoc ☿ in lixio ☿ soluitur, si inibi decoquatur.

3. Præcipitatum Antimonij diaphoreticum.

℞. Croc. Metall. ℥ij. impone destillatorio vitreo oblongi colli, quod calenti ∆ immergatur, hinc affunde sensim ☿ m ☉ ℥xii. moueque sæpius ne ♂ fundo adhæreat. Conserua id calidum, donec ☿ ☉ non amplius labore, & ♂ redactum sit in puluerem album. Dein vase exactè clauso, digere in MB septiman. 4. aut 5. ac tandem separa ∇. ☉ in ☿, pulueremque spatula lignea agitando, exicca ad ∆, donec nullus amplius fumus exhalet. Hinc ablue & re-lue ∇ is cordialib.

Dosis à g. 4. ad. 2. Sala de ♂.

4. Præcipitatus Regulus ♂.

℞. Clor. Regul. ♂ (cum ✕ sublimat. & edulcoratos) solue in ∇ (ex ☉ & ✕ destillat.) digere ac tandem per iteratas cohobationes præcipita. Præcipitatum ablue & reuerbera vt ☿ ∇ separentur, continuo spatula ferrea agitando, donec acquirat colorem flauum. Quercet.

II. SVBLIMATIO.

Vnde

FLORES & CINNABARIS.

1. Flores Antimonij Crudi, vel minere Antimonialis.

℞. ♂ crudi triti, q.v. pone in cucurbitam fictilem, quæ in ☿ m ponatur
AAa satis

fatis profunde. Cucurbitæ adapta alem-
bicum cæcum vel rostratum cum exci-
pulo, aut si mauis connecte ollas ali-
quot (Num. iij. v. 1. vel plures, (sese in
vicem excipientes: Ignem gradatim
admoue, ne sit nimium fortis, nec de-
bilis nimis. Si enim fortior sit, fundi-
tur Antimonium, nec sublimatur, sin
vero debilior, non ascendunt flores.
Si rectè Δ mrexeris, colliges tripli-
ces flores, albos, flauos & rubros. *Sen.*
Instit. Phlegma antimonij in appositum
excipulum colligi poterit.

N. 1. Felicius ac compendiosius pro-
ceditur.

Primo, si cucurbita tubulum seu ca-
nalem in latere habeat, per quem \oint tri-
tum paulatim & per vices, (singulis ho-
ris parum.) in cucurbitam (gradatim
ignitam, iniciatur. Liquescit enim sta-
tim \oint , abitque ferè penitus in flores.

Secundo, si cucurbita oblique fornaci
imponatur, ut tubulus perpendiculariter
ascendat.

Tertio, si in anemio sublimatio insti-
tuatur, ac Antimonij ζ ij. Δ e ζ ij. ad-
misceantur. Alij admiscunt carbones
contusos, eliciuntque ¶ r, remanente in
fundo materia cærulea, in qua ¶ An-
timonij.

Quarto, alembici vertex foraminulo
sit peruius. Et hoc benè notandum est, ni-
si sine frustrari velis.

N. 2. Parari possunt & flores Anti-
moni per Om binis nostris ante scil. &
retro connexam, quorum rostrorum an-
tico apponitur excipulum amplum, per
posticum autem inflatur ventus, vapores
sen flores ab \oint eleuatos, in excipulum
deducens. *Kesl.* 1. cent. 31.

N. 3. Non è re foret, si excipulum fo-
ramen haberet canalè mæ, quo acidum
phlegma in aliud excipulum suppositum

desueneret. *Quinimo excipulum nisi per-
nium fuerit, foramine flatibus egres-
suris idoneo, in cassum laborabitur.*

2. Flores Reguli.

Ex Regulo eodem modo quo ex
 \oint crudo flores eleuari poterunt.

3. Flores cum additamento, f . compositi.

Ex \oint crudo, regulo & vitro.

R. Antimonij \ast an. misceantur
exactè & sublimentur per Δ m.

N. Sufficit alembicus sine ollis; ele-
uanturque flores rubei, qui ∇ a calida
edulcorati albescent.

Vires. Vomitus mouent, mitius ta-
men quam simplices flores.

Dosis g. 4. ad 6.

N. 1. Restituit horum florum vsus
Mamacos, Melancholicos, *Quarta-*
narios, vid. *Epist. tract.* 1. obseru. *Hor-*
stij annexas.

N. 2. Si \oint dulcis gr. 12. gr. 2. horum
flor. addideris, fortiterque simul contriue-
ris, ferè sine vomitu per secessum serosa
& biliosa educunt.

N. 3. Eodem modo fiunt & flores ex
Reguli & \ast , vel ex vitri \oint & \odot , aequal.
partib.

N. 4. Quod in summitate cucurbi-
ta inuenitur, adde fecibus in fundo reli-
ctis, additoque panxillo \odot sublimationem
repete, habebis flores flauos.

4. Aliter, Δ Antimonij secundum Basilium.

R. Antimonij opt. lb. 1. \ast ζ iv.
sublima: sublimato admisce antimo-
nij ζ v, sublima iterum: hinc edulcora
& habebis ¶ r combustibile. *Basil. in*
Cur. Tr. p. 217.

N. Sunt qui loco \odot . R. ¶ .

4. Flores \oint ¶ lati.

R. Florum antimonij rubeor. ζ iv.
Flor. ¶ , (sublimatorum ad perfectam
albedi

albedinem) ʒij. Colchotar. ʒxi i. mix-
ta; sublimentur ter, & habebis flores
rubicundissimos. *Quercetan. in Tetrad.*

N. *Basilius non addit* ☿.

6. Flores Reguli spiritu ☿ ac ☿is
imprægnati.

℞. Reguli stellat. atque ☼ [à ☿
ter; sublimat.] añ. sublima bis teruê,
hinc edulcora & exicca, tandem de-
nuò à colchotare teritiò eleua.

Vires. *Purgant blandè, conferuntque
ad omnes Febres intermittentes.*

Dosis aliquot gr. Querc in Tetr.

N. Flores hi cum ☿ sublimari, &
nondum ab eodem edulcorati, resoluuntur
in liquorem magnarum virium in
vulneribus Basil.

De vlu florum antimonij in ge-
nere notare expedit, quod sc. quoniam
violètos vomitus ferè proritant, optima
correctiōe opus habeant, sine qua non
facile ac tutum erit, eos in vsum Me-
dicum vocari.

*Sunt nihilominus qui exhibent g. 2.
ʒ. 4.*

Sit igitur.

Correctio florum Antimonij.

℞. Flor. Antimonij alb. ʒj ☉ ☿ i
☿u ☿ imprægnati ʒiʒ. Liquefcant
vi Δ in massam rubram. Affunde
massæ huic trita ☿ (☿ vitæ,) aro-
matifatum, additis Salis vel Magiste-
rij Perlarum ac Corallor. an. ʒij. Dige-
rantur calore cinerum ☿ ʒ2. postea
abstrahatur ☿ ad siccitatem, remane-
bit in fundo ☿ optimè depuratum,
seruetur in vitro clauso, quia in aère
resoluetur.

Vires. *Opitulantur morbis, ab atra-
bile oriundis, per aluum, per superiora,
per insensibilem respirationem noxia co-
piosè expurgantes.*

☉ ☿ i ☿ imprægnatur hoc modo.

℞. ☉ ☿ i [frequenti solutione ac
coagulatione summè depuratum,]
solue in ☿ Hinc abstrahe humidita-
tem lento igne, nouumque ☿ affun-
dendo, iterum solue ac abstrahe. Ope-
rationes solutionis ac abstractionis
reperendo, donec ☿ extillet aciditate
sua, non amplius spoliatum, (quod
octaua vel nona imbibitione ac de-
stillatione fiet) Exiccetur postmo-
dum; sic habes ☉ ☿ i impræгна-
tum.

N. *Huius vsus quoque est in Magi-
sterio ☿ i purgante.*

☿ aromatisatus, seu Δ vitæ
aromatifata.

℞. Galang.

Galliæ mosch.

Garyophyllor.

Cinamom.

Macer. an. ʒʒ.

Croc. ʒij.

Ex mediocriter tritis fit extractio
cum ☿ optimè rectificato, donec am-
plius non tingatur. Tinctura decanta-
ta est ☿ aromatisatus:

Vide de his Crollium.

Correct. 2.

Circulentur per mensem cum ☿
mellito, sic omnem deponunt violen-
tiam, retinebuntque solam deiciendi
facultatem.

Dosis à g. ʒ. ad 7. vel ad summum 10.

☿ mellitum.

☿ affundatur melli, stet aliquan-
diu, postea destillantur: In fine augea-
tur Δ, vt ☿ quoque mellis transeat
& iungatur ☿.

Correct. 3.

Exponantur flores in scutella vi-
treæ, charta supernè dumtaxat recta,
mediocri calori (fornacis) per men-
sem vnum ac alterum, quotidie bis

(ne non agitati nigrescant) agitando:
Flores maneant quidem rubei, sed ta-
men benè porosi & leues, ¶ re fœtido
ad papyrum eleuato.

Vires. *Mouent sedes duntaxat sine
vomitu satis benignè.*

Dosis à ʒ. ʒ. ad 8. vel 10.

Correct. 4.

Mitiores etiam fiunt, si aliquandiu
cum S conterantur & postea iterum
 ∇ dulci dulcorentur.

7. Flores Antimonij diaphoretici.

R . Flores J irriga O A is & cal-
cina + clauso Δ carbonum.

Sala in anat. Antimonij, f. 3.

N. Alij affundunt O m C i, quo
iterum abstracto edulcorant ac calci-
nant, ut materia igniatur.

8. Flores fixi.

Flores Cheiri Paracelso.

R . Flores Antimonij fige sublima-
tionibus, toties iteratis, donec nihil am-
plius sublimetur.

N. 1. Flores relictæ in fundo materia,
denuo in singulis sublimationibus semper
admiscendi sunt.

N. 2. Hi flores in cella per deliquium
in O soluntur, quod ∇ destillata
quinquies eluendum.

Fixantur flores hoc modo.

Formetur pila rotunda terrea cum
foramine, per illud immitte Ψ & re-
ple ad medias, postea immitte quo-
que Nodulum floribus J albis re-
pletum, tum circumcirca nouam Ψ
uiuam agglomera, ad plenitudinem vs-
que globuli integram, tum ostiolum
luto obducito, globulumque in furno
lateritio ad reuerberandum collocato,
& per biduum vrito.

Vires. Flores fixi clementius purgant
& sudores copiosos mouent.

Dos. gr. 8. ʒ. ʒ. Est S. Closs.

9. Cinnabaris Antim.

Fit, si post butyri Antimonialis de-
stillationem Δ fortis & suppressionis
quoque, i. e. super A m (horis aliquot
detur. Quippe cinnabaris Antimonij
hac ratione collo O x adhærescit,
quam collectam sublimatione vna ac
altera purificare poteris.

N. 1. Si desideras potius cinnabarim,
quam butyrum Antimonij, da statim Δ
fortem.

N. 2. Ex hac paratur H diaphoreti-
cus, qui in Epilepsia præstantissimus, Vi-
de lib. 2.

III. DESTILLATIO.

Vnde

ACETA, OLEA, SPIRITVS, &c.

1. Acetum Antimonij.

R . Mineram Antimonij tere ac eli-
ce H per O m , prolectum funde su-
per mineram nouam, digere S (2. 3.)
hinc destilla iterum per O m , idque
repete, donec quantitatem cupitam
acquisueris.

N. Parum H fundit, adeoque labor
sat radiosus est.

Aliter.

R . Miner. J læuigat. affunde ∇
pluuiæ destillat. ad eminent. digit. ali-
quot, digere vase H. cl. in fimo equi-
no, donec incipiant fermentari ac spu-
mam eiicere: Dein abstrahe ∇ m , au-
gendo ∇ m in fine, sublimatum redde
capiti suo mortuo, & reaffusa ∇ , quæ
abstracta erit, fiat cohobatio toties
reiteranda, donec prodeat liquor aci-
dus, instar +.

Vires. Inseruit Tinctura Antimonij
extrahende, refrigerat efficaciter sangui-
nem, in febris præcipue maligna & Pr-
garica, si cum Lap. Prunella & ∇ de-
stillata conueniente misceatur: curat
inflammationem expulnere nitrario or-
tam

tam cum saccharo hi.

N. 1. + hoc ☿ melius enadet, si puluerisata noua minera ☿ id affuderis ad emin. dig. 3. circulariterque (♂ 12) sic tingetur rubro colore magisque acetum effunde ☿ abstrahere per MB. sic + ☿ exhibet clarum ☿ rubedinem post se relinquet in fundo.

N. 2. Acuari potest hoc + suomet Sale. Nimirum.

℞. +. antimonij ꝑ iij. ☉ antiimonij ꝑ iij. solue ac destilla per E.

Dici poterit ✕ antimonij alkalisatum, siue radicum.

N. Felicius forsitan processeris, si Sal ☿ in + solueris atque ex argilla ☿ solutione hac massam ☿ exinde globulos formaueris, eosque per retortam, ut ☿ ☉ sollet, destillaueris.

Aliter.

Acetum ☿ ii in maiori copia obtinebis, si super cratem ferream mineram ☿ ii frustulatum imponas, superstructo Aludele cum pluribus ollis peruiis & ✕, subministrando carbonem in alia areâ focariâ accensos, ne acetum à carbonum vaporibus inquinetur.

Ex S. Closs.

N. Cum hoc aceto ☿ ali parari possunt flores fixi sine ☿ diaphoreticum de quo Poppus in Hodoget. pag. 145. ☿ sequent.

2. ☉ Antimonij per se.

℞. ☿ quantitatem satis magnam, pone in putrefactionem, dein educ ☿, quam vicissim affundendo, putrefactionem ac postea destillationem reitera, idque toties donec exurgat tandem ☉, seu liquor oleagineus.

N. Nanciseris potius + quam liquorem oleagineum.

Vires. Dissolvens est egregium. Poter

in Pharmacopœa.

3. Alteri.

℞. Miner. antimonij, q. v. misce cum arena, & pelle per ☉ m.

4. ☉ ☿ Saccharatum.

℞. ☿ lb. ss. Sacchar. cand. ꝑ iij. M. opt. & destillantur per ☉ m in arena F. ☉ ☉.

Beguinus.

℞. Atimonij, sacchari candi ana ꝑ iij. O vlt. ꝑ iij.

Vtile est ad externos ☿ internos morbos.

N. Ex hoc ☉ ☉ fiunt Pilulæ febriles ad quartanam, quas vide. l. 2.

5. ☉ ☿ Saccharatum Sennerti.

℞. Antimonij lb. ij. ☿ ꝑ iij. M. pone in ☿ circulari ut liquecant, atque ita ☿ per hor. 4. vel 5. continua: dein auge ☿, ut ☿ accendatur & exhalat; hinc puluerisat ☿, affundéque ✕ digeranturque ☿ ☿ 8. dein destillantur, donec guttæ rubræ ascendere incipiant, tunc muta recipiens.

℞. ☿ relictum in fundo lb. i. sacchar. cand. ꝑ vi. V opt. ꝑ ix. Destilla per ☉ m, (in receptaculum in quo sit ☉ ☉, quod primo extillarit.) ☿ forti, donec nihil ☉ ☉ i vel vaporis amplius appareat. V in B. abstrahere ad remanentiam 4x partis.

Vide Sennerti.

N. 1. Melius fit hoc ☉ ☉ si digeratur aliquandiu cum V nouo, fecibusque per colaturam separatis à colatura V per destill. abstrahatur.

N. 2. In seliciendo ☉ ☉ ☉ saccharato lente procedere memineris, ne nimia ebullitione sine optato frustreris.

N. 3. Si cum ☿ vita aliqua, vel ☿ rosarum, in qua moschus vel ambra soluta sit, addita ☿ cinam. digeratur, atque aliquot cohobis cohobetur, mouet aluum

sine vomitu ac molestia, utileque Medicamentum exhibet in Hydrope.

Dosis g. 3. ad 6.

6. *Oleum Antimonij Saccharatum Quercetani.*

Antidotus Panaretos.

℞. Miner. ♂ ad albed. calcinatae ℥.℥. sacchar. cand. in formam syrupi cum circulato minore (✓ opt.) transmutati ℥. i. Misc. Digerantur ♂ ♀ (4. vel 5.) in B, dein per gradus Δ destillentur.

Elicitur primò circulatum minus, secundò liquor albus tertio flavus, quartò rubicundissimus, instar sanguinis, dulcisque Balsamus; collige singula seorsim vel separa ab invicem.

Vires. Liquor albus opitulatur cancris & ulceribus & externis morbis.

Liquor flavus idoneus est vaccinationi per aluum & vomitum.

Liquor rubicundus ternis aut quaternis cohobationibus rectificatus & ablutus Δ cordiali, admirandas præstat curationes in Lepra, Morphea, Apoplexia, Epilepsia, Peste, in ▽ appropriatis exhibitus.

Dosis à g. 3. ad 6. Quercetan. in Tetr.

N. Eodem modo & ex Croc. Metall. & Sacchar. ana cum ▽ digestis, ☉ præparari potest.

Dosis g. 4. 5. 6. 7.

7. *Oleum ♂ ij Saccharatum Fausij.*

℞. Croc. metallor. puluerif.

Sacchar. cand. an. ℥ iv. vel Sacchar. ℥ vi.

Spir. ☿ i rectific. ℥ ij.

Vini ℥ ℥.

Digere ♂ ♀ (8) postea destilla in ☉ per gradus. Aufer phlegma in MB lento.

N. Eodem modo extrahitur oleum ex ☿ ♂ ij Orato, prodit liquor crassus. qui extrahendus aliquoties affuso rec. ▽ quo rursus ad mellaginem separato, eademum per ☉ pellanda in oleum.

Dosis à g. 8. ad ℥ ℥. in morbis fluidis. Cl. D.D. Joh. C. Fausj.

8. *Oleum Antimonij Saccharatum Basilij.*

℞. Vit. ♂ læuigat. affunde agrestam, digere aliquot ♂, dein (abstracta agresta ad siccitatem, (admisce sacchar. cand. æquali pond. cum modico + ri, destilla per ☉ in gradatim, tandem Δ fortiss. prodibit ☉ rubicundum, cum ☿ exaltandum.

Vires. Prodest aduersus Epilepsiam.

Dosis gut. aliquot. Basilij incur. triumph.

9. *Oleum seu Liquor ♂ mellitus.*

℞ ♂ crud. pulu. ℥ i. Mell. i opt. ℥. iiij Bulliant simul, moveanturque spatula, vsque dum substantia aquosa mellis euaporauerit, & remanserit materia quædam nigra, instar picis, quæ digitis friari queat. Hanc destilla per ☉ in Δ nudo gradatim, in excip. amplum, hor. 24. & prodibit liquor imprægnatus facultatibus antimonij, cum aliquot floribus à liquore separandis.

Vires. Liquor iste est corrosivus & penetrans, summopere mundificativus, præsertim in ulceribus, assumit enim excrecentias, &c. Aduersus gangranas præstâtissimum quoque existit remedium. Fui eo possumus aut solo, aut commixto melli rosato, vnguentis, pulueribus ▽, &c. Sala de ♂.

N. Liquor hic + Philosophici vices supplere poterit, in præparatione Tincturae Antimonij ☿ quæ dicitur.

10. *Aliud*

10. *Aliud Magist. ☿.*

℞. ☿ opt. ℥. β. O vit. ꝑ. iv. Bol. arm. ℥. β. ☉ ℥. β. omnia seorsim trita misceantur, destillenturque Δ nudo. Sic prodibit primò phlegma, secundò albicans, tertio Δ rubescens. Si quid collo adhæreat glaciæ instar, admove cautè ferrum candens (vt solvatur. Rectifica per ☿: In rectificatione hoc ☿ solue ☉ foliatum: Solutioni postmodum affundes V, circuliisque sept. 6. circiter, & subsident feces, à quibus decanta V, cui si affuderis ∇ destillatam præcipitabatur ☿ albus, edulcorandus, & reservandus. Dicitur Magisterium Antimonij.

Vires. Purgat suaviter per vomitum.

Dosis g. 3. Kessl. 1. c. 68.

N. 1. Pulvis ille correctus cum Nu ☉ euadit sudorificus: vide infra Tincturam ex Regulo ☿, N. 13.

N. 2. Magisterium hoc ☿ Kessleri nil est aliud quam ☿us vita ex butyro. Ita Hartmannus in Croll. parat ex floribus albis ☿ ☿ ☉, & Glanb. in secunda parte p. 93 aliud concinnat ex ☿ ☿ ☉ lo. Hi omnes modi in unum revidunt certo exprompto.

11. *Oleum Antimonij glaciale, ex*

☿ ☿ ☿. 10.

Vide in destillat. ☿.

12. *Aliud Oleum Antimonij glaciale, seu Butyrum ☿, & exinde Antidotus πολύχρυσος ☿ ☿.*

℞. Reguli ☿ stellat. ℥. 1. ☿. t. ℥. i. β. M. exactè destilla per ☿, (vide in destillatione ☿), ☿ glaciale destillatum rectifica vna ac altera destillatione, feces semper reiiciendo. Hinc affunde Δ in hydromelitis vinosi, cohobaque, vt tandem crebris istis co-

habitationibus ☿ illud dulcescat. Tandem abstrahere V ad consistentiam ☿ i.

Vires. ☿ hoc exquisitissimum, ac preciosissimum est Remedium, multis curandis agnitudinibus, usque grauissimis aptissimum. Quin & domitor est februm tertianarum, quotidianarum ac imprimis quartanarum. Blande enim vomitum multis concitat, aliis alui solutionem citra vomitum, eamque vim habet, vt radices & seminaria mali prorsus eruncet & euellat.

N. Δ hydromelitis vinosi separatus, si viriolica aciditate (Δ ☿ i) imprægnetur, summum est diaphoreticum, & longè ab aliis vulgaribus aliud.

Dosis cochl. f. vel 1. per se vel in liquore conueniente. Querc. in Tetr.

13. *Aliud Oleum Antimonij Chrysellinum ex floribus.*

℞. Flores Antimonij alb. Vis, (ex ☿ ad flaued. calcinato & Van. ℥. iij. argillæ ℥. v. vel vi.) dephlegmata à M. & destilla in MB, sic tantum prodit phlegma, Δ sique cum floribus coeunt. Affunde nouam V atque denuo euoca, idque repete, donec flores nihil spirituum amplius retinere queant. Tunc destilla per ☿ primò excipiendo seorsim humiditatem aqueam, dein mutato Excipulo ☿ albicans, ac ponderosum, instar butyri antimonij relicto ☿ inutuli.

Vires. Idem ferè est cum butyro Antimonij: Inseruit solutioni ☿is, & est basis præcipitati purgantis, vt ☿ vomitorij. Hartm. in Croll. p. 224. Sennert. Inst. l. 5. p. 3. f. 3 c. 17.

Nimirum:

Rectificatur oleum hoc per Retortam: hinc duplex inde paratur præcipitatum, alterum αἷον κατὰ, alterum κατὰ

☿ solum purgans: prius fit, oleum id instillando in ▽ 9 m plu. pulueremque ab acrimonia sua lotionis beneficio liberando: posterius fit oleum id cum an. ol. ☿ p. d. mixtū (8 2) reponendo & hinc similiter flores edulcorando.

Dosis à g. i. ad 4.

14. *Oleum Antimonij compositum ad Vulnura.*

℞. Antimonij, △ ran. p. ij. * vel ☉
☐ p. i. ☿ p. iv. destilla △ forti cum tribus cohobiis, quod sublimatum erit, semper ☉ reddendo.

Vires. Mundificat optimè vulnura inueterata. Basil.

15. *Aliud Oleum.*

Fit eiusdem qualitatē ☉, si ☿ cum ☿ u ☉ imbiberis, ac postea destilla veris. *Tentzelius.*

16. *Aliud, Balsamus Antimonij.*

℞. ☿ ℥. ij. ☉ ♀ i ℥. β. ☿ 3 iv. Fluant in + forti, effundanturque in tabulam lapideam.

℞. Massam hanc & ☿ 3 iij. misce & affunde ☿ m terebinth. ad eminent. 4. digit. Digere vase clauso ☿ ☿ aliquot, sic ☿ Terebinth. rubro colore tingetur. Postea adde filices contusos ad spissitudinem aliquam, destillaque per ☿ m.

NB. Vbi guttæ flauæ apparere incipiunt, muta receptaculum, & auge △ atque extillabit ☉ tubrum *Sennert.*

Vires. Magnarum est virium in diuturnis ulceribus.

N. *Vide etiam Balsamum Antimonij seu Reguli. In Tincturis ex Regulo.*

17. *Balsamus Vulnerarius Basil.*

℞. ☿. opt. ℥. i. ☉ comm. vel ☿. ℥. β. Argill. ℥. vi. M. & destilla △ fort.

per ☿ m. & prodibit tandem ☉ quod dephlegma ad remanentiam ☿ veris rubei, hunc solue per deliq.

Vires. Summarum est virium, & arcuum summum in vulneribus inueteratis. Basil. in C. Triumph. vide etiam Balsamum Reguli in Tincturis.

N. 1. *Kesslerus.*

℞. Antimonij ☿, (vel ☉, ana. O vst. ℥. β. destillaque sine argilla.

Alij.

℞. Solum ☿ & ☿, (sine O & argilla) vel ☉. *Vide Basil. in repetit. lapid.*

Alij.

℞. Antimonij, part. i. ☉ p. i. Bol. armen. p. ij.

N. 2. *Processus est plurimum (3) dierum, instituendaque, est destillatio per gradus.*

N. 3. ☉ hoc precipitari potest cum △. *Precipitatum elotum exhibetur à g. 3. ad 6.*

18. *☿ ex Regulo.*

1 Figatur Regulus,] quod fieri potest multoties iteratis sublimationibus, siue in ovo Philosophico id fiat, siue in cucurbita, quotidie scil. id quod sublimatum est ad fundum detrudendo.)

2. Regulus fixus ponatur aliquandiu (☒ 6.) in cellam vsoluatur, ☉ illud filtra & coagula ad spissitudinem. Hinc repone iterum ad liqueendum filtra & coagula ac solue iterum ac cum triplo Tripolæ mixtum destilla per ☿ m. Sic primo prodit ☿ albus, dein rubeus: rectifica.

Vires. In febribus omnibus intermittentibus, ut ☉ in quartana virium est summarum, mundificat sanguinem per diaphoresim, atterit calculum Renum & Vesicae, materiam Prodagricam discuti-

rit, dolores vel extrinsecus applicatum lenit.

Dosis à g. 3. ad 5.

19. Aqua Antepileptica ex Croco
Metall. Quercet.

R. Croc. Metall. misce cum crusta panis puluerisata, ac elice ∇ m per cornutam ad Δ m latis magnum.

Vires Hanc pluri facit Quercetanus in Epilepsia, quam reliquas suas Antepilepticas omnes è vegetabilium familia desumptas.

Ego huic labori ♂ ac ♀ . 3. integras frustra impendi, primò exiuit phlegma, secundo ☿ nebulosi prodierunt, tertio stria seu ☉ rubicundum, omnia autem in parua quantitate.

20. Δ Stimmi sulphurea. Clyffus
alis.

R. ♂ elect. ☉ pur. ☿ pur. à (lib. 1) propellantur per ☿ m, in ventris capacitate superiori tabulatam, in receptaculum amplum ac capaciss. rostro firmiter annexum, in quo infusa sit aliquota ∇ a pars: Inice materiam sensim per vices, tubulumque propediem obtura, videbis materiam iniectam paulo post incendi, receptaculumque nebulosis vaporibus repleri, quibus sensim ∇ a illi commixtis receptaculum pellucidum redditur, quo apparente, inice iterum, &c. ∇ m spiritibus destillatis impregnatam filtra, vel si placeat, & adustionem sapiat à phlegmate in **MB** libera.

Vires. Crassam ☿ r eamque mucilaginem ubicunque locorum delitescat in corpore attenuat, ac per emunctoria conuenientia expurgat, per aluum scilicet, per ☿ m, per sudorem, per salinationem: Vnde vilissimum Medicamentum audit in obstr. Epatis, Lienis, Mesenterij, Vteris in affectu Hy-

pochondriaco, Colico, simil. praesertim si cum Crystallis ♂ acuatur. Miscetur cum ∇ font. vel alio liquore conuenienti, ad gratam aciditatem, bibiturque pro libitu.

21. Aqua Stimmi ♀ rea.

Fit eodem modo ex ♂ . ☿ & ☉ an, quibus si aliquid ☿ is admiscetur, melius destillatio procedit.

Vires. Prodest itidem in obstrustionibus, maxime autem expellit per sudorem materiam in habitu corporis delitescentem.

N. 1. In vtriusque ∇ a destillatione colligi possunt flores qui à ☿ re per sublimationem liberati in usum venire quodque possunt.

N. 2. Ex ☉ fit ♂ diaphoreticum, si semel ad iterum cum ☉ ana calcinetur & dulcoretur, vel ex eodem ☿ r auratum extrahi potest, si cum lixurio forti coquatur. Vide ☿ r Antimonij.

22. Spiritus ♂ ij composius
S. Closs.

R. ☿ is ♂ alis (Clossæan. vid. infra) part. 1. colchotaris ☿ si p. ij. M. & ter aut quater aceto perfunde destillando, cum cohobio, Tandem vltima vice repone pulueris in amphoram terream tabulatam (vitrea enim disrumperebatur) cum Recip. amplo. vrge Δ in re verberio clauso spatio triidui integri, vt fieri solet in destillando ☉ ☿ li & spiritum ab ☉ separa atque rectifica.

Vires. Inseruit vtrumque figendo ♀ & ♂ ri.

IV. LIQVATIO.

Liquor seu Balsamus ex scorjis
Reguli.

R. Scorjas Reguli, (siue simplicis,
BBb siue

sive compositi,) expone aëri humido; sic soluentur propter Salia ☿ & ☽ admista.

Vires. In Chirurgia vsus est insignis, praesertim infistulis & ulceribus foetidis.

2. Liquor ex Sale vitri Antimonij.

Fit si id in albumine oui ad duritiem cocti, vel Raphano, vel Bryonia excavata in cella resoluatur.

Vires. Liquor hic assumptus intrinsecus Podagricas defluxiones, & Paroxysmos efficaciter compescit. In Chirurgia, vulnera, fistulas absque mordacitate tamen à putredine conseruat & sanat.

Dosis ʒss. ad ʒj.

V. EXTRACTIO.

Vnde.

SVLPHVRA & TINCTVRÆ.

SVLPHVRA sunt Extracta crassiora.

TINCTVRÆ sunt Extracta magis elaborata.

DE SVLPHVRIBVS.

Sulphura hæc extrahuntur vt plurimum cum lixiuio forti, vel & cum ☿.

Lixiuium forte ad Extract,

1. R. ☽ ☿ i, Calx viua, & ☽ vft. ana. F. lixiu. filtratione clarificandum.

2. R. ☿. clauell. calx viua & ☿. comm. F. lixiu.

3. R. Calx viua lb. v. lb. xv. F. lixiu.

1. ☿ ex Minera Antimonij, vel ☿ crudo.

R. Mineræ ☿ lb. iij. v. & c. vel in defectu mineræ.

R. ☿ crud. tereminutiss. & superfundeli lixiuium forte, (ex ☿ & ☽) digere

☿ 6. vel 7. vt fiat Extractio: Extractionem filtra, & leniter bulliendo reduc in ☿ verem rubeum. Hartm. in pract. Kest. 2. c. 18.

N. Si experiri volucris, an aliquid ☿is supersit in materia, transfunde noudum nihil extractionis in vas aliud, instillaque + sic præcipitabitur ☿ ad fundum.

Vires. Inseruit extrahenda tinctura, purgat itidem supra & infra.

Dosis g. 2. 3. 4. 5.

2. Aliter.

R. ☿ puluer. q. s. coque in lixiuio forti, præcipitaque ☽ pluuiali (imprægnata ☿.) hinc edulcora.

Vires. Tutius agit per vomitum quam crocus Metallorum.

Dosis g. 3. 4. 5. Beguin. & Quercetan.

Nix Diaphoretica ☿ij S. Closs.

☿ ☿ ris ☿ij huius descript. vel ☿ aurati diaphoret. ʒj. ol. ☽ li ʒij. M. in ☽, fiet massa nigra vt pix, fermentetur per noctem, postea per reuerberatorium exhibit aqua acidula & in fundo manebit puluis albus excelsus Diaphoreticum, valet etiam ad vermes, cum pomatâ vero sequenti fit inde Cosmeticum præstans hoc modo.

R. axung. porci lb. j. sæui veruec. circa renes collect. lb. ij.

Ireos flor. ʒiv.

Garyoph.

Coriandr.

Benzoin.

Styrac. calam.

Calam. aromat. an. ʒij.

Florum lauend. quart. vi.

Bull. cum rasur. pomorum curtipendul. cum pellic. lb. j.

Aq.

Aq.ros lb.ij.in \mathcal{M} per horas x i i.in vase vitro.

Colentur in vas vitreatum vbi re-
frixerint; aqua & feces diligenter amo-
ueantur; tum calore miti iterum lique-
cat, effundatur in mortarium calens, vbi
tamdiu agiretur, donec in Pomatam
albam; leuem & boni odoris (addito
moscho) abierit, cuius singulis vncis
immiscebis \mathcal{G} ii Cosmetici \mathcal{Z} j.

3. Δ r ex \mathcal{G} calcinato.

\mathcal{R} . Antimonij, \mathcal{Z} i, \mathcal{A} , mixta lique-
scant ad Δ , postea effunde in ollam
plenam ∇ calida, stentque per \mathcal{O} m,
dein decanta ac præcipita Δ r instilla-
tione + i, vel sola coctione adhibita.

N. 1. *Alij fundunt solum \mathcal{G} , idque fu-
sum effundunt dicto modo in \mathcal{X} acerri-
mum, vel \mathcal{O} m \mathcal{O} acuatum: Hinc de-
cantant, præcipitatumque \mathcal{F} erem colli-
gunt.*

N. 2. *Nisi me felicior fueris, nihil ef-
ficies, cum nihil sit quod \mathcal{A} \mathcal{G} ij foras
attrahat.)*

Alij.

\mathcal{R} . \mathcal{G} p. i. fundunt, fusoque iniici-
unt antimonij. atque dicto modo ef-
fundunt in \mathcal{X} .

Aliter.

\mathcal{R} . Antimonij p. ij scor. \mathcal{G} (*Ham-
merschlag*) p. i. & \mathcal{A} \mathcal{A} M. & iniice sen-
sim super \mathcal{O} & \mathcal{F} ad Δ fluentia, hinc
fluant simul optimè, dein extrahe Δ r
coquendo in lixiuio forti, præcipitaque
instillatione \mathcal{X} .

Vires. *Purg. i per aluum.*

Dosis g. 4, 5, 6, 7, 8.

5. Δ r ex Croco Metallorum.

Fit eodem modo: Hepar scil. anti-
monij coquatur in lixiuio forti, vel sola
 ∇ . (vt in edulcoratione Croci Me-
tallor.)

6. *Aliter.*

\mathcal{R} . \mathcal{G} & \mathcal{Z} pulueratorum an. lb. ij. ca-
mententur per 4. aut 5. horas, vase
probè incandescente, quod tandem
proiicies in mensur. 2. aceti & per ho-
ram vnā aut alteram ebullire fines,
cola +, & coagula in puluerem.

Ex S. Clois.

7. Sulphur ex scoris Reguli: sulphur auratum Antimonij:

\mathcal{R} . Scorias à Regulo separatas, eas-
que coque in lixiuio, traiceque per
chartam, colatutæ insperge \mathcal{F} , & præ-
cipitabitur Δ auratū antimonij, quod
decantato lixiuio edulcorandum.

Vires. *Mouet vomitum, ac interdum
secessum.*

Dosis g. vj.

8. Sulphur ex Regulo Antimonij

Δ alt.

Fiat Hepar ex Regulo \mathcal{Z} iali & \mathcal{O}
Hoc Hepar sine ablutione coque in
lixiuio forti, vt abstrahatur Δ r, de-
cantata & præcipita instillatione \mathcal{X} .

Quercet. in Tetrad.

9. *Aliud.*

2. \mathcal{R} . \mathcal{G} crud. per ∇ præcipitatum &
edulcoratum, quoque bulliēdo in lixi-
uio \mathcal{F} i, decantaque, lixiuio tinctum
euaporet, sic remanebit in fundo Δ r
antimonij cum \mathcal{O} \mathcal{F} i, sublima illud
addito sabulo, & sublimabitur Δ an-
timonij purum. *Sala de \mathcal{G} .*

10. Sulphur ex Cinnabari antimonij, Sulphur Antimonij verum.

Cinnabaris antimonij puluerifat, co-
quatur ebulliēdo in lixiuio fortissimo,
(ex cineribus clauell. & \mathcal{W} à, vel ex \mathcal{O} c
 \mathcal{F} i & \mathcal{O} \mathcal{W} æ,) per \mathcal{G} . 3. vel 4. Decan-
tetur dein lixiuū à \mathcal{F} viuo, qui currit in
fundo, filtreturq; hinc reponatur, vt \mathcal{A}
subsideat coloris rubei. quod à lixiuio
separatum edulcoretur sæpius ∇ à com-
mun, calida; dein leni calore exiccetur,

BBb 2 habes

habes Δ antimonij genuinum.

Hinc paratur

Panacea Δ is Antimonij veri.

1. \mathcal{R} . Δ ris iam descript.

Regul antimonij an. \mathfrak{z} j.

$\circ\circ$ \mathfrak{z} 1. per C. vel $\circ\circ$ \oplus i recti-
ficatiss \mathfrak{z} ij.

Digere per aliquot σ (8) in loco calido, deinde destilla ex Δ per \mathcal{O} . vitream, ter ad minimum cohobando; vrge postremo Δ e quarti gradus \mathfrak{z} 12. & erit totaliter fixum, quod exime & cum ∇ rosar. lana & exicca.

N. Præstat materiam \mathcal{O} fracta exemptam subregula \mathfrak{z} 5.6. reuerberare.

2. \mathcal{R} . Huius puluer. \mathfrak{z} j.

Mag. vel Θ Corral. \mathfrak{z} ij. M.
exacte.

Vires. Est instar. panacæ: habet mirum in se vim diaphoreticam ac sanguinem mundificandi, ideoque quibuslibet morbis per sudorem sanabilibus inservire potest, præcipue Lvi venerea, scorditæque cutis, Repetenda est Dosis sæpius in quibuslibet morbis, præsertim vero in Epidemiis, & malignitatem aliquam secum vehentibus.

Dosis à gr. 10. ad 15. & 20.

Hartman. in Croll. in præct. Agricola de \mathfrak{z} .

DE TINCTURIS.

De Tincturis \mathfrak{z} ij notare in genere expedit, quod monente Basilio, \mathfrak{X} in priori extractione adhibitum, \mathcal{O} purgantes figat, (ita ut per \square m sudores & pyralissimum duntaxat operentur, etiamsi postmodum per ∇ extrahantur.) & e contra ∇ vim in eadem detectoriam auget. Basil.

Tinctura antimonij nihil aliud est quam portio aliqua antimonij, ido-

neo menstruo soluta & exaltata, ea-
que potissimum sub colore rubeo.

Absoluitur Tincturæ præparatio plerunque duabus Operationibus: Extractione scil. & Exaltatione. Hæc ferè non nisi ∇ perficitur, illa potissimum \mathfrak{X} , quod plerunque acuitur aliquo \mathcal{O} u acido.

1. Tinctura ex \mathfrak{z} crudo.

\mathcal{R} . 1. \mathfrak{z} pulu. extrahe Tincturam rubicundam scil. cum \mathcal{O} u \oplus i Philosoph. digerendo in \mathfrak{E} bus, hinc decanta, decantatas Tincturas confunde, abstrahæque \mathcal{O} m \oplus i m MB l. Δ . donec guttæ hæuescant.

2. Tincturæ in fundo remanenti affunde ∇ m rectificatum, extraheque ∇ l. Δ MB, donec itidem guttæ hæuescant. Tunc mutato recipiente, igne fortiori propelle Tincturam.

Vires. Balsamum mirum est, quo vi possumus ad vulnera curanda, tam interna, quam externa: movet sudorem, nonnunquam etiam secessum & vomitum: emendat Symptomata veneni- Lepre. Faber Monsp.

Alij pro menstruo vtuntur ∇ , ex \oplus \oplus & \mathcal{O} plumos.

2. Alia, Balsamus vita Basilij.

\mathcal{R} . \mathfrak{z} crud. q. v. extrahe Tincturam rubic. cum \mathfrak{X} radicato, digerendo per \square m, filtraturam digere iterum per \square m, & nigrescet. Abstrahæ \mathfrak{X} ad siccitatem, edulcora & circula cum ∇ opt. ad eminent. 3. vel 4. digit. per \square m vnum ac alterum, vase clauso: decanta dein & destilla ex \mathfrak{E} e, & prodibit ∇ impregnatus Tinctura antimonij: circula σ ρ 10. circiter & subsidebit Tinctura, quam per Tritorium à ∇ separa.

N. Candefac primum \mathfrak{z} : hinc in-
iice in \mathfrak{X} .

Vires.

Vires. *Summarum est virium, mundificat sanguinem, curat Morphaam, scabiem, ex hilarat spiritus.*

3. *Aliter.*

R. ꝑ crudi q.v. extrahe Tincturam rubic. cum + antimonij, digerendo aliquando, decanta, abstrahèque + & pelle Tincturam per ☒ ex ☐.

Vires. *Summè prodest in Morphea L.V. &c. Basil.*

4. *Alia, Manna Antimonij dicta.*

R. Antimonij pulueris. extrahe Tincturam cum ☐u antimonij essentificatio: filtra ac abstrahè. Hinc digere cum ☒ ac abstrahè.

☐ Antimonij essentificatus præparetur ex Magnesia, acuatque natio suo sale.

Integrum equidem adscripsissem Processum, verum cum id forsàn Du. D. Paulo Kesler, cui illum acceptum fero, ingratum foret descriptionem quam de-idi, eamque vel Tyroni Chymie satis perspicuam, equi bonique consule.

Ex ☒ calcinato:

5. Tinctura ex vitro Antimocij, Magisterium Antimonij Sala: ☐☐ vitri Antimonij Basil.

R. Vitri. ☒ 5℔. laeuigato, affunde ☒ acerrimum, vel acuatum ☐u ☒i, (alias in cassum laboraueris,) ad eminent 2. aut 3. digit. digere in ☐ calore, qui manu absque adustione tolerari possit ☒ ☐ (30. circiter) quotidie semel aut bis agitando, &c. Tinctum liquorem decanta & abstrahè ☒ ad coagulationem vsque subfuscam & acrem, (ad siccitatem ☒ eris, *Basilus.*) Hæc exposita ☐ ri dissoluitur in liquorem, qui vitreo vase probe obturato seruetur, ne lique scat & euaporet. Sala, *Thold. in Halograph.*

Huic affunde ☒ ac extrahe ite-

rum, decanta à fecibus, tandemque ☒ abstrahè. Dicitur Alexiterium antimoniale. *Basilio in Curr. Triumph.* qui ☒ erem ante ☒ affusionem edulcorat ☒ destillatæ iteratis abstractionibus.

N. *Hec Tinctura quandoquidem difficulter retineri queat, quin lique scat, paratur exinde Bezoardicum quod.*

R. ☐ huius antimonialis, ad mellis consistentiam inspissati 3ij. C.C. ust. præparat. 3j. M. exactè & exicca lentè.

Vires. *Virumque conducit ad obstructions omnes inueteratas. Hepatis, Lienis, Pulmonum, &c. Item aduersus mensum retentionem, Leucophlegmatiam virginum, Ictericam utramque, Hydropem, Phthisin, Asthma, Pleurisin, Cachexiam, Melanch. Hypochondriacam; Itemque ad ulcera, tam externa, quàm interna, Scabies quascunque & pruriginès, Luem ven. Febres pestilenciales, continuas, puridas, &c. Morbillos, variolas: noxia expurgat per sudorem, ☐m, salinationem: vsus eius continuari potest. Basil. Tentzel.*

Dosis Tinctura à g. 3. ad 9. in vino maluat. vel alio liquore. Bezoardici à g. 4. ad 12. &c.

Acetum ad hoc opus idoneum, hoc refer ex destillatione +. Eodem modo eadem Tinctura parari potest si loco ☒ sumatur ☒ ex ☐ ☒ à ℔. 1. * 3iv. ☒, ℔. iij. quæ digesta mantur per ☐ in, ut ☒ ☒ ipolet. Liquor rectificatur ab æquali pondere ☐ is. *Kel. 1. c. 30.*

N. Pulvis ille ante affusionem ☒, albumini onorum coctorum impositus, in liquorem conuertitur, vulneribus recentibus & inueteratis malignisque sa-

nandis utilissimus. *Basil.*

6. *Alia Tinctura* ☿ *vitri, ex*
minera facti.

Extrahe primò cum + proprio, decanta ac abstrahere.

Extrahe secundò cum V opt. decanta (reiectis fecibus, (ac circula.

N. *Tincturam* hanc per ☿ in unum ac alterum circulatam & veris, consequeris ☿ seu *Essentiam Antimonij* omnium ferè morborum *Panacea*, ex qua lapis ignis.

Dosis gutt. 8. *Basil.*

7. *Alia ex vitro* ☿ *Oari.*

R. *Vitri antimonij Solaris*, q. v. affunde V rectificatiss. ad eminent. digitorum 4. digere in vase clauso, & extrahetur *Tinctura rubicundissima*, quam serva, & adhibe sine abstractione.

Vires. Mouet sudorem citra vomitum ac nauseam, mundificat sanguinem ab omnibus impuritatibus & feculentis ☿ Preis. Salem microcosmicum resolutum (ex quo hydrops) coagulat, & plegmasa noxia ex corpore exterminat. Podagricos iuvat, praesertim si cum arcano Filicis fuerit propinata. Dolores artuum ex Lue Vener. tollit, ut & ipsam Luem Ven. cum decoctis convenientibus, curat ulcera. In Peste & aliis morbis Epidemii magnum exhibet solamen.

Dosis à ʒij ad ʒiij. vel plures.

N. 1. Post. *Extractionem* qua ☿ fieri ferè potest, remanentia denuo fundi potest in corpus Solare album. *Hartm. in Croll. Kesl. 2. c. 30.*

N. 2. *Quandoquidem vis deiectionis* ☿ refranatur, non abs re foret, primo hanc *Tincturam* cum ☿ (ut in praecedenti preparatione) extraxisse.

8. *Alia, ex vitro Antimonij*
solari.

R. *Vitr. antimonij* part. ij. ☉ per ☿

purgat. p. 1. fundantur simul, dein extrahatur *Tinctura* cum ☿ radicato, quo iterum abstracto, circuletur *Tinctura* cum V per ☿ P (8) abstrahere vicissim V, ac si placet auctori ☿ *Tincturam* per ☿ propelle de pressiore, eamque seorsim collige.

Vires. Medicina Diaphoretica est longè excellentissima. Purgat etiam satis promptè si Basil. credimus, addito Extr. Rhubarb. Hartm. Tentzel.

9. *Tinctura ex Croco Metallorum*
Bickeri.

R. *Croc. Metall. q. v.* extrahe *Tincturam* s. a. cum ☿ acerrimo, decanta tinctos liquores & abstrahere ☿ ad spissitudinem mellis.

Vires. Purgat & mouet sudorem vehementer

Dosis à g. 6. ad 12.

N. *Ex remanente Antimonio, ex quo Tinctura scil. proleeta est; fit ☉ Antimonij dulce. (Vide suo loco.) Hoc Tinctura admixtum, efficacior em eam reddit. Bicher. in Epist. Clariss. Horst. vide huius obseru. l. 1. f. 1.*

10. *Alia.*

R. *Hepar antimonij, (i. e. Crocum Metallorum à ☉ suo nondum educlo-*
ratum,) calcina per ☿ as aliquot. (12)
& euadit puluis albus, dein expone in cella, ut in liquorem abeat. Ex hoc liquore extrahe *Tincturam* cum V opt. rectificat. decanta & abstrahere Vm.

N. ☉ Partim sponte in cella coagulatur, partim quoque in extraxio subsidebit, ubicunque ergo separa.

Vires. Vires & Dosis eadem cum praecedenti.

N. *Tinctura haec est Viri Experientissimi ac benè de Rep. Chimica meriti, Dn. August. VVeis. Pharmacopaei apud VVormatienses spectatissimi.*

11. *Alia S. Cloffai, quam vocat Oleum*
ſij febrifugum & Antipleu-
riticum.

2. Reguli ♂ per speculum ardens
 incinerati q. v. Superfundatur ☿us
 ☿ li ad extantiam vnus digiti, dige-
 re per biduum, ſolutionem inclina,
 alium ☿um ☿ li affunde, euacua, om-
 nes ſolutiones M. & ex ☿ phlegma
 extrahe, reſtabit O. liquidum quod in
 ☿ diſſolues, alteraque vice extrahes.

Dofis gr. 4.

12. *Tinctura ex ☿ ſato.*

℞. ☿ crud. ☿ a miſce & calcina in
 anemio, donec ☿ penitus combuſtus
 ſit, elue dein ☿ in ☿ calida, ac extra-
 he ex ☿ remanente Tincturam ſ. cum
 ☿ abſtrahe ☿ & remanet Tinctura ☿
 in fundo, *Baſil.*

N. ☿ abſtractus cum Tinctura non
 poteſt iterum miſcere, ſed ſupernatat
 ſemper.

12. *Rubinus Antimonij ☿alis.*

℞. ☿ elect. ☿ i a fundantur ſimul.

℞. Huius maſſæ ſij (potius Regu-
 li) ſij opt. purgat. ſij. ☿ ☿ i ſij. M
 diligenter, digeranturque l. calore,
 donec ſicceſcant: Dein extrahe ſ. a.
 Tincturam rubicundiſſimam cum ☿:
 decanta & abſtrahe ☿ in ad conſisten-
 tiam mellis, ſic habebis materiam, quæ
 frigori expoſita indureſcit in lapidem
 inſtar rubini. *Clodius.*

23. *Tinctura ex Regulo ♂ aut ♀*
Antidotos Pantagogs.

℞. Calcem Reguli ♂, aut ♀, ſolue
 digerendo aliquot ☿ cum ☿ u ☿,
 tandemque deſtilla ☿ fortis. & prodi-
 ☿ o craſſum, cui rectificato affunde ☿,
 opt. circula, deſtilla cum cohobiis tri-
 bus, ſemper feces reiiciendo. Tandem
 liquor ſeruetur accuratiſſimè.

Vires. Repurgat ſanguinem, appeti-

tum excitat, viſcera corroborat, eradi-
cat cachexiam, melanchol. hypocondr.
Ictericum, hydropem, idque leniter pur-
gando.

Dofis gutt. aliquot 2. 3. & c. Quercet.
in Tened.

Poteſt etiam in præcipitatum, &
 calcem albam, rubram, imò etiam fla-
 vam redigi.

Cuius Dofis gr. 3. 4.

14. *Alia, Baſamus Reguli, &*
exinde Tinctura.

℞. Regul. puluer. q. v. digere in MB.
 cum ☿ u Terebinh. & rubefcet, de-
 canta, abſtraheque affundendo ☿. (*vide*
Baſil. ☿ (dein ſolue in ☿, digere &
 abſtrahe.

Vires. Optimum eſt remedium in af-
fectibus pulmonum, phthiſi, aſthmate,
tuſſi; ſi frequenter adhibeatur.

Dofis g. 3. 4.

15. *Tinctura ex ☿ calcinatio cum*
lap. prunella.

℞. Lap. prunell. ad porositatem vſ-
 que per ☿ depurati, Antimonij añ. M.
 & committe igni reuerberatorio ☿
 (5) vt + bulum ſemper ſit ignitum.
 Ex antimonio hoc edulcorato extrahe
 Tincturam ſ. a. per ☿, hinc decanta,
 & abſtrahe ☿ Tincturam remanentem
 exalta, vt moris per ☿. *Keſler.*

Vires. Purgat ſecreſſum, (potius per
ſudorem.)

Dofis g. 2. 3. 4.

N. ☿ in extractione cum ☿ reſi-
 dua, ſi dulcoretur, ſiſtit omnes alui flu-
 xus.

Dofis g. 8. 10.

16. *Tinctura ex ☿ rubeo fixo.*

℞. Antimonij rubei fixi, (*vide in*
calcin.) q. v. extrahe Tincturam rub.
 digerendo cum ☿, decanta & abſtra-
 he ad ſiccitatem. Poſtea extrahe cum ☿
 ſimiliter

similiter procedendo vti eum +.

N. *Basilius reuerberat materiam antequam secundum extractionem cum* ∇ *scil. aggrediatur.*

Vires. *Summarium est virium in resoluendo errore, irrumpendis apostematibus, in curanda Lue Ven. &c.*

Dosis g. 3. 4. *Basil. incurr. Triumph. Bacode* ⚄ , *qui vel pro Panacea fere venditat.*

17. Tinctura ex Floribus Antimonij Lilium Paracelsi.

Rx. Antimonij \ast an. propellantur per Om , vt nil nisi feces remaneant. Ex floribus his optimè edulcoratis, & in reuerberatorio aliquādiu vase clauso per colores ad rubedinem reuerberatis, extrahe Tincturam f. a. cum ∇ rectific. eumque rursus tandem abstrahere ad consistentiam olei.

Vires. *Medicamentum est restitutum totius corporis, sola humorum correctione agens, mundificat corpus hominis supra omnia arcanarum insuper in obstructionibus Epatis, Hydrope, Morphaea, Lepra, in morbis Lienis, vti Scorbuto, & simil. mouet menses, & si Basilio credimus, purgat leniter per aluum, cum extr. Rhabarb. ac tinctura Corallorum.*

Dosis g. 3. 4. 5. 6. 7. 8. *Paracels. l. 2. magna Chirurg. Basil. in curr. triumph. (vocat Elixir. Antimonij,) Hartm. in dispt. Chymico-Medic. 7. thes. 129. Querc. Poter. Sala in Anat. ⚄ (qui quoque flores rubeos obscuros cum ⚄ sublimatos aque efficaces censet, vt & flores reuerberatione ad eundem colorem redactos.*

18. Aliter, Arcanum Antimonij

Rx. Flores illos edulcoratos (etiam nondum reuerberatos) affunde M ⚄ rectific. circula, donec bene vni-

antur: dein propelle simul, ac affunde ∇ , circulaque subsidentibus fecibus separatis, Tincturam, si libet, adhuc semel rectifica.

Vires. *Confortat ventriculum, noxios humores consumendo, appetitum excitat, tollit melanc. hypochondr. suffocationem vteri, colicam, & simil.*

Dosis g. 1. ac altera. *Basil.*

19. Aliter.

Elixir O avo ⚄ ij, aliàs *Electrum seu Lili Parac.*

Rx. Reguli ⚄ ij (ex ♀ io vitæ cum pari pondere ♀ & ana ⊙ per detonationem facti) partem 1. auri purgati tantundem, fluant simul & puluerizetur, adde \ast ci quadruplum pondus, sublima toties donec Astrum ⚄ ij ascenderit, infundo autem terra fatua & inutilis remanserit, elue falsedinem \ast ci & restantes infundo ⊙ & ⚄ ij flores pone in Ouum Hermeticum in capellâ fixatoriâ, da Δ talem vt in fluorem non aducantur, sed ex flauis citrini, tandem vero ex citrinis castanei coloris fiant. Hisce fixatis floribus affunditur ⚄ Alkalif. & postmodum ∇ ad extrahendam Tincturam vti latius traditur Artic. de Tincturis ⚄ ij & in. Antidoto ⚄ ij ⚄ Querc.

Vires. *Summa Medicina perhibetur esse in Ictero nigro, podagrâ, hydrope.*

Dosis instar granici andri bis in die ad curationem in Syrupis, ad preservationem semel in mense.

20. Alia, Basil.

Rx. Flor. antimonij rub. q. v . extrahe digerendo cum ∇ ac abstrahere.

Vires. *Purgat leniter, tollit febres tertianas & quartanas.*

21. Alia ex floribus:

Antidotum ⚄ ij ⚄ Quercet.

Rx. Flores Antimonij, (nimirum qui

ex.

ex antimonio Vngarico per se ad albedin. calcinato, cum ☀ sublimati sint & edulcorati, (q.v. extrahe cum ☒ philosophico Tincturam rubic. s.a. tempore sat longo. Decantatos liquores tinctos destilla ad siccitatem. Ex puluere edulcorato extrahe iterum Tincturam pellucidam cum ∇ vitæ Coralliorum (☐. Corall. inflam. mab.) tandemque propelle fortissimo igne per ☉ in rubrum cum ipsa ∇ vitæ, reserua citra separationem.

Vires. Est verum vite Balsamum, nunquam satis laudandum. Exhibetur cum appropriatis, in Epilepsia, Apoplexia, Paralyti, Pestiferis morbis, Lepra, Morphæa, mundificat totum sanguinem.

Dosis gutta aliquot. Quercet. in Tetr. ☒ Philosophicum pro hoc Opere, vide de ☒.

22. Tinctura ex floribus Antimonij ☐ latis.

Antidotus Dysipyretos.

℞. Flor. ☐ ☐ lator. rubicundiss. Extrahe cum ☉ u ☐ i ☐ is, deinde cum vero Hi æthereo ☉ u.

Vires. Vera est Antidotus contra febres omnis generis, uti & pestiferas.

Dosis gutt. 4. 5. in liquore conuenienti. Quercet. in Terr.

23. Tinctura ex floribus Reguli.

Antidotus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐.

℞. Flores Reguli rub. q.v. reuerbera vase clauso vitreo ☐ ☐ 3. 4. continuos. Dein extrahe Tincturam s.a. cum ☒ radicato. Decantatos liquores libera à suo menstruo per destillationem. Postea noua fiat extractio cum ∇. Tandem denuo ∇ ac siccitatem usque abstrahatur.

Vires. Totam sanguinis massam emen-

dat, Morphæam, Lepram, Scrophulas, Luem Ven. persanat: instaurat & augec natium calorem, visciditates ventriculi absumit, ac corpus omnibus excrementis expedit. Colicis est aptissima Medicina, necnon praefocationibus matricis, si Reguli ♂ loco, Regulus ♀ ad parandos flores substituantur. Quercet. in Terrad.

24. Alia ex floribus Reguli ♂ praecipitatis:

Antidotus Isochrysos.

℞. Praecipitatos fl. Reguli. ♂ ad flaued. reuerberatos, extrahe Tincturam cum ☒ philosophorum s. a. relictis quibusdam fecibus albis in fundo. Menstruo per ☐ separato remanebit in fundo ☐ leuissimus rubei coloris, quem reuerbera ☒ . 2. aut 3. Dein affunde ☉ in Iunip. digeie. Sic fere totus ☐ conuertetur in Tincturam rubicundissimam.

Vires. Admirandarum virtutum est, adeoque ipsi auro potabili equiparanda. Apostemata interna omnia aperit atque curat, sanguinem concretum dissoluit, corruptumque purificat, ad Lepram, Scrophulas, L. Ven. Pestem, infinitosque alios morbos magnum remedium exhibet.

Dosis gutt. 6. 7. 8. 9. 10. Quercet. in Terrag.

25. Tinctura ex Ol. Antimonij Saccharato.

℞. ☉ i illius q. v. affunde ☒ ad emincit. 3. aut 4. digitor. digere ac tandem abstrahere. sic relinquitur Tinctura in fundo rubicundissima Gluckraht.

N. Kesler. 2. c. 4. extrahit cum ∇, eumque vicissim abstrahit.

Vires. Purgat por inferiora.

Dosis g. 3.

26. Tinctura ex 4 ribus An- timonij.

CCc

℞. 4 r

R^x. ☿ ex ♂ crud. (primi modi) q. v. extrahe f.a. cum V non vsque adeo forti. (Alcohol non extrahit) Decanta & destilla cohobationibus 7ies repetitis per ☿. Tandem propelle per ☿ in vitream ex ☿, addito quoque igne suppressionis, ac prodibit in forma rubicundissima ☿ antimonij dulce: abstrahere V per M ac remanet in fundo Tinctura.

Vires. Confortatuum est summum, monet sudorem, praeservat à Podagra.

Dos. g. 3. ad 4. Harum. in Pract.

N. Operatio hac quia expertis non successit, aliud eligere menstruum suadeo, vel acuere ☿, addito ☿ u ☿, aut ☿ i, & simil.

27. Aliter.

R^x. ☿ rex ♂. (secundi modi.) q. v. extrahe f.a. cum ☿ u ☿, quo iterum abstracto, digere cum V, eumque de novo vicissim abstrahere.

Vires. Sudorem ciendo contracturam artuum, inprimis ex colica causatam, feliciter curat.

28. Tinctura ex ☿ re Antimonij Aurato.

Extrahe cum V, decanta & abstrahere ad consistentiam mellis.

Vires. Sudorem pronocat, purgatque inprimis per aluum absque molestia, non primo, sed tertio demum die.

Dosis g. 4.

29. Tinctura ex ☿ Reguli ☿ ialis Antidotus Scit rios Querc.

Ex ☿ re dicto edulcorato extrahe Tincturam f. a. cum vitriolica hydromelitis vinosi aciditate, alkalifata scil. proprio ☿ c. (i.e. cum ☿ ex melle + & dein acuato cum suo S. le.) abstrahere menstruum & circula ad aliquot ☿ cum flagrant Juniperi ☿ u. Deinceps per ☿ m crebris cohobationibus destillabis,

& ☿ m Juniperi, si placet, separabis, ut restet in fundo Destillatorij liquor suauissimus.

Vires. Omnium affectuum Pulmonum aque salutaris Medicina ac Balsamus utilis in Phibisi, Dyspnoea, Asthmate, Pleurisi, Peripneumonia, &c. In summa, saluberrima est Medicina, quam plurimis; gravissimisque Morbis profligandis, apta.

Dosis à gutt. 3. ad 6. vel plures. Querc. in Tetr.

30. Tinctura ex ☿ Antimonij cum ☿ Antidotus ☿ re ☿ i.

R^x. ☿ per ♂ purgat. p. i. ☿ antimonij p. vi. F. a. a. a. Ex hoc a. a. te abluto & purgato extrahe Tincturam pellucidissimam instar rubini f. a. variis cohobationibus cum circulato minore Paracelsi eam exercebis, circulatumque postea, si voles separabis, ut Tinctura restet sola.

Vires. Preciosissimum est donum Dei adversus Pestem, Lepram, Morphem, & id genus alios morbos gravissimos.

Dosis gutt. 3. 4. 5. ex theriacali. Quercet. in Tetrad.

31. Tinctura ex ☿ seu Crystallis Antimonij.

R^x. ☿ seu Crystallus antimonij viridiusculos, superfunde ☿ m frigidam copiosam, & praecipitabitur ☿ albus, qui reuerberatione euadit citrinus ac dein rubeus. Ex hoc extrahe f. a. Tincturam rubicundam cum ☿. Hoc iterum abstracto, reiteretur solutio cum V, quem quoque vicissim tandem abstrahere. Thold. & Halograph.

32. Tinctura magisteriata. Lapis ☿ is Basilij.

32. Tinctura antimonij, (ex vitro quod è minera factum,) lb. ij. ☿ is antimonij

timonij ʒij. Misce ac fac coire circu-
lando cum \mathbb{V} , (per \mathbb{M} ad mini-
mum,) dein abstraha in \mathbb{MB} \mathbb{V} ad sic-
citatem, & postea fortissimo Δ , elice
per \mathbb{O} \mathbb{O} rubicundum, \mathbb{O} hoc re-
ctifica iterum \mathbb{MB} , vt quarta parsex-
haleat.

\mathbb{R} . Huius \mathbb{O} i rectificati.

\mathbb{F} ij antimonialis præcipitati, (sc.
per \mathbb{O} \mathbb{O} \mathbb{F} is,) an.

Digere in vase H. clauso ali-
quandiu, sic soluetur primum præci-
pitatum, dein vnientur omnia, & ex-
hibebunt \mathbb{F} crem rubeum fixum & fu-
silem.

Vires. Tinctura hac æquipollet viribus
 \mathbb{O} Basil. in C. Triumph.

\mathbb{N} . \mathbb{F} ij præparationem habes infra.

VI. INFUSIO.

1. Infusio \mathbb{O} crudi.

\mathbb{R} . Antimonij crud. læuigati ʒʒ.
 ∇ æ \mathbb{O} æ vel Vini ʒijij. i v. macerentur
per noctem, colenturque.

Vires. Colatura illa purgat supra &
infra. Poter. in Pharmac.

2. Infusio Vini Antimonij Spey- vasser, Hartm.

\mathbb{R} . Vitri. \mathbb{O} . ʒij. vel ʒij. vini generos.
ʒb. iij. vel i v. vitro benè firmitérque
cooperculato, aliquandiu insolantur,
donec nempe liquor citrinum colorem
induat, postea filtretur liquor, & vicif-
sim in vitro benè clauso asseruetur.

Vires. Datur ad vomitiones ciendas
magno cum fructu, præsertim in iis
morbis, qui non aliter quam vomitioni-
bus curari possunt & volunt, quales sunt
omnes tusses, pleuritides, angina, anore-
xia, ructus, atque infanti alij in prima
regione ventris hospitantes. Vide & in
Vitro \mathbb{O} .

Dosis à ʒj. ad ʒv. Hartmann. in
Croll.

\mathbb{N} . Sunt qui frustum vitri \mathbb{O} . pon-
dere ʒij. ad ʒb. sine puluerisatione in
Cereuisia vel Vini haustu aliquot ʒas.
prout scil. operationem magis vel minus
efficacem expetunt, macerant, decanta-
tumque liquorem propinant.

\mathbb{N} . 2. Admirandum est in infusione
Vitri Antimonij, non exhaustiri eius vim
emeticam, sed pene in infinitum vitrum
id posse infundi, vt nihil plane virium
vel admodum pauxillum decedat. Quin-
imo, quod idem, si qua imbecillius reddi-
tum sit, noua fusione pristinas vires re-
cuperet.

3. Alia Infusio vitri \mathbb{O} , quam pro Aqua
Benedicta Rulandi habet
Brendelius.

\mathbb{R} . Vitri. \mathbb{O} . (per se sine addit. fa-
cti,) ʒij.

Vini generos. vel maluat. ʒb. i. vel ad
summum ʒb. iij.

Macerentur in loco non admo-
dum calido, donec cutim contrahat
vinum. (Hæc cutis nihil aliud est,
quam residua portio \mathbb{F} is \mathbb{O} calis,
à qua oritur illa vehemens vomitio,
relictà à calcinatione antimonij,) cute
ea per filtrum ab infusione separata &
abiecta, longè mitius quam antehac,
operationes suas exercet aqua benedi-
cta. Brendel. in Chymia.

4. Infusio Croci Metallorum, Aqua
benedicta Querc.

\mathbb{R} . Croc. Metall. Vngar. ʒj.
Aq. card. bened. ʒb. iij. vel iij.
Cinam. ʒb.

Macera per biduum aut triduum,
dein transcola & serua vsui.

Dosis ʒb. aut amplius.

5. Aqua benedicta Rulandi.

Rulandus ∇ suam benedictam. ita
C C c 2 descri

describit: *Crocus* noster Metallorum maceratur per ρ in, vel urgente necessitate ebulliat à lentis magnitudine ad pisi quantitatem in ∇ vel Vino, vel Cereuisia, vel ∇ mulsa, vel denique in liquore morbo conueniente, de quo capitur post infusionem ab $\mathfrak{z}\beta$. ad $\mathfrak{z}\text{ij}$. colatum deinceps bibitur frigide vel calidè.

Verum quis ille *Crocus* Metallorum Rulandinus sit, ambigitur, de quo vide in *Croc. Metall.*

Sit vt sit, sufficere tibi potest illa *Quercetani*, vel si mauis.

\mathfrak{z} . *Croc. Metall.* (siue vulgaris ille sit, siue *Hartmanni*.) gran. iij. ad $\mathfrak{D}\beta$.

Vini generos. vel Vinimalu. vel Hydromel. vel Cereuis. vel conuenientis liquoris ab $\mathfrak{z}\beta$. ad $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Macerentur & necessitate urgente bulliant, colenturque per chartam.

Vires. ∇ & benedicta, vtriusque usus proficiuus est in dolore capitis, ab impuritate ventriculi, (sape enim is accidere solet,) in Epilepsia, Pleuritide, Melanch. Hypochondriac. Febribus, Peste, Arthritide, coagulatione Sanguinis, &c. In quibus omnibus cum liquore appropriato exhibeatur.

Vsus præterea eius insignis est in Clysteribus.

Nimirum:

$\mathfrak{z}\beta$. ad $\mathfrak{z}\text{ij}$. ecullit in ∇ conuenienti vel Vino, colatura admiscetur Iuri vel Decocto simplicium mollientium. Optimum Medicamentum est in Colica.

Huc

6. ∇ Ophthalmica ex Croco Metall. Vide l. 2.

7. Syrupus Vomitiuus. V. l. 2. c. 64.

8. Vinum Hippocraticum purgatiuum. V. l. 2. c. 84.

9. Oxyssaccharum Vomitiuum. Vide

librum 2. caput 84.

10. Spiritus Vita aureum Rulandi.

N. De hoc Ω u. varia Medicorum opiniones: *Quercetanus* è familia Metallici desumptum illum existimat, in *Pharm. rest.* c. 17. Alij nihil aliud esse opinantur quam Infusum Trochiscorum Alhandal, quod vide in *Colocynth.* *Tenzelius* Spiritum Vita aureum à rubro diuersum facit, aureum constituens Infusum Troch. Alhandal: Rubrum vero ex terra sancta (*Antimony*) paratum autumat.

VII. SALIFICATIO.

1. Sal $\mathfrak{z}\text{ij}$.

\mathfrak{z} . \mathfrak{z} . Ex quo Tinctura prolecta est, (siue ex Croco metalli, siue ex vitro,) caleinetur in fornace figulina \mathfrak{z} donec in \mathfrak{E} m penitus veratur. Ex \mathfrak{E} hoc extrahe Θ cum \times decantaque. Hinc abstrah \times & clarifica, solatione ac coagulatione, vt moris, iterata.

N. 1. Nisi \mathfrak{z} prima vice probè calcinatum fuerit, adhuc semel calcinari poterit.

N. 2. Eadem calcinatio absolui potest, si \mathfrak{z} cum \mathfrak{A} ana misceatur & comburatur, donec \mathfrak{A} r penitus efflagrarit.

N. 3. Quinimo + Antimony super \mathfrak{z} fusum Sal subdulce elicit.

Vires. *Aequipollet* viribus Θ is ex Θ ; mundificat sanguinem, expurgat corpus ab omnibus impuritatibus, curat Luem Ven. prodest in Podagra, rumpit Apostemata, fugat Febres, extrinsecus mundificat ulcera maligna.

Dosis gr. 4. Thold. in Halogr. vide etiam obseru. *Horstl.* l. 1 in Epist.

2. Aliter.

\mathfrak{z} . Reguli pulu. q. v. præcipita per se, in

in sublimatorio semper quod sublimatum est, materiæ quæ in fundo est, red-dendo. Regulus ita in ☿ erem rubëum conuersus ponatur in cellam ad lique-scendum: liquorem dephlegma aliquan-tulum ac repone ad crystallisandum: Crystallinos purifica.

N. Hi Crystalli cum triplo tripola per ☿ destillati, exhibent primo ☿ alium, dein rubëum, quem rectifica in MB vel VB.

Vires. Prodest hic ☿ in febribus præcipuè ana, atterit calculum vesicæ, promouet ☿, præseruat à Podagra, extrinsecus illitus, mundificat ulcera maligna Basil.

3. Aliter.

℞. ☿ ☿ i rectificatiss. funde super mineram antimonij, stent in digestionem septimanas aliquot, (6) sic soluetur ☿ in massam rubram, terribili fœ-toris. Hanc inde ☿, pelleque igne nudo in receptaculum sat amplum, (vti fit in ☿tione ☿. ☿ i,) sic prodibit primum ☿, hinc ☿ antimonij rubeo colore. Receptaculum tandem vesica probe occlusum reponere in cellam ☿ (14) sic concreuent Crystalli rubicundi, quos exime & sicca.

N. 1. Aquam residuam rectifica, & habebis ☿ ☿ i vt ante.

N. 2. Ex Crystallis his fieri potest ☿, vt ex Sale communi.

Vires. Crystalli hi obstructiones reserant à viscosa ac tartarea mucilagine subortas, purgantque per aluum. Hinc vsus præcipui in affectu hypochondriaco, tertiana, pleuresi, & simil.

Doſis gr. 4. 5. Agricola.

VIII. MERCVRIFICATIO.

☿ Antimonij.

℞. Sal ☿. volat. * ☿ i a. 3j. M. & affunde ☿ acerrimum, digere vase H. cl. per ☿ m, dein destilla in ☿ e ad siccitatem: Siccis his salibus adde Tri-polæ triplum, elicéque ☿ m per ☿ m Δ forti.

℞. Ergo Regul. læuigat. 3vj. affunde ☿ m tuum destillatum, didere ☿ es 2 dein abstrahere l. Δ phlegma, restantique materiæ admisce quadruplum limatur. ☿, destillaque Δ fortissimo ex ☿ in excipulum va semiplenum, ac videbis ☿ m in fundo currentem. Basil. in Curru Triumph.

Ex hoc fit ☿ seu Butyrum ☿, de quo in ☿io.

N. Alium modum exhibet Basilius in repet. Lap. Phil.

Nimirum:

☿ macerat aliquandiu in Spir. ☿ i imprægnato *. Hinc sublimat, sublimatumque in sartagine ferrea agitat ad acquirendum ☿ m.

Alius modus.

℞. ☿. pluriæ destillatæ cum * affunde antimonio crudo puluerisato digere per ☿ (8.) Hinc decanta & euaporare finito, habebisque ☿ erem albi-cantem dulcem, qui ad ☿ m fusus ☿ m exhibet nobilissimum, nihilque aliud est quam ☿ ius antimonij, de quo Ioh. Agricola.

C A P. XVIII.

De Recrementis Metallicis Naturalibus.

Metallinorum corporum enodationem excipit anatomia Recrementorum Metallicorum.

Duplicis hæc sunt sortis; Naturalia & Artificialia.

Naturalia voco, quæ Natura operatrice, dum in gremio terræ Metalla generabantur, ex materia ad generationem eorum inidonea, extiterunt.

Talia sunt :

Cobaltum, Chalcitis, Misy, Sory, & Marcasita seu Bismuthum.

1. *Cobaltum.*

Cobaltum, cadmia natiua, fossilis, metallica, est minerale terreum, colore fere nigrum, æris vel argenti participes. Germanicè *Kobold*, *Muckenpulver*, quia Muscæ eius gustu perimuntur.

Foditur copiosè haut procul Goslaria.

Vires. *Vi caustica & erodendi pollet tanta, ut fossorum manus & pedes exulceret : adeoque inter Venena recensetur, quippe intus haustum animalia quaque perimit.*

2. *Chalcitis.*

Chalcitis est minerale simile æri, friabile nec lapidosum, Sory tenuius, Misy vero crassius, tractu temporis ex Sory factum.

3. *Misy.*

Misy est minerale, colore aurum imitans, aureisque scintillis dum frangitur, splendens, natum super chalcitum & ex chalciti, non secus ac ærugo

nascitur super æs & ex ære.

N. *Misy est efflorescentia chalcitis.*

4. *Sory.*

Sory est minerale lapidosius, & vehemertius compactum, crassissimum, friatum scintillas miscos emittens.

N. *Chalcitis, Misy & Sory. mineralia sunt, inter se origine & viribus coniunctissima. Nimirum, ex Sory fit Chalcitis, ex hac Misy, videatur Matthiolum in Dioscoridem, qui inter recentiores primus quid illa sint, demonstravit. Verum adhuc dum Officinis nostratibus in usum non ventunt, quæ Chalcitis loco Colchotar Theriacæ immiscent, cum tamen genuinum Misy, adeoque & genuinam Chalcitin, monete eodè Matthiolo, Ducatus Brunsvicensis suppeditet.*

Vires. *Adurunt & Escharas efficiunt, attamen & nonnihil quoque adstringunt. Differunt tamen inter se tenuitate & crassitie, Sory partium est crassarum, & proin minus penetrat, Chalcitis tenuiorum, Misy tenuissimarum.*

5. *Marcasita s. Bismuthum.*

Marcasita est ~~metallum~~ Metallicum, in generatione metalli ex portione aliqua ad generationem Metalli inepta productum, inque corpus minerale albicans durum ac fragile mutatum. Germanicè *Wismuth*, *Marcasit*.

N. *Differt à Cachymia, quod illa ex parte magis volatiliori constet, quapri-*

mo scilicet Metalla generabantur, sequestrata fuit, hac ex portione magis fixa atque ultimo segregata.

Vires. Recremento H i respondent.

Vsus rarissimus est & non nisi exterius.

PRÆPARATIONES & PRÆPARATA.

I. CALCINATIO:

Vnde

Magisterium Marcasitæ.

R . Marcasitæ pulueris. q. v. solue in V , [ex O & Θ a fact.] præcipitata cum V , præcipitatum edulcora & exicca. *Beguinus.*

Vires. Confert ad cutis vitia, lichenes scilicet impetigines, scabriciem manuum, & simil.

II. DESTILLATIO & SUBLIMATIO.

Vnde

Oleum sive Liqueor, Sal & Flores Marcasitarum.

R . Marcasitæ crudæ [qualis ex fodinis eruitur.] q. v. e. gr. lb. x.] pulueris maceraque cum Vino albo generoso q. f. ♂ ♀ (3) hinc deple, atque nouum vinum affundendo, iterum macera, toties id repetendo, donec mens. 20. affuderis: Decantationes omnes tandem affunde Matcasitis ac destilla ad siccitatem, hinc obtura rostrum alembici, daque Δ m fortiorum & sublimabuntur Flores argentei,

(N. Liqueor fit, si Flores argenteos per deliquium in cella solueris.)

Destillatum porro lento calore coque, vel, si M mappetis, destilla ad remanentiam mensuræ r. reponere aliquandiu. Hinc coque iterum ad me-

dietatem circiter, reponere ad crystallifandum.

N. Crystallificationem promouere potes imponendo stramina.

Vires. Vtrumque ♂ ♀ & Sal magnarum sunt virium in viceribus cancris, fistulis, aliisque affectibus malignis, Paracelsi. l. de Essentia Metallorum.

Aqua Marcasitæ.

R . Miner. Magnesiæ, i. e. Bismuthi crudi igne non experti, q. v. destilla per O m. & nancisceris V m albam, quam vel tertia vice rectificatam serua.

Vires. Perhibetur extrahere animam auri, relicto corpore albo. Reuificare item dicitur herbam quamcunque aridam, si radice ei imposita maceretur. Quinimo si cum ∇ destillata herba cuiuscunque confundatur, atque cum modico salis eiusdem herbe maceretur, formam herbe eiusdem apparere aiunt. Eadem ∇ cum proprio sale (ex Q o) alcalisata dicitur O m ad miraculum usque resolueret. Fides sit penes expertum.

N. Aqua Marcasitæ clauso vase asseruata, nouilunio dicitur augeri, plenilunio e contra imminui. Andr. Orthelius in Lumine suo Chymico.

III. EXTRACTIO.

Vnde

Extractum Marcasitæ aurea

S. Cloff.

R . marcas. auri (leucophæa obscuris punctis traiecta optima censetur) puluerisetur & imponatur testæ vitæ, calcinetur vi Δ hinc & inde materiam rudiculâ ferreâ agitando, donec non fumiget amplius & A eius impurum omnino combustum sit, tum per incerniculum agatur, & inde Tinctura per X Alkalicatum proli-

ciatur.

ciatur. Euaporato menstruo restabit materia mellita.

Vires. *Cum micâ panis subigitur, formanturque pilula ad pisi magnitudinem. Detur unica pilula pondere gr.vj. ad repurgandum corpus in febribus intermittentibus.*

2. *Extractum aliud valde nobile.*

Eadem Marcasita præparata ut dictum M. cum part. x i i. cremor. ☐ Bull. in cacabo ferreo cum magnâ quantitate aq. communis, dum tingatur aqua, quæ postea filtranda & eua-

poranda est ad consistentiam sapæ, & cum V denuò circulanda in Essentiam.

Vires. *Seruum purgat potentissimè, hydropicos admiraculum inuat.*

S. Closs.

N. 1. *Infusio simplex* 3 Marcasit. in 3 v. vini albi adhuc fortius hydropicos euacuat instar 3 y.

N. 2. *Si ex floribus Marcasit. vel ex vitro eiusdem concinnatis ad normam florum vel vitri 3 y fiet extractio, res felicius erit successura.*

C A P. X I X.

De Recrementis Metallorum Artificialibus.

Recrementa Metallorum artificialia vocò, quæ separantur à Metal-
lis, dum in fornace funduntur & pur-
gantur.

Suntque :

1. Cadmia, 2. Diphryges, 3. Lithargy-
rium, 4. Molybdæna, s. Plumbago,
5. Tutia, s. Pompholyx & Spodium.

I.

C A D M I A.

Cadmia { Natiua { metallica, v. Cobaltum.
 { metalli expers, v. Lapis calaminaris.
 { Factitia, de quâ hic.

Cadmia factitia est corpus densum, ex fuligine æris, dum in fornace conficitur concretum, adhærens lateribus, camerisque fornacum, vel & in partem infimam delabens.

Dicitur *Kadμία*, Arabicè Climia vel Chlimia.

Triplicis id sit generis, nominibus à re quam repræsentare videtur desumptis.

Botritem appellant, quæ Vuæ speciem refert: Ostracitem, quæ testis similis est: Placitem quæ crustis.

Botritis reperitur in fornacis parte

media: Ostracitis in infima: Placitis in editiore.

N. 1. *Sunt qui Capnitern & Calamitem addunt.*

Capnitern, quæ in ipso fornacum ore reperitur, tenuissima, exusta & nimia tenuitate similis fauilla. Verum hæc à Pompholyge vix vel parum differre videtur.

Calamitem vocant, à figura Calami, quam à pertica ferrea acquirit. Nimirum decutitur hæc à ferreis perticis, quibus cadmia, dum as fustum iis agitur, adhærescit.

N. 2. *Quin*

N. 2. *Quin & Cadmia paratur ex Pyrite Lapide in fornace vsto.*

Optima est Botritis, densa, modice grauis, & in læuitatem magis clinans, racemosa facie, quæ fracta cinerulenta est. *Diosc.*

Vires. *Leniter desiccatur, abstergit, ulceribus humidis & putrescentibus confert, eademque ad cicatricem ducit. Adhibetur autem Botritis & Placitis inprimis in affectibus oculorum, reliqua in ulceribus aliis.*

PRÆPARATA.

P. Tutia (porius Cadmia) preparata Officinarum.

Igniatur & extinguitur cadmia in ▽ rosarum, idque terna vice, hinc lauetur vt Pompholyx.

1. Collyrium album Galen. v. Dispens.

N. Præstat in Collyrio hoc, vt & in aliis, loco Cadmia adhibere Pompholygē seu Tutiam. Nec audiendi sunt, qui Cadmiam & Tutiam confundunt, Tutiaque faciunt, quæ Tutia minus legitime, rectius autem Cadmia species est.

3. Unguentum de Tutia Nicolai, V.D.

4. Emplastrum de Lapide calami-nari, V.D.

II.

DIPHRYGES.

Diphryges est genus recrementi metallici, quod subsidet, dum æs in fornace fusum ▽ frigida perfunditur.

Vires. *Mistam habet facultatem, continet enim in se quiddam & mediocriter adstringens & mediocriter acre: quamobrem ulcerum rebellium optimum Medicamentum est.*

Vsus in Officina est rarissimi.

III.

LITHARGYRIVM.

Lithargyros, Lithargyrium Officinis, spumosum excrementum est, è purificatione argenti, quæ per plumbum sit, residuum.

Duo eius genera communiter statuuntur, videlicet Lithargyrium argenteum, quod coloris albi, & aureum, quod flauī coloris existit. Verum non nisi coctione differunt, aureumque magis coctum est, quam argenteum. Germ. *Gleet.*

N. Nihil est aliud, quam H.

Vires. *Siccatur & refrigeratur moderatissime adstringit, reprimat, occludit, cana explet, extergit, sarcoticum est.*

PRÆPARATIONES

Præparationes easdem cum H pro re nata tamen suscipit. Vnde Medicamenta quoque eadem suppediat, quorum tamen præcipua sunt.

1. Sal Lithargyrii, Alumen Hi Paracelsi.

Paratur beneficio ✕, non secus ac Sal Hi: decantatur solutio, filtratur ac inspissatur.

Vires. *Et præcedentibus collige, & si libet respice ad Sal Hi: Internè exhiberi quoque poterit in diarrhæis, dysenteris, reliquisque morbis resolutis. Intestina læsa ac ulcerata sanat ac consolidat, sanguinem astuantem refrigerat.*

Dosis ʒ℥. cum Theriaca vel alio Elettuario sudorifico siue anodyno.

2. Magisterium.

Præcipitur solutio cum ʒʒ. ʒi.

3. ʒʒ Lithargyrii rubrum.

℞. Sal Lithargyrii. ʒ decrepitat. ā M. ac destilla per Om.

Vires. *Curat vulnera oculorum,*

DDd

nigrum

nigrum inspergitur vulneribus.

4. *Extractio seu Tinctura Lithargyri Therebinthinata, alias Balsamus Lithargyri Therebinthinatus.*

R. Sal Lithargyr. ℥ij. ☞ Therebinth. ℥iv. macera in Eibus calidis & rubescet.

Vires. *Mirarum existit virtutum in Chirurgia, conuenit ulceribus inueteratis, ut & tumoribus: curat vulnera, eademque ab accidentibus preseruat, precipue si addatur Camphora ℥β. succurrit itidem fistulis, cancro, morphæis & aliis*

5. *Balsamus seu Vuguentum.*

R. + Sale Lithargyrii imprægnatum, misce cum ☉ (præstat in mortario plumbeo,) sic coagulatur in Linimentum.

Vires. *Confert inflammationibus, ambustis, podagraque calida, & simil.*

N. Eodem modo fit & balsamus ℞i, ex +o sale ℞i imprægnato, & ☉ oliuarum.

6. Liquor.

R. Sal vel Magisterium Lithargyrii, solue per deliquium.

IV.

MOLYBDÆNA seu PLUMBAGO.

Molybdæna s. Plumbage duplex Dioscoridi est: *Natiua & Factitia.*

Illam nihil aliud esse videtur, quam Lapis s. Minera plumbi, seu potius Minera plumbi & argenti simul.

Factitia est species Lithargyrii, videlicet est illud recrementum quod in argenti, antique purificatione cum plumbo, mineraue plumbi instituta, fornacis folio concretum perustum adhærescit.

Vires. *Similem Lithargyro vim*

possidet, ad frigidum paululum recedens, sed nec abstergentis facultatis est pariceps.

N. *Viraque celerrime funduntur.*

V.

TUTIA seu POMPHOLYX & SPODIUM.

Pompholyx est fauilla tenuissima & volatilis, quæ dum æs in fornacibus perficitur, supernæ earum parti adhærescit. Arabicè Tutia. Latine Bulla, Offic. Nil, vel Nihili album Germ. *VVetz nicht Augen nicht.*

N. Coit ibidem in glomusculos vellerum similes, contractaque farina modo dispergitur. Eodem modo & Cadmia, vi ignis violenti in fauillam seu tutiam redigi potest. Vide Diosc.

Spodium est fauilla eadem ob grauitatem in pauimentum decedens. Græcè τῦδιον & τῦδιον. Latine Spodium Græcorum. Offic. Nil vel nihili gryseum. Germ. *Gravv nicht.*

N. Dicitur Spodium Græcorum ad differentiam Spodij Arabum, quod nihil aliud esse, ait Auicenna l. 2. canon. tractat. 2. c. 617. quam radicem alcanne cōbustam, cuius vires refrigerent & exiccant, styptica sint & confortent cor, conferant tremori cordis & hincopa ex cholera suborta, &c. Hoc igitur cum nebis desit, Officina nostrates. Ebur vsum eius loco vendunt, seu viribus similibus præditum.

Vires. *Pompholyx Medicamentorum propè omnium, quæ citra morsum desiccant, (si lota fuerit,) præstantissimū est, quamobrem ad ulcera cancrofa idonea existit, ut & ad alia omnia maligna. Inditur Collyriis, quæ ad oculorum imponuntur fluxiones, quæque bullas seu pustulas in eis natas curant.*

Spodium Græcorum vti specie à Pompholyge

Pompholyge non differt, ita & viribus inter se conueniunt.

N. *Legitima hæc Pompholyx ac Spodium raro in Officinis nostratibus extant, vnde eius loco Cadmia vti solent, verum opera præsumptum est, de legitimis comparandis esse sollicitum.*

PRÆPARATA.

1. Tutia lota.

℞. Pompholygis q.v. inde linteolo modicè raro agitaque in limpida, vt tenuior ac vtilior tutiæ pars aquæ immisceatur, & nil in linteolo remaneat, præterquam quod inutile est. Hinc residere permittitur, ac aqua decantatur.

2. Vnguentum Nihili ad oculos. *V. Aug.*

3. Aliud ad Oculos. *V. Aug.*

4. Diapompholygos Nicolai. Nihil dictum.

De Tutia,

N. *Hic recipienda cadmia.*

CAP. XX.

De Salibus in genere.

Salia nihil aliud esse quam corpora mineralia in ∇ solubilia ac denuo in salinam crystallinamque formam coagulabilia, libro primo dictum est: hoc loco vltiorem eorum enodationem aggredientes, quatenus ea medicam prouinciam subeant, referemus.

Salia quæ medico vsui inferuiunt, adeoque præparatis inde parandis materiam suppeditare apta sunt, triplicis quidem sunt generis, pro triplici scil. mundi regno, minerali, vegetabili, animali: attamen hoc loco primariò non nisi de mineralibus agere conuenit, iisque natiuis solis, ad quorum normam tamen & artificialia; siue è mineralibus, siue vegetabilibus, siue animalibus elixiuata illa fuerint, facile dirigi poterunt.

De horum Salium origine sic sentio: Macrocosmus non minus ac reliqua duo mundi regna sua sustenta-

tur viuitque nutritione. In hac redundat perittoma salinum, respondens falsuginosis excrementis, in animalium vrina, sudore, catarrho, & simil. deprehensis. Dictum perittoma macrocosmicum salinum, in globo hoc inferiore congregatum, variam pro varietate matricum induit speciem, non secus ac excrementum illud salinum in animalibus, differens euadit.

Hinc.

Sal	{	Commune,
		Gemmæ,
		Nitri,
		Alumen,
		Ammoniacum,
	{	Vitriolum,

Quibus & Arsenicum addere licet, quod tamen inter Salia & Δ ra ambigit.

Eligenda sunt Salia hæc in genere loco natali celebriora, tum puriora, nitidiora, & si natura ferat crystallina.

PRÆPARATIONES.

Præparationes quibus Salia subiiciuntur, sunt. 1. Purificatio. 2. Calcinatio. 3. Destillatio. 4. Sublimatio. 5. Fixatio. 6. Liguatio.

I. PURIFICATIO.

Salia, quia plerunque heterogeneis, sciant, minusque syncera existunt, depurari opus habent. Depurationis huius modus pro varietate salium varius quoque institui potest. Potissima tamen ratio salium purificandorum consistit in solutione, soluti filtratione, filtrati exhalatione, ad eoque salis concretionem vel crystallisationem.

Soluuntur Salia non nisi in liquore aqueo, (non sulphureo aut pingui, & proin nec in **V** rectificatis.) Liquor hic, nisi specialis accesserit admonitio, adhibetur vulgariter **V** fontana, in qua sal quodlibet maximè si tepescit, dissolvitur; dissolutum per chartam traiecitur, ut fecibus in charta relictis syncerum transeat; Hoc postmodum humiditate, ad siccitatem usque abstracta, condensatur, vel f. a. cum aliquota liquoris portione crystallisatur.

II. CALCINATIO.

Calcinantur Salia per ignitionem, idque vel sine, vel eum fusionem: & interdum accedente subinde materia feruili, de quibus speciatim in singulis.

III. DESTILLATIO.


Salium destillatio, quia ut plurimum **N**u fixiori grauida sunt, per

Om peragitur, eamque vel simplicem, vel tabulatam: vitream, vel terream, idque igne tum arenæ, tum nudo, pro fixitate scil. maiore vel minore liquoris eliciendi adhibito.

Per **O**m tubulatam destillatio hoc modo peragitur.

Ad manus habere decet **O**m terream formam, quæ in superiore ventris sui medietate tubulum habeat foramine peruium, quo materia per vias iniici, quodque post injectam materiam obturari firmiter possit. **O**m hanc (si lubet loricatam) luto in fornace destillatoria obfirma, ut tubulus emineat, fumariis tamen vno ac altero relictis. Hinc rostro appone receptaculum capacissimum, (quia **N** cum impetu irruentes amplum requirunt spatium,) iuncturis firmiter luto firmatis. Luto lento exiccato accende primo lentum ignem, hinc fortiozem, ut **O** incandescat. Tum iniice materiam paulatim per tubulum, foramenque vel luto, vel bacillo stupha humida circumdato obtura, donec **N** illi impetuosi coagulati [aquæ in receptaculo immixti] sint, receptaculumque clarescat. Hinc iterum iniice, obturaque ut dictum.

Vide de his figuram appositam.



N. i. Commodum erit aliquotam aqua partem

partem receptaculo infundere, cui scilicet impetuosi illi Δ immisceri, adeoque condensari possint.

N. 2. Salia simpliciora citra fluxum seu fusionem destillari volunt, quare ne inter destillandum vi caloris fundantur, duplum, triplum, &c. vel arena, vel farina laterum, vel agrilla sicca humida-ve commisceri solet, quorum beneficio fusio illa præcaueatur.

IV. SVBLIMATIO.

Sublimatio non nisi Sali ammoniaco peculiariter ac præcipuè competit, vt & arsenico. Flores enim Θ communis vno & eodem destillationis actu acquiruntur.

V. FIXATIO.

Fixantur Salia diuersimodè, de quo speciatim suis locis.

VI. LIQVATIO.

Liquari possunt Salia, si vel aëri humido exponantur, vel liquore aqueo aspergantur.

Formæ Medicamentorum seu
PRÆPARATA
Salina sunt.

1. Crystalli seu Sal purificatum.

N. Crystalli Salis, si simpliciter præscribantur, nihil aliud denotant, quam Sal crystallisatione purificatum, sic conficiuntur Crystalli Δ , &c.

Excipe Crystallus Θ dulces, de quibus in Θ . cap. seq.

2. Sal calcinatum.

3. De- { Phlegma. Aqua.
stillatum { Spiritus.
vnde { Oleum.

4. Sublimatum. Flores.

5. Fixatum.

6. Liquor-Balsamus.

CAP. XXI.

De Sale communi.

Sal commune nihil aliud est quam sal fugo ∇ æ falsæ, [marinæ scil. vel fontanæ,] quæ sal fugo humanitatis aqueæ euaporatione inspissata remanet.

Dicitur, Basilio Monacho: nobilissimum ac optimum Aroma. Græcè $\alpha\lambda\varsigma$. Arabicè Melich, Melha, Germ. Salz, Kuchensaltz.

. Duplex Salis huius genus occurrit, marinum scil. & fontanum, vtriusque diuersæ sunt species.

Primas autem Sal marinum sibi vendicat, ac præcipuè Hispanicum, in cuius tamen defectu satius est sal fonta-

num, quod ad manus est, in præparationibus nostris recipere, quam aliud salis genus cum sumptu acquirere.

Inter fontana tamen maxima quoque diuersitas est, reliquisque laudem præripere videntur Hallense ac Lunæburgense: quibus tamen haud multum cedit, quod in Patria mea Vlleniæ VVestphalorum paratur.

Vires. Calfacit, exiccat, abstergit, dissoluit, purgat, adstringit leniter, consumit superfluitates, penetrat, digerit, aperit, incidit, Venerem stimulat, putredinem, venenisque resistit.

Hinc conuenit, Internè in cruditati-

bus ventriculi, appetitu prostrato, obstructionibus, alui & vrinae, colicis doloribus, &c.

Externè, in ulceribus putridis ac serpentibus mundificandis, in tumoribus simplicibus & pestilentialibus discutendis, in combustionum ἐμπύρεσι extrahenda, in pruritu & scabie exiccanda, in suggillationibus, sanguineque extra vasa ro resoluendo ac discutiendo, in dolore dentium, colico, cephalico, arthritico, & simil. mitigando, in oculorum pterygio absumendo.

N. Ad Salis huius communis naturam accedunt salia artificialia, ex vegetabilibus ac animalibus incineratis scil. elicita, unde & iisdem ferè præparationibus subiici queunt.

PRÆPARATIONES.

Præcipua sunt.

Purificatio. 2. Calcinatio. 3. Destillatio 4. Sublimatio.

PURIFICATIO.

Purificatio Θ fit modo vulgari, soluendo in ∇ ac crystallizando.

N. Si solutio hæc ac crystallisatio aliquoties repetatur, tandem Θ dulcescit.

II. CALCINATIO.

1. Decrepitatoria.

Sal calore irritatum crepitare solet. Quare ne crepitando vas destillatorium distrumpat, operæ precium nonnunquam erit, idem decrepitare, i.e. ad Δ m calcinare, donec amplius non crepet.

2. Fusoria.

Funditur sal in +bulo, sine aliquo artificio, Δ e saltem fatis forti adhibito.

Aliter cum Ψ .

R. Θ is, Ψ . añ misce ac in anemio calcina igne violento, vt concreascit. Hinc extrahe sal cum ∇ commun. ac coagula.

Vires. *Basiliius* Θ hac ratione cum Ψ ter calcinatum, singulis vicibus cum noua Ψ anaticè mixtum) abibet in Tinctura (\mathcal{C} conficienda. Vide de \mathcal{C} .

III. DESTILLATIO.

Destillatio Θ is exhibet acidam ∇ , phlegma, sal volatile & spiritum.

Nimirum.

R. Θ . destilla per se ex \mathcal{O} , primò prodibit ∇ acida seu Θ -lata; secundò phlegma, cum quo sal quoque armoniacus seu volatilis sublimatur. Cessa à destillat. ac repone Θ in loco humido ad attrahendam ∇ m (vel aliquota ∇ x parte irriga,) dein destilla rursum, sic exhibit \mathcal{O} acidus. hoc repete toties, donec totum Θ in \mathcal{O} m conuersum sit, quem in \mathcal{M} B rectifica.

1. Spiritus Salis, sine Oleum Θ vulgare.

R. Salis commun. lb. ij. impasta vel malaxa cum argillæ figulinæ, boliuè armen. lb. iij. ad v. & vltra, inde forma orbiculos, quos ad duritiem exiccatos, impone \mathcal{O} x terreæ, ruto obductæ, vix ad medietatem implendæ: iungatur Recip. satis capax & seruatis. Δ gradibus, donec phlegma egressum sit, vltimo pelle forti Δ continuando eundem donec \mathcal{C} albi prodierint, \mathcal{O} m hunc rectifica, phlegma,

ma, vel in **M** abstrahendo, vel si ma-
uis euaporando.

N. 1. Si terram sigillatam loco argil-
la sumpseris, præstantiorem elicies spiri-
tum: Quin imo sal cum triplo arena vel
farina laterum, vice argillæ misceri po-
rest.

N. 2. Quandoquidem in prima de-
stillatione salis portio minima in **M**
resoluitur, nonnulli **Q** in **∇** communi
coquunt, & **Θ** inde extractum, ut prius
destillant.

Alij **Θ** extractum cum **Λ** u illo
priori miscent, aliquandiu digerunt &
deinde cum bolo & sim. **§** ando, to-
tam salis substantiam in **Λ** m trans-
ire faciunt. Croll. Senn. in Inst. l. 5. p. 3.
c. 5. Beguin. Agricola.

N. 3. Impastatur Sal ne fluat, quippe
si fluxerit, vix **Λ** ascendet.

N. 4. Alij.

R. Oust. part ij. **Θ** p. iij. **§** ant-
que, verum **Λ** m **Θ** purum hac ra-
tione acquiri non videtur verisimile,
imò in examine constat, eiusmodi
Λ vim suam ab **O** potius obtinere,
quam à **Θ**.

Vires. Diureticus est & Lithonripti-
cus, tartareamque mucilaginem potenter
resoluit, unde utiliter adhiberi solet in
obstructionibus Epatis, Lienis, &c. in
Hydope, Ictero. Extinguit sitim mira-
biliter, absument corrodendo sine dolore,
quicquid in vulneribus aut affectionibus
aliis putredine corruptum est. Mixtum
cum **Q** o Terebinth. Cera, Camomill.
Verba scicet & sim. dolores podagricos
sedat, topchos discutit. &c. Sariat quoque
membrorum contracturam ac ariduram.

N. Ad eundem modum eliciuntur &
Λ ex salibus artificialibus vegetabi-
lium, quorum vires licet ex plantis suis
aliquo modo coniecturari possint, (e. gr. ex

sale absinthij elicitur **Λ** stomachicus,
&c.) Attamen **Λ** vegetabilium in ge-
nere omnes sunt acidi, instar **Λ** **Θ** is
com. incidunt, resoluunt, &c.

2. **Λ** Salis compositus.

R. **Θ** puriss. & **Θ**. decrepit. (vel
fusi) à **M**. cum dupla vel tripla quan-
titate, [aliq. quadrupla,] argillæ liccæ,
& exinde more solito **Δ** nudo **Λ** m
prouoca.

R. Huius **Λ** lb. i. **Θ** is fusi **§** iv.
digere aliquandiu, ut nimirum **Λ** ad-
iectum solui possit, & protinus per
Θ m destilla. Augebis hac ratione
Λ m & fortiolem reddes, quem eo-
dem plane modo, cum nouo **Θ** fuso,
eadem quantitate sumpto, pro libitu
toties augebis, quoties placuerit. Ab-
strahe ab hoc **Λ** u phlegma, & dein-
ceps eundem r. ectifica per **Θ** m. Vnt-
zer. Agricola.

Vires. Maximarum est virium in
Hydope, intrinsecus & extrinsecus ad-
hibitus, confert itidem in fistulosis vul-
neribus.

3. Spiritus **Θ**. viridis.

R. Fragmenta laterum, indantur
ollæ, ignianturque in fornace calca-
ria; ollæ huic alia superposita sit olla,
sale aliquatenus adimpleta, quod vbi
vicaloris liquefactum fuerit, pertun-
de fundum ollæ superioris, ut sal fu-
sum in ignita defluat laterum fragmen-
ta, cumque iisdem misceatur. Ex his
igitur **§** etu **Λ** r per **Θ** m ut moris.
Sennert. Institut.

N. Idem perfici potest, si sale in cella
liquefacto fragmenta laterum ignita im-
buantur.

4. Spiritus **Θ** corallatus.

R. Sal comm. lb. iij vel iv.

Corallor. tenuiss. tritor. lb. i. **M**. læ-
uigando super porphyr. postea igne
destilla

destilla vehementissimo in excipulum capaciss. & in salis accipies vna cum Σ u corallorum.

N. Addere potes & sabulum, ut fusio impediatur.

Vires. In affectibus cordis, palpitatione scilicet & sim. maximarum est virium.

Dosis \mathfrak{B} .

5. Spiritus Salis dulcis.

R. Σ Ois optimè dephlegmati ∇ opt. a M. \mathfrak{J} lentur ter vel quater, sic vniuntur inseparabiliter & dulcescent.

N. 1. Eandem dulcedinem consequi poteris, si vel ∇ , vel \mathfrak{O} \mathfrak{Q} i, vel feces vini ab initio \mathfrak{J} lationis cum Θ commiseris.

N. 2. Exiit quoque Σ Θ vi corrodente ac velut maturescit, dulcescitue \mathfrak{J} dephlegmatus vase firmissimè clauso trimestri spacio in Θ bus continuo atque equali calore tepentibus [qualis est Θ is astimus] digeritur.

Vires. Egregium præseruatium est in peste, arcet enim omnem putredinem. Ventrículum cum visceribus reliquis in optima conseruat dispositione.

Soluit corallia, &c. quinimo & Θ is tincturam extrahit, vide ∇ temperatam Basilij in ∇ l. 4. class. 2.

Vfus. Cum saccharo cando in formam Electuarij misceri, singulisque diebus ieiunio ventriculo assumi poterit. Hartm. in præf. loc de pest. Senn. iniust. Tentz. Gluckraht, &c.

6. Aliter.

R. Sal fusum, solue in ∇ pluuia destillata, filtra, inspissa, ac reponè ad crystallandum: Crystallòs hos exemptos viciibusque aliquot, (10) vtri dictum solutos & crystallifatos, (sic dulcescent) imbebe cum ∇ , formaque globulos cum argilla, destillaque vt moris, est.

Vires. Prater virtutes iam descriptas, insigne exhibet menstruum ex rob fere omnibus tincturas extrahere idoneum: insuper Herniam carnosam consumit, si quotidie ter illinatur: manequè ac vespèri eius gutt. x. assumantur. Agricola.

7. Θ dulcis compositus.

R. Σ Θ compositi ac Alcohol. Vini a M. ac vni circulando, cohobandoque,

Vires. Adeo resistit siti, vt Hydropici vsu illius aliquandiu à siti liberè reddantur, prodest etiam Ictericis, Lumbricos potenter expellit, extrinsecus lente podagram si caute illinatur, imo, quicquid de Ol. Spirituè Θ is apud Paracelsum, aliosque modernos Auctores legitur, id ipsum huic potissimum adscribendum est.

Dosis g. 6. ad \mathfrak{B} . in uno vel alio Liquore. Hartmann. in Croll. Tentzel. Vntzer.

8. Spiritus Θ is \mathfrak{D} lati diureticus.

Fit ex leuiter calcinati \mathfrak{D} li & Θ tosti partibus æqualibus cum bolo vel ∇ figulinâ globulis confectis, (meo damno expertus \mathfrak{D} lum his non sufficere ad cohibendum fluxum, fixitatemque materiæ) more vero communi Σ us euocatur, qui postea per rectificationem à phlegmate liberatur.

Dosis gutt. vj. matutino tempore cum brodio decoctionis petrosel. Excommunicatione G. Horstij habuit S. Closs.

9. Spiritus Essentialis.

R. Salis Hallensis ad albedinem calcinati (qui hac in operâ reliquis præfertur) \mathfrak{Z} ij. Imbibatur \mathfrak{O} Θ mar. vel montan. ad consistentiam pultis liquidioris. fiat clauso vase digestio. quousque Σ us cum Θ calcinato vnitus siccatúsque sit, affunde alium imbibendo

bendo, deficcandóque toties, dum sal vltiorem proprij sui Σ us incorporationem reculet, & ex colore aureo odoreque suauis dignoscas, \S rationis tempus instare, quam si per Θ instituas, exhibuit fumi albißimi, qui in aquam conuertuntur & rectificatione opus habent.

Vires. Dicitur ex Θ tincturam absque corp. dilaceratione allicere. Est insuper remedium sistendis in momento Vomitibus dicatum & certum, idque indifferenter & in omnibus morbis.

Dosis gutt. 3. in Sympo, in sculo vel vino.

Ex commun. S. Clossai.

10. Spiritus Θ dulcis Θ em soluens.

Extinguantur fragmenta laterum 5. aut 6. vicibus in Θ o Θ , postea destillentur, prodibit Σ us subacidus, qui in volâ Θ is folia & margaritas soluere creditur. 2. Flos Salis siue crystalli Θ dulces collo Θ post destillationem affixi, longóque tempore cum Θ digesti idem efficiunt. 3. Solus Σ us Θ vi circulationis diutinæ caudam suam deuorat, id est acridinem suam innato suo balsamo dulcificat. 4. Idem cum Σ u ardente Π ni mixtus aliud menstruum dulce præbet Θ is solutiuum. 5. Ex spiritu Roris Majalis & sale calcinato fit alia Aqua solutiuu dulcificata longâ digestionum & irrorationum serie, quæ Θ em in liquorem volatilem potabilemque euehit.

Dx communicatione eiusdem.

11. Crystalli Θ is dulces, seu spiritus Θ coagulatus.

P. Θ terrea, ampla & fortis, quæ in superiori ventris capacitate fistulam habeat in medium æ corpus pone desinentem. Huic Θ æ impone Θ .

commun. vel quod melius Hispan. seu marini Π .ij. vel 1v. Receptaculumque adapta capacissimum, cui si libet ∇ in infunderelicet; adde Δ per gradus, donec Θ fluat, tum per fistulam guttula vna vel altera ∇ æ frigida immittatur, vt (fistulæ orificio statim obstrueto,) in Θ spirituum copia mediante humiditate eleuetur, inque receptaculum propellatur, continua hoc ipsum, donec Θ in Σ m ferè sit redactum. Dephlegmetur dein \S atum, euaporètque humiditas; reliquum exponatur ad crystallifandum, s. a sic crystalli colligi possunt Sacchari dulcedinem referentes, solubilesque per deliquium.

Vires. Sudorificum est, Hydropicorumque sitim non minus ac Θ ille salis dulcis compositus arcet; quippe nihil aliud est quam Σ Salis coagulatus, unde quoque essentiali humiditatem, quæ multum in Hydropicis exhauritur, maximopere adiuvat, ventriculumque ac viscera reliqua confortat, malignitatem in peste, pestilentialibusque febribus potenter discutit.

Dosis gr. 5. 6. 7. ad 20.

N. 1. Si ad sal comm. exiccat, Π .j. addideris carbonum puluerisat. Π .ij. optimèque miscueris, ex Π .j. Θ accipies Spiritus Π .f. Hartm. in Croll. Kessler. 4. cent. 79. Agricola.

N. 2. Crystalli hi cum Θ imprægnati nobilissimum exhibent confortatiuum. Fiquè si Crystallorum p. 6. cum Θ foliat. p. 1. aliquot \S as in + sub tegula reuerberantur. Agricola.

N. 3. Kesslerus docet & follem adhibere, cuius rei gratia Σ m habere duplicem tubulum oportet, alterum frigida immittenda, alterum folli intromittendo inferuentem.

12. Flores sal communis.

Quemadmodum in succini destillatione flores, salis volatilistitulo eleuantur, parietibusque ac collo Δ adhærescunt: ita & g atione \cup olei uè salis, tandem Δ is vehementia flores ascendunt, quos collige.

Usus horum varius est, ac crassum phlegma incidendum, corruptosque humores à putredine vindicandos.

N. 1. Sunt quicum \ast sublimant, verum decipiuntur, si flores salis simplices inde sibi imaginantur.

N. 2. Fiunt etiam flores salis, si in rectificatione \cup ac \cup lei Salis id quod residuum fuerit fortiori Δ sublimes.

N. 3. Si g atio facta sit cum \cup , \cup m aëri aliquandiu expositum, ac iterum g ationi subiectum, plus olei ac florum suppeditabit, potest hoc aliquoties repeti.

13. Alius \cup seu \cup Θ . unde

Crystalli dulces.

R . Θ marini crebris solutionibus [in ∇ pluuiæ. vel fontis destillata] filtrationibus & coagulationibus optimè purificati, lb. vi. adice dissoluentis Θ lati & mellisflui ex vegetabili & animali parati, (i.e. \cup i ex melle facti,) q. l. præmissa digestionem destilla gradatim ac cautè, ex Θ terrea vel vitrea, luto probè munita in receptaculum capaciss. Sic elicies \cup aqueos sulphureos ac Θ latos, dulces acidosque, qui firmissimè salî reconditi inhærent, [gradatim ac cautè g atio hæc peragenda est. Oportet enim vas incandescat, purpureo tamen non claro colore, ne scil. Θ fluat, & in hoc gradu immorari decet 8] post \cup nebulosos, [in quibus primum Ens metallorum resolutum est,] exhaustos, tandem ad collum recipientis sublimabitur ∇ foliata instar niuis albissima,

vel etiam flaua, [qui g aut g r philosophorum nuncupatur.] \cup m destillatum, vt & ∇ m coniunge, abstraheque phlegma solummodo insipidum \cup calore lentiss. reliquum repone ad crystallifandum f. a Et hoc repete, donec nulli amplius crystalli concreuant, & id quod extillat aciditatem sapiat. Tunc ab opere desistendum, & \cup m fundo cucurbitæ quærendum verum Θ is \cup vitriolatum.

Vires. Crystalli hi, etsi sapore dulces, admiranda tamen sunt virtutis, adeo \cup m vel per se seorsim, vel cum oleo suo debita proportionem permixti, verum sint Solis menstruum ac dissolvens, quod proprietates eius ac virtutes vitales, vegetantesque locupletat & exacuit.

14. \cup Θ is rubrum.

R . Sal fusum \cup o sufficienter ita prægnatum, misce cum silicibus grossè contusis & destilla ex \cup per \cup m, prodibit primo \cup flauus, postea \cup rubrum.

N. Imprægnatio illa fit ut moris.

Nimirum:

Θ fuso superfunde \ast , & abstrahe per \cup m: iterum superfunde nouum \ast . & rursum abstrahe, hoc toties repetendo, donec materia optimè sit putrefacta & nigra.

IV. EXTRACTIO:

Vnde

Tinctura Salis:

R . Salis calcinati q. v. solue in ∇ still. & coagula, idque repete tantisper, donec Sal purum sine fecibus dulce reddatur.

Hinc

R . Maius p. ij. \cup vsti part. i. destilla Δ e nudo paulatim, donec \cup omnes propulsi sint, \cup m hunc rectific

ficā vicibus aliquot (4.) Dein ex ☉ Sal cum ▽ destillata elicitō, idque optimē solutionibus ac coagulationibus purificatum, calcina in phiola ad rubedinem, (fit spacio ☒.) Huic demum superfunde ☿ priorem, digere & elicies Tincturam rubicundam, quæ nec recusat per ☿ pro-
pelli.

Vires. *Sudorificum ac diureticum est*

insigne, tartareas mucilagines incidit, putredini omnigena resistit, corroborat itaque Balsamum natiuum, adeoque vsus præcipui est in peste, febribus, hydrope, calculo, (attingit nimirum,) obstructione Epatis, Lienis, &c. Quinimo & sanguinem mundificat, unde maxime prodest in cutis pruritu, doloribus arthriticis, & similibus.

Dosis ℞j. ad ℞i.

CAP. XXII.

De Sale fossili seu Sale Gemma & Indo.

SAL Gemmæ salis communis genus est, quod in fodinis lapidum frangitur, specieque Crystallorum splendens eruitur, unde gemmeum, à gemmis ob colorem nuncupatur, dicitur alias Sal fossile. Germ. *Steinsaltz.*

Vires. *Hoc etsi easdem vires cum sale communi obtineat, substituique eadem queat, rarioris tamen vsus est in praxi Medica; crebrioris in Chymica, ubi in solutionibus Metallorum Salis communi antecellit. Commendatur tamen peculiariter Foresti experientia ad stercora dura eliquanda, adeoque ad colicæ tormina arcenda intus & extus l.*
21.5.

PRÆPARATA.

Omnes præparationes subire aptum est, quas ☉. Attamen præcipua quæ ex illo in vsum veniunt.

Sunt

2. *Spiritus Salis gemmæ, Spiritus ☿ fusibilis & talis.*

Fit eodem modo, quo ☿ ☉.

Nimirum, ☿ miscetur cum triplo argillæ vel sabuli, &c. ☿ aturque per ☿ igne nudo.

2. *Balsamus Salis gemmæ, seu Liquor.*

℞. ☿ ℞ij. fluat ad ▴, & postea solvatur in ▽ pluuiæ destill. Filtratur coaguleturque. Has operationes liquefactionis, scilicet solutionis, filtrationis & coagulationis tantisper repete, donec ☿ ad summam subtilitatem fuerit perductum, quod inde cognoscitur, quando eius particula ad candellam admota, statim liquefcit.

Vires. *Arcanum summum est in rupturis, intus & extus adhibendum.*

Intra corpus dantur quotidie gutta aliquot (3. 4. 5.) cum Extr. act. consolidæ.

Extus fiat illitus, Harvini præct.

N. *Mentio quoque apud veteres fit Salis Indi, de quo ambigitur, quid propriè sit. Sunt nimirum, qui contendunt non esse Salis genus, sed Saccharum, salis nomine insignitum (ob similitudinem quàm cum sale habeat.) Verum enim verò rectius sentire videntur, qui id pe-*

E E e 2 culiare.

culiare genus salis fossilis faciunt, eiusque loco, cum raro vel nunquam in nostras regiones transportetur, Sal gem-

meum recipiunt. E.gr. in Pelulis de Lapide Lazuli, & simil.

C A P. XXIII.

De Sale Nitri.

SAL Nitrum est Sal Sulphureum, seu *φλῆγισον*, salso-amarum ex terra pingui excoctum.

N. *Et si præter Nitrum antiquorum quod planè nobis incognitum est, triplex dari possit. Nimirum 1. Quod ex terra extrahitur. 2. Quod muris lapideis adhaerescit. Et 3. quod scopulis seu rupibus adnascitur: Attamen Officinis nostris, non nisi unicum usitatum est. Primum videlicet, idque excoquitur ex terris desertis ac pinguibus, siue pinguedo illa à terra Archaeo sit immissa, siue aliunde introducta. Introducitur enim e.g. urinis atque excrementis animalium ac columbarum.*

Chymicis dicitur Gerberus Chymicus, Sal infernalis, Sal *ἄρεος*, Hermes, Baurach, Algali, Sal Anderonæ, Anatron, Cabalatar, &c. Basilio, Serpens terrenus, German. *Salpeter*, *Salniter*.

Eligendum nitrum est crystallinum, purum. Tanto autem purius censetur, quanto minus salis communis participes fuerit, participationem hanc expetiri licet *πλοχόσι*.

Nimirum:

Mitte sal nitrum in carbonem ignitum, si omne auolauerit, purum iudicatur, & è contra, si aliquid remanserit, quantum remansit, tantum de sale communi participare aestimatur.

Vires. De Nitri qualitatibus primis haut parum controuertitur: Sunt enim qui calidum, sunt & qui frigidum id aestiment.

Ceteras Nitri vires quod attinet, vim habet putredini resistendi, sitim ac astum compescendi, Tartaream saburram incidendi, coagulatos sanguinis grumos resoluendi, dolores mitigandi, (id quod præcipuè lapidi Prunella adscribitur.)

Hinc

Vsus eius tam internus, quam externus vulgarissimus est.

Internè soluitur in potulentis ac præcipuè in ∇ fontan. (*3. vel ʒiʒ. in mensur. 1.*) exhibeturque in febribus ardentibus epatis ac mesarai.

N. Vbi alius nimis laxa fuerit, vel ventriculus debilis, eius vsus non ita proficius est.

Externè communissimus eius vsus est in inflammatione faucium & angina (ubi in gargarismis solui solet. 1.) in topicis anodynis ac refrigerantibus, ubi præcipuè soluitur in liquore appropriato & imponitur cum linteo: in combustionibus, ubi simili modo applicatur.

Dosis eadem quæ lapidis Prunella.

PRÆPARATIONES.

Præcipue sunt.

1. Purificatio. 2. Calcinatio ac Fixatio. 3. Destillatio. 4. Extractio.

PVRIFI

Vnde

Nitrum Crystallifatam , seu Cry-
stalli Nitri.

Nitrum crystallifatam quando sim-
pliciter præscribitur, nihil aliud intel-
ligi solet, quam Nitrum sine calcina-
tione, sola solutione ac crystallifatione
purificatum. Soluitur autem in ∇ com-
muni, crystallifatúrque s. a. vt moris.

Depuratio sal Nitrum.

Præter eam quæ a Kessler art. 61.
centur. 1. describitur, fit quoque, si th .
xv. \odot in mensur. vnâ aq. comm. soluas
in cacabo æneo super Δ lignorum
per dimidiam horam, si probè solum
est, remoue ab Δ , & sensim per vices
instilla z iv. aut circiter +, tege caca-
bum pluribus linteis, & sine concre-
scere in diem alteram.

Ex S. Closs.

II. CALCINATIO.

Vnde

1. Lapis Prunella, Nitrum tabulatum,
seu præparatum, fixum, anodynum
seu crystallum minerale.

R. \odot . puri q. v. fundatur in + bulo
superinice aliquid A puri (melius est
flor. A .) quod vbi deflagrauerit ite-
rum aliquid A is immitte, idque re-
pete, donec super \odot z j. inieceris z ß.
ad z j. & \odot planè purum fiat, tum
effunde; & hic est lapis prunellæ vul-
garis.

Nitrum hoc modo præparatum si
qua impuritates contraxit, purificari
potest solutione & crystallifatione, vt
supra dictum.

N. Præstat ∇ m rosarum pro soluen-
te adhibere.

Vires. Vires ac Dosis eadem qua
Nitri, imo qua supra de Nitro dicta

sunt, de lapide hoc prunella potissimum
intelligi debent.

N. Dosis, Hartm. in practica. miscet
huius \odot i præparati z j. cum mensur. 1.
Liquoris, seu ∇ a pro potu febricitan-
tium. Ego vix Div. transcendo, nimirum
aliquantulum, debilitat ventriculum,
vnde & alui fluxus concitare nonnun-
quam solet, aliàs à z ß. ad z j. propinari
sine noxa potest, præcipuè autem cum
Saccharo, quo amaror mitigatur. vide
Sennert. Institut. Beguin. lib. 2. cap. 12.
Quercetan. in Pharmacop. rest. & Ale-
xicac. & c.

2. Nimirum fixum, aliud.

R. \odot pur. th . iij. Ψ th . iv. M. & ce-
menta z 5. vel 6. dein extrahe \odot af-
fundendo ∇ m calidam, filtrando & fil-
traturam inspissando.

N. Prima Crystallifatio \odot optima
censenda est, continet enim nitrum pu-
rius & magis inflammabile, secunda,
qua fit per euaporationem eiusdem aque
vsque ad medias, minus sincera est, &
 \odot fixi particeps.

3. Aliter.

R. \odot q. v. affunde N um \square a, de-
stillaque sensim, tandem adde ∇ m au-
ctiorem vt fluat; Labores hos repete
aliquoties, (5. ad minimum,) semper
nouum N m affundendo.

N. 1. Alij pro N u \square a substituunt
 N m A ris.

N. 2. Nonnulli Nitrum laugatum
impastant cum albumine oui, exsiccant-
que ad Δ m, tandem augent Δ m vt Ni-
trum fluat: hinc effundunt.

Vires. Metalla reddit malleabilia.

4. Crystallum minerale saccharatum.

Fit, si Crystallo minerali in ∇ ro-
sarum soluto Sacchari ana misceatur,
idque fit propterea ne scil. vrinofus
sapor molestiam pariat. Fel. VVirtizius

4. Chirurg. c. 4. pro arcano habet in hamorrhagia vulnerum.

5. Nitrum perlatum.

℞. Di \times solut. part. iij. vel iv. sal perlat. itidem in \times solut. p. ij. vel ana coniunge, coagulaque euaporando, ac repone in frigido loco ad crystallisandum.

Vlus. Egregium est cordiale & mitigat simul aestum febrilem.

6. Nitrum corollatum.

Fit eodem modo ex sale scil. corallorum & O an.

Vires. *Vsus idem est cum priori in febribus & virium restauratione.*

7. Nitrum saturnisatum.

Fit eodem modo, nimirum, ex Saccharo Hi & O puro, seu lapide prunellæ,

Vires. *Confert asthmaticis.*

Dosis g. 6. vel 7. in ∇ aliqua conuenienti.

N. Si cuiquam lubet nitrum vel lapidem Prunelle tingere, soluat tincturam rosarum, violarum, santali fl. Tunica, & sim. in appropriata aqua, in qua nitrum sit solutum, reponaturque ad crystallisationem: Eodem modo & Saccharatum crystallinum tingi potest.

Crystalli Di sine Draco fortificatus.

Digere nitrum depuratissimum in Au O , vt illius soluat quantum poterit, abstrahe, egredietur phlegma, alium Au suffunde, digere, & a, donec tam acer exeat, vti affusus fuit, tùm satis Draconem imprægnasti, liquorem in O residem pone in cella vt lapillefcant, hos lapillos in aqua solue & denuò in Crystallos coge.

Ex commun. S. Closs.

Vires. *¶ eas materias expellunt hi crystalli, sudores, sedes & Urinas mouent.*

Dosis Dj . in aqu. appropri.

Terra foliata O S. Closs.

Candefac D in + & per vices iniice carbonem viuum, vt C inardescat, continuat donec flagrare desinat, quod restat soluat in \times , filtretur, coaguletur, idque ter cum nouo \times repetatur. Tandem soluat in V , qui postmodum S etur. In fundo erit Terra Talcosa nitri fusilis instar ceræ.

Vires. *Obstructum Mesenterium & lienem liberat, suauiterque repurgat extractis Rhabarb. & sene commodè additur ad virtutes eorum augendas.*

Dosis ʒB in dicto radic. aperitinarum.

Nitrum O rum, seu Sal dulcis Holsatib. Panacæa duplicata.

Arcanum duplicatum.

Nihil est aliud quam O ex Q V (ex O & O an.) extractum, crebrisque solutionib. & coagulationibus ita depuratum, vt candidissimum existat. Hæc sublimissimè puluerisatum, & cucurbitæ lutatæ impositum, calcinatur ita vt liquefiat. Melioris liquefactionis ergo aliquota pars Di additur,

N. 1. Laborem hunc interdum 2. & 3. vice repetere conuenit.

N. 2. Si vice tertia repetitio iteranda sit, expedit prius materia solutione accoagulatione à fecibus depurare.

N. 3. Alij liquefactionis ergo ℞. Lap. Prunelle p. 1. ad O is illius p. 2.

Communicata mihi fuit hæc descriptio diuersis è locis, & præ alijs ex illustr. aula Holsatiae, Gottorp. vnde & nomen illis in locis obtinuit.

Vires. De viribus ita ad me Cl. D. D. Joel Langelot scribit: Mille experimentis salis huius efficaciam Aula nostra

III. SVBLIMATIO.

Vnde

Flores sal nitri.

R. \odot is, an. lb. 1. fluant. Hinc superiniice carbones ignitas ac superimponere fictile in versum rite adaptabile. Sic exurgunt flores in futile superius superius panno madido obducendum. Candidos illos flores penula absterge & serua. Facile liquefcunt in aqua.

Vires. Efficax est medecina in febris tertiana, aliisque astibus. Ioel Langel.

N. 1. Butyrum candidum purgatum ex liquore \odot & salis \oplus vide in Myrothec, Fabri p. 330.

N. 2. Arcanum \ominus per calcinat. 3. & cum Ψ ro & solutionem cum ∇ , additis spiritu cinnamomi &c, vide in Deo dato p. 177. 178.

IV. DESTILLATIO.

Vnde

1. Spiritus Nitri.

Ω eodem modo rectissime paratur, quo Ω is, nimirum \ominus , cum triplo aut, quadruplo boli, argillæne siccae, cum vel sine formatione globulorum miscetur, perque retortam destillatur.

N. Loco argillæ recipi potest Δ .

2. Modus alius.

R. Ω in superiore ventris eapacitate tubulatam] præstat habere ferream,]. pone in fornacem vt tubulus emineat receptaculo adaptato capacissimo exactè Ω æ annexo. Hinc candefac Ω m ac iniice \odot per vices, tubulumque statim obtura. Sic Ω in receptaculum irruet, ac subsidebit.

N. 1. Subsidentia hac feliciter ac celerius fiet si receptaculo ∇ infundatur, vellinteum frigida humectatum imponatur.

N. 2.

Ara comprobauit in Melancholicis affectibus, febribus quibuscunque continuis in intermitentibus, calculo, scorbuto, &c. Quin & somnum conciliasse, præsertim in Melancholicis non semel notauimus.

Dos. à \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} ij. Constitit illustriss. nostro descriptio quingentis imperialibus. Libras aliquot quotannis absumimus. Mynsichtus hic accepit, qui illud sub nomine Arcani duplicati vendit.

Ad salis illius part. 7. Calcis \odot rite preparata p. 1. addimus.

Sal cachecticum Chalibeatum.

R. \odot is illius puri (ex \odot ∇) p. ij.

Sal comm. prunellæ. p. 1.

1. Fluat sal comm. prunellæ in +bulo, hinc superiniice animam \mathfrak{z} is siue illa liquida sit, siue in forma pulueris) sic rubescet. Si satis imprægnatum ac rubeū videatur, conterendo admisce \odot illud sal cōmuni, fiatque, puluis subtilissimus. Hunc inde cucurbitæ vitreæ, da ∇ arenæ gradatim, tandemque fluat instar aquæ (quo diutius, eò melius.) Denique fracto vitro exime lapidem rubicundum.

Vires ac Vfus: Summè conducit (vt & Sal Holsat) in appetitu prostrato, cachexia, febribus, nephritide, catarrhis, scorbuto, lue gall. contractura, paralyfi, & vbicunque sanguinis emēdatione opus est. Somnū inducit. & alia præstat quāplurima, idque vt plurimum insensibili transpiratione, nonnunquam sudore sine molestia, aliis blandum mouet vomitum, sed raro, aliis leniter aluum ciet.

Dos. à g. 6. ad \mathfrak{z} i. in liquore appropri. Ex commun. Amici Hamburg.

N. 2. Si quis flores in destillatione eleuatos seorsim colligere velit, habere creditur quo ☿ium figere possit.

Vide ☿ Crystallos ☉ dulces.

Vires. Reprimit ac sedat effervescentiam ☿ Salis microcosmici, discutiendo ac resoluendo malignos, crudos, nitrosos, tartareosque vapores: viscera, reseruat, calorem p. n. infringit, mouet insuper ☿ sudorem, unde vsus eius insignis in colica, pleurisi, prunella, febribus aliis, precipue malignis.

Dosis ℥j, ad ℥ij. &c.

Vsus eius tum internus, tum externus esse potest, v.g. in gargarismis & simil. In colica miscetur cum an. ☿ ut fiat mixtura ℥ij. ad ℥j. quæ in haustu ☿ æ fontanæ exhibetur: Illini quoque potest vmbilico cum ☉ o Nucistæ ac tantillo Zibettæ.

3. Alius modus Kessleri.

℞. Alumini vsti & ☉, a M. ac destilla per ☉ m 1. cent. 56.

4. Alius eiusdem cum ☿.

℞. Sal nitrum puri q. pl. impone ☿æ tubulatæ cum receptaculo capaciss. aliquota parte ☿æ adimpleto, da ☿ m ut fluat Sal nitro, postea fluenti superiniice per tubulum parum ☿is puri, claudèque orificium, &c. hanc coniectionem ☿is repete, donec sal nitrum consumptum sit, sic prodibit liquor seu ☿. ☿ instar butyri ☿ij: ☿ m hunc ☿, dephlegma, ac rectifica, &c. Materia in ☿ relicta suppeditat ☉ fixum.

5. Spiritus sal Nitri Bezoardici.

Est ☿ sal Nitri in præparatione Bezoardici mineralis butyro affusus, ac iterum destillatione in ☿ abstractus.

N. Hic si celeriter urgeatur, extillat rubicundus commodumque menstruum

præbet ☉ soluendo ac volatilizando. Vide de ☉.

6. Aqua caustica, seu aqua fortes.

Aquarum fortium ut & regiarum (quas dicunt) magna passim est varietas. Fiunt pro diuersitate scoporum è salibus mineralibus, ad scopum facientibus, ☿, ☉, ☿, & simil. Nos breuitatis studio vnica ac altera descriptione contenti remittimus tyrones ad Authores fusè de his tractantes, ut sunt, Beguin. lib. 1. c. 3. Sennert. Inst. lib. 5. part. 3. sect. 2. c. 6. Liban. l. 2. Alchym. tr. 2. c. 27. &c.

7. Aqua fortis communis.

℞. ☉ i exiccati, ℔ ij.

☉ ℔ j.

Tere simul & misce.

Destilla per ☿ m loricatam, ☿æ aperto per gradus: est operatio horarum 12.

N. Geber. Lib. Inuent. cap. ultimo, addit ☿ ℔ ij. ☉. destillatque: in destillata hac ☿. soluit ℔ ij. ☿. ad ☿ acquirendam.

Vires. Soluit ☿ ☿ ☿.

8. Aqua Regia, Stygia, Chrysulca Basilij.

℞. Sal Nitrum part. ij.

☿ part. ij.

Silic. contus. p. iij. circiter.

Destilla per ☿ m ignitam tubulatam, vide in ☿. destillationem ☿æ stim. ☿rea.

Vires. Soluit ☉ eumque per ☿ se cum transportat. Basil. in Clauib. Tent. Zel.

N. Vsiatissimus facillimusque modus destillandi modernis est per cacabum seu ollam ferream, cui ceu alembico terreum imponunt capitellum cum rostro, destillantque igne aperto in receptaculum capacissimum.

9. Eadem

g. Eadem ∇ , alio modo destillata.

R. $\textcircled{1}$ i per se q. v. & cum tribus partibus silicum contusorum misce, destillaque igne libero per \textcircled{M} . Sic habes ∇ m nitri: postea habeas \textcircled{E} è quibus per ∇ m calidam extractum sit sal, vt omnis acredo lixiuij auferatur, hos \textcircled{E} misce cum \ast , sit autem \ast tantum, quantum antea erat $\textcircled{\Theta}$. destillaque Δ libero per \textcircled{M} . Sic habebis ∇ R.

N. Si velis rursum ex B. vel \textcircled{E} ibus per alembicum nem destillare, sit clarior & lucidior. Tentzel.

IV. EXTRACTIO.

Vnde

Linctura nitri.

Tinctura $\textcircled{\Theta}$ ad eundem fieri potest modum quo $\textcircled{\Theta}$ is.

Vires. Insigne est co roborarium, diaphoreticum.

CAP. XXIV.

De Alumine.

Aluminis genera vſitatoria Officinae quinque nobis exhibent.

1. Rupeum] Gallis *Allun de Roche*. 2. Plumeum seu plumosum; videatur Amiantus. 3. Scissile, [quod glebarum instar est & plumosum oblongum vocatur.] 4. Zuccarinum siue Saccharinum (ex O rupeo, albumine ouorum & aqua rosacea.) 5. Alumen catinum.

Verum vt in omnibus locis vbi Aluminis simpliciter mentio fit, ita & in his nostris præparationibus, rupeum recipere fas est: quod nihil aliud scilicet est, quam salsugo terræ mineralis naturæ saturninæ, constans ex spiritu acido ac sale terrestri caustico.

Triplicis autem id originis est vel enim 1. per se in vinis suis inuenitur, vel 2. ex ∇ is mineralibus excoquitur, vel 3. ex terra & lapidibus alijsuè mineralibus extrahitur.

Dicitur autem Rupeum, quia ex Rupe seu faxis confici solet. Item, Glaciale, quia glaciei conforme est

Græcè *σουλφία*. Arabicè *Sceb* f. *Seb*. Germ. *Alaun*.

N. 1. *Mentio apud Dioscorid. fit quoque Aluminis rotundi & liquidi, verum cum nostratibus minimè ea vſitata sint, omisimus: nec audiendi sunt, qui liquidum Alumen faciunt materiam aluminis rupei. Vide Matthiol.*

N. 2. *Alumen catinum, propriè aluminis genus non est, sed Sal ex \textcircled{E} bus lignorum quorundam extractum, optimeque reuerberatum. Germanicè *VVeid. Asche*. Huc referri potest & *Alumen fecum*, quod paratur ex fecibus vini vſtis & albefactis.*

N. 3. *Modum alumen rupeum conficiendi, si quis scire cupit, consulat Matthiol. Liban. in Alchym. &c.*

Vires. *Exiccat, abstringit, incrascat, &c.*

Vſus. *O crudi precipuus externus est, [quāuis ab Empiricis & internè profectifugo exhiberi soleat,] ac imprimis in angina & columella laxata, putredine ginginæ, tumori b^o pedū adematosis, &c*

Fff

N. Sunt,

N. Sunt, qui in dysenteria O exhibent.

tura euaporet & habebis Sal fixum Ominis.

PRÆPARATIONES &
PRÆPARATA

1. Crystallisatio seu Purificatio. 2. Calcinatio seu Vstio. 3. Salificatio. 4. Destillatio, 5. Subtilisatio.

I. PURIFICATIO seu CRYSTALLISATIO.

Aluminis purificatio fit more vulgari, scilicet soluendo, in ∇ pluui. calida, euaporandoque, donec cuticula in superficie appareat; hinc reponitur ad crystallisandum.

N. Hanc purificationem si bis terne repetueris, mitescit acerbitas O.

N. 2. Libanius soluit in \square , proceditque dicto modo, verum qui hac ratione O, purum nancisci sperat, fallitur, quippe Sal \square & O omni sese immiscuit.

II. CALCINATIO seu VSTIO.

Vstio aluminis quoque tonforibus notissima est.

Nimirum:

O coquitur ad Δ m, vt phlegma & exhalent, terraque mollis porosa remaneat.

N. Hac terra idem est cum \odot ex ratione \curvearrowright residuo.

Vires. Vsitatissimum est Alumen vstum in vulnereum excrescentiis carnosis consumendis, in putredine arcenda, &c.

III. SALIFICATIO:

R. O vstum, [vel \odot aluminis.] coque in ∇ , traice per chartam; filtra-

IV. DESTILLATIO.

Vnde

1. Phlegma ac Spiritus.

R. O, puri q. v. destilla per \odot in Δ ac elicieis initio l. Δ phlegma. Igne postea fortiori, \curvearrowright prodibit albiissimus.

2. \curvearrowright dulcis O.

R. \odot , rectifica aliquoties cum ∇ & dulcis atque iucundus euadit.

Vites. Vsus eius internus diureticus est, pellit calculum, obstructions Lienis aperit, astus in febris compescit.

Externus eius vsus admodum proficuum est, in vitiis oris, inflammationibus nimirum, Aphthis, & sim. curandis.

Dosis g. 4. vel 5. in vino vel alio liquore conueniente.

Phlegma adhibetur ad vulnera mundificanda, adstringenda, &c.

3. Magisterium, seu \odot Ois Magisteriatum.

R. O. puri q. v. impone in vitrum, asperge aquam & repone vt dissoluatur.

Liquorem filtratura depuratum destilla in ∇ ibus, ex cucurbita humili ad siccitatem: solve denuo, modo quo dictum, in liquorem, & destilla. Eousque solutionem & Stationem repete, donec tota O substantia per \times transcenderit.

Vsus. Stypticum est nobile, quod vix cedit Essentia ferri, boli, sperniola, &c.

4. Saccharum O.

R. O purificati q. v. destilla vt eliciatur phlegma, quod affunde iterum \odot , & postquam \times 24. steterint, denuo abstrahe, idque vicibus aliquot (5. vel 6.) tandem phlegmate reseruato,

reſeruato, ſolue ☉ per d. Liquor dige-
ratur ☿ (12.) coaguleturque in ☿
ad ſiccitatem: ſic præparatum Saccha-
rum O.

Vires. *Celebratur in pectoris morbis præſertim ex minerarum balitu contra-ctis, qualibus Metallurgi frequenter affliguntur; Odontalgiam ſedat, gingi-
næ impositum.*

Dofis à gr. 5. ad 8.

V. EXTRACTIO.

Vnde

Extractum Aluminis.

aliàs

Magiſterium.

Rx. O crud. lb. (vi) coquatur in fictili
amplo, vt euaporet phlegma. Tandem

calcina vt penitus candefcat. Hinc in-
ficiatur in ☿ O illud candens; Sic
extrahet ☿ Eſſentiam ſeu Magiſteriũ
reſidente terra alba (quæ aqua feruenti
abluenda & ſeruanda) ☿ illud impræ-
gnatum filtra, & abſtrahe in ☿ ad
mellis conſiſtentiam. Tunc exponatur
frigido ad cryſtalliſandum. Cryſtallos
exime & ſicca pro vſu.

N. Cryſtalli tingi poſſunt rob ſambu-
ci pro libitu.

Vires. *Sudorem mouent, conueniunt-
que in ſcorbuto (ſingulis ſeptimanis
ſemel ac iterum pro ſudore exhibiti. (7a
febrib. tertianis (ante paroxiſmum ali-
quot vicibus iterato aſſumpti.)*

Dofis à g. 8. ad 20.

Excommunicatione Amici Hamburg.

C A P. X X V.

De Sale Ammoniaco.

SAL * natiuum à maioribus deſcri-
ptum, ſub arenis Lybicus concreſce-
bat. Verum noſtratibus non niſi arti-
ficialis cognitum eſt. Quod nihil aliud
eſt, quam ſal amarum factitium com-
poſitum, volatile, coctum ex ☿, ſale
fuliginis, ☉ commun. vel ☿, & ſimil.
*Vide ſi placet modos conſciendi, apud
Liban. in Alchym. & hinc apud Vnt-
zer. in tr. de Sale.*

Dicitur & Sal armoniacum, Sal
ſolare, Aquila cœleſtis, alba ☿ialis
fuligo, Sal ☿ialis philoſophorum,
Lapis Adir. Audix. Anacab. Alacab.
Aliocab. Allocaph. Alcob. Alfol. Al-
fatide. Alinziadir. Aliſtiles. Alumo-
nodig. Amizadir. Anoxadic. Azanec.
Butrum. Hiſazium. Lixandram. Mi-

ſadis. Neſtudar. Nuſiadal. Nylæ. O-
bac. Raal. Salmiax. Turſies. German.
Salmiar.

Eligatur candidum ac purum, vel
niſi ſatis nitridum fuerit, purificari po-
teſt. Præſtantius habetur * Venetia-
num & Antuerpianum, ex quibuſta-
men poſterius priori cedit.

Vires. *Internè vim habet diaphore-
ticam, præcipuè in febribus, maxime in
febri quartana, reſiſtit putredini, &c.*

Dofis ad ℥ſſ.

Externè adhibetur in Gangrana car-
ne putrida abſumenda, in Angina cu-
randa (in Gargarismiſis.) Quinimo Bar-
bitonſores aquam ſuam cœruleam, inde
conſciunt ad albuginem oculorum tol-
lendam.

Nimirum:

✱o in pelui ænea ∇m affundunt additoque modico ☿ simul optimè agitant. *Vide l. 2. c. 49.*

PRÆPAR.

1. Purificatio, vnde ✱ Crystallifatum 2. Calcinatio. 3. Sublimatio; vnde Flores. 4. Destillatio. 5. Li-
quatio.

I. CRYSTALLISATIO.

✱ crystallifatum, nihil aliud est, quam ✱ modo vulgari purificatum, i.e. in ∇ solutum, & post euaporationem aliquotam crystallifatum; ideoque vsus eius cum priori idem est.

II. SYBLIMATIO.

Flores ✱.

℞. ✱ trit. limaturæ chalyb ā q. v. mixta diligenter ex cucurbita in ☿ sublimes; sic relictis in fundo fecibus ascendit ✱ purum, aliquota portunculæ ☿is imprægnatum.

℞. ✱ huius, ☉ fusi ā M. sublimaque denuo, sublimationem de nouo septies repete, semper ☿ reiciendo & parem ☉is fusi quantitatem singulis vicibus admiscendo.

Nonnulli contenti sunt posterioribus saltem sublimationibus (sc. cum ☉ citra ☿ peractis) ✱ depurasse. Verum quia ☿ vim aperitiuam ✱ insigniter acuit, operæ precium erit, nec priorem illam sublimationem intermittere.

Vires. Flores hi ut operosiores, ita & effectui præstantiores censentur, quam ✱ sola crystallisatione purificatum, ideoque felicius illorum loco adhiberi possunt in

quartana. Tollunt quoque perfectè cruditates ventriculi, si in vino absynthiaco vel decocto sassafras per aliquot & continuos propinentur, sudorque à sumpto medicamento procuretur.

Dosis. 3. vel 4 imò ad ʒß. & ultra. Sennert. in Institut. Hartmann. in practica, loco de crud. ventriculi. Tentzel. in Exeg.

N. Si cum limaturâ ☿ fiat ☉atio, tunc arroditur ☿ à sale, parumque admodum sese sublimat, si vero cumbatiturâ ferri non tritâ, tunc fere sal omne ascendit colore ex flauo rubescente.

III. CALCINATIO & FIXATIO.

Figitur cum ☿, si anaticè (vel ☿) cum eadem mixtum Δc fortissimo subito adhibito, addito quoque folle fundatur, postmodumque aqua eluatur.

Vsus eius præcipuus est, pro liquore inde conficiendo.

IV. DESTILLATIO.

Vnde

Spiritus ✱.

℞. ✱ p. i. ☿ p. iv. M. atque destilla ex ☿ per ☿, sic prodit ☿ ✱, quem rectificatè cucurbita altiori.

2. *Aliter.*

Solve ✱ in ∇ calida, eaque potatolateres ignitos, vt ∇m illam ✱ coimprægnatam penitus imbibant. Hinc destilla per ☉m igne arenæ, vel igne aperto.

3. *Aliter.*

℞. ✱ sublimati q. v. asperge W rectificat. vt humectetur, hinc digere vase clauso in MB vt resoluitur. Solutiones decanta, è cucurbita oblonga in MB ʒa ad dimidium: ∇ ʒram rursus

rarius affunde & \mathcal{S} a : tandem Δ auctiore omnes spiritus per \mathbb{X} propelle & rectifica.

Vires. Est diaphoreticus, incisum, diureticus.

Dosis gr. 3.

Ioh. Rhenan. Chymiotecn. l. 1.

4. Aliier.

R. \odot q. v. misce cum argilla, ac exinde rac globulos, \mathcal{S} laque per \mathbb{M} vt moris est Clar. Da. D. Heluic. Dieterich.

Vires. Hic \odot i \mathbb{N} affusus solutionibus Metallicis cum \mathbb{F} factis, indique per \mathbb{X} abstractus, secum alias corrosiuas aquas transportat. Idemque in Atana & obstructionibus felicissimo cum successu exhiberi poterit, soluit itidem calculum.

Dosis a g. 3. ad 6. vel 10.

Extrinfecus anaticè cum \mathbb{V} mixtus & plumaceolo loco dolenti podagrico aliquoties illitus, dolores ad miraculum restingit, precipuè si in eo tantillum Camphoræ fuerit solutum. Sennert. Institut. Hartm. prax. loc. de Arthrit. Tentzel. in Exeg.

Spiritus \odot i urinosus.

In \odot co duplex \mathbb{N} us reperibilis est, scilicet Spiritus Urinæ & \mathbb{O} communis; Ille facilè elicitur vel additis cineribus anaticâ proportionem, aut calx viua, \mathbb{D} fixo sale \mathbb{Q} . Modum vide pag. 159. secundæ partis Glauberi. Quem vero describit idem author pag. 158. cum Lapide Calaminis non ita feliciter cessit, fortè propter impuritatem Calaminæ, est enim vna alterâ longe melior Spiritus aureus eiusdem naturæ cum \mathbb{O} communi sic prolicetur.

Spiritus acidus \odot ci S. Closs.

Solue \odot in aqu. comm. ita vt aliquid insolutum restiter, hac solutio-

ne imbibe folia plura chartæ Emporeticæ in globulos siue pilas molles conformata, quas in cucurb. conice & ex \mathbb{A} vel reuerberio clauso propelle spiritû coloris aurei summè acidum, qui per rectificationem albesceat.

Vires. Spiritus hic est penetrans admodum & subtilis à commixtione salis volatilis \mathbb{Q} , unde summè Diaphoreticus est & Colicam sedat.

Dosis gutt. 6. 8. in vino.

N. 1. Caue ne vehementiori Δ charta comburatur, aliàs denigrabitur \mathbb{N} us extillans cum putore vstionis, sit ergo Δ gradualis.

2. Caue ne \mathbb{Q} \mathbb{N} tum addas, vt facit Querc. in Tetrade titulo de Panacea \mathcal{S} i, sic enim prodit vnâ cum \mathbb{N} : salium fuligo quadam \mathbb{Q} alis, à quâ (si detur hic \mathbb{N} us intra corpus) gula constringitur, cum signis instantis Conuulsionis, post absolutam autem destillationem si detur Δ \mathbb{N} ationis, tunc combustâ papyro nancisceris \mathbb{Q} um dulcem.

Spiritus alius fugaciss. \odot i.

R. Calc. viu. q. v. inde Cucurbita in \mathbb{M} imposita. Hinc affunde \odot cum in \mathbb{V} dissolutum, idque paulatim & per vices, alembicum semper reaptando. Quando omne superfusum fuerit, Receptaculo & Iuncturis probè munitis destilla lentissimo Δ . Sic prodit quidam Spiritus aliquali phlegmate cinctus, sed qui vnica rectificatione dein fugacissimus redditur.

Vnus eius est in variis morbis. Mi-
mur tamen precipue in morbis capitis:
Epilepsia, Apoplexia, gravitate auditus, &c. In morbis uerè Retentionis, et
sum, difficultate conceptionis, si singulari
quodam instrumento eum applica-
tus, cui si vola manus calens admo-
netur, statim operatur. Ioel Langel.

V. L I Q V A T I O.

Vnde

Liquor seu Oleum, per deliquium.*

℞. * purif. q. v. impone albumini-
bus ouorum coctorum, ac repone vt
soluatur per deliquiū. *Kesler. 1. cap. 19.*

C A P. X X V I.

De Vitriolo.

Vitriolum est Sal mineralem me-
tallis proximum, ac præcipue
Cupro, &c. Græcè Χαλκανθον, Arabi-
cè Calcantum, Calcant, Alcalcadis.
Latinè, Atramentum futorium, Vi-
triolum. German, *Vitriol. Rappfer-
vasser.*

Varia sunt eius genera, pro natura
mineræ, quam in se continent, diffe-
rentia. Præcipua autem quorum hoc
tempore est existimatio. Sunt 1. Cæ-
ruleum, Saphiri instar, compactum,
vt Saccharum candum, tactu siccum,
Hungaricum vocant, vel Cypreum.
2. Subuiride, herbacei coloris, magis
granulatum, grumosumque instar \odot
commun. paulum vnctuosum, manui-
que tangentis adhærens, quale Gosla-
rienſe, Suecicum, &c. 3. Album, in for-
mam paruulorum panum effictum, ta-
ctu siccum.

Ex his itaque generibus, (nisi pe-
culiariter monitus sis) secundum eli-
ge, & ex hoc, quod plus de ♀ quam
de ♂ participat, nimirum quod cul-
tro affricatum rubeo colore inficit,
cauendo tamen Vitriolum minutulum
subcæruleum, pallidulum & aquosum,
manusque tangentis madefaciens, quod
passim venale prostat.

Vires. *Vitrioli vsus tantopere fru-
tuosus existit, vt Paracelso (in natura-
libus) ac Phadroni tertia pars Medici-*

*na habeatur, imò totam Officinam in eo
latitare perhibet. Quercetanus in Te-
trad. Galeno, calfacit, siccatur, adstringit
vehementer, constipatur, vomitum ciet,
lumbricos fugat. Extrinsecus Errhinum
exhibet naribus inditum.*

P R A E P A R A T A.

Sunt

1. Purificatio. 2. Calcinatio 3. Destil-
latio. 4. Sublimatio. 5. Præcipitatio. 6.
Salificatio. 7. Extractio.

I. P U R I F I C A T I O

Purificatur \oplus in à fecibus, tum
superficiariis, tum exactius inhærenti-
bus: Illud fit sola solutione, filtratione
ac crystallisatione: Hoc interueniente
insuper digestionem.

*Hinc*1. *Vitriolum album vomitium.*

Solue \oplus in album in ∇ , filtra &
euapora, donec quasi crusta superna-
tans appareat, postea ponas in locum
frigidum, & concreſcent crystalli,
quos posthabitis fecibus, quæ subsi-
dent, exime: ∇ iterum euaporare
fines, reponesque vt antea. Hic labor
penitus tertio reiteretur, coagulando
scil. & dissoluendo: vltimò ter eo-
dem modo procedatur cum ∇ rosa-
rum. Crystalli tandem supra calo-
rem lenem exiccari, redigantur in \oplus
reiti album.

Vires.

Vires. Est lene vomituum, operaturque feliciter in febris. affectibus ventriculi, catarrhis, lumbricis, peste, epilepsia, &c.

Dosis à ℥j. ad ℥j. in Vino, Infuso, vel alio Liquore.

N. 1. ☿ centaurij, vim emeticam maxime promouet. Croll. Beguin.

N. 1. Quatuor sunt ☿ la vomitina apud Chymicos seu Gilla. Primum fit ex ☿ loceruleo dissoluto & precipitato cum Ol. ☿, separato ☿, filtratur solutio & cogitur in crystallos. Hac Gilla est omnium vehementissima & acris valde. Altera fit ex ☿ albo modo iam dicto, quæ ad tantam malitiam non accedit. 3. est ☿ ☿ is aut ☿ paratum ad mentem Crollij, illi inest dulcedo styptica, præsertim si bis aut ter in phlegmate O resoluatur & rursus coaguletur, huic minor violentia inest. 4. Gilla est omnium innocentissima, puerulis vomitu indigentibus dicata, quæ fit ex ☿ ☿ li post extillationem spirituum & olei, diciturque Sal ☿ li, vide infra. Omnia hæc ☿ la intra quadrantem horæ vomitus excitant.

2. Vitriolum Hemmetico purgans.

Rx. ☿ m Roman. [vel quoduis aliud ex tribus illis supra commemoratis,] q. v. puluerisatum in loco calido, radii sui solaribus in ☿ erem album exicca. Postea solue in ☿ centaur min. filtra, & in loco frigido ad crystallifandū repone. Crystallus exiccatus (seruato tamen colore caruleo) seruatur in vitro probe occluso.

Vires. Purgat per vomitum & secernit eximium existens in febris pestilentibus Medicamentum.

Dosis à gr. 20. ad 31. & plur. In liquore vel ☿ appropriata, Sala de ☿. Gluckraht. in Beguin.

Purgatio defæcatoria.

Solue ☿ m in ☿ vel rore maiali, [filtrato, vel quod melius, destill.] solutum cola, colatum colloca in digestionem, [per mensem] sic ad superficiem & fundum reiiciet feces, quas separa. Iterum ponatur in digestionem tamdiu, donec nullas feces amplius reiiciat.

Inferuit multis preparationibus.

Coagulum ☿ S. Closs.

☿ Salis ☿ li in aqua solut. filtrati, que, ☿ ri calcinati itidem in aq. resolut. ana part. æq. Coniunge ambas solutiones & coagula in lac.

Vires. Desiccatum purgans præbet, non ita vomituum.

Dosis a ℥ss. ad ℥j. & ℥j. in febrilibus. Intermitt. & ad educendam Melancholiam.

Sal vitrioli nitratum S. Closs.

Rx. ☿ & ☿ per purgationem. ℥ss. M. colloca in ollâ Δ sustinente, operculo suo munita, inter prunas ardentes per 7. aut 8. horas. Quod restat materiæ bulliat in aq. communi ad dissolutionem usque, filtretur, euaporet ad cuticulam, tunc in frigido crystallos expecta vomitorios, quorum

Dosis erit à ℥j. ad ℥j. & ℥j. in Cachexiâ, hydropæ, calculo suffocatione matricis, mensum retardatione.

II. CALCINATIO.

1. Vitrioli calcinatio aperta, unde Colchotar.

Rx. Vitrioli calcinati, e coque & combure in vase terreo, donec omni humiditate priuata, rubescat.

N. Vitriolum Calcinatione hac ultra dimidiam partem pondere imminuitur.

2. Calcinatio Vitrioli clausa.

Vitriolū crebris solutionibus & coagulationibus

gulationibus optimè depuratum, lenique calore exiccatum, pone in Matracium firmum sigillo Herm. munitum. Matracium hoc in ☿ calidis colloca, quifolis æstiu calorem non faperent: tet ita donec per flauedinem in rubedinem instar sanguinis conuertatur. Labor est 20. ♂ circiter. *Be-guin.*

N. ☿ m rara stratificatione sternendum est, ne stratum illud crassitie cultelli in dorso densius sit, [*nicht dicker als ein Messerruck dicke,*] plura ergo Matraccia, nisi incassum laborare volueris, habere expedit.

Inseruit variis preparationibus.

III. DESTILLATIO.

Vnde

Destillata aquosiora.

1. Ros ☿ i

☿. ☿ m crudum, elice rorem calore ☿ feruentis cucurbita non adeo alta adhibita.

Vires. Valet ad arduos capitis dolores, mitigat sanguinem adustum, corroborat viscera Sala.

Dosis ℥ij. continuatim, ad aliquos dies.

2. Aqua ☿ i secunda.

Post extillationem roris transfer cucurbitam cum restante ☿ o ad ☿ m, & destilla, quoad ☿ ari potest.

Vires. Conducit ad purgandos renes, lenit corrosiones internas, ☿ m & sudorem proritat. Inflammationem plagarum corrodentium aliquantulum calcfacta sedat, lenit & mitigat dolorem, & ad consolidationem confert; (infusa gutta una ac altera Ol. ☿, ut mordacior fiat,) scabiem siccam mundificat, & carnem solidiorem efficit. *Sala.*

3. Phlegma ☿ i acidum.

☿. ☿ i carul. q. v. destilla ex cinebus

per ☿ cohobaque aliquoties, (7.) supra ☿, vltima vice fortius vrgendo.

N. ☿ a illa suauem acquirit odorem, si post vltimam ☿ ationem aliquandiu calore moderato circuletur.

Vires. Est arcanum ad capitis dolorem & epilepsiam Hartm. in Croll.

4. Spiritus ☿ i volatilis.

☿. ☿ i defecet. & exiccati q. v. destilla gradatim per ☿ m ☿ nudo, vt simul post phlegma sublequantur

☿, quantum fieri potest omnes. Li-quori egresso adde part. ij. ☿ æ pluuialis destillat. & in ☿ B noua destillatio instituat, tunc subtilissimus ☿ i cum ☿ eleuatur, relicto acidissimo oleo in fundo.

N. 1. Si volupe sit ☿ m ☿ i volatilempurum obtinere, aufer Excipulum, dum instrumenta adhuc calent, statimque in ☿ B aqua feruentis, probè adaptato alembico & recipiente paruo, cautè colloca. Videbis statim volatilem ☿ m in Excipulum transire, quem seorsim collectum, diligenter serua. Ex 6. vel 8. lb. ☿ i vix ℥ij. ad summum ℥℥. acquiri potest.

N. 2. Hac est illa volatilis ☿ i quam Theophrastus passim precipuè autem part. 3. de morb. ament. tr. 2. commendat ad Epilepsia curationem. Hartmann. in Croll.

Vires. ☿ ille ☿ æ pluuiali immixtus summe penetrans est, & in febris Vngarica, aliisque ardentibus febribus efficacissimè operari solet.

Alij ☿ ationem hanc ex cucurbita loricata perficiunt, octies plus minus cohobando.

Alij ad nonum vsque Alembicum fortissimo ☿ pellunt, scil. alembico altero alteri exactè imposito, vt in sublimatione flor. ☿ ii fieri solet, quaratione

ratione penetrantissimus elicitur D i
 N , ad fugandam epilepsiam præ-
 stantissimus. *Hartm. in Croll. Senn. I. st.*
Tentzel.

Alij addunt D o optimè purifica-
 ro V m, vt fiat pasta; eliciuntque per
 C m. 1. V . 2. Vitrioli phlegma. 3.
 N in Vitrioli. Tandem separant V m
 in M à Vitrioli phlegmate: & N m
 Vitrioli per E dephlegmant: vel phle-
 gma cum N u ab oleo fixiori per
 A proliciunt: postea in E dephleg-
 mant. *Senn. Instit. Tentzel. vide & seq.*

5. *Spiritus volatilis* D li.

Solutum D lum in aq purâ coque
 in lebetè ferreo per 2. aut 3. horas, ad-
 iecta Z j. aut alterâ limat. A ris ad li-
 bras singulas soluti Vitrioli. Remoue
 ab Δ & ochra limaturæ sese implicabit
 post refrigerationem, idter repete cum
 nouâ limat. singulis vicibus V ochre-
 am separando. Crystallos vero Vitrioli
 restantes impone O lutatæ, dando Δ
 per gradus. vsque dum vapores albi
 recipiens oppleant, tunc cessa, phleg-
 ma à spiritu acidulo per rectificatio-
 nem in M separa & serua. Sed parum
 habetur hac viâ. Quare Glauberum
 sequor secundâ parte furnorum p. 95.
 verum cum vasa illius siue terrea siue
 ferrea, sint porosa, neque per ea tota
 spirituum & olei quantitas exhaustia-
 tur, ego post absolutam impetuosi
 phlegm. & N uum alborum G atio-
 nem subsistere soleo post 12. horas &
 quod Colchotaris superest coniicio in
 O vitream optimo luto instructam,
 admotoque eodem Recipiente phleg-
 ma & spiritus 1. exceptos continen-
 te, hoc opus G andis redintegro, aper-
 to Δ cum carbone terræ subtus & su-
 pra administrato, idque per 8 G ad mi-
 nus continuo, imò si ad XII. G ex-

tendi posset, melius foret, præsertim si
 Vitriolum optimæ notæ fuerit, quale
 est Vngaricum, tunc enim, (nec ferè
 prius) spiritibus suis volatilibus ac dul-
 cedine suâ totaliter priuatur. Tandem
 separatio spir. Volatilis ab Oleo dulci
 instituitur, vt vult Glauberus in se-
 cunda parte p. 10.

Vires. *Spiritus volatilis ibidem vi-
 dere est.* Olei dulcis virtutes plures quo-
 que sunt: Iecur & lienem egregiè deob-
 struit, valet in febribus ardentibus, dosi
 maiore quæ ad D j. extenditur (propter
 dulcedinem) in haustu ceruicis. figit quo-
 que Z um in pulu. album ferme fixum.

N. 1. *Siriè operatus fueris, tunc ex
 tb. xij. D Hungar. tb. v. olei nancisceris*

N. 2. *Sal Vitrioli ex hoc O beneficio
 phlegmatis elicitum pro vxo ac gemino
 habendum est, reliqua salia, quæ post tri-
 duanam G ationem emunguntur, nil al-
 liud sunt, quàm Vitriolum resolutum.
 nondum suis N bus acidis orbem ac
 priuū. Potest tamen inde haberi Sal syn-
 cerū, si O ad albedinē reuerberetur, &
 postea more communi extrahatur.*

N. 3. *Habes aliam Spiritus volatilis
 methodum in Helmontio sub titulo Ignis
 F is, vnde Diaphor. Parac. paratur.*

6. *Spiritus Vitrioli, vulgari modo de-
 stillatus.*

R . D i ad rubedinem calcinati, (vel
 ex G atione roris & V x secundæ re-
 sidui) tb. vi. vel q. v. destilla Δ e nudo
 ex O benè lutata, in Recipiens capa-
 cissimum, commissuris exactè clausis,
 adhibitoque Δ gradatim. Post tres fe-
 rè G as phlegma stillare incipit, quod
 tandem paulatim aucto Δ circiter G
 6. vel 7. N albi nebulosique subse-
 quentur. His apparentibus continu-
 dus erit Δ , paulatimque augendus, do-
 nec nulli amplius N egrediantur,
 G G g quod

quod cognosces, si Receptaculum pellucidum appareat. Σ in dephlegma- in ME , donec guttæ acidæ extillare incipiant, postea rectifica eundem per O in vitream in E ere, sic exibat A clarus, in A vero manet O rubicundum & acre.

N . Si citra iacturam aliquam spirituum (in calcinatione forte evanescentiū) ut & citra corrosivi olei admixtionem, (quo alias vix A planè liberari poterit,) destillationem expetis, procedere monet Dn. D. Brendelius (in Chymia sua ubi & rationibus id inculcare conatur.) modo qui sequitur.

R . Vitrioli opt. crud. q. v. (lb. xij.) inde O æ, Excipulo capacissimo firmiter connexæ, (ita tamen ut foramen in commissura relictum, sit, spiritibus volatilibus ac impetuosius exitum concedens,) destilla ut moris, lentè, donec impetuosius illi A fuerint egressi, (id quod cognosces, si collum refrigescat,) dein obtura firmiter foramen illud, ac auge Δ in, pelleque S 12. (non ultra, alias A in inquinabis oleo corrosivo graviore.) Hinc dephlegma ac rectifica, & habes A in Vitrioli optimum,

N . Spiritus in calcinatione evanescentes vix ac ne vix opera, dicto modo, adhibita æquivalent. Ideoque nisi A in quoque volatilem expetis, vulgaris modus satisfacere potest. In quo nota tamen, nè nimium initio calcines, nec nimium Δ in in destillatione virgeas. Etenim ut in omni ferè S atione, ita in hac paulatim crassius, &c. propellitur.

Alij addunt E i aliquid, sed S a- tum hoc potius V , quam A Vitrioli nomen meretur.

Vires. R . Vitrioli est diureticus, diaphoreticus, incidens, attenuans, putredini resistens, &c. Hinc utilis in fe-

bribus ardentibus, obstruct. Epatis, Lienis, & Mesenterij, appetitus prostrato, &c. Quinimo cum liquore vel vino mistus, lenit Odontalgiam, (gingivis impositus) prodest & eius in tinea capitis, aliisque generibus scabiei & pruritus cum ∇ chelidon. mixtus.

Dosis à g. s. ad ss . vel ad d . in liquore, vel adhibetur in potibus quant. suff. ad aciditatem gratam.

7. Spiritus D i dulcis, seu O Vi- trioli dulce.

R . Vitrioli benè calcin. lb. iij. super- funde X , ut benè supernatet; digere decantaque & affunde novum X , id- que quinquies vel sexies, semper S aliquot digerend. Acera illa imprægnata destilla, donec A in Vitrioli tetigerit S andi ordo. Tunc inde in O in adiec- tis sabuli puri manipulis duobus & li- quor Vitrioli emanans dulcè referet sa- pore. Tentzel. *Recept. 3. cent. 27.*

Vires. Prodest in calculo, tartareis morbis, catarrhis, &c.

Dosis Sj . in liquore conveniente.

8. Aliter.

R . A in Vitrioli vulgar. (rectificati,) lb. j.

Q i Vitrioli [ex quo E sit extractū] S 1 v.

Destilla per O in vitream in A in receptac. satis capax; sic prodit A in subdulcis, quem si dulciorem cupis, cir- cula cum V O 4. aut 5. dein abstrahere V , sic habes A in Vitrioli dulcem.

N . Dulcescit etiam sola circulatio- ne cum suo phlegmate, vel si aliquoties à scoris S (semper novas scorias sumendo,) S etur.

9. Spiritus Vitrioli Philosophicum, vulgò Cohob. S ij.

R . ∇ , qua S vitæ edulcoratus est, euaporet leniter ML , donec appa- rere

rere incipiat liquor flauus & acidus. Liqueor hic est Spir. Vitrioli philosophicus, qui per ☉ in à terrestri materia rectificari potest,

Vires. Potioris est virtutis, quam qui vulgari modo conficitur. Medetur Febribus. Luem ♀ mitigat, Lienem & Meseraicas soluit, ventriculum debilitatum, & à phlegmate crasso infarctū confortat. In melancholia hypochondriaca. Epilepsia, omnibusque affectibus capitis mirè prodest, Extrahuntur & eius ministerio Tinctura mineralium, corallia & perle dissoluntur. [Idem acuatius ☿ ☉, soluit ☉ m.

Dosis g. 3. 4. ad 8. in haustulo vini vel liquore conuenienti. Hartman. in Croll. Kest. l. 1. c. 26.

10. Spiritus ☿ i ☿ satius, alias Liquor Diana.

℞. Vitrioli Vngarici ad albed. calcin. p. ij.

☿ i ad nigred. calcin. p. i.

Puluerisata inuicem misce & ☿ paulisper conspersa, destilla per cucurbitam (☿ imposito) forti Δe, cohobaque: deinde rectifica liquorem egresum in ☿, seorsim capiendo, & ☿ m. & liquorem reliquum.

Vires. Egregias vires exhibet ad sudandum in omnibus internis obstructionibus, in sanguine grumoso, contra scabiem. ad mundificandam & lenigandam cutim.

Dosis à ʒj. ad ʒss. cum brodio, aut cum pauxillo vini Hispanici. Daturque per 3. auras continuas si libet. Tentzel.

11. Spiritus vel ☿ aperiens Penoti.

℞. ☿ i Vng ad rub. calc. lb. 1v. Silicum è flumiis collect, & optim. calcin. lb. v.

☿ i albed. calcin. lb. i.

Mixta, inque tenuissimum ☿ erem tusa liquefcant in cella aliquantum in liquorem, quem destilla ex ☿ per ☿, cohobaque ter, ☿ atum liquorem singulis vicibus ☿ in ☿ erem redacto, affundendo. Extremo per ☉ m ☿ e aperto pelle, sic initio len to Δe primum phlegma exstillat, postea vero ☿ acidus auctiori Δe elicitur. Ex ☿ o calcinato ☉ m extrahe, & cum eo [ablato prius phlegmate per B.] ☿ m acidum digere. Tandem cum argilla in pastillos redige, atque ex ☉ Δe nudo, gradibus tamen obseruatis, ☿ m alkalifatum prouoca.

Vires. Vfus eius insignis est in obstruct. Epatis, Lienis, Mesenterij.

Dosis ʒj. ad ʒij. vel ij. in vino vel alio liquore conuenienti. Hartmann. in pract. loc. de obstruct. Epat. Sennert. Instituitur.

N. Dicitur Antihydopicum Muffetti, summeque celebratur in Hydrope, cuius fomitem per aluum ac urinam, spiritus etiam nondum alcalisatus educit. Datur cochlear unum ieiunantibus singulis vel alternis horis aqua appropriata iniectū. Horning. in Cista med. Ep. 122.

12. Spiritus ☿ i mellisatus.

℞. ☿ i Sole albificati lb. ij. mellis cum fauo. lb. i. Misc. exactè ac destilla vt moris.

Vires. Lenit dolores Podagricos: si adsit inflammatio misceatur cum +o, alias cum vino. Med. dest.

13. Spiritus Vitrioli diaphoreticus.

℞. ☿ i vulg. ʒv i. ☉ ☿ i C. C. vst. à ʒij. M. in mortario vitreo digerantur aliquantulum: dein destilla ex ☿ in reeep. capaciss. donec omnis humiditas extillarit. ☿ ato liquori adde ☿ an. reseruaque in vase benè obturato.

G G g. 2 Vires.

Vires. Purificat sanguinem, abigitque scabiem ac pruritum, aperit obstructions; sudorem prouocat in peste, venenis, hydrope, icterica, contracturis, &c. Efficax quoque est in mundificandis pulmonibus.

Dosis à ℥j. ad ʒʒ. continuari potest eius usus ad libitum sine periculo. Sala in Anat. Vitrioli.

SPIRITVS VITRIOLI ANTE-PILEPTICI.

14. Spiritus Vitrioli Antepilepticus puerorum Hartmann.

℞. Vitrioli Vngaric. depuratiss. lb. iv. adde ☐æ puerorum sanorum recenter collect. lb. viii. Digere vase clauso aliquandiu in Mb, postea ex eodem vase destilla ad siccitatem duplex phlegma, quorum primum insigne est paregoricum ad dolores podagricos, aliosque suauiter demulcendos, alterum est insigne ophthalmicum, ad quæuis oculorum vitia vtilissimum. ☉ puluerifat. ex ☉ valida terrea, de nudo, sed tamen ab initio valde lente in excipulum capax vrge, prodeuntibus confestim spiritibus liquor promanat preciosissimus sulphurei odoris & austeriusculi saporis, qui per ☉ in semel atque iterum rectificatur atque reseruatur.

Vires. Omnem puerorum Epilepsiam radicatus tollit.

Nimirum:

℞. ℥j. ☐ radic. Pæon. & flor. Til. an. ʒj. M. de hac mixtione exhibe in paroxysmo [prius membris contractis & reuulsis, reductis,] cochl. β. & paulo post recolletis sensibus denuo aliquid exhibe, atque ita etiam tertio id repetere, non omissis interea quæ ce-

rebrum confortant, sc. magist. perlar. corall. cranij humani & similit. Hartm. in Croll. Senn. in jnitit.

N Fit quoque ☉ efficax contra Epilepsiam.

Si Sal ☐æ in Sp. Vitrioli dissolutum per ☉ in ☉ etor.

15. Spiritus antepilepticus Basilij

℞. Virid. aris. q. v. superfuso ☒ calido extrahe. & decanta: Liquorem per ☒ abstrahere. Reliquum in ☐ pluuiali solue, filtra. coagula ad tertiæ partis remanentiam: reponere in loco frigido ad crystallisandum, Crystall. toties collige, quoties ☐a ulterius coagulata & reposita illos dabit.

℞. Hos Crystall. destilla ex ☉ fortiter & prodibit ☐ subuirdis, quando incipit subnigra apparere cessa, ☐mque illam subuirdem deinde per Retortam destilla & extillabit clarissima.

Vsus eius non modo in Epilepsia, sed & in calculo valde nobilis perhibetur.

Dosis ℥j. in ☐ appropriata, Pæon. Fœnic. &c. Tentzel. in Exeget. 1.

16. Spiritus Vitrioli antepilepticus Quercetani.

Spirit. Vitrioli viridis dictus, in Tetrade.

1. ℞. Vitriolum: destilla vt habeas seor. sim phlegma ac ☐m, eaque in quantitate sufficienti.

In phlegmate marcerentur (in Mb ☉ 4. vel 5.) semina Hyperic. & Pæon. flor. Lil. Cenuall. Tilia, Calend. Rosmar. Hyperic. Rosar. aliquid. Ebor C. C. cranij humani, visci querni pro libitu, fiatque expressio quæ destilletur ☉ toto eo imbue vit. not. recent lb. i. vel ij destillaq; in Mb ☐ cohoba quater vel quinque: tandem adice ☐m virrioli seruatum, destillaque ex cucurbita per serpentinam in Mb feruente:

Si

Si benè operatus fueris (inquit Quercet.) solus & cum virore elicitur penetrantissimus.

Dosis *gut. 15. vel 16.*

17. *Spiritus Vitrioli antepilepticus Paracelsi.*

℞. Vitriolum Vngaric. vel Roman. elice phlegma, cohobaque toties super ☉. donec eo penitus imbuatur. Tunc admisce V opt. rectif. digere & in vnū ac alterum vase clauso, hinc destilla, Δ nudo gradatim aucto, donec ☉ prodierint omnes. Extillato Liquori (à fecibus segregato) adde ʒ. ʒ. the-riac. Camphorata, denuoque bis vel ter destilla.

Vires. *Exhibetur in paroxysmo & ante paroxysmum.*

Dosis ʒss. cum liquore conuenienti. Vide Quercet. in Tetr.

18. *Spiritus Vitrioli Antepilepticus compositus.*

Videatur l. 2. c. 5. Elix. Crollij.

19. *Spiritus Vitrioli coagulatus.*

℞. Terram sigillatam stringens. affunde Sp. vitrioli, stent in loco calido, vbi refrixerint, simul coagulabuntur, inque calido iterum soluentur, &c. Hunc ☉m coagulatum, si placet; inde ☉æ vitreæ & destilla ex ☉. & habet Liquor minus acidus quam ☉ vitrioli, cohobavice tertia, & nil nisi phlegma extillabit, adeoque ☉ vitrioli in ☉manebit coniunctus cum terra sigillata, qui in loco humido iterum liquefcit.

N. Alij ☉m vitrioli cum ☉e proprio digerunt, & hac ratione coagulationem conantur.

20. *Aliter cum Crystall. ☉.*

℞. ☉ Crystall phlegm. vitrioli an ʒvi. solue, ac filtra abstrahèque ☉ando ad siccitatem, dein affunde

abstractum hoc phlegma ☉o adiungendo Sp. vitrioli ☉. d. abstrahèque in ☉. tum phlegma, tum ☉o nitrī in forma vaporum rubicundorum egredientem, donec rubedo cesset; postea repone ☉atorium: cum restitante Spir vitrioli loco frigido & coagulabitur.

N. Quia ☉ & Vitriolum nexu non adeo amicitabili viuuntur, huius usum nulli suadeo.

DE OLEIS.

Olea hic aqueos, non pingues liquores denotant, adeoque à spiritib. nisi crassitie differunt.

Sunt

1. ☉o dulce.

℞. Vitriolum purificatum, solue in ☉o ☉ p. d. ac abstrah. Mategiā relictam solue cum ☉. u ☉is, atque redige in massam cum cremore ☉i [vel cum Saccharo cando, aliove Sacchari generi.] Hinc pellatur per ☉m.

Vires. *Diaphoreticum est insignis, polletque vi leniter adstringendi.*

Dosis à *gut. 1. ad 3.*

N. 1. *Parum Olei suppeditat.*

N. 2. *Ex Metallis seu crudis, seu in calcem redactis eadem ratione per ☉m ☉, ac cremorem ☉. Olea clari possunt. Ex commun. Experient Dn. D. Dieteric.*

2. ☉o Vitrioli rubicund.

℞. ☉ d flaued. calcin. p. i.

Silic. grossè cootutor. p. ij.

V q. s. vt f. pulvis instar.

Destilla per ☉m, sic rubicundum ☉o prodit. Gluckrabr.

Usus eius potius est in Metallurgia, quam in Medicina. Poterit tamen ☉ intrinsecus exhiberi, vide supra Spir. Benoti.

GGg. 3

3. Alind

3. *Aliud rubicundum.*

℞. Colchorar. part. iv.

Vini alb. generos. p. ij.

Facebullire ad siccitatem vsque, postea tere & ex ☉ Δ aperto destilla primo phlegma, postea applica receptac. capaciss. ac iuncturis benè munitis propelle forti Δ ☉, instar sanguinis, rubicundissimum, *Gluckradt.*

4. *Aliter.*

Vitrioli calc. destilla cum Lythargyr. & prodit ☉ vitrioli rubicundum, quod Podagricis prodest.

5. *Aliud ex Terra Vitrioli.*

℞. Feces seu ☿ in subflauam ☉ i siccitatem, [*vide infra*] destilla per ☉ Δ reuerberij, ☉ dabit rubicundum, penetrantissimum.

Vires. Dosis gutt. 6. ad 10. ad plerosque affectus capitis perutile est.

N. Guttæ 15. ad 21. (annotatibus quibusdam) vomitus expediunt. *Tentz.*

6. *Aliud ☉, ex ☿ re**☿ li.*

℞. ☿ r ☿ i (dulc.) misce cum dimidia parte Sal. ☿ i. Destilla per ☉ m, Δ mque vltimo adde suppressionis & prodibit ☉ rubrum.

N. 1. Hinc ☉ si instillaris ✕ precipitabitur ☿ spadicei coloris què edulcora ☿ frigida hinc sicca & serua.

N. 2. Præstantius erit, si flores ex ☿ re ☉ i eleuatos receperis.

Vires. Prodest sed efficacius in iisdem affectibus, in quibus ☿ r ☉ i. *Vide suo loco.*

Ex hoc Præcipitato fit Essentia seu Tinctura.

IV. *SVBLIMATIO.**Vnde*

1. Flores ex ☿ Vitrioli, Substantia cuprea Vitrioli.

℞. Terræ vitrioli nigre, [ex qua

☿ extractum,] vel ☿ ☉ ochrea q. v. misce cum ✕ an. Sublima initio Δ lento, dein maiori, donec nullum amplius fumum ascendere videas. Sublimato affunde ☿ m com. collocaque in ☿ tepido ☿. 24. vnde subtilis ☿ in fundo subsidet, iteratis ablutionibus edulcorandus.

N. 1. Hic pulvis igni fusionis subiectus, comburitur partim, partim in bonum cuprum funditur. *vide Basil. in repet. Lap. Ph.*

N. Eodem modo ☿ ☿ ☉ i ☿ tractatur, vnde ☿ combustibile ☿ is. *Keßl. l. 1. c. 44.*

Virtus substantia huius cuprea est, mundare plagas putridas, incarnare & cicatrices inducere. *Sala de ☿.*

2. *Flores ex Sulphure Vitrioli.*

℞. ☿ r vitrioli (dulce) sublima sine additamento ex sublimatorio humili, paulatim id iniciendo alembico scil. ablato & rursus reposito.

3. *Flores ex Vitriolo crudo.*

Fiunt eodem modo, cum ✕.

V. *PRÆCIPITATIO:**Vnde*1. *☿ Vitrioli ochrea.*

℞. ☿ i pur. q. v. solue in ☿ font. steterque aliquandiu sic vel sponte sua subsidebit ☿ ☉ i instar ochræ.

2. *Sulphur Vitrioli dulce.*

℞. Vitrioli puri q. v. solue in ☿ calida, solutioni affunde guttatim ☿ ☿ i, [aliq. lixiuium ex ☿ ib. clauell.] & precipitabitur ☿ r vitrioli, quod edulcoratum exicca.

Vires. Confert affectibus pulmonum, mundificat plagas putridas, cicatricésq; inducit. *Hartm. in Croll. Sala in Vitriol. tr. Tentz. Keßl. 4. c. 69. 3. c. 10.*

3. *Sulphur*

3. Sulphur Vitrioli purgans.

℞. Vitriol. opt. q. v. affunde phlegma vitrioli, vel ∇, destillat, ad eminent. digit. 4. stent in digestionē, & subsidebit ∇, filtra: in filtraturā instilla 〇〇 ♀i p.d. & præcipitabitur ☿r vitrioli; decanta Liquorem & edulcora ☿. r ∇ tepida, atque exicca. *Kesl.*

Dosis à g. ʒ. ad 10.

Eodem modo fit & ☿r vitrioli ♂ purgans; illud sic soluendo in phlegmate vitrioli, defæcando & præcipitando cum Ol. ♀i. *Kesl.* 1. c. 38.

4. Sulphur Vitrioli fixum seu ♂iale.

℞. Limatur. ♂ puriss. sine omni puluere, p. 1.

Vitrioli Vngaric. cærul. aut vitrioli ♀ is, p. ij.

Trita misce & imbebe indendo in vitrum cum ☿, vt supernatet digit. 2. Coque & coagula ad siccitatem ∆ arenæ: in fine ad candescentiam vsque vrgeatur. Huic pulveri affunde aliud ☿ ad eminent. 4. digit. ac extrahe colorem s.a. In hoc tincto ☿ delitescit ☿r vitrioli combustibile, [quod evaporatione & dulcoratione experiri poteris.] Instilla 〇〇 ♀ p.d. sic sulphur vitrioli ilico præcipitabitur & figetur. Edulcora aqua com. *Hartman, in Croll. Tent. el.*

Ex hoc ☿re vitrioli fiunt Anodyna, Laudani nomine insignita.

Præcipitabitur & pulvis spadicæ coloris, si oleo ex ☿re vitrioli dulci destillato ☿ instillaris. *Vide 〇〇 ex ☿re vitrioli.*

VI. SALIFICATIO:

Vnde

Sal Vitrioli.

Vitriolum Vngar. cærul. in +bulo calcina, donec in puluerem obscurè

purpureum abeat. Huic ita calcinato. affunde aqua com. sensim agitando ne in fundo conglomeretur, donec aqua [quæ calida euadit, ac si calci viua superfusa fuisset,] refrigeret. Stent ita 24. hor. postea filtra per chartam, fiatque exhalatio super ∆ lentum, donec sal in fundo reperiatur siccum & coloris quodammodo incarnati. Hoc pulverisando in albedinem vertitur.

Idem Sal potest extrahi ex 〇〇 vitrioli in ☿at. ☿ residuo.

N. 1. Si Vitriolum calcinatum non fuerit nigropurpureum, sed tantum instar Boli Armeni, nihil extrahes præter Vitriolum eiusdem coloris, vt fuit antea.

N. 2. ∇ residua (corpus exanime vulgò) maxima est virtutis in Diarrhœa & Dysenteria.

Vires. Sala vomitorium hoc ad cælum vsque euehit, in Epilepsia aliisque cerebri Symptomatibus, ex corruptis & acerbis è ventriculo sursum actis vaporibus ortis. Item in Pleuresia, Febribus pestilentialibus, Lipothymia, à repletione humorum corruptorum, & efferuescentiâ bilis circa orificium ventriculi; in Epate, Liene & Renibus obstructis.

Item Sal' naribus inspiratum sternutationem egregiè ciet, circa vim cerebri seorsis suis excrementis expediens.

Dosis à ʒß. ad ʒß. vel ʒj.

Sala in Tern. Emetolog. Querc. in Trad. & Pharm. rest. cap. de vomitiis. Senn. Inst. Beguin.

N. Sal Vitrioli ex solo 〇 ex quo flores Sulph. eleuati sunt à ʒß. ad ʒj. exhibitus (in ☿ fœnic. vel vino) conciliat facillimè vomitum, interdum & sedes, & sudores. *Hartm. in Croll.*

VII. *EXTRACTIO.*

Vinde

TINCTURÆ seu ESSENTIÆ
SIMPLICES & EX-
TRACTA.

1. *Extractum Virioli Narcoticum.*
atodynnum.


℞. Vitrioli puluerisat. ac lento calore ad albedinem vsque exiccati tbd. affunde **V** opt. rectificat. $\frac{3}{4}$ xxx. [**N**. *Nella humiditas præter **V** accedat, vasque sit siccessimum, alioquin incassum laborabis.* [Sepelito in finum equinum per mensem. Decanta postea à fecib. absque perturbatione, & destilla in **M**ad residendum vsque liquoris flauis, & o $\frac{3}{4}$ ato non absumilis. Tunc cessa, & quod prolectum est, serua. Liqueorem restituantem benè occlusum quoque in vsum reponet, qui preciosum Extractum est.

Vires. Extracti illius vsus est narcoticus & anodynus, nec potentia opio cedit, sine periculo tamen reprimi & coagulat Vapores subtilis venenosos, Epilepsiam causantes, idque specificè.

Dosis à gut. 6. ad 8. & 12. cum
Liquore conven. Salai in Φ .

2. *Essentia* Δ *is Vitrioli.*

℞. ☿rem spadicei coloris (vide
 ☿ ex ♁e Vitrioli,) digere cum ♀
 in loco calido, (vase clauso) ☿☿ 8.
 sic dulcissima Essentia ♁is vitrioli
 tandem supernatabit in forma ☿☿ ei,
 quā ♀ separa per tritoriū & serua

Vires. Hæc dulcissima  is Vitrioli
Essentia aequipollet viribus suis. Tinctura
☿ij, & mirabiles effectus facit in ∇
Melissa, noxios humores totius corporis
expellit per insensilem transpirationem,
venerem stimulat, uterum roborat, eius-
que motus inordinatos sistit, & in utro-
que sexu prolificam vim seminis ad li-

berorum generationem operatur. In ∇ .
Petroselini idem penè præstat, sed insu-
per Hydropem curat.

Vsus autem istius Essentie aliquan-
din continuandus est.

Dosis g. i. usque ad 4. Hartm. in
pract. loco de Lepra, Tent. el. de Δ rei
Virrioli. Kest. 4. c. 69.

2. *Alia Tinctura, Manna Vitrioli dicta.*

℞. Vitrioli purificati q. v. extrahe
Tincturam, digerendo cum ℞i Vitrioli subtilissimo Essentificato, i. e. proprio Sale alcalifato, filtra, coagula, & habes Mannam seu Tincturam vitrioli flavam.

N. Hanc Tincturam, si cum V circulaueris, ∞ supernatabit, quod per ∞ destillatum, ac iterum cum ∞ circulatum fragrantissimum euadit.

Vires Nec minores vires habet, nec
minorem laudem meretur, quam Essen-
tia \ominus is precedens.

4. *Tinctura.*

℞. Vitrioli viridiusc. quant. satis
magnam, educ phlegma ac cum
per **E**cum educto Liquore, ex ☉
extrahesa. (etiā in loco frigido, sapē
tamē cōmouendo,) Tincturā viridius-
culam, quā cautē decantatā destilla ad
mellis consistentiam atque aëri frig. ut
in Crystallōs concreseat, expone.

N. Si menstruum ad extractionem requisitum deficiat, Ratione in abstrahe ad extractionem continuandam.

g. Crystall. proximè præcedenti-
um lb. iij. vel iv. &c. circula cum V
opt. rectific. vase H. C. Deinde destil-
la per XX ex ☿ Hinc cohoba. Insuper
affundendo ☿ in ☿, destillaque per
☿ in gradatim ☿ 4. vt extillet post
☿ & ☿ rubicundum. V abstrahe
in MB; in ☿, in Eere, &
restat

restat ☉ seu Tinctura rubicundissima.

Vires. *Admirandarum est virium aduersus omnes agritudines, in crassiore materia sedem habentes. Quercetan. in Tetrad.*

5. Tintura Magisteriata seu Magisterium ☿ i.

℞. Tincturam præcedentem, coniunge cum proprio suo ☿ Vitrioli, (qui inde abstractus, digere aliquandiu, sic dulcescet. *Quercet.*

Vires. *Remedium est nunquam satis laudandum, idque præcipue si ☉ philosophicè solutum, adiectum fuerit; prodest enim aduersus Epilepsias, astralesque omnes affectus, Apoplexiam, Paralyfin, Vertiginem, Maniam, Ecstasim, Syncopen, Cachexiam, Hydropem, Calculum.*

Dosis gut. vna ac altera. *Quercet. in Tetrad.*

6. Eadem Tinctura.

Aliter.

℞. ☉ Vitrioli (ex ☉ o illo reuerberato extractum ac) opt. depuratum, q. v. affunde ☿ Vitrioli (in præparatione Tincturæ referuaturn,) ad eminent. 2. digit digere ac destilla, hinc nouum ☿ affunde, digere, destilla, idque repete, donec pars volatilis superet fixam, secum euehat atque ☿ fixum volatilifet. Hoc ☉ Vitrioli sublim. imbebe ac incera cum ☉ o seu Tinctura illa, digereque in Athanore per gradus vt vniantur, & per colores ad purpureum tandem deueniant. Est opus aliquot mensium.

Vires. *Est Elixir seu Medicina vniuersalis, summe penetrans ac fixa, ad curationem deploratissimorum morborum sufficiens.*

Dosis g. i. ac altera. *Quercetan. in*

Tetrad.

Mediante hoc Vitrioli lapide reducitur ☉ in suam primam substantiam, unde tandem exurgit Medicina vniuersalissima. Vide ibidem in Tetrad.

7. Magisterium ☿ i.

℞. Vitrioli opr. q. v. ☿ etur more vsitato, ☿ cum ☉ o per ☿ simul redificetur. Cum phlegmate (vel ☿ ☿ at,) ☉ ex ☉ o extrahatur, phlegma ☿ ando à ☉ se separetur, cum aliquot cohobiis & digestionibus.

Hinc.

℞. ☉ is p. ij. ☿ vel ☉ o ☿ i, p. i. Ponantur in phiola in ☿, vt aquositas exhalet, idque tantisper repere, donec. Saltantum ☿ ei imbibere, quanti ponderis primo fuit. Hinc in phiola hermetice clausa 8. ☿ digeratur, tandemque in ☿ collocetur 14. ☿ ☿ ad coagulandum. *Sennert. Institut.*

2. Magisterium ex Tinctura ☉ Spiritu Vitrioli,

℞. ☿ in se calcinatum; extrahe tincturam affundendo ☿ optimū: ☿ tinctum dacanta, ☿ aque ad siccitatē, & manebit in fundo ☿ rubicundus, quem pone in ☿ adhibito receptaculo grandi, dando ☿ per grad. decenres, egredietur ☿ flauus, postea rubicundus; continuetur ☿ eodem gradu, donec appareant ☿ albi, tunc cessandū. His spiritib. imbue ☿ in ☿ restitantes, (potius ☿ ex ☿) digerendo, imbuendo, donec ☿ & anima proprio corpori restituantur. Hæc tandem in vase H. clauso digere quadragint. ☿ ☿, donec figantur.

9. Tinctura Vitrioli ☿ prii sine Mysteriorum ☿ is.

1. Digeratur vitro clauso per duos menses ☿ gradaturn aucto, donec varij colores appareant, postea flauedo H H h supremaque.

supremaque rubedo, hac enim viâ viriditatem Leonis custodies & ad exteriora verres. 2. Tincturam ad hoc Leone cum ∇ extrahe. 3. Diuide eam in partes secundas. Vna defica & sanguis restans in formâ pulu. figatur per gradus in ∇ am rubram. 4. Partem alteram Tincturæ liquidæ, putrefac per 3. hebdom, abstrahere per cohobationem, cum reliquo ∇ tincto eundem processum seruando. 5. Liquorum remanentem vrge per α , donec Oleum benedi-

ctum exeat, quod aliquoties rectificat. 6. cape ∇ ia superioris fixatæ p.ij Ol. bened. Vitrioli part. i. sigilla vas. H.S. digere in cineribus, donec animam suam corpus receperit coagularique. tunc nouum Ol. suffunde, coagula vt prius per 10. α . Tandem fige ad quartû vsque gradum Vulcani, & per 3, α . in fluore detine. Habebis Lapipe rubrum, fixum absque fumo, tingentemque, summam medicinam.

Ex commun. S. Closs.

C A P V T. XXVII.

De Arsenico.

REstant è mineralib. secundariis mineralia sulphurea ac inflammabilia.

Hæc fiunt ex perittomate macrocosmico pingui, respondente in Phytologia, Oleis, Resinis, Gummatibus, in Zoologia pinguedini axungiarque abundanti, excrementisue pinguedinè referentibus. γ . gr. auriû.

Suntque

1. Arsenicum, 2. Sulphur. 3. Ambra, 4. Succinum, 5. Sperma Ceti, 6. Asphaltum, 7. Naphtha, 8. Petrolæum, 9. Carbo Petræ, 10. Gagates.

Arsenicum.

Arsenicum fuligo siue succus est mineralis, pinguis, inflammabilis.

Dicitur & Auripigmentum. Græcè Αρσενικόν , ἀρσενικόν . Arabicè Harnet & Zarnich. German. *vveisz Kattenpulver*.

Genera eius tria recensentur, album videlicet, (Arsenicum in specie sic dictum, se arsenicum Crystallinum, Ci-

trinum seu Flauum, (Risigallum Auripigmentum, & tertio Rubeum Sandaracha.

Ex his album in Medicina vsitatissimum est, fuluum rarè rubrum rarissimè. Eligatur album Crystallinum, ponderosum, durum, purum, ad lacteum colorem tendens.

N. *Arsenicum Crystallinum factitium est, siq; sublimando eam auripigmenti scobe & sale anaticè mixtis. Auripigmentum & Sandaracha natia sunt, nec differunt, nisi quod Sandaracha auripigmento sit magis in terris excocta.*

Vires. Inter Venena loco haud ultimo Arsenicum recensetur, nec immerito, quippe præter summam acrimoniam, tanta quoque malignitate vita nostra Balsamo infestum est, ut non modo intus assumptum, sed & extrinsecus adhibitum, horrenda Symptomata introducat.

Qualia sunt:

Convulsiones, manuum ac pedum stupiditates, sudores frigidi, palpitaciones,

tiones, deliquia cordis, vomitiones, corrosiones ac tormina, sitis, æstus, &c. *Exempla vide sis apud Salam in Ternar. Bezoardic. c. 27. apud Schenck & alios.*

Verum enim vero nec facultatib. caret utilib. quas intrinsecus in curanda peste, reliquisque venenatis affectib. vt & in scabie maligna, cancrofa, &c. conferre potis est, modo qua decet ratione præparetur.

Extrinfecus adhibetur ad partem quamuis pilis denudandam, nonnuncquam & cauteriis, amuletisque admittitur.

Auripigmenti & Sandaracha Vires eadem ferè sunt, nisi quod in Arsenico paulum sint mitigatiores, idque ob sal in præparatione eius accedens.

N. Sandaracha Arabum est Gummi - Iuniperi.

PRÆPARATA.

Præparationis scopus eò dirigendus est, vt acrimonia mitigata dulcescat atque maligna & volatilis separetur. Huic scopo media destinata reperimus, sublimationem, fixationem, & liquationem.

SUBLIMATIO.

Vnde

1. Arsenicum dulce.

℞. Oocrystall. q. v. sublima per se deinde in + o opt. horar. 2. spacio decoque, [sic enim sua nigredine & farina quadam leui atque corrosiua spoliatur.] Postea cum squamma aris, *Rupferschlag*, iterum sublima. [quæ venenum illius crassius atque nigrius retinebit. Tandem bis ac ter cum Sale commun. præparato sublima, postea perfectè

dulcoretur.

N. Illius perfectio ex eo cognoscetur, quando Metallis iniectum, candorem illis conciliat & indit perfectissimum, qui remanet etiam iniis, postquam ignita fuerint: Cum tamen ∞∞ crudum eadem nigrefaciat, atque fumo quodam infesto, què oculus & olfactus non sine noxa, & incommodo sentire possunt, contaminet & inficiat.

Vires. Tantum abest quod assumentibus noceat, vt quoque benigne & sine ulla perturbatione ea venena expurget, qua aliis Catharticis nullatenus cedunt.

Vfus. Dari potest illius sublimati substantia, in infusione ad pondus 5. 6. 7. 8. granorum. Querc. in Alexicac.

Potest & per distillatum in ∞∞ redigi ulceribus utile.

Aliter.

2. Rubinus Arsenici diaphoreticus.

℞. ∞∞ q. v. sublima bis vel ter in ♁, temperque sepaga ☿ erem subtilissimum, qui in cucurbita instar farinæ volatilis adhæret. Est enim ∞∞i venenum, partem Crystallinam misce exactè cum flor. ♁. ana & sublima.

Vires. Est specificum in affectibus pulmonum ex crassis catarrhis. Datur quoque ad sudorem ciendum, in morbis malignis & venenatis.

Extrinfecus si adhibeatur, curat omnia ulcera maligna curatu difficilia.

Dosis à gr. 5. ad 8.

N. ∞∞ hac ratione præparatum ad ℞j. secundum Tentzelium exhiberi potest. Tentzel. in Exeg. Querc.

Eodem modo potest parari & Rubinus ex auripigmento æquali dosi, & ad similes affectus adhibendus.

Ar senicum sublimatum.

℞. ∞∞, ☉ tost. colchorar, limatur ☿ an, M. sublimaque dando Δm

HHh 2 per

per gradus, quod sublimatum est, tum nouis speciebus misce & vt prius sublima, idque ter repete.

FIXATIO seu CALCINATIO.

Vnde

1. ∞ fixum, & exinde ∞ .

R. ∞ Crystall. [vel Auripigmentum illius sublimati, \ominus i purific. an. [alij R. Auripigmentum, part. i. \ominus , part. ij. Alij ∞ \ominus \boxplus an.] M. ac iniice per vices in + bulum versaue spatula, [cauendo fumū,] donec cesset Ebullitio. Postquā cuncta inieceris, da Δ m fortiss. per $\&$. 4. 6. [alii ∞ integrum Tandem edulcora, Sal \odot calida ∇ reparando, remanebitque in fundo \boxplus albissimus ∞ i fixi.

N. 1. Felicius hac calcinatio procedet inter duo + bula luto connexa, cum spiraculo ad fumi egressum.

N. 2. Müllerus tertia vice calcinationem illam cum \ominus ana repetit, \boxplus erem singulis vicibus ∇ dulcorando.

Vires. Inferuit Oleo per deliquium preparando, vt & Auripigmentum fixo sudorifero.

Eodem modo potes procedere cum Realgare argenti, Cadmia, & simil.

2. Arsenicum fixum sudoriferum.

R. \boxplus eris arsenici fixi, q. v. imbibatur ∞ \boxplus p. d. aliquoties (ter.) Denique dissolue materiam in aqua vitæ, vt extrahatur & separetur totus Sal, & restabit \boxplus alb. & fixus, quem separa.

Vires. Sudorem mouet, datur cum Theriaca.

Dosis g. 3. 4. 5. Müllerus in miraculis Chymicis. Querc. in Spag.

3. Regulus ∞ & Auripigmentum S. Closs.

\boxplus huius vel illius \boxplus vii. \ominus & \boxplus simul detonatorum per accensum car-

bonem \boxplus vi. limat. \boxplus \boxplus iv. pulu. carbonum \boxplus i M. fundantur in + lo & regulus concutiendo ad fundum depellatur, qui purior est quàm ille \boxplus ii.

N. Ex hoc Regulo in flores ∇ ato per putrefactionem cum salibus resuscitantibus & \boxtimes fieri volumi \boxplus ∞ corporalem. Fides sit penes Experientiam.

L I Q V A T I O.

1. ∞ ∞ Anodynum, Butyrum ∞ Liqueor ∞ .

R. Pulueris Auripigmentū fixi, q. v. dissoluatur in cella per deliq.

Vires. Conducit venenatis ulceribus in Lue Venerea, Cancro, Serpigine, an fistulis, morsu canis rabidi.

Vsus. ∞ Auripigm. illius, [vel Pulueris,] tantum in ∇ plantag. vel persic. soluitur, vt mixtura ipsa gustu lingua tolerari possit. Aquā illā laetetur vulnus sculcus.

N. Basilus in rep. L. Ph. addit \boxplus i & ad liquefendum exponit.

2. Aliter.

R. Butyri Arsenicum \boxplus .

Ol. Nitrum Mith. \boxplus j. Mith.

N. 1. Paracelsus l. de mori. rer. nat. hanc ∞ fusionem cum \ominus , liquefactionemque subsequentem in cella, mortificationem vocat, atque Auripigmentum Realgaria & c. simili modo mortificari posse perhibet.

N. 2. Quercet. in spag. yr. preparatione preparationes Arsenicum datas anygmaticè describit, quas enucleant in Querc. re diuino.

D E S T I L L A T I O.

Vnde

Spiritus & butyrum Arsenicum.

Fit ex parte vna Arsenicū & \boxplus \boxplus ti part. ij. destillatis per \boxplus , vt fieri solet in parando butyro \boxplus ali; primo egreditur

ditur spiritus subtiliss. semper fumans, & sub finem liquor crassus, qui in aqua communi præcipitatur vel in suoli-quamine seruatur.

Vires. Spiritus dicitur, Item solue-re radicaliter, tincturisque ingressum præbere in corpora metallica. Butyrum

vero est Septicum violentum, Cancrorum ulceratum eradicatum debet autem ei par quantitas opij ad sensum doloris obtundendum permisceri, & ex filo carpto circumcirca admoneri cum defen-siis conuenientibus.

Ex S. Clossao.

CAPVT XXVIII.

De Sulphure.

Sulphur est Resina siue pinguedo terræ, Chalcantosa aciditate gra-uida.

Dicitur, Arabicè Cibur vel Chy-bur, Crybrit, Rabric, Albusao: Chy-micis, Akiboth, Ahufal. An. Anerit. Anerick. Alchibith. Alcebris. Aphe-briock. Kibrith. Kaprili. Lamare, Tifa-sum, Tin, Vhsur. Græcè Θείον. Germ. Schwefel.

Sulphur tum natium, tum facti-tium Officinis in vsu est.

Natium ex terra effoditur, purum solidum, interdum scissile, venitque nomine ♁is viui, seu αἰὼν. i.e. Δm non experti.

Factitium vel ex viuo ♁re impu-riori, pyriteus vi Δ educitur, vel ex aquis ♁eis excoquitur.

♁r caballinum quod in Officinis dicitur, feces sunt è coctione sulphu-ris viui impurioris relictæ & in vrceos admixtis nonnunquam squammis ♂ transfusæ.

N.1. Adhærescunt quoque interdum q. stiria Sulphurea camino, ubi ☉m ex sua vena excoquitur, qua nihil aliud sunt, quam ☿ris flores ex Virriolodum excoquitur, eleuati. Horum copiam ex-

hibet Suecia sat magnam.

N.2. Exhibet Chymia & Artificia-lia Sulphuris genera ex ♀ ☿, &c. quidem longe reliquis præstant, verum, quia rara & chara sunt, rarissimè Chy-micis præparationibus vulgaribus subiici solent.

Delectus.

Eligatur ♁r purissimum colore vi-rescens, facillè inflammabile, luculen-ter ardens fumumque mas cœu-leum halans.

Vires. Calidum & siccum est, pecto-ri dicatum; aperit, incidit; putredini, veneno, venenatorumque animalium morsibus resistit. pronocat sudorem, &c. Hinc conducit in Phibisi, Tussi, Asthmate, Peste, pestilentialibusque fe-bribus. Extrinsecus discutit tumores du-ros, sanat lichenes duros, pruritum, &c.

PRÆPARA.

1. Sublimatio. 2. Præcipitatio. 3. Destillatio. 4. Infusio & Extractio. 5. Liquatio.

I. SVBLIMATIO:

Vnde

Flores Sulphuris.

HHh 3

Flores

Flores ☿ is nihil aliud sunt, quam ☿ r à terrestribus excrementis per sublimationem purificatum.

N. Nonnunquam tamen ☿ aliis im-
pregnantur.

Sublimatio ☿ is fit in arena calore mediocri gradatim adhibito, ex cucurbita terrea, cui ☿ vitreus sine luto imponitur, ut auferri sc. ac post exemptos flores iterum reponi possit.

N. 1. Orificium cucurbitæ interea temporis, quo flores eximuntur, probè tegatur, ne aeris irruptione ☿ r [quod facile accidit] incendatur. Cuius rei gratia non abs re foret, duos in promptu habere alembicos, quorum alter alterius vicem sine mora subire possit.

N. 2. Alembicus ante impositionē ad ☿ m caleseat, quippe securi facile dissiliet.

N. 3. Rostrum ☿ i recipiens apponi potest, ad liquorem acidum, qui primo egreditur excipendum, Liquore egresso rostrum charta obturare licet.

1. Flores ☿ simplices.

R. ☿ grosè (si libet) contusi q. v. impone cucurbitæ terreae, vel vice vna, vel per vices, ac paulatim. Sublimaque in ☿ , ut dictum, igne moderato. Primo exit aciditas, quam Excipulo excipe ac serua (de qua infra,) secundo, sublimantur flores flauī, &c.

N. 1. Alij admiscēt. ☿ is lb. i. farina laterum lb. β. Alij à terra sigillata sublimationem instituunt, vel à bolo.

N. 2. Si ☿ fortuito accenderetur, farina vel cinere in iecto extinguī flamma poterit.

N. 3. Cauendum ne ☿ nimium incendatur, adeoque non excedat calorem, qui alembico manum imponere permittit.

Flores ☿ ☿ lati.

R. ☿ flauiss. lb. i. ☿ fusi & ☿ i

calcinati an. lb. β. pulueriscentur & misceantur. F. Sublimatio ut dictū, dando initio ignem lentum post aliquot horas (3. vel 4.) phlegma incipiet stillare & durabit per horas 4. vel 5.

N. 1. ☿ augendus est sensim magnis carbonibus, ut tandem Catinus in quo arena continetur, rubeat.

N. 2. Calor si sit nimis excessiuus, non flano, sed nigro calore ☿ r ascendit.

N. 3. Alij.

R. Sulphuris ☿ i calcinati & ☿ is ana, quæ ponderum diuersitas neminem turbet, modo ☿ m rite adhibeat. Additamenta enim quo pauciora fuerint, eo ☿ sufficit mitior.

Quercetanus non nisi colchotar anatica addit, omisso ☿ e.

N. 4. Flores cum nouo additamenta Virioli ☿ ☿ ut ante sublimari possunt, idque vel vice tertia, quippe quo sapius flores eleuantur, eo plus tenuitatis acquirunt, purioresque enadunt, non tamen sine imminutione quantitatis.

Vires. Resistant puredini, cient sudorem, exiccant, &c. Hinc profunt in peste, pestilentialibusque febribus, sine curandi, siue præseruandi gratia adhibere libeat. Exhibetur quoque utiliter catarrhosis, pulmoniacis, tussientibus, & simil.

Dosis robusto ʒj. inueni ʒβ. in præseruatione autem non excedimus ʒβ. Exhibemusque commodè cum Extracto Enula campana.

3. Flores ☿ gummati seu myrrhati.

R. Flor. ☿ composit. ut ante lb. β.

Colchotar ʒvi.

☿ fusi ʒv.

Mirr. Alexandr.

Thur an. ʒiij.

Aloës succorr. ʒiv.

Mastich. ʒiij.

Croc. ʒβ.

Omnia trita simul atque benè mixta sublima l. Δ. post horas aliquot, exime flores, rursus alembicum impone, Δm continuando per hor. aliquot (12.)

N. 1. *Aly* & mox initio Δ pulu. lb.

1. *Di calc. & ana* 3v. *Aloes* Tbur. *Myrrh* à 3ij. Floresque novis speciebus 2. vel 3. vicibus sublimant. *Senn. Inst. Paracels. volum. 1. p. 1046.*

N. 2. *Felicius procedunt, qui floribus Sulphuris iam factis, species solummodo admiscunt. Vix enim quicquam citra combustionem ex gummatibus una cum Sulphur. ascender.*

N. 3. *Imponenda est materia per vices, si enim nimium imposueris comburitur materia sufficitque 3. v. digitorum crassitie, singulis vicibus osuisse.*

Vires. Efficaciores sunt quam simplices, tum exiccando, tum putredini resistendo.

4. *Flores Sulphur. Saccharati.*

℞. Fl. Sulphur misc. atque sublima cum Sacchro cando.

Vires. Maius auxilium conferunt ad asthma, aliasque affectiones pulmonum, quam vulgares. Quercet. in Pharmac. rest.

5. *Flores Sulphur. albi.*

℞. *Θ* purificat. q. v. lique scat in +, postea iniice per vices Sulphur. pulueris. [ut in *Lapidis Brunella preparatio ne*,] idquetandiu, donec *Θ* in ipso igne coaguletur. Ignè postea auge, operculatoque + bulo etiam Δ supra accende, idque continua, horis duabus.

℞. Ergò huius *Θ* fixi. p. i.

Sulph. Elect. p. ij.

Misce optimè & sublima Δ. 3. x.

Vires. Lacti Sulphuris, viribus ac potestate aequivalent. Sen. Inst. Tenzel.

6. *Flores Sulphur. Corallati.*

℞. Corall. lb. 1. Fl. Sulphur. 3 iv. tere

minutissimè & misce : sublima que vt dictum, Vni profluentem forasum primo collige, dein flores.

N. *Sulphur sic secū trahere dicitur subtilissimam Coralliorum substantiam.*

Vires. Habemur praestantiores quam vulgares Sulphuris flores, & si ex his Balsamus fiat Sulphuris, optimus pulmonum Balsamus perhibetur.

2. *Flores Sulphur benzoinati.*

Fiunt duobus modis : Vel subleuando XX omni horâ interea dum sublimantur flores Sulphur. & in cucurb. 3j. pulu. benzoini proiectiendo, vel collocando flores iam factos in patinâ terream vitreatâ, in cuius medio scutella Terrea promineat, cui inditur ferrū incensum igne, moxque iniiciuntur particulae benzoini, contegitur patella, vt fumus flores reuerberet, sicque iteratur ferri accensio, & benzoini projectio, donec sit satis, quo facto teruntur flores Sulphur. cum floribus benzoini exaggetatis, seruanturque tanquam odoris iucundi, maiorumque virtutum.

II. PRÆCIPITATIO.

Vnde

Lac Sulphuris.

Lac Sulphuris, Magisterium Sulphuris est, seu præcipitatum.

N. *Aliis dicitur cremor Sulphuris, alius Butyrum.*

Paratur autem 1.

℞. Fl. Sulphuris, p. i.

Salis *¶* i p. ij.

Pone in vitro oris capaciss. (siue in olla fictili) in arenam collocato. affunde *▽* ad eminent. sex digitorum ita tamen, vt quarta pars vitri sit vacua, hinc bulliant, vt Sulphur solvatur, [quod 5. vel 6. horis fiet,] spatula lignea continuò agitando, donec ferè omne

omne Sulphur solutum sit, liquorque rubeus appareat. Hinc filtra calidè per chartam Emporeticam, ac affunde confectum vinum austeriusculum, [alij ☒], lentè, celerè tamen lapsu, tamdiu donec colorem lacteum acquirat, qui ad fundum paulatim secedit, nomine lactis: Lac hoc ad fundum præcipitatum, effuso liquore collige, abluè Δa & exicca, vel, si placet, antequam plane exiccet, misceatur cum ∇ cinam. vel alia appropriata, vt fiat instar pultis vel lactis, &c.

N. Si ∇ bulliendo euanescit, affundatur alia, sed feruida.

2. Modus compendiosior.

R. ☒ & ☉is ☐ iliquefiant in + o per d. simul liquefactis affunde aliquidaquæ calidæ, mox affunde in patinam ∇ calida plenam & statim filtrentur, affundaturque paulatim vinum: sic totus liquor albescet atque lac ad fundum præcipitabitur.

N. *Quercetanus dissoluit flores in oleo ☐i, dissolutionique affundit +. præcipitatque, &c.*

Vires. Balsamum est pulmonum ac velut Δ consumens & exiccans. Exhibetur igitur utiliter his qui molestantur Catharris, fluxu Capitis, Asthmate, Phthisi, Tussi, Colica, &c. Promouet expectoracionem, intercipit defluxiones ad articulos, ventositatos ventriculi ac intestinorum præcauet ac discutit.

Dosis. Tantum pulueris miscetur, vt vehiculum albicante colore tingatur, daturque mane & vespèri cochl. i. Vehiculum sit appropriatus liquor, Aqua scilicet Cinamomi, Melissa, &c.

N. *Quercetanus exhibet ʒj. pro cathartico.*

3. Lac ☐ S. Cloff.

Coque in cacabo ferreo ☐ part. ij. ☐ puluer. part. i. cum maxima quantitate aq. donec partes 3. aq. sint consumptæ, ruboremque contraxerit instar sang. ex Δe dissoluto, coletur calidè per manicam, refrigerari permittatur, denique præcipitetur ☐ calente, & decantato lixiuo Lac 10. aut 12. aq. calidà dulcoretur.

Vires eadem qua lactis Crolliani, verum quia interdum fallit, parumue præcipitatur, hic modus infallibilis ad inueniendus fuit.

III. DESTILLATIO.

Vnde

1. Spiritus ☐ S. Cloffi.

Eligatur ☐ Leodiente coloris virescentis minoris tubi siue magnitudinis (Galli vocant du sou re verda petit canon,) tale enim per se luculenter ardet, locetur per magdaleones in scutellâ intus & extus vitreatâ, accendatur ad candelam, vt guttulæ liquati ☐ & ardentes, alios magdaleones incendiant, huic scutellæ Campana ex arte appendatur, ita vt verticem illius flamma non attingat, nec etiam nimium distet, (gignitur enim hoc Oleum ex reuerberio flammæ subuolantis contra aliorum opinionem) aliàs flores acidos habebis, perge in substituendis scutellis, donec satis ☐us campanarij habeas. Ex lb. i. ☐ nancisceris ☐us ʒj.

2. Spiritus s. Oleum Sulphuris per C.

Habendum est vas vitreum latum paropsidis vel patine instar, è cuius medio surgat meta, [tripus vel aliud aliquid metæ vices supplens,] supra metam concha vel + bulum statuatur Sulphure

Sulphure repletum. Desuper campana suspendatur vitrea, ea distantia ne flamma illam attingat; sic fumus est Sulphure accenso ascendens in campana condensabitur, condensatusque ex campanæ oris in suppositam patinam decider.

N. 1. Si conclauē fuerit clausum, locusque ac tempus humidum, maior olei quantitas colligitur.

N. 2. Vitile est campanam initio mafacere.

Alius modus.

Idem Oleum per Retortam tubularam destillari potest.

Nimirum:

Retorta tubulata, vel quæ in postica parte tubulum habeat in fornacem collocetur, eique recipiens ∇ æ mensura ad impletum, sine luto adaptetur. Postea vbi incaluit Retorta frustula Δ is partitis vicib. iniiciantur, & post singula frustula iniecta tubulus claudatur: Spiritus postea seu Oleum in \mathcal{M} ab ∇ separetur & rectificetur.

N. Si prorsus aërem denegaueris, sine frustraberis, id quod mihi accidisse scias, qui lactescentem liquorem loco Spiritus obtinui, omnis aciditatis expertem.

Vires. Spiritus ut fere nihil aliud est, quam spiritus Θ i, ita & eandem cum ipso vires obtinet. Insuper est & contra Pestem, Asthma, & c. utilissimæ; extrinsecus adhibetur in procidentia ani, si illius pauxillum cum ∇ , v. g. plantaginis miscetur, & spongia hoc liquore mandefacta locus affectus tangitur.

Vide Senn. Inst. Beguin. Gluckarth. Tenzel.

N. Ex residuis fecibus si in copia collectæ fuerint, Sal elixiniari poterit.

3. Spiritus Campanarius facillimus
S. Cloff.

\mathcal{R} . Δ viridis vel alterius pulueris.
 \mathcal{Z} iv. \odot us sal nitri vel \odot us ex sal com-
& Θ compositi (vide supra cap. 21.)
ad supereminentiam. 4 digitorum trans-
versorum, & a ex \odot in \mathcal{E} subitus &
supra positus ad ultimam usque guttu-
lam. Cohobetur 6, aut 7. (quo plus,
eò melius (Reperies in \odot ultra \mathcal{Z} ij.
 \odot us eiusdem amaroris, naturæ, fa-
culatisque cum Campanario, viribus
 \odot us nitrarij haut imminutis.

N. Et si ad siccitatem videatur se-
cretum fuisse menstruum, nihilominus
 \mathcal{R} . rei inhaeret Sal causticum, quod dio
expositum in \odot um Δ ris resoluitur,
nouo quotidie succrescente, nec à Cam-
panario vllatenus differente.

4. Aqua acida seu aciditas, vel
Phlegma Δ is.

Aqua acida Sulphuris appellari
potest liquor ille acidus, qui in subli-
matione florum, initio (parce tamen)
extillat.

Vires easdem cum spiritu precedente
obtinet, verum quia minus efficax, raro
in usum venit.

5. Aqua seu Ens Balsami Sul-
phuris.

\mathcal{R} . Aquam acidam, quæ extillauit
in sublimatione flor. Δ Θ tor. rectifi-
ca & coniunge in \mathcal{M} bullienti, cum
 ∇ acida quæ extillauit in sublimat.
flor. Δ resinatorum.

N. Hac ∇ (quæ lactei coloris) seor-
sim colligena est, ne misceatur cum oleo
subnigro, quod subsequi solet.

Vius idem qui florum, in peste, fe-
bribus, colica, obstructionibus ac aliis
affectib. pulmonum Croll.

6. Ol. Sulph. Balsamem.

Balsamo Sulphuris Sal tostum adde

II i atque

arque per Retortam destilla. *Sen. Inst.*

7. Ol. Δ Linatum,

R. Δ circ. [lb. i.] maceretur & solvatur in Ol. Lini, (lb. i. β .) & fiet massa concreti sanguinis instar. Refrigerata materia destilletur per Retortam, & prodibit Oleum rubicundissimum.

N. Alij addunt Θ i calcinat. lb. ij. Mil.

Vires. Prodest ad ulcera ac bubones pestilentialia maturandos.

9. Ol. Δ is aureum.

R. Δ aliquoties liquefacti & in ∇ effusi lb. i. pumic. lb. β . misc. ut fiat massa ac destillamento Δ . [N. ne des ignem inferius, sed supra Θ adlatus,] sub fine auge ignem, & extillat oleum instar \odot .

Vires. Exhibetur utilissime in Cachexiis obstructionibusque viscerum, præservat à peste. Clar. D. D. Ioh. Tileman P. Profess. Marburg.

10. Ol. Sulphuris rubrum.

R. Δ r, lb. i. Ψ . lb. ij. per Retortam pelle.

Vires. Itidem maxime est utilitatis in bubonibus pestilentialibus maturandis.

11. Oleum sulphur verum S. Closs.

Resolve ζ ij. tusi in lb. β . spiritus thereb. clari, id quod fiet intra Θ super Ξ , solutionem rubentem decanta, alium affunde digere, separa per inclinationem, feces (quæ erunt per paucæ) abiice. Tincturas \S a Δ lentissimo ex magna \curvearrowright , donec ferè omnem Λ um thereb. recuperaveris. Guttulis autem rubris apparentibus mutetur recipiens & Δ paulatim augetur, egredietur Oleum coccineum cum fœtore intolerabili, qualis est lactinarum. ultimò \curvearrowright ferè incandescen-

te, spissum & obscurè nigricans. Hoc redifica & separa à Λ u thereb. superstito. Oleum autem vase clauso digere per mensem in MB, ubi fœtorem deponet, euadetque verus Pulmonum balsamus.

Vires. Est egregium Vulnerarium intrò sumptum, curat ulcera interna, resistit suffocationi matricis, pesti, colicæ, catarrhis fluentibus asthma, empyemati, urinam pronocat. Dosis gutt. 3. in syr. conven. vel oui vitello.

IV. INFUSIO:

Vnde

1. Balsamus Sulphuris Terebinthinatus seu Rubinus Sulphuris.

R. Fl. Sulphuris \mathcal{D} i ζ ij. Spir. Terebinth. ζ vi. vii i. Digerantur in vase vitreo, donec solvatur Sulphur & spiritus Terebinthinæ rubicundus reddatur. Hinc decanta ac serva

N. Quod si hunc Balsamum à suo solvente seu spiritu separare volueris, affunde ∇ . & destilla, sic spiritus una cum ∇ extillabit, relicto Balsamo in fundo.

Vires. Excellentissimam Medicinam præbet contra Phthisin, quippe valet ad ulcera pulmonum consolidanda, præservat à peste, aliisque, morbis contagiosis: inseruit quoque Tinctura Sulphuris, vide infra.

Dosis à g. 4. ad 7. scil. si à suo solvente separatus sit, vel ad g. 20. cum suo solvente. Querc. in Pharm. rest. Hartm. in Pract. Sen. Inst. Beg. &c.

2. Balsamus Sulphuris compositus,

Balsamus vite,

R. Flor. Sulph. lb. i. Myrrh. ζ ij. Aloës succorr. ζ ij. croc. ζ ij. pulverisa, ac digere cum Λ u Terebinth. ad eminent. digit. 2. affuso, decanta.

Vires. Efficacius operatur quam simplex.

5. *Balsamus sulphuris ad Externa, qui Rulando adscribitur.*

Fl. ☿ vel sulphur pur. ʒj.

Ol. rapar. exprels. vel nucum
℔. β.

Vini generosi. ʒij.

Macerentur ☿ 8. Δe lento, aliquoties agitando. Postea coquantur lentè ad vini consumptionem. Tandem cola & serua vsui.

Vires. *In variis morbis Rulando Balsamum hic adhibitus est. Vide eius 1. Cent. 9. 2.*

N. *Balsamum Rulandi aliter describit Vntzerus tract. de sulphure. Vide & Balsamum sulphuris ☿ latum in Angel. Sala tract. de ☿ lo.*

4. *Tinctura sulphuris.*

Postquam à Balsamo ☿ Terebinth. separatus fuerit,] *modum separandi habes in Balsamo*] affunde ☿ & extrahe ☿ in MB, & habebis Tincturam; digere atque à fecib. subsidentib. decanta.

Vires. *Prestantiores effectus habet quam Balsamus.*

Dosis gutt. 3. 4 &c.

N. *Extrahit quoque ex sulphure crudo Tincturam citrinam ☿ optimè rectificatus.*

5. *Tinctura sulphuris S. Cloff.*

Infer in candens rigillum per cochlearia mixturam ex ☿ ℔. j. sulphur pulver. ʒ iv. coniburantur Δ forti, donec strepitus cesset, & in massam rubram mixtura detonata compingatur, cui in pulu. red. ctæ Spiritus Vini ☿ satus affundatur extrahaturque Tinctura.

Vires. *In peste, febribus, scorbuto, obstructionibus hepatis, pulmonumque morbis.*

Dosis gutt. 8.

6. *Alia Tinctura.*

Fac Capicellum ex salnitri in aqua soluto, in cuius ℔. vi. bulliat per 24. horas sulphur puluer. ℔ j. filtretur liquor rubeus, & præcipitetur cum aceto, in quo decoctum fuerit ☿ ex ☿ lo. In fundo residet puluis scarlatinus, è quo tinctura modo superius tradito, vel per ☿ um thereb. extrahenda venit.

Est S. Cloff.

7. *Crystalli ex Tinctura sulphuris*

Postquam per ☿ um thereb. & ☿ tinctura fuerit prolecta, vt dicitur artic. 4. p. 166. abstrahendus est ☿, dum restitet tantum pars tertia illius, quæ in cellâ collocatur, vbi nascuntur crystalli; in quibus residet Q. Essentia sulphuris, dissoluantur iterum in alio ☿, & denuò coagulentur, quò magis ac magis ab odore graui immunes redantur.

Dos. gr. 4. in liquor. appropri. tabellis electuar.

S. *Sal. sulphuris.*

Vel fit ex ☿ ☿ us Campanarij, de quo vide Kesslerum artic. 5. 4. Centur. 1. vel ex carbone nigro leui & foliato sulphure post extillationem Olei veri, (vide præcedentem pag.) residuo, hoc Δ miti reuerberandum est ad albedinem.

Vterque modus parum ☿is præbet, sed efficax aduersus verminationem remedium.

9. *Essentia Sulphuris.*

℞. Miner. Sulphuris q. v. affunde ☿. (ex ☿ & ☿) solue, quoad poteris. Hinc abstrahes solum ad siccitatem, edulcoratumque reuerbera ad rubedinem saturatam. Hinc extrahe. Tinct cum ☿, digereque donec Ess. Sulphuris à ☿ separetur instar olei, fundumque petat.

• Vires. *Magnum est virium ad ar-
cendam putredinem.*

Dosis gutt. 6.

N. In hac Sulphuris Essentiâ si Myr-
rha, Aloë, aromatauè infundantur, atque
Tinctura Mextrahatur, dicitur Balsa-
mus mortuorum.

Basil. in repet. Lap. Ph.

V. LIQVATIO.

Sublimatus Sulphur in sublimato-
rio sat alto Δ forti, sublimatum ex-
pone liquationi in cella, aliquandiu.
Basil. d. l.

C A P. X X I X.

De Bitumine ac Ambra Grysea.

Bituminis nomen generaliter deno-
trat quodcunque minerale pingue
Vnde & diuersas sub sespecies com-
prehendit. Ambram scil. Succinum,
Sperma ceti, tum quoque Bitumen in
specie sic dictum; Naphtham & Pe-
trolæum; Carbonem petrae & Ga-
gaten. De quibus sigillatim breui-
bus.

De Ambaro.

Ambarum, Ambra, siue Ambara
generaliter duo bituminis genera de-
notat, quorum vnum, Ambrae nomen
communiter retinet, & ad differentiam
alterius, Ambra grysea dicitur. Alterum,
Succini nomen assumpsit, de quo loco
sequenti.

N. 1. Est & Ambra nigra, de qua
maxima est Authorum inter se dissen-
sio. Sunt enim qui vera ambra nati-
ua speciem faciunt, quæ reliquis sit imbe-
cillior. Alij factitiam statuunt, ex mo-
scho, Zibetra, ligno aloes, styrace & lada-
no. Alij Gagaren. sub titulo ambra nigra
vendunt. Alij succinum colore ad ni-
grum vergens.

N. 2. Est & ambra subalbida, i. e.
Sperma Ceti.

Ambra Officinarum bituminis

quoddam genus est, ex fontibus acal-
ueis maris ad litrus eructatum. Germ.
vvolricchend Amber.

Optima censetur Grysea (seu co-
loris cinerei) à sordib. purgata, odo-
rata, læuis, quæque acu perfossa suc-
cum pinguem refudat. Improbatur
nigra, candida valde, utpote dubio pro-
cul adulterata.

Factitia facilis cognitu est, odore
scil. (quo res ex quibus confecta est,
prodit) tum quoque colore, (quo
plerumque nigra est,) adde quod ∇
imposita citius mollescat, quam na-
tiua.

Vires. Calfacit, siccatur, resolvit, cor ce-
rebrumque roborat, spiritus vitales ac
animales sulphurea sua ac suavi exha-
latione suscitatur reficitque: Vnde haud ra-
rus illius usus est in globulis illis fra-
grantibus ad infectum aërem corrigend-
um, spiritusque ab infectione tuandos,
formatis, quos globulos inde Poma Am-
bra vulgus appellat. de quib. l. 2.

P R A P A R A T A.

1. Essentia Ambrae.

℞. Ambr. gryf. p. i. Ol. amygd. d. p. ij.
impasta,

impasta, ac digere & aliquot, postea exprime: Expressioni affunde V re-ctificatiss. digere ac destilla per arenam. Sic eleuabitur cum V Essentia quo-que Ambrae, relicto oleo amygdal. in fundo Abstrahere igitur V leni calore, ad consistentiam olei.

Dosis g. paucæ.

2. Species Diambrae, vide in D.

3. Poma Ambrae, vide lib. 2. c. 75.

4. Ambra Essentificata.

℞. Ambrae gryf. opt. part. viii.

Mosch. odoratiss. p. i.

Sacchr. albiss. p. f.

Omnia puluerisata cum Spiritu Rosarum ardente terantur optime diutius, sæpius aliquid de Spiritu ro-sarum affundendo, attemperando & rursus reponendo, vt q. siccescat. Hinc rursus vt prius teratur, & seruetur.

Vires. Omnium viscerum conforta-tium maximum est & inprimis vim procreandi promouet. Dosis instar pisi minoris in Vino vel alio liquore. Hartm. in pract. & in Croll.

N. Flores Ambrae habet Kesslerus sub nomine glebabituminosa.

C A P. XXX.

De Succino.

Succinum nihil aliud est, quam Suc-cus bituminosus seu Resina terræ optimè digesta, exinde in mare tra-ducta atque ibidem præcipuè con-creta.

N. Dum bituminosa illa substan-tia adhuc liquida est, varia sese inuol-uere solent, vt musca, formica, &c.

Dicitur Arabicè Ambra citrina, Ele-ctrū, Chrysolectrum, Carabe; Glessium, Resina terræ, (Paracelso) *Agstein Bern-stein, Gentar.*

Delectus.

Succini genera etsi plura vulgo numerantur, album scil. flauum, & ni-grum; attamen non nisi duo Officinis nostris eo nomine veniunt. Album scil. & flauum seu Citrinum; nigrum enim non datur nisi particulis, ad nigredi-nem aliqualem inclinantib. id nomi-nis imponere velis. Vtrumque quam-vis laudibus suis haud destitutum sit: Attamen præstat album, vt pote

magis digestum. Eligendum id ipsum candidum, syncerum, suaue fragrans Huic succedit flauum, quod præstat pellucidum, quodque præ aliis attritu, suaue halat odorem, nigrius enim (quod nonnulli succinum nigrum, alij ambram nigram faciunt,) vilius est. Flauum ad albedinem deduci potest hoc modo.

℞. Succin. flau. e. gr. ℥. i. pone in cu-curb. terream validam, superadde salis marini vel (si eo cares,) salis gemmæ, aut salis commun. opt. ℥. ij. superfunde aquæ pluuiæ. q. s. ad soluendum: quo soluto, in super affunde recentem ∇ flu-uidal. ebullian superimposito ☞ bico cæco, (ne ∇ subito exhalare possit, non tamen firmiter cucurbitæ agglutinato:) & P 14. vel donec coctione illa album euadat.

N. Ne ∇ deficiat, identidem alia feruens superadiicienda erit. Hartm. in Croll.

Vires. *Calfacit, exiccat, roborat, adstringit leniter, capiti ac utero imprimis dicatum est. Hinc abibetur utiliter in Catarrhis, Epilepsia, Apoplexia, Letargo, Vertigine, Suffocatione ac Inflatione matricis, profluvio sanguinis ac seminis, quod ad naturalem statum reduci: In fluore albo multorum. Caterum globuli è succino ad oculorum defluxiones miro successu auxiliari dicuntur, annexi occipitio. Idem etiam collo gestati praejudicant, ne destillationes in guttur ferantur. Baptista Port. Matthiolus.*

Vfus, *Præcipue albi, tam internus, quam externus esse potest. Internè exhibetur ad ʒi. iusque*

N. *Alij commendant pro amuleto in peste, si compulsi saepe fricentur.*

PRÆPARATIONES

1. Præparatio. 2. Solutio seu Præcipitatio. 3. Destillato.

I. PRÆPARATIO.

Vnde

Succinum præparatum.

Præparatio Succini vulgari modo fit, cum ∇ appropriata læuigando.

N. *Quercetanus in Ph. rest. c. 26. misceat Succ. pulu. cum ∇ , hunc desuper accendit, continuo agitando, & hoc 4. repetit, tandem humiditatem Δ e separat, residuum Succinum puluerifat & seruat pro vsu.*

Vires. *Eadem qua supra.*

II. SOLVTIO & PRÆCIPITATIO.

Vnde

Magisterium, Extractum, Tinctura.

ʒ. *Succini pulueris, q. v. affunde ∇ rectificatiss. solue, decanta & ab-*

strahe in MB, vel præcipita cum ∇ font. & remanebit in fundo Magisterium.

N. 1. *Paracelsus.*

ʒ. *Carab. q. v. affundit circulum, digerit in ∇ tribus σ (6.) Hinc abstrahit ac cohobat, idque toties donec in fundo σ appareat, lib. 6. archid. p. 81.*

N. 2. *Dici quoque potest Tinctura, si in forma liquidiuscula adhuc adseruetur.*

Vires. *Magisterium hoc, ut nihil aliud est, quam pars purior ac resinosa, à crassioribus sola solutione separata, ita easdem cum succino, efficaciores tamen operationes obtinet.*

Aliter.

ʒ. *Succinum puluerisatum & parum tostum, affunde \times ac extrahe, Extractum præcipita cum Spir. \oplus i.*

Vires. *Sudorificum est ac diureticum.*

Magisterium Succini dulce fixum.

ʒ. *Succin. alb. puluerisat. subtiliss. q. v. affunde \times ad eminent. 4. digerit, ebulliant. an arena aliquot dies (si euaporet, affunde nouum) ut rubescat \times . Hoc filtra & abstrahere, sic manet magisterium in fundo. Hoc solue in ∇ (rosatum) filtra & abstrahere, idque vice tertia, tandem præcipita cum Spir. \oplus i vel succo citri.*

Vires. *Sudoriferum est insigne, admodumque conueniens in morbillis, pleuresi, confortat cor, &c.*

Dos. à ʒ. 6. ad 12.

N. *Ita etiam paratur Magisterium C.C.*

III. DESTILLATIO.

Destillatio exhibet Oleum, Phlegma, Spiritum ac Sal: perficiturque vel sine liquore, vel cum liquore affuso, per cuius virtutem scilicet aliquantulum digeratur ac solvatur.

N. Oleum non ascendit, quandiu aquam adfuerit vehiculum, ideoque si oleum experatur, sine ∇ destillatio peragi potest.

E. gr.

R. Succin. grossè triti, q.v.e. g. lb. ij. vel lb. iij. (possunt & silices contusi addi, (destilla per \odot m vitream, terreamuè igne gradato & caute adhibito: Extillabit primo phlegma, postea oleum subtilius, tandem crassius, Salque volatile parientibus adhærescet. Hæc singula si libet seorsim suscipe.

N. 1. Alij digerunt primo Succinum cum aqua, (sic Crollius cum ∇ rosacea) hinc destillant. Verum ut dixi oleum non ascendit, priusquam humiditas aquea consumpta fuerit, protrahitur itaque nimium labor citra utilitatem, quæ sit alicuius momenti.

N. 2. Alij succinum optimè terunt, ut sit instar farina, hanc miscent cum cinere optimè elixiniato, destillantque igne adeo leni, ut intra momenta 20. vix guttula decadat. Sic eliciunt oleum penetratissimum, quod seorsim colligunt, mutato, cum flauum apparere inceperit, recipiente.

Hactenus olea ac spiritum confu-

sim, destillando adeptus es: itaque destillatione seu rectificatione ulterius ea separare ac rectificare poteris.

R. Oleum omne vel singula seorsim, infunde in cucurbitam, cum s.q. aquæ addendo nonnihil \ominus is ac destilla per MB vel per vesicam.

N. 1. Alij affundunt oleo rectificando \times , digerunt & destillant.

N. 2. Si oleum illud crassius unacum + super \odot restitans rectificetur, oleum extillat primo instar ∇ e limpidissimum, quod subsequitur, sub flauo colore pradtum est.

Hinc extant

PRÆPARATA

Officinalia.

1. Succinum præparatum: fit ex albo, l.a. cum aqua.
2. Magisterium seu præcipitatum, vide supra Præcipitatio.
3. Phlegma. In destillatione Collectum (sed rarè.)
4. Oleum succini albi:

1. rectificatum.

2. non rectificatum seu fœtidum.

Oleum succini citrini.

5. Balsamus fit ex succini 1. Magisterio seu Extracto duriusculo. 2. Oleo, & 3. \ominus : quæ excipiuntur Oleo nucistæ expr. præparato.

6. Pilulæ de Succino v.l. 2.

7. Trochisci de carabe Aug.

8. Crystalli rufi & Sal volatile album Succini describ. à Kest. centur.

3. artic. 12

C A P. XXXI.

De Spermate Ceti.

Est & aliud genus Bituminis, quod Sperma Ceti Officinæ vocant, alij Ambram subalbidam, alij florem maris seu salis veterum interpretantur. Germ. *VValroth*.

N. Colligitur in mari, cui ceu spuma supernatat. Cuius autem originis sit, nondum inter se Authores conveniunt. Sunt enim qui esse semen volunt è Balena seu Ceto emissum, sed malè, inuenitur enim in locis, ubi ne balena unquam deprehensa sunt. Sunt ergò alij qui florem salis à Veteribus descriptum, nominant, adeoq; spumofum quod salis marini perhibent. Verum & hi hallucinantur, primum quod cum veterum flore salis, qui ruber & liquidus describitur, minimè conveniat. Secundum, quod sit citra vim absterforiam salis, quam spuma salis utiq; referret. Verisimilius ergo videtur, uti in reliquis Regnis duobus vegetabilium scil. & animalium, excremen-

ta suppetunt pingua: Ita & in Regno Macrocosmico. Et huius speciem esse pinguedinem hanc furfurosam, productam, vel exhalatione terra sulphurea, mari communicata, vel ex sulphureis particulis marino salis immixtis, qua agitatione fructuum congregata, & in pinguedinem coacta sint.

Eligatur candidum, pingue, recens, non rancidum, &c.

Vires. Humectat, resoluit, anodynum est, proin vulgaris usus in coagulatione sanguinis resolutione à casu vel similiter contract. In torminibus colicis sedandis, ut & in torminibus ventris infantum mitigandis. In tussi tartaroque pulmonum demulcendo.

Dosis à ℥j. ad ℥j. vel ℥ij.

Extrinsècus sunt qui cicatris exanthematum illinunt, ut carne eas repleant.

C A P. XXXII.

De Asphaltis, Naphtha, Petroleo, ac oleo Terre.

Asphaltos { Vera, de qua hic.
Substituta, Asphaltos.

Officinarum, de qua lib. 4. *Pissaphaltum*.

Ἀσφαλτος, Ἀσφαλτυν est Bitumen, (seuum, refina,) Macrocosmi, picis instar durum, &c. Supernatare primum aquis conspicitur seu lacubus, hinc ad littora propulsum concre-

scit, densatur, tenacissimumque redditur.

Præfertur reliquis Iudaicum Bitumen, quod mortui maris (δολιχίου propterea dicti,) genitura. German. *Judenpech*.

Eius verò probatio est, ut purpureo modo splendat, (scil. in nigrore) sitque ponderosum & validum odorem

rem vibret, nigrum autem & sordidum, vitiosum est.

N. 1. *Quia rarissimum est, nostratibus eius loco Pissaspaltos in usum est, quam vide lib. 4.*

N. 2. *Oleum illius datur ut Succini.*

Naphtha est colamen bituminis Babylonii, consistentia liquidum, ignis rapacissimum.

N. *Nec & hac nostratibus usitata, sed loco eius Petrolaum usurpare solent.*

Petrolaum, Oleum Petrae, Stenaele est liquamen (axungia Macrocosmi,) pingue, liquidum, è petris, & faxis effluens.

Vires. *Calfac. & sic. tennium paritum est, digerit, & resoluit. cerebro ac nervoso generi confert.*

N. 1. *Petrolaum in Italia regione Mutinensi stillat candidum & rufum. In Si-*

cilia fontibus innatat. Apud Meianum pagum in tractu Parmensi album est. Babylonicum autem in suo fonte flagrare dicitur, secus Italicum.

N. 2. *Rectificatio Petrolai fit in Capella vacua, ita habebis limpidissimū. Num, & in fundo Vernicem seu Colophoniam nigram, solidandis vulneribus aptissimam. Spiritus autem pernionibus ulceratis confert, nernosque illitu cum Vroberrat.*

Oleum terrae oleum est pellucidiorum, bicundum, odoris fortis petrolaum æmulantis, sed gravioris

Ante paucos annos nobis innotuit ex India orient. asportatum, ubi ex monte quodam effluere dicitur.

Vires. *Arthritidi vaga maximo est solamini, inunctum.*

CAP. XXXII.

De Carbone Petrae & Gagates.

CArbo Petrae, carbo fossilis, *Steinkohlen*, Bituminis terreni genus est fossile, lapideum, friabile, nigrum.

Dicitur Carbo quod nonnullis, præcipuè Anglis, ut & nonnullis Germaniae locis fomitem ignis præbeat. Aliis terra ampelitis audit, aut male.

De usu eius Medico nihil adhuc quod addam habeo, nullum tamen dulcit, quin oleum inde elici possit ad maturanda ulcera, emolliendosque tumores aptissimū.

Gagates est genus terrae nigrae, lapideae crustosae, ad eò bitumine prægnans, ut bitumen redoleat, & accensum picis ferè modo flagret, nigerrimumque emittit

fumum.

Dicitur Gagates à Gaga Fluvio Ciliciæ, in cuius faucibus olim solum inueniebatur. Hodierno tamen tempore & in Germania frequenter eruitur. Differt à carbonibus fossilibus quod hi nec flammam emittant, nisi folliibus excitentur, nec bituminis odorem spirent, Gagates vero igni admotus flagrat, odoremque bituminis exhibet.

N. *Sunt, qui succinum nigrum vocant, cum succinum reuera non sit, quippe crustosus gagates est, succinum leue. Alij Pissaspaltum, sed male, quippe hoc facti*

factitium quid est. vide lib. 4.

Vires. Emollit, discutit, Colicum morbum sanare creditur, si in pollinem redactus septem diebus continuis ad ℥j. usque propinetur. Aëtius flagrantem in vino extinguit, idque cardiacis propinat.

PRÆPARATA.

Oleum in cinere ex retorta vitrea

paratur ad modum olei succini, sed igne paulum vehementiori. Oleum hoc si liber, poterit rectificari, addita aqua simplici.

Vires. Commendatur Epilepticis, Mantacis, Paralyticis, Spasmodicis, Tetanicis, Arthriticis, ab utero suffocatis, naribus illitum.

Scrius transmissum inferendum supra.

Ad pag. 320. lib. 3. capite 2.

Est & genus terræ exoticæ, colore purpureum, punctulis albis intertextum, ac si situm contraxisset, sapore austeriusculum, masticatum liquefcens, subdulcemque post se relinquens saporem; CATECHU vocant, seu TERRAM IAPPONICAN. *Huius usum perhibent celebrem in exiccandis catarrhis, capiteque roborando, si in ore detineatur.*

Particulam huius obtinui à Pharmacopœo nostrate curiosissimo Dn. Matthia Banſa.

Et sic ad Finem perducta est Mineraloga.



P H A R M A C O P O E I A E

MEDICO-CHYMICÆ,

L I B E R I V.

Seu

P H Y T O L O G I A.



HYTOLOGIA est
pars Pharmacologiæ,
quæ agit de plantis,

Classes Phytologiæ
sunt 4. Prima enodat al-
terantia primaria, quæ sunt, planta,
harumque membra. Secunda, enucleat
alterantia secundaria, vti sunt; Succī,
Olea, Resina, Gummi-resina, Gummata.
Tertia exhibet purgantia primaria.
Quarta describit purgantia secundaria:
utraque eodem modo cum prioribus
accepta.

N. Damus autem rerum quarum-
cunque 1. Species vsualiores ab aliis di-
stinctas. 2. nomina seu titulos, quibus
Authores celebriores & famosiores eas
rubricant, t.e. titulos tenus inscribunt. 3.
Tempus ac locum natalem. 4. delectum.
5. Officialia Nativa, i.e. quid de rebus
singulis crudè officinale sit. 6. Vires, 7.
Preparata vsualiora, &c.

Rubricas seu titulos vñd. cum aucto-
rum nominibus addimus, non modo vt eo
facilius res quæ ita occurrat, atque à re-
liquis suis speciebus distinguatur, sed &
immorescat quoniam authores & quoniam
illorum scripta ad vltiori rei cognitio-

nem consuli, adiri queant. Sunt autem
Authores præcipui, eorumque scripta:

Amati Lusitani Enarrationes in li-
bros 5. Dioscoridis.

Andræ Cæsalpini de plantis lib. 16.
Augustanorum Pharmacopœta seu
Dispensatorium.

Bartholomæi Carrichterī herbarium
Germanicum in 8.

Caroli Clusij 1. historia rariorum
plantarum. 2. libri 10. Exoticorum. 3.
Corollaria in Dodoneum Gallica à se
reddita, vt & in Garziam, Monardem
& Acoflam.

Caspari Bauhini Pinax theatri be-
tanici. 2. Note in Matthiolum.

Castoris Durantis herbarium in
linguam Germanicam à Clariss. Petro
Vffenbachio huius reipubl. Francofur-
tana olim Medico celeberrimo transla-
tum.

Christophori Acoftæ historia aro-
matum & medicamentorum in Orien-
tali India nascentium, qui est liber 9.
Exoticorum Clusij.

Eurici Cordi Pharmacologicum.

Garziæ ab Heito historia aroma-
tum & simplicium, atque medicamen-

K K k 2 torum

torum apud Indos nascentium, qui liber est 7. Exoticorum Clusij

Hieronymi Tragi herbarium seu libri 3. de stirpium usitatis nomenclaturis, &c.

Iac. Theodori Tabernamontani historia plantarum germanica libris 3. edita.

Ioachimi Camerarij 1. Hortus. 2. Epitome Matthioli, 3. Matthiolus German. quem novis iconibus auxit.

Ioh. Baptistæ Portæ 1. Phytognomica. 2. Villa.

Ioh. Fragosi historia aromatum, fructuum & simplicium aliquot ex utraque India delatorum.

Iohan. Gerardi historia plantarum Anglica.

Ioh. Manardi libri 20. Epistolarum Medicinalium.

Leonhatdi Fuschij historia stirpium. 2. Eiusdem icones in 8. 3. Eiusdem de compositionibus medicamentorum.

Matthei Lobelij historia plantarum seu observationes & aduersaria à Lobelo

& Pena edita.

Nicolai Monardis simplicium Medicamentorum ex nouo orbe delatorum, historia: qui liber est 10. Exoticorum Clusij.

Otronis Brunsfeldi historia libris 3. comprehensa.

Pedacij Dioscoridis libri 6. de materia medica.

Petri Andreae Matthioli 1. Commentaria in Dioscoridem. 2. Eiusdem Epitome in 4.

Petri Bellonij observationes libris 3. expressæ, cum notis Clusij, cuius Exoticis subiunctæ sunt.

Prosperi Alpini de plantis Aegyptiis liber.

Remberti Dodonæi historia stirpium pemptades 6. seu libri 30.

Valerij Cordi annotationes in Dioscoridem. 2. historia stirpium. 3. Dispensatorium.

Et hi sunt Botanographi, quorum hac in parte fit mentio, omiſſis authoribus pharmacopoëticis.

CLASS. I.

De Alterantibus primariis, quæ sunt Planta, harumque membra,
i. e. Radices, Folia, Semina, Cortices, &c.

I. Abies

Abies { alba, ἄλβη hæc præfertur.
rubra, πίκυς Picea.

Albainſcribitur Abies, Brunf. Trag. Matth. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Lon. Ger. Dod. (cui potius Picea.) Abies alba & fœmina, C. B. 2. Germ. Thannenbaum, uveifs. Thannenbaum.

Rubra inſignitur, Picea Brunf.

Matt. Cord. in D. Leon. Lob. Cast. Tab. Germ. Abies 1. & rubra, Trag. Abies, Dod. Picea maior prima seu abies rubra, C. B. Geſin. roth Thannenbaum, Fichte, Fichtenbaum.

N. Adeo conformes inter se sunt, ut nonnullis confundantur. differunt tamen, 1. quod folia Picea sint nigriora, latiora, molliora, lauiora, minus pungentia, ramos circumquaque vestientia. 2. quod Cortex

Cortex Piceæ sit nigrior, tenacior: abietis albicantior, fragilior. 3. quod Piceæ rami ad terram flectantur, secus ac abietis. &c. Matth.

Virent perpetua fronde nisi quod mensè Maio foliis pristinis decidentibus, noua subinde renascantur. Montibus gaudet saxosis.

OFFICINALIA NAT.

Cortex (sed raro) Coni & resina. N. Innaſcitur & viscum abieti alba, quod Plinij & Theophrasti Stelin reputat Clusius

Vires, Cortex exiccat, adstringit. Vſusque est præcipui externi in ulceribus & ambustis.

Coni (strobili Thanappfel.) exiccant & adstr. Vſus iridem sunt inprimis externi inflammatione Epatis & aliarum partium (Epithema) in verrucis (cuius signaturam referunt) & clauis pedum abigendis (lotione.)

Resina ab abiete duplex colligi potest, liquida & sicca. Liquida (lacryma, oleum abiegnum (colligitur ex tuberculis (ceu ex Vomica) abietum nouellarum sed pauca: Hæc Officinis Terebinthinæ Venetæ titulo venit (de qua class. 4.) sed perperam, siquidem illa (abiegna) acrior ac calidior sit. Sicca ex Abiete & Picea colligitur: Hæc vti Thus figurâ ementitur, ita & vſum eius æmulatur.

PRÆPARATA.

Oleum still. Fit ex ligno per descensum igne leni, sic extillat clarum.

N. Rari est vſus. Poterit tamen adhiberi in odontalgia, aliisque affectibus loco Terebinthinæ.

II. Abrotanum.

Αβροτον, ἀβροταν, ἀβρότον. Germ. Stabwurtz, Girtwurtz, Gertwurtz, Gartenheil.

mas, quod vulgariter nomen abrotani retinet, & huius loci est
Est { *fœmina, Cupressus seu cyparissus hortulana, Vide fil.*

Loco gaudet temperato, præcipue dum adhuc in ætate adoleſcente conſtitutum est, coliturque in hortis.

OFFICIN. NAT.

Ex Abrotani maris variis generibus solum officiniale est angustifolium maius: Huius extant in officinis fol. & gemma seu summitates collectæ Augusto: huic succedit minus seu abrotanum humile,

Maius insignitur Abrotanum mas, Brunſ. Dod. Matth. Lob. Caſt. Tabern. malculum maius, Cam. primum, Trag. vulgare mas, Fuchſ. Abr. mas angustifolium maius, Caſp. Bauhino.

Minus C. B. 6. Abrotanum 3. Trag. odoratum humile dense fruticosum, Lob. humile Tab.

Vires. Calſ. ſicc. incidit, aperit, ſubſtringit, extergit, valide diſcutit, reſiſtit putredine ac veneno, morſibus venenatorum animalium medetur, vermex necat, urinam mouet, impetus hyſtericos deſcutit, regium morbum ſoluit. Extrinſecus vſus eius ſamoſus eſt in offiſibus exiccandis, roborandiſque, & quia pilorum ſignaturam ſummitates eius æmulantur, ad alopeciam tollendam maximo preſe commendatur.

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex foliis ac ſummitatibus.

KK k 5 2. Vinum

2. *Vnum* : Veteribus in usu fuit creberrimo, modò non item.

3. *Conserua* : Ex summitatibus &
flor. paratur vt conseru.absinthij.

4. *Oleum*: Infusarum summiatunt
in O°O communi.

5. *Oleum stillatitium*: Ex summita-
tibus ficcis.

III. *Absinthium*,

Αβρίθιον. Αψίδιον. *Arah*. *Assinthi-*
um, *Afenefij*, *Sefurem*, *Alhanlais*, *Bar-*
rus, *Buleigi*. *Germ. Vermuth.*

Est { Vulgare rusti-
cum nostrate { maius. *C. Bau-*
{ bin. N. I.
{ humilius mon-
{ tanum. *C. B.*

1 Ponticum. *Vide loco sequenti.*

Maius insignitur, Absinthium ponticum seu Romanum officinarum C. B. 1. Absinthium Mari. Cord. in Diosc. Lon. vulgare Tring. Fuchf. Lob. Cast. Tab. commune Cam.

Humilius: Abf. ponticum montanum. C. B. 2. Abf. montanum *Cam. in Matth.* seu Romanum *Tab.* tenuifolium ponticum *Galeno.*

N. *Vulgare maius, illud est quod pas-
sim nascitur. Montanum in certis tan-
tummodo locis provenit, estque humi-
lius communi. Et hoc si haberi possit eli-
gere monet Tabernam.*

Florent Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Rustici Absintij *Folia ac Summitates.*

Vires. Stomachicum imprimis est, hinc hepaticum. Splenicum : calf. 1. (ad 2.) sic 5. aper. atten. astringit. amarum est: hinc vermes necat, bilem edu-

*tit, crapulam discutit, sudorem ciet, fe-
bribus (precipue tertianis) conuenit.*

N. Capiti quia vapores crassos exhibet, pigritiem ac somnum inferre solet, minus tamen si prius per ∇ calidam trahatur leniterq; exprimatur. Extrinsicet Vigiliis (temporibus ac plantis pedum impositum) conforat ventriculū, auditum acuit (suffitus aure suscepens.) &c.

PRÆPARATA.

1. ∇ still. Ex summit. & fol. recentibus.

2. *Spiritus*. Destillatur ex summit.
siccis ∇ affusâ fermentatis.

NB. Potest ad fermentandum ☉
aut simile quid addi. *Senn. in instit.*

3. *Succus expressus ac inspissatus.* Fit,
ex summitatibus siccis in ∇ coctis,

4. *Vinum absinthites.*

5. *Extractum liquidum seu Tinctura*
Cum *V* facta.

N. Eiusdem efficacia Tincturam facili negotio assequi poteris, si summitatibus aquam vitæ affunderis, parum accenderis atque hinc expresseris.

6. *Conserua*. Ex summitatibus paratur. l.a.

7. *Syrupus compositus*. Vide Dispens.
August & Noriberg.

8. Trochisci de Absinthio Vide Disp.
A. & N.

9. *Oleum infusum* Ex omphacio, & summit. absinth. cum Rosis. Vide D. Noriberg.

N. *Augustam* addunt quoque *succum*
absinthij.

10. *Oleum stillatitium.* Cum aqua ac spiritu descendit.

14. *Sal fixum*. Ex incinerata planta
laelicitur.

1.2. *Sal.*

12. *Sal. volatile.* Ex succo l.a. confici potest, quod raro in usu.

N. Sum cui absinthium hoc vulgare, veterum absinthium ponticum esse velint, adeoque & Romanum dici.

13. *Trochisci de Absinthio.* V. Disp.

IV. Absinthium ponticum.

Absinthium ponticum Officinarum. C.B. 4.5. Absinthium ponticum & tenuifolium, incanum, nobile, Abrotanum minus & 1. *Trag.* Abr. fœmina. *Fuchf.* Lon. Abr. album. *Card.* Absynt. ponticum. *Matth. Fuchf.* (in iconibus.) Tab. Abs. tenuifolium. *Dod. Germ.* *WVelsch WVermuth*, *Garten WVermuth*, *Romisch WVermuth*.

Vires. Epaticum est præ vulgari. *Calsf.* in princ. gr. 1. sicc. in princ. 3. minus amarum est, astringit, valideque incid. exterg. disc. putredini resistit, educit bilem per urinam, proin convenit in omnibus affectibus Epatis, vesicæ, bilis, ventriculi: tormina ventris & uteri sedat: minus commodè autem in mucilaginosi affectibus pulmonum, inprimis ob astrictiorem adhibetur. Extrinsecus discutit tormina ventris, ideoque & qua partum subsequuntur: infantum vomitum compefcit. &c.

N. Huic affinia sunt, quæ & in locum eius substitui cum commodo possunt, absinthium ponticum repens, ut & absinthium Nabatbaum seu tenuifolium *Austriacum*. C.B. 4. & 5.

PRÆPARATA.

Præparata eius raro pro usu extant, parari tamen possunt non secus ac ex absinthio vulgari. ▽ *stillat*, *Spiritus*, *Succus*, *Vinum*, *Extractum*, *Conserua*, *Syrupus*, *Oleum infusum* & *destillatum*,

V. *Acacia vera.*

Acacia Dioscoridi frutex lignosus

ac spinosus est, ex cuius semine maturo, eiusdem nominis succus exprimitur nigricans: ex immaturo; rubescens seu subfulvus. Et hic est vera veterum acacia, quæ Theriacam ingreditur, recipiendaque est, ubi acaciæ simpliciter mentio fit. Ex omnibus præstantissima perhibetur luteorubea odoris grati.

Vires. *Refrig. sicc. crassarum partium est, incrassat, astringit.*

N. 1. *Succus hic cum rarus sit, substituitur ut plurimum Acacia Germanica.*

N. 2. *Dat & aliam Acacia speciem arbuscula, quæ G. Arabicum profert, sed minus usitatam.*

VI. *Acacia Germanica.*

Αχουοκκομυδία Prunus sylvestris, *Brunf. Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cast. Tab. C. B. 1. alias Acantha, Arab Schamuth. Schak! Halepi. Germ. Schlehendorn.*

N. Prunus sylvestris transplantatio-
ne diligentique cultura evadit hortensis,
fructusque fert gradiores, quos Germani
vocant *grosse Sarten schlehe*.

Floret primo vere: fractum fert maturum autumnno.

OFFICINA NAT.

Flores pruni sylvestr. raro Folia, rarissime cortices radicem.

Vires. Folia. fructus, cortices refrigerant, exsiccant. gr. 3. astring. incrassant. Usus præcipuus est in profluvio alui, Vteri. Extrinsecus in gargarism. balneis uterinis.

Flores. Resolunt, Renum sabulum educunt, compressiones cardiacas leniunt, pleuriticam radicem resolunt, aluum laxant.

N. Accrescit nonnunquam muscus, qui specificè kernus conferre dicitur.

PRÆ

1. *Conseru. Flor.*

2. ∇ *stillatit. Ex floribus elicita. MB*
N. *Alij cum vino distillant.*

3. *Syrupus* : fit ex multiplici florum infusione, vt rosarum.

Vires. *Purgat leniter, prodest in pluresi. tussi sicca, renes expurgat, &c.*

4. *Succus seu Rob prunor. syluestrium solidius. Ex fructibus exprimitur, inspissatur, in quetaleolas formatus asseruatur pro acaciae veræ substitutione.*

5. *Vinum. Ex fructibus maturis exicatis. Nim. contrusi hirediguntur in globulos ac in furno exiccantur. Hinc infunduntur.*

6. *Fructus conditi. Fiunt cum mellis, P.ij. & Vini p.j.l.a.*

V II. Acetosa.

Ὠξυλις ἀτάραχ, Acetosa, German.
Sauvrampffer.

Est Acetosa	{	Maior	{	hortensis rotundifolia.		
				syluestris seu praten- tensis	{	plana &
						hac interdum folia habet crispata.
Minor aruensis	{	Lanceolata aruensis.				
		Non Lanceolata minima.				

Ex his Officinis maior syluestris, C.B. 1. in vsu est, de qua vox acetosa simpliciter intelligatur. Huic tamen nisi præferre volueris, substituere non citra rationem poteris, hortensem rotundifoliam.

Maior syluestris insignitur Acetosa

pratenfis, C.B. 1. Lapathum 4. *Diosc.*
Acetosa, Lon. maior, *Cast.* Oxalis *Trag.*
Matth. Fuchf. Doa. Lob. Tab. Rumicis
4. genus, *Cord. in Diosc.*

Hortensis rotundifolia, C.B. 8. insignitur Oxalis rotundifolia, *Dod.* rotunda, *Tab.* sativa Franca rotundifolia repens, *Lob.* Acetosa rotundifolia repens, *Cam.* Acetosa rotundis foliis, *Cam.*

OFFICIN. NAT.

Exhibent vsui pharmaceutico *Folia, Radices & Semen.*

N. *Radices asseruantur excorticata Florent Majore, turgesc. semine Iunio & Iudio.*

Vires. *Cardica in primis est & Epatica: frigef. & sice, 2. aperit, resistit putredini, appetitum excitat, choleram reprimat, sitim sedat, unde in febribus simplicibus ac pestilentibus vstitutissima est, præcipue autem vsui interno; hinc & externo adhibita.*

P R A E P A R A T A.

1. *Conseru. folior.*
2. ∇ *destill. Ex foliis.*
3. *Succus. Ex fol. rec. exprimitur, clarificatur ac coagulatur.*
4. *Syrupus. Ex succo & sacchar. Augst. 1. Norib. 1.*
5. *Conseru. Ex fol. rec. & sacch. 1. aut 1.*

V III. Acetosella.

Trifolium acetosum, *Matth. Dod. Cast. Brunf. Oxys, Fuchf. Cord. Cam. Tab.* Oxytriphylon. *Trag.* Liniula, Alleluja, *Lon.* Trifolium acetosum vulgare, C.B. 1. *Buchampffer, Sauvurklee, Guckguosklee.*

floribus

Estque { floribus albis.
 { floribus luteis.
Floret Aprili ac princip. Maij. Locis
gaudet nemorosis & arenosis.

menſum, Lienis ac Epatis, in dolore co-
lico.

P R Æ P A R A T A.

O F F I C I N. N A T.

Folia acetosellæ albæ.

Vires. Cardiacæ & Epatica est sin-
gularis, acetosa vires niſi ſuperans ſal-
tem amulans, adeoque actum febrilem
mitigat, ſitim ſedat, &c.

N. Acetofella Lonic. eſt acetosa ar-
uenſis lanceolata.

P R Æ P A R A T A.

1. Conſeru. Folior.
2. ▽ ſtillat. Ex foliis.
3. Syrup. Ex ſucc. & ſacchar. $\frac{1}{2}$. aut $\frac{3}{4}$.
4. Conſerva. Ex foliis.

I X. Acorus.

Acorus verus, ſive calamus arom.
Officinarum. C. B. 1. Acorus perperam
Calamus arom. Officinarum. Mo-
nard. Trag. Matth. Cord. Lob. Aco-
rum, Lon. Cam. Tab. Ger. Acorum le-
gitimum, Cluſ. hiſt. Germ. Calmus,
Ackervvurs.

N. Acorus officin. dicitur vulgo cala-
mus aromaticus, cum tamen cal. aromat.
proprie ſic dictus herba ſit ab hac di-
uerſa. Vide infra.

Colitur in hortis, ſoloque gaudet
paluſtri.

O F F I C I N. N A T.

Radix, raro Folia.

Eligenda radix albicans ſapore
amara ac acris

Vires. Stomachicus eſt, caſſac. &
ſec. in princ. 3. partium tenuium eſt
atten. aper. uſus præcipuus in obſtruct.

1. ▽. Ex radice macerata.
2. Acorus conditus vulgaris. Vide
Auguſtan.
3. Conſecta radix.
4. Ol. ſtillat. cum ▽ aſcendit.
5. Elect. diacorum. Vide Auguſt.
6. Extract. rad. Coque in Vino ex-
prime & inſpiſſa.

Vires. Plurimum valet in dolore co-
lico. Doſ. ʒj.

X. Acorus adulterinus.

Acorus adulterinus, C. B. 2. Aco-
rus falſa, Cord. in Dioſc. Acorum adul-
ter. Trag. falſum, Matth. Gladiolus
luteis liliis, Eric. Cordi, luteus, Fuchſ.
(icon.) Lon. Acor. Officinarum, Fuchſ.
Acorus paluſtris, Lob. Iris paluſtris
lutea, Tab. Pſeudoiris, Dod. Grem. gelb
Schwertel.

Officinis raro inferuit uſu, eoque in
ſolâ radice effodienda ſc. Septemb.

Vires. Exiccac, parum calefacit, at-
ternuat, aſtringit, roborat, reſoluit, vi pe-
culiari ad neruoſi generis & cerebri aſ-
fectus commendatur, ut & ad dyſſen-
teriam, alioſque fluxus alui ac vteri ſiſten-
dos. Extrinſecus ad dyſſenteriam præca-
uendam, more noſtratum, de collo ſuſpen-
di ſolet.

P R Æ P A R A T A.

Nonnunquam inde paratum ex-
tat Electuarium Stomachicum. Vires
lib. 2.

XI. *Adiantum.*

Adiantum, Math. Dod. Capillus
 ♀ vulgo *Adiantum* foliis cordi C.
 B. 1. *Adiantum nigrum*, Cordi. *Adiant.*
 nigr. verum, Tab. Ad album *Plinij*,
 magnum, Trag. Lugdunense, Cam. Ger.
 man *Fravvenhaar*. *Venushaar*.

N. *Adianti* vox pluribus plantis im-
 posita inuenitur. 1. *Planta* iam data 2.
Adianto aureo, polytricho. 3. *Ruta mu-*
riaria 4. *Trichomani*: de prioribus hoc
 loco, de posterioribus alibi

Adueritur ex Gallia Narbonensi:
 Floret æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba seu folia.

Vires. Caliditate & frigiditate tem-
 peratum est, exiccat, attenuat, aperit,
 extergit, pulmonum renumque vitiis
 medetur, Epatis & Lienis obstructions
 reserat, urinam & menses ciet.

N. Sunt qui *Trichomani* eandem vi-
 res ascribunt, adeoque substitui posse au-
 tumant: Alij *Rutam murariam*.

P R Æ P.

1. *Aqua* Ex fol.
2. *Syrupus simpl.* Ex decoct. & sac-
 char. 1. August.
3. *Compos.* Vide August. & Norib.

XII. *Adiantum aureum.*

Polytrichū } maius. Hoc minus vsuale.
 aureum } medium. Hoc vsuale.
 } minus. Nec hoc officina-
 } nas subit.

Dicitur Polytrichum aureum me-
 dium, C. B. 2. nobile vel primum, Trag.
 aureum Apuleij vel 2. *Lonic*, Muscus
 capillaris, Dod. *Adiant.* aureum mi-
 nus, Tab. Germ. *guiden Vviderthon*.

OFFICIN.

Integra herba seu caulis cum foliis
 muscolis & floribus.

Vires. De viribus apud authores ni-
 hil fere inuenitur. *Carrichterius* tamen
 ad morbos incantatione introductos com-
 mendat, cuius rei gratia apud muliercu-
 las celeberrima est.

Extrinfecus ob signaturam commen-
 datur ad capillos generandos

XIII. *Agallochum.*

Ξυλαδὸν Lignum aloes, Lon. Tab.
Agallochus seu *Xylaloes*, Cord. in D.
Lob. Cast. Tanrum, Cord. h. C. B. 2. *Pa-*
radisi, oder. *Aloës-holtz*.

OFFICIN. NAT.

Lignum cuius frusta raro magna
 ad nos aduehuntur, ut plerimum enim
 in fragmentis nobis transmittitur,
 quæ optima censetur nigropurpurea,
 venis cinerij coloris interfecta, amara,
 ponderosa, liquorem, si prunis, can-
 dentine ferro imponantur, exudan-
 tia, suauem ac acidulum fumum, si
 incendantur, præbentia, bullulasque
 simul post se relinquentia, haud ita
 facile disparentes: His adde haud po-
 streum bonitatis signum, si aquæ su-
 pernatarint.

Vires. *Calfac.* & *sicc.* 2. *confortati-*
um est omnium. viscerum ac præcipue
 cerebri. Cordis ac Vteri; spiritus vita-
 les ac animales recreat: hinc medetur
Lypothymia, amaritudine sua lumbri-
 cos necat. Externè creber eius usus est
 in cucuphis & Epithematibus cordia-
 libus;

P R Æ P.

1. *Extractum*. Fieri potest ad nor-
 mam aliorum Extractorum siue Gum-
 mosum solum id expectatur siue simul
 viscosum;

viscosum: De quo vide lib. 2. c. 57.

Angelus Sala. R. Fragmentor. elector. pulueratorum (instillari potest inter puluerisandum ▽ Rosar. ne quid auolet) ℥j. digerit ac extrahit cum Vi rectificatissimi ℥vi. vase clauso MB♂ 3. digerendo. Decantato dein liquori affundit ▽ Rosar. ℥j. abstrahit lentissimo calore V. Restantem Essentiam Resinosam lauat & exiccat, pro libitu coquit ad consistentiam, vt exinde trochisci formari possint.

Dosis gr. iij. ad x.

Residuæ feces aptæ sunt quæ admisceantur candelis profumo.

Quercetanus. Extractum hoc seu gummi parat cum ▽ stillat. Hypericiant Centaurij atque pro peculiari remedio habet in lumbricis ac putredinibus arcendis.

2. *Species Diaxylooes.* Vide Disp.

3. *Trochisci Diaxylooes.* V. Disp.

XIV. *Ageratum*

Αγράτου. Matth. Cam. Tab. Cast. Eupatorium Mesuæ, Trag. Matth. Lon. mentha corymbifera minor, Cord. hist. Costus minor hottensis, herba Iulia, Balsamita minor. Dod. Ageratum foliis ferratis, C. B. 1. Arab. Gafet. Leber-Balsam, kleiner Costen-Balsam.

Colitur hortis, floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Planta cum foliis & floribus.

Vires. *Calif. & succar. gr. 2. substantia tenuis, saporis aromati, aromaticat, exterget, putredini resistit, Epatica est. laxat aluum quam blandissime. Exirin, secus ciet urinam, utrumque emollit (suffitu.)*

PRÆPAR.

2. *Syr. de Eupatorio Mesua.* Vide Disp.

Pil. de Eupatorio. Vide Disp.

3. *Trochis. de Eupator* Vide Disp.

XV. *Agnus castus.*

Salix Amerina Diosc. Matth. Vitex. Trag. Dod. Cord. in L. Lon. Cam. Agnus castus, Cast. Eleagnon. Theophrasti, Lob Vitex foliis angustioribus cannabis modo dispositis, C. B. 1. Keuschzamb.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. *Calif. & siccatur, insigniter, disc. menses ciet, appetitus venereus cohibet, semen imminuit.*

PRÆPAR.

Trochisci. Vide Dispens.

XVI. *Agrimonia seu Agrimonium.*

Agrimonia, Bruchf. Dod. Lob. Cam. Eupatorium, Matth. Fuchf. Cord. Cast. Tab. Vulgare, Trag. Eupatorium Græcorum, Lob. Cam. (Arabum enim Eupatorium vel Ageratum est, vel Eupatorium Cannabin.) Eupatorium veterum seu Agrimonia, C. B. 4. German. Agermenig, Odermenih, Adermenig, Bruchvuriz, leberkletten.

Floret fere æstate integra, crescit iuxta sepes,

OFFICIN. NAT.

Folia & Summitates.

Vires. *Epatica nobilissima inprimis est, hinc splenetica vulnerariaque: Calif. & sicc, 2. substantia est tenuis, aperit, deteg. sub. str. corrobora Epar, eiusque fluxus coëcet, adcoque usu creberrimo*

venit in morbis ab Epatis imbecillitate subortis, ut sunt Hydrops, cachexia, &c. extrinsecus adhibetur sepiissime in balneis & lotionibus.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Ex fol. & flor. velex integra planta circa finem Iunii collecta.

2. Succ. Ex fol. & flor.

2. Syrup Ex succo.

4. \odot ex cinere integræ plantæ.

XVII. Alchimilla.

Alchimilla, Trag. Dod. Lob. Tab. Ger. Vulgaris, Clus. hist. Cam. Pesleonis, Brunsf. Fuchsf. Leon. Brancha Leonis, Planta Leonis. (Dioscor. Phadi-um.) Stellaria, Matth. Cast. German. Sinavu, gülden Ganserich, Læwenfuss, vnser Frayven Mantel.

Crescit loco vdo ac humido ac præcipue in pascuis, vnde & in hortos transplantari solet. Floret Majo & Iunio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Vulneraria est è nobilissimis non postrema, calid. & frigid. temperata, consolid. astring. ex terget. sanguinem incrassat, proin utilis fluxui mensum, &c. Vsuque adhibetur interno in potionibus vulnerariis, tum & externo.

PRÆPAR.

∇ . Fit ex integra planta, collecta mense Iunio cum floribus.

XVIII. Alkekengi.

Ἀλκήκαγγιον, Halicacabum, Cast. vulgare, Fuchsf. Hal. vesicarium, Cam. Hal. seu vesicata, Cord. Hal. Solanum halicacabum, Trag. Matth. Lob. So-

lan. vesicarium, Dod. Alkakengi, Lon. Saxifraga rubra & 4. Brunsf. Solan. vesicarium 2. Bauh. i. Iudenkirschen. Boborellen

Crescit in vineis inter vites, locif- que opacis, floret Iunio, fructus fert ante autumnum.

OFFICIN. NAT.

Bacca quæ colore ac figura cerasa rubra repræsentant, colligendæ, cir- citer finem Augusti.

Vires. Refrig. & sicc. 2. Nephritica diuretica ac lithontripica insignes sunt. Vfus præcipui in calculo renum & vesti- ca, in ictero (bacca & folia) in sanguine coagulato.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat. Ex baccis.

2. Tinctura. Ex baccis cum ∇ propria.

3. Trochisci de Alkekengi. Vide Di- spensat.

Alkermes vide Chermes.

XIX. Allium.

Σκόρδος. Dioscoridi, Arab. Chaum. Allium, Brunsf. Trag. Matth. Cord. in Diosc. Lon. Lob. Cast. hortense, Fuchsf. vulgare Cam. satium, Dod. C. B. I. Knoblauch.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Calf. & sicc. 4. incid. aperit. discutit, alexipharmacum est Vfus præcipuus internus & externus in collica flatulenta, lubricis, peste (cum +) tussi, calculo. Extrinsecus in scabie, urina ob- structione, apoplexia uterina (umbilico inungitur succus) tussi (iniungitur plan- tis pedum cum axungia porcina).

N. Dulcius sapit si plantetur (exi- stente sub Horizonte, eodemque tempo- re

re rursum effodiatur.

PRÆPARAT.

Electuar. de allio. Vid. l. 2.

Aloes lignum. vide Agallochum.

X X. *Alfine.*

Alfines varia à Botanicis exhibentur genera, è quibus potissimum vsualis est *Alfine media*, C.B. 11. *Alfine*, *Matth. Lob. Cast. Alf. maior*, *Fulchf. media*, *Tabern. Ger. minor*, *Cord. hist. Morfus Gallinæ. 1. Trag. German. Hünnerdarm. Hünnerbifs. Vogelkryant.*

Crescit in omnibus hortis & vineis. Prouenit hyeme floretque ad mediam vsque ætatem.

OFFICIN. NAT.

Folia, vel integra herba, sed raro.

Vires. Refrig. & humect. 2. easdem vires obtinet quas parietaria, præterquam quod non astringat; insigniter nutrire creditur, unde atrophiam, phibisique laborantibus esca salutaris æstimatur.

X X I. *Althæa.*

Althæa Dioscoridis & Plinij, C.B. 1. *Althæa*, *Brunf. Trag. Matth. Fuchf. Dod. Cord. Vulgaris*, *Cam. Bluf. hist. Malua palustris*, *Lon. Lob. Ibiscus Cast. Tab. Maluauifcus*, *Bifmalua*, *Ger. Germ. Erbuschvurtz.*

N. Quatuor faciunt *althæa* genera: *althæam simpliciter sic dictam*, *althæam aborescentem*, *althæam palustrem*, & *althæam Theophrasti seu Abutilon Aui-cenne*. Ex his primum officinis in usu est.

Crescit locis humidis, floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia, *Radix*, (collecta vere vel Autumno) *Semen.*

Vires. Herba calida est sicca (aliis humid.) gr. 1. (Radix calfac. in princ. 2.) emollit, laxat, discut. dolores lenit, tumores maturat, acrimoniam mitigat & corrigit. Vfus præcipuus in affectibus vesicæ, pectoris, v.g. pleuritide, &c. Vide Maluam, cum qua in qualitatibus omnibus conuenit: Externis creberrimus eius vsus est in cataplasm. clysteribus, &c.

PRÆPAR.

1. ∇ . Ex foliis & floribus.

Mucilago. Ex radice extrahitur cocta cum aqua.

N. 1. *Utiliter hæc adhiberi poterit pro trochiscis sublingualibus incorporandis.*

N. 2. *Ex mucilagine hæc insigne Extractum cum ∇ parari poterit, in lenienda faucium asperitate utilissimum.*

3. *Syrupus Althææ. Fernel. V.D.*

4. *Unguentum Dialthææ simpl.* Ex folis emollientibus. Vide Disp.

5. *Unguentum Dialthææ Compos.* Ex emollientibus & discutientibus. Galbano scil. & S. hederæ. Vide itidem Dispensatoria.

X X I I. *Amaranthus.*

Amaranthus, *Matth. Am. paruius*, *Cam. purpureus*, *Fuchf. Dod. Lon. Cord. in D. angustifolius simplici spicata pannicula*, *Lob. Amar. vulgaris*, *Tab. Amal. simplici pannicula*, C.B. 4. *Circæa*, *Trag. aliis*, *Flos amoris*, *German. Flor-Amor*, *Tausentfchæn*, *Sammetblum.*

Floret Augusto, colitur in hortis.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. Refrig. & seccat. modicè astring. Hinc vsus in fluxionibus cūctis.

LLI 3 E.g.

E.g. exputione sanguinis, diarrhæa, dysenteria, fluxu uterino, &c.

N. Sunt qui propinant ad lactis generationem inuandam.

XXIII. Ammi verum.

Ἀμμή, ἀμή, ἀμμή. Ameos, mios Ammeos, cuminum Æthiopicum. Ammi, Brunf. Trag. Cord. in D. Lon. commune seu vulgare, Dod. Cam. Ger. vulgatus, Lob. Ammioselinum, Tab. Germ. Ammey.

Adfertur Alexandriæ Ægypti Venetias & in Germaniam.

OFFICIN. NAT.

Semen. Eligendum hoc est purum.

Vires. Calf. & sicc. g. 3. tenuium partium est, incidit, aperit, disc. Hinc conuenit in dolore colico & uterino, in mensibus & urinâ obstructis, in inflatione ventriculi, vsusque præcipue interni est, hinc & externi.

XXIV. Amomum.

Ἀμόμον. Amomum veterum quodnam sit, adhuc subiudice lis est. Sunt enim qui Rosam Hierochontis esse velint, vt Cordus; alij aliud quid esse contendunt. Clusius tres eo nomine describit herbas, quas tamen cum Dioscoridis amomo minimè respondere confitetur.

Officinæ duplex semen sub Amomi nomine monstrant, quorum alterum maius nigrum rotundumque est iustar granor. pipetis rotundi vel cubearum, gustu minime acre, quod videtur veterum esse sison, sinon, &c. Alterum minutum semen & pallidum, vtrumque raro in vsum venit, locoque amomi veterum recipitur Acorus.

XXV. Amygdala, seu Amygdala.

Amygdalæ fructus sunt, amygdali arboris, ique vel dulces vel amari. De Amydalo videatur, Brunf. Trag. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cam. Tab. Matth. Germ. Mandeln.

OFFICIN. NAT.

Vtriusque nuclei amygdala vel amygdalæ dicti.

Vires. Dulces nutritiue sunt temperatè calidæ & humidæ, humorum acrimoniam lenientes, & hinc dolorem & Vigiliis ab acrimonia oriundas, demulcentes, adhibenturque præcipue in Emulsionibus.

Amara sunt calidæ & siccæ. 2. atten. aper. exterg. diuretica sunt, obstructioni iccoris, lienis, mensenterij, uterique conferunt. Extrinsecus lentigines tollunt, si masticata illinantur, capitis dolori subueniunt (in frontibus.)

PRÆPARAT.

Confect. amygd. dulc.

amarar.

Ol. expressum amygd. dulc.

amarar.

Vires. Oleum dulce lenit, maturat, anodynum est, vsusque præcipui in colico ac nephritico dolore mitigando (propinatum dosi ℥j. vel ij. cum manna, vel & clismati infusum) infantulis recens natis creberrimo ad tormina Ventris compescenda cum saccharo penidiato exhibetur ad ℥ij. quin etiam ad mitiganda tormina puerperarum vsus eius creberrimus est. Olei amari vires ex superioribus colligenda sunt.

N. Vsus interno recens expressum adhibendum est, non acidum: Expriimitur autem tum sine igne, i.e. non calfaciendo

faciendo ad ignem vel cum igne.

XXVI. Anacardium.

Anacardium, *Matth. Cord. h. Lon. Cast. Trag. Tab. Ger. Ger. Arab. Balado. Anacardium, Elephanten, Lausz.*

Fructus est arboris exoticae, colore ac figura cor repræsentans, præcipuè sificatus sit.

Crescit in India Orientali.

OFFICIN. NAT.

Fractus sed raro.

Vires. *Calf. & siccat* (non 4. nec 3. gradu) ut nonnulli volunt, sed remissius, *Cephalicus est, memoriam ac sensus acuens ac confortans.*

PRÆPARATA.

1. *Elect. seu Confectio Anacardina.* Vide Dispens.

2. *Mel anacardium.* Ex fructurenti in ∇ cocto supernatat. Vide Dispensat.

3. *Oleum* vel ex fructibus exprimitur vel in corticis coctione supernatat, sed rarissimum hoc est.

XXVII. Anagallis.

Anag. { *Aquatica. Vide infra.*
 { *Terrestris* { *Mas flore phœniceo, C.B. 2.*
 { *Fœmina fl. cæruleo, C.B. 2.* } *hæ officin. & huius loci.*
 { *Lutea inusitata.*

Mas insignitur Anagallis, Cord. in D. Brunf. Trag. Matt. Fuchs. Dod. Lon. Cast. Ger. Anag. phœnicea mas, Lob. Tab. Cam. mas, Clus. hist.

Fœmina dicitur Anagallis fœmina, Brunf. Trag. Matth. Fuchs. Dod. Lon. Cast. Ger. Anag. cærulea, Tabern. Cam.

Dicuntur. Gauchheil, Colmarkkraut, Vogelkraut.

Crescunt in vinetis, hortis ac aruis; lutea tamen non nisi in sylvestribus ac umbrosis locis prouenit.

Floret Majo & hinc per totā æstatem.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus, sed raro.

Vires. *utraq; calf. & siccat. amara est, exterg. & subastr. Vnde & pro vulneraria habetur, morsus canis rabidi subuenire à nonnullis commendatur: adhibeturque usu interno & externo.*

PRÆPARATA.

1. ∇ . Ex integra planta.

2. *Succus.* Raro extat, cum tamen maximè commendetur in Errhinis.

XXVIII Anagallis aquatica.

Anag. { *Latifolia* { *folio subrotundo* { *maior, C. B. 1.* } *Hæ vsuales & præcipuè*
 { *Angustifolia.* } { *minor, C. B. 2.* } *minor.*
 aquat. { *folio oblongo* { *maior.*
 { *minor.*

Dicuntur Beccabunga, Berula, Sium aquaticum, Lauer. Germ. Bättbungen, Wasserbungea.

Crescunt in riuiis. Florent Majo & iunio.

OFFI

OFFICIN. NAT.

Folia vel integra planta.

Vires. Calfac. moderate humectat.

Vfus præcip. in scorbuto, vrisiam, calculum renum & vesica insigniter expellit, menses ciet, foetum mortuum eiicit, Extrinsecus opitulatur phlegmonis & Eryipelat; maculas facies abstergit (cum fure.) Vulneribus medetur (cusi Θ & tela aranearum imposit.)

PRÆPARATA.

1. ∇ Ex planta integra vel succo eius expresso.

2. Succus. Expressus & inspissatus: rui raro extat.

XXIX Anethum

Ἀνέθον, ἀνέθου, Dill, Dillenkraut.

Aneth. { Hortense, hoc usuale.
Sylvestre.

Infigitur Anethum, Brunf. Trag. Matth. Fuchs. Dod. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Cam. Ger.

Crescit loco arenoso & aprico. Flor. Iun. Iul. Aug.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores & Semen.

Vires. Calfac. in princ. 3. sicc. in princ. 2. (radix calf. 3. sicc. 2. complete) diger. disc. maturat, lenit dolores, auget lac, conciliat somnum, venereos appetitus minuit, singultui vomituique medetur: Et hac omnia præstat usu interno & externo. Inprimis tamen extrinsecus Clysteribus anodynus immiscetur, capitisque cataplasmatibus anodynus & somniferis (summitates cum oleo oliuarum cocta.)

PRÆPARATA.

1. ∇ . Ex integre planta. (rari vsus est.)

2. Oleum insolatum. Ex fol. & flor.

3. Ol. stillati. Fit ex semine.

XXX. Angelica.

Hortensis seu sativa, Costus niger. C. B. 1.

Sylvestris { Major. C. D. 2.
Minor montana. C. B. 5.
Ex his in vsu est prima; Nec contemnenda tamen & secunda.

Prima dicitur Angelica, Brunf. Lob. Cast. Tab. Angelica major, Dod. Angelica sativa, Trag. Matth. Dod. Lon. Ger. Ang. odorata, Cam. Smyrnum, Cord. in D.

Secunda, describitur sylvestris maior, C. B. 2. Angelica fylu. Trag. Matth. Fuchs. Dod. Lob. Cam. Ger. Germ. Angelick Zwurtz. Geilgen Beistnurtz.

Crescit sativa locis cultis, humidis ac pinguib; Sylvestris maior humidiora amat prata: Minor locis montanis opacis & nemorosis gaudet.

Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix colligenda initio veris

Vires. Bezoardica & cordialis nobilissima est, Calf. 3. (syl. maj. 2.) sicc. 2. aper. atten. sudorifica & vulneraria est: menses mouet, foetum expellit, suffocationi uteri maxime conducit, malignis morbis, venenis, ipsique pesti medetur: Venena omnis generis per sudorem pellit, adeoque usu interno præcipue, tum & externe adhiberi apta est. V. g. ad arcendam pestem (in amuleto, in sublingualibus) ad morsum canis rabidi (in cataplasma, &c.)

Dosis ʒj.

PRÆPAR.

1. ∇ . Ex integra planta.

2. Succus. Ex radic. recent.

N. Potest & ex siccis radic. mediante coctione elici.

3. Extract. Fit cum ∇ .

Dosis

Dosis à ℥℥. ad ʒ℥.

N. *Quercetanus* extrahit. cum Spir. Juniperi. hydromelite Vinoso, &c. Vide pharmacop. rest.

4. *Condita radix*. l.a.

5. *Oleum stillat.* Ascendit cum ∇.

6. *Balsamus*. l.a. cum oleo nucistæ præparato fit.

7. ☉. Ex incinerata vel integra planta vel ☿ in destillatione remanente.

N. His adiungi potest rad. præparata, quam dicunt, i.e. in aceto macerata. Verumenim vero, quis dubitat, infusione hac magnam virium partem, menstruo communicari, adeoque radici decedere.

XXXI. Anisum.

Ἀνίσον, Ἀνισόν, Anis.

Gaudet loco optimo & stercorato; feritur mense Martio, floret Iulio, semen maturescit Autumno.

OFFICIN. NAT.

Semen. raro Herba.

Vires. Calf. sicc. 3. recens mitius est, atten. discut. diureticum est, lac auget, pulmonicum ac stomachicum inprimis audit: Hinc usus præcipui, in inflatione ventriculi, tussi, &c. Infantibus ʒj. exhibitum blande per inferiora ac superiora saburram ventriculi intestinorumque eiicit.

PRÆPARATA.

1. *Confectio*. Ex semine fit.

2. *Confectio Anisi laxativi simplex*. Fit scamonij cum saccharo mixtione, vel maceratione anisi in ∇. in qua scammonium fuerit dissolutum.

N. Alij in infusione ☿ij anisum conficiendum macerant.

3. *Confect. anis. laxat. compos.* Vide August.

4. ∇. *destill.* Ex herb. & semine.

5. ∇. *vite Anisata*. Ex semine cum Vino destillatur. Vide lib. 2. de spiritibus.

Fieri itidem potest spiritus, si remanentia ex destillatione aqua residua cum fœcibus cereuistæ fermentetur vel simili.

6. ☉ *stillat.* cum ∇ ascendit.

N. 1. Ex aniso stillat aqua lactea qua calori solis exposita copiosius oleum, ad superficiem mittit.

N. 2. Anisum diumacerare oportet. Sic dat ℔j. olei ʒ℥.

N. 3. Anisi destillatio lento igne peragenda est, quia nimirum volatilius illa pars facilis est ascensu.

7. Sal. Ex incinerata planta vel remanentia destillationis.

8. *Species Dianisi*. Vide Disp.

XXXII. Anserino.

Argentaria, Argentina, Dod. Potentilla, Brunf. Matth. Lon. Agrimonia sylvest. Anserina, Trag. Tab. German. Grensich, Genserich, Grünsing, Silberkraut.

N. Est sine sapore & odore.

Crescit passim herbosis locis, pratis, iuxta sepēs & vias. Floret appetente ætate, quo tempore & colligi apta est.

OFFICINALI NATIVA.

Folia vel integra planta.

Vires. Refrig. moderate, sicc. fortius, astring. const. pat. Hinc sanguinis expulsiōni medetur, diarrhæam ac reliquas aluitum & uteri fluxus, compescit hæmorrhoidis & hæmorrhoidis subsequens calculum insigniter arcerit: Quinetus insuper admodum condon. Lat. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

famosa est in doloribus dentium mitigandis, putredine gingivarum arcenda, æstu febrili sopiendo, quem potenter compescit si cum sale & aceto contusa planis pedum supponatur vel & carpis applicetur.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex planta integra.
2. ▽. Ex floribus.
3. Conserua. Ex floribus.

XXXIII. *Anthora.*

Anthora, Matth. Lon. Cast. Cam. Anthora, Lob. Dod. Tab. Ger. vulgaris, Clus. hist. Aconitum salutiferum seu Anthora C. B. 17. Napellus Moylis, Auicennæ, aliis Antithora (quod Thoræ pharmacum sit,) Heilgiff, Gifftheil.

N. Sunt qui radicem Contrayernam faciunt Germanicam: alij Zedoariam Arabum, Auicennæ scil. & Serapionis. Vide Tabern. Herbar. lib. 1. qui posterius mordicus asserere nititur.

Crescit in Alpibus Heluelicis, in Sabaudia, &c.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Saporis amari est, calfac. & sicc. cardiaca est: attent. aperit. absterge. Vfus præcipui in morbis acie libus venenatis, pesti spifice aduersatur & peculiariter Radici Thoræ.

Dosis à ʒss. ad ʒj.

N. Educit in super mucilaginem Tartaream ac aquas per alium.

XXXIV. *Antirrhinum.*

Antirrhinum, Matth. Dod. Lob. Tab. Antirrhinum maius alterum folio longiore, C. B. 2. Germ. Orant, Dorant, Brackenthaupt,

Kalbnsafen, Hundskopff.

Crescit locis sabulosis. Floret Maio, Iunio.

OFFICIN. NAT.

Herba integra, i.e. folia cum floribus ac geminis ramusculorum, quæ repræsentant caput viruli.

Vires. Rari vsus est in Medicina, nec adhibetur nisi à mulierculis contra spectra, incantationes, veneficia, &c. idque tam præseruandi quam curandi intentione vtrique satisfacit appensione, fumigatione, suppositione, appositione, balneatione. Vide Carrichter, in Herbario.

XXXV. *Apium.*

Apium, Σελινον, Eppich,

Macedonicum. Vide Petroselinum Macedonicum. Veterum seu hortense. Vide Petroselinum officinarum. Palustre, Apium officinarum: de quo hic. Montanum. Vide Petroselinum montanum.

Dicitur Apium, Fuchf. Lon. Paludapium Lab. Eleoselinum, Dod. Lob. Apium, vulgare, Tag. Braunes Peterlein, Wasserpeterlein, VI assermorellen, Wassereppich, Wassermarck.

Crescit inter Beccabungam: floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix & Semen.

Vires. Calef. & sicc. ferè gr. 3. incid. aperit, unde & inter 5. radices aperientes recensetur. Vfus præcipuus internus [.] & menses mouet, calculum pellit, regium morbum soluit. Semen efficacius est quam radix, annumeraturque seminibus calidis minoribus. Viraque præcipue internè usurpantur.

PRÆPARAT.

▽. Ex caule, fol. & floribus Iunio collectis.

XXXVI. *Aquilegia.*

Aquileia, Ageley, Ageleyen.

N. *Diuersa reperiuntur species florum colore vel plenitudine distinctæ: Officinaria simplex illa flore caruleo, C.B. 2. vel 8. intelligitur.*

Dicitur *Aquilegia*: *Trag. Fusc. Lon. Dod. Cam. Aquileia, Matth. Lob. Cast. Tab.*

Crescit sata in hortis ac fundo pingui nonnunquam in locis syluestribus incultis. Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Semen, tùm Flores & Herba.

Vires. Calf. moder. sicc. 1. aperit Epar & Lienem, ac inprimis meatum biliarium, unde regio medetur morbo Ciet urinam & menses, vulnera consolidat, ventris tormina sedat. NB. Semen in expellendis morbillis ac variolis vsus mulierculis est creberrimi. Extrinsecus frequens eius vsus est ad putredinem gingivarum scorbuticam emendam, vice- raque oris fanciumque solidanda.

PRÆPAR.

1. ▽ *stillat.* Fit ex fol. flor. ac radice, Augusto collectis.

2. *Conserua.* Ex floribus quæ rari vsus est.

3. *Acerum.* Ex infusione florum.

XXXVII. *Aristolochia.*

Aristolochia, Osterlucey, Holzwurtz.

Est { *Longa, lange Holzwurtz.*
Rotunda, (à radice rotunda,)
runde Holzwurtz,
Clematidis.
Pistolachia.

Ex his officinales sunt longa & rotunda. Verum de (rotunda) notandum, quod officinis fumaria bulbosa illius loco vsualis sit, quam vide suo loco.

Indigitatur *Aristolochia longa*, *Dod. Cord. in D. Lob. Clus. hist. Aristolochia longa vera, Cam. C.B. 3.*

Rotunda vocatur *Aristolochia rotunda*, *Trag. Lon. Cam. Arist. rotunda, Matth. Dod. Cord. in D. Lob. Cast. 1. Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro, C.B. 1.*

Vtraque colitur in hortis: floretque potissimum Maio & Iunio.

OFFICIN. NAT.

Rotunda Radix sola. Longa Radix & Folia.

Vires. Vtraque Cephalica, Epatica & Pulmonica inprimis est: calf. & sicc. 2. completè; atten. aperit. Hinc prodest ad □ eam mucilaginem resoluendam expecttorandamque; ad menses ciendos, tumores internos rumpendos, venena discutienda. Insuper longæ infusio ad scabiem exiccandam vel vulgo hic vsitatissima est. Extrinsecus adhibetur vsu creberrimo ad exiccanda & mundificanda vulnera.

Rotunda tenuiorum est partium quam Longa adeoque efficacior & in primis mensibus ac secundinis ciendis celeberrima: Calf. & sicc. 3. aper. attenuat.

PRÆPAR.

△ Ex integra *Aristol. longa*, i.e. foliis ac radice.

XXXVIII. *Armoracia.*

Raphanus syluestris. Sinapi agreste 3. Trag. Rapistrum albo fl. eruca foliis, Lob. album, Tab. Rapistrum fl. albo seu siliqua articulata, C. B. 1.

Heydenreich. Wildmeerrettich.

N. Sunt qui *Lampsanam* Dioscoridis putant.

Crescit in locis multis iuxta riuulos ac in vallibus.

OFFICIN. NAT.

Radix sola.

Vires. *Calfac.* & *sicc.* mucilaginem tartaream incidit, attenuat, resoluit, viscera aperit, diuretica, lithonriptica & antiscorbutica est.

N. Lac imminuere dicitur.

XXXIX. *Arnica.*

Chrysanthemum latifol. nardus. Chalta 2. vel *plantago alpina*, Lob. Chalta alpina vel *Damasonium*, Tab. Alyfina Diosc. Matth. aliis *Lagea Lupi*. Germ. *Mutterwurtz*, Vl *olverley* Saxonibus.

Crescit in montibus ac pratis, floretque per totam ferè æstatem.

OFFICIN. NAT

Planta cum floribus.

Vires. *Calf.* & *sicc.* partium tenuium; sudorifica est & diuretica, nonnunquam & vomitoria. Proin *Holsatos* rusticos contra grumosum ac coagulatum sanguinem vel & contra febrem in *ceruisia* coxisse ac cum successu propinasse, obseruauit.

XL. *Artemisia.*

Artemisia Diosc. *Artemisia vulgaris maior*, C.B. 1. *Artemis. maior*. Trag. *Matth. Cord.* in D. *Cam.* *Artemis. vulgaris*, Clus. h. *Artem.* *Latifolia*, Fuchs. *Lon. Dod.* *Artem. mater herbar.* Lob. Ger. *Artem vulgaris* & *Artemisia altera polycronos dicta*, Diosc. *Artemisia rubra* & *alba*, Tab. aliis olus re-

gium, herba regia. Germ. *Beysfus*, S. *Iohannis Gurtel*.

N. 1. Variat colore tum caulis tum floris: una caule & flore rubro purpurascens, seu subpurpurascens: altera ex viridi albicante, vel subpallente *Spadiceone*. Hinc dua figura Tab.

N. 2. Viraque est interdum inueniatur maior, interdum minor attamen viribus conueniunt.

OFFICIN. NAT.

Summitates cum semine incluso: quin & tota herba, eaquetum rubra, tum alba.

Vires. *Vterina* est, *calf.* 1. *sicc.* 2. aperit, discutit; menses, factum, secundinas pellit, sordes abstergit, adeoque usus creberrimi est mulierculis, qua eam adhibent internè & externè, adeo ut vix balnea seu lotiones parent, in quibus *artemisia* non contineatur.

N. Rubra efficacior habetur alba, proin & communior.

PRÆPARAT.

1. ▽. Ex summitatibus & foliis.

2. Ol. stillat. rarò extat.

3. Syrup. Compos. Vide Dispens. August. & Norib.

4. Sal. Ex planta incinerata.

N. Sunt qui carbonem sacro *Ioh. Baptistæ* die sub radice fossam, ad *Epilepsiam* comment. Exhibent autem tum in puluere, tum suspendunt de collo.

XLI. *Arum.*

Æor, *Pfaffenpint*, Teutsche *Ingber*.

Est vel $\left\{ \begin{array}{l} \text{foliis macu-} \\ \text{latis} \\ \text{non macu-} \\ \text{latis} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{utrumque sine} \\ \text{discrimine of-} \\ \text{ficinale est.} \end{array} \right.$

Prius dicitur *Arum maculatum*, maculis candidis, vel nigris, C.B. 2. *Ariz.* genus,

genus, *Trag.* Arum nigricantibus lituris signatum, *Dod.* Arum, *Matth.* maius foliis aliis maculis notatis, *Cast.* Arum offic. *Lob.* A. maculatum, *Tab.*

Posterius vocatur Arum vulgare non maculatum, *C.B.* 3. Arum, *Brunf.* Arigenus, *Trag.* Arum, *Fuchf.* Cord. *Lon.* Tab. vulgare, *am.* majus, *Ger.*

Crescit locis pinguibus & campetribus. Folia erumpunt mense Martio, flores Iunio.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ recens rari usus est ob acrimoniam summam, exiccata autem crebrioris, Colligenda radix est cum germinare Arum incipit mense scil. Martio.

Vires. *Calfac.* & *sicc.* 3. *Galeno* gr. j. (quod de Aro nostrati quippe quod acrimonia maxima & exulcerante sole piprino pradtum, intelligi nequit,) ♀m præcipuè prima regionis, tum quoque pectoris & pulmonum peculiariter incidit, resoluit ac discutit. Proin usus eius creber est in cachexia, asthmate, &c. hernias curat, ciet utinam, obstructions viscerum resoluit.

P R A P.

1. Radix preparata. Præparatur vulgò maceratione in ☒ atque exiccatione.

2. Fecula. Fit l.a. Vide lib. 2. Vide Disp. August.

3. Pulvis Stomachicus Quercet. Cuius basis est radix Vinopreparata. Vide lib. 2.

X L I I. Asparagus.

Ἀσπάραγος, Ἀσπάραγος. *Spargen.* *Sparschen.*

Triplicis generis est, hortensis sativa. 2. sylvestris, 3. palustris. Ex his prior officinis in usu est. Cui substitui in defectu potest secunda, utpote quæ à prima non nisi sola cultura differt.

Dicitur Asparagus, *Brunfels.* *Trag.* *Matth.* *Fuchf.* Cord. *hist.* *Lon.* Asparagus altilis, *Fuchf.* Tab. Domestica, *Bellou.* Asparagus *Diosc.* Asp. sativus, *Cast.* *Ger.* Asper. hortensis, *Dod.* *Cam.* Asp. domesticus, *Lob.* Asparagus sativa, *C.B.* 1.

OFFICIN. NAT.

Radix & Semen.

Vires. Radix est diuretica, lithontriptica & ex aperitiuis & illis famosis non postrema. *Calfac.* & *sicc.* moderate, discutit. *Epar.* Lienem præcipue & Renes infarctu liberat, ideoque in decoctis eo respicientibus frequentissima est. Externe adhibetur (in gargarismis) pro lenienda odontalgia & laxitate gingivarum.

Semen, easdem Vires obtinet, sed usus est rarioris.

P R A P A R.

▽. Fit ex integra planta cum bacis rubris Septembri mense collecta, quæ supra recenti herba rectificari potest, sed rari est usus.

X L I I I. Atriplex.

Melte, Milte, Molte, Scheiszmilte.

Est { 1. Hortensis fol. ac caule } rubris.
 { viridi albescentibus. *Hec præstantior reliquis est, licet nec relique contemnenda fuerint.*
 { viridi nigris.
 2. Sylue stris.
 3. Maritima.

Alba nominatur *Attriplex fatiua* *Trag.* *Attr. fatiua alba*, *Lob.* *Attriplex*, *Matth.* *Hortensis*, *Fuchf.* *Cast.* *Attriplex fatiua viridis*, *Cord. in D. A.* *alba viridis*, *Lon.* *Attriplex hortensis alba* seu pallide virens, *C. B. 1.*

Rubra dicitur *attriplex rufo folio*, *Cord. in D.* *Attriplex hortensis*, *Dod.* *hortensis rub.* *Lon.* *Attripl. fatiua*, *Lob.* *Attr. rub.* *Tab.* *subfatiua alba.* *Ger.* *Attr. purpurea grandis*, *Cam.* *Attripl. hortensis rubra*, *C. B. 2.*

Locis gaudent arenosis, crescitque syluestris passim iuxta vias. Florent Iunio, Iulio, & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia syluestris præcipue: hinc hortensis pallide virentis. *Semen* rarioris vsus est.

Vires. Refrigerant 1. humect. 2. leniunt dolorem: *Hortensis* insuper culinaria ac alimentosa est, syluestris autem in soluenda aluo celebris.

Vsus officinalis præcipue externus est, in clysteribus ac Epithematibus paregoricis, v.g. antipodagricis, tum quoque in lotionibus pedum somni causa paratis.

XLIV. Avena.

De *Œm* vel *Epous*, *Avena Brunf.* *Matth.* *Fuchf.* *Dod.* *Lon.* *Cast.* *Lob.* *Avena fatiua* & prima *Trag.* *Avena vesca*, *Lob.* *Ger.* *Avena vulgaris* seu alba, *C. B. 1.* frumentum, *Cord. in D.* *Germ.* *Habern.*

Avenæ semen culinare potius est

quam officinale, nihilominus tamen non exul prorsus est, sed adhibetur tum crudum, tum quoque in farinam redactum. Crudum sacculo inditur, qui ventri optimè calfactus imponitur ad dolores colicos & vterinos leniendos, Farina auenacea cum butyro in pultem cocta, conducibilis est in scabie capitis exiccanda, &c.

XLV. Malus Aurantia.

Malus Nerantia, *Pomeranckenbaum.* Virer per integrum annum. Videatur pomum *Aurantium*, *Trag.* *Aurantia mala*, *Matth.* *Lon.* *Cast.* *Tab.* *Cam.* *Aureum malum*, *Clusibist.* *Arangia*, *Cord. in D.* *Arantia*, *Lob.* *Malus anarantia*, *Dod.* *Arantia major*, *C. B. 1.*

OFFICIN. NAT.

1. *Poma* quæ simpliciter arantia, aurantia vel mala aurea, poma nerantia & anerantia, poma arangia dicuntur suntque tum acida, tum dulcia, tum vinosa, seu media.

2. Cortices.

Vires. *Poma acida & vinosa* præferuntur reliquis, easdemque virtutes habere putantur, quas *Citria mala*, imbecillius tamen: *Cortices calidiores* sunt vsusque vulgaris in torminibus ventris colicisque (à statu subortis) inque dysuria corrigenda. Quinimo & febris fugi comperti sunt subsequente sudore.

Dosis \mathfrak{zj} ad \mathfrak{zj} .

PRÆPARATA.

1. ∇ . Ex floribus. Dicitur peculiarior

riore nomine Nampha, Laufam vel Angelica.

Vires. *Promouet sudorem, adhibetur-que in odoriferis.*

2. ▽. E corticibus.

3. *Succus expressus.* Ex pomis acidis; qui tamen rari vsus est.

4. *Syrupus.* Ex succo acido & saccharo. rari itidem est vsus

5. *Condit. cortices.* Ex corticibus recentibus (purgatis, amaroreque aliquantulum liberatis) & saccharo.

6. *Conseru.* Ex floribus. Apportatur ad nos ex Gallia, Hispania, Italia.

7. *Electuar. seu Gelatina* arantior.

Ex corticibus exterioribus recent. (l.a. amarore suo exutis) coctis vel & contusis & cum maluatico saccharoque mixtis.

8. *Oleum stillatit.* E corticibus.

9. *Balsamus.* Ex oleo: vt alij Balsami.

10. *Vnguentum* arantior. B. Pomum arantium acid. facto foramine, exprime succum, cum quo misce tantillum Theriacæ, croci & aceti, inde iterum pomo ac coque sub cineribus: tandem exprime.

Vires. *Fugat lumbricos infantum umbilico impositum, compescit æstum caria, iunctum, somnum blande conciliat temporibus illitum.*

X L V I. *Auricula muris.*

Pilosella, pilosella lutea, *Maißz-æhrlein, gelb Maißzæhrlein, Nagerkraut.*

Est { *Repens maior* { *hirfuta.*
 Erecta. { *non hirfuta.*
 Montana, hispida seu hispidula,
 vide suo loco.

Præfertur autem reliquis pilosella

maior repens hirfuta, C. B. i. *Auricula muris* *Brunf. Cord. in Diosc.* *Auricula muris minor, Trag. Lon.* *Pilosella, Matth. Lob. Cast. Tab.* *Pilosella maior, Fuchf. Dod.* *Pilosella repens, Ger.* *Pilosella maior repens hirfuta, C. B. i.*

OFFICIN. NAT.

Integra planta seu folia.

Vires. *Calfac. & sicc. 2. astring. absterg. constip. sternutatoria est & vulneraria (intus & extus adhibita) dysenteriam, alui vterique fluxus sistit, bilem æstuantem sedat & incrassat, hernias (infantum præcipue) curat. Extrinsicus medetur vlceribus oris (in collutionibus) hæmorrhagiam narium sedat (pulvis nari inditus.)*

PRÆPAR.

▽. Destillatur in MB ex integra planta collecta sine Maij vel circiter.

B.

X L V I I. *Balanus Myrepfica.*

Βάλανος μυρσική Dioscoridi. *Balan. myrepfica, Cord. in hist. Tab. Cer. Bell.* *Glans vnguentaria, Matth. Cord. in D. Lob. C. B.* *Granum Ben, Lon. Ben paruum, Monard. Arab.* *Habel Ben.* *Fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auellanae nucis, intus nucleum continens pinguem & oleosum, veluti amygdalæ.*

Vires. *Nucleus calf. 3. sicc. 2. terget. purgat supra ac infra, educitque bilem, ac pituitam. Curat scabiem imperiginis-que sanat.*

N. *Mesues Ben duplex facit, magnum sc. vt auellana, quod Monardes auellanas purgatrices esse vult: & paruum ciceris magnitudine, ex quo oleum Itali conficiunt.*

PRÆPAR.

Oleum ex nucleis exprimitur & ad nos

nos transfertur, titulo olei Balanini vel de Been. Vide Auguft.

Vires. Emollit, discutit, neuriticum est, scabritiem, lentigenes aliaque cutis vitia sanat, qualicunque tinnitui aurium subuenit (inditum auri.)

N. Oleum hoc quia rancescere nescit, commiscetur rebus fragrantibus. E.g. moscho, zibetta, coriisque illinitur ad fragrantiam impertiendam. Alij tamen eius loco adhibent oleum express. è nucleis cerasorum, in quo solutum Beniuinum. Heurn. in meth. prax.

XLVIII. Balsamum.

Balsami planta frutex seu arbuscula est, tres cubitos ad summum alta, folia aliens rutæ foliis similia.

Dicitur Balsamum Syriacum rutæ folio, C. B. 1. Balsamum Lentisci folio Ægyptiacum, Bellon. obs. Carpobalsamum veterum flauum. Carpobalsamum & Cassamum verum, Cord. Germ. Balsambaum.

Nascitur sponte in Arabia felici, vnde olim in Iudæam, & hodiè in Ægyptum translata, loco quodam occluso (Cayro vicino) quem Mateream vocant, colitur.

OFFICIN. NAT.

Fructus (Carpobalsamum.) Ramusculi (Xylobalsamum.) Liquor Balsameus (Opobalsamum,) de quo vide Balsamum, class. 2.

Fructus eligatur recens, plenus, ponderosus, gustu mordax: Ramusculi probatur recentes, tenues odorati.

N. 1. Carpobalsamum atque Xylobalsamum quia non nisi in compositionibus quibusdam veterum adhibentur, prostant raro atque non nisi vetustate obsoleta, unde loco Carpobalsami Cubebas adhi-

bere receptum est, loco Xylobalsami Lentiscum recentem: Xylobalsalmum autem nostrate, quod Mechâ Arabia felicitis asportatur, esse idem cum veterum probat Petrus Bellonius in suis observation. lib. 2. cap. 29.

N. 2. Est & arbor quedam malo punica maior, sponte in noua Hispania nascens, ex qua elicitor Balsamum Indicum seu Peruvianum. Vide infra cl. 2.

N. 3. Sunt & Arbores in Tolu Provincia inter Carthaginem & nomen Dei sita, pumilis pinis similes, ex quibus elicitor Balsamum de Tolu. Monardes. Vid. infra cl. 2.

XLIX. Bardana.

Kletten { Maior, huius loci.
Minor, loci sequentis.

Dicitur Bardana siue Lappa maior, Dod. Brunf. Trag. Personata. Lon. Lob. Personata maior, Matth. Cast. Personaria, Fuchf. Arcium, Cord. in D. Lappa maior, Arcium, Diosc. C. B. 1. Germ. groß Kletten.

Crescit passim iuxta vias, & in Cæmeteriis. Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radices, raro Folia, ratiùs Semen.

Vires. Siccat, est pulmonica (NB.) diuretica, diaphoretica, extergens, subastringens. Hinc conuenit in asthmate, culculo, expuitione sanguinis, in vulneribus in veteratis; tumore lienis, aliarumque partium, in arthriticis morbis, (quibus peculiari proprietate conferre statuitur.

Semen insigne censetur Lithontripticum.

Extrinsècus imponuntur folia vulneribus in veteratis, articulis luxatis, ambrustis, &c.

L. Bardana.

L. *Bardana minor.*

Ξίδιον, Diosc. παχύδαιον, Galen. Xanthium, Fuchf. Matth. Dod. Cord. in D. & hist. Lon. Cast. Tab. Xanth. seu Strumaria, Lob. Bardana minor, Ger. Lappa minor, C. B. 6. Germ. klein Kletten, Bettersläuse.

Gaudet solo læto & pingui iuxta mœnia & scrobes arefactas. Viget Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Radix, Fructus (lappulæ) & herba. Vires. Calf. & sicco. dig. gustu est amaro & subacri. Usus præcip. (secund. Matthiol. (in minera lepræ educenda (cum Rhab. exhib. radix) in lipothymia. Extrinsec. in struma & tumoribus dissecutiendis (epithem.) in capillis luteo colore tingendis. Herba cancrorum ardori efficax est extinguendo.

L I. *Basilicum.*

Όμιον, Όκμιον. Basilicum siue Ocimum, Brunf. Basilica minor & Baccharis Germanica, Trag. Ocimum medium, Matth. Cast. Cam. Ocimum mediocre, Fuchf. Ocimum seu basilicum medium vulgare, Lob. Ocimum magnum, Tab. Ger. Ocimum vulgare, C. B. 6. Germ. Basiliën.

Crescit in hortis. Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia ac Semen.

Vires. Calf. 2. humect. diger. resolu.

L I I I. *Bellis.*

expargat pulmones, menses mouet, ideoque usurpant poterit usu interno & externo, sed rarius adhibitum deprehenditur.

P R A P A R.

∇. Ex integra fit planta collecta Iunio.

L I I. *Behen album, Behen rubrum.*

Binas officinæ nostrates radices monastrant nomine Behen: vnam Behen rubrum appellant, alteram album. De vtraque controuertitur cuius sint speciei. Arabibus (vt Serapioni) sunt Behen radices, pastinacæ radicibus similes. Hinc scribit Haly Abbas, Behen & Pastinacæ syluestris radices nullum inter se discrimen habere. E modernis Behen album aliqui Polimonij siue Lychnidis syluestris speciem esse autumant, quam Tabern. vocat herbam articularem: Behen rubrum alij Limonij maritimi, alij valerianæ rubræ, alij Bistortæ speciem esse autumant: aliqui vero Garzia & monente & reprehendente, zerumbeth esse statuunt. Hinc est, quod aliqui in descriptionibus Arabum substituunt Eryngium, alij Tormentillam, alij pastinacam syluestrem, alij Angelicam, alij denique Caryophilatam. Actuarius & Myreplus Behen hermodactylos esse volunt, forsan auellanas purgratice, de quibus vide supra: Balanus Myrsifica.

Primula veris, Marienblümlein, Gansblümlein, MasZlieben, Zeislofen.

NNn

Est

Est vel $\left\{ \begin{array}{l} \text{sylvestris} \left\{ \begin{array}{l} \text{Major, Trag. Matth. Fuchf. Dod. Cast. Cam. Ger. Lob. Tab.} \\ \text{Media, Matth. Lob. Tab. Clus. Dod. minor Cast.} \\ \text{Minor, Matth. Fuchf. Tab. Ger. Lob. C. B. 7.} \end{array} \right. \\ \text{hortensis} \left\{ \begin{array}{l} \text{simplex.} \\ \text{prolifera.} \end{array} \right. \end{array} \right.$

Et si singulæ officinales esse non nequeant, prævalet tamen sylvestris, eaque minor.

Sylvestr. crescit passim in pratis & pascuis: Hortensis colitur in hortis. Floret per integram æstatem præcipue verò verno tempore.

OFFICIN. NAT.

Integra Herba cum floribus, sed raro.

Vires. *Vulneraria est calfac. & sic. moderatè, partium est tenuium: mulierculis nostris usitatum est, herbam cum floribus infantibus ad aluum laxandam exhibere.*

N. Bellis maior & minor §. 6. 6. Aprilis manè ante ortum Solis collecta valide emolliunt attenuantque: eadem collecta mense Junio, secundo die à plenilunio sub crepusculo noctis, plurimum valent ad hæmorrhæam sistendam.

PRÆPARAT.

▽. Fit ex integra planta florente, mense Majo collecta.

Ben, vide Balanus Myrepfica.

L IV. Berberis.

Berberis, Brunf. Lon. Lob. Cast. Com.

Spina acida, Brunf. Dod. Oxyacantha, Trag. Oxyacantha Galeni, Cord. in D. Tab. Crespinus, Matth. Oxyacanthus Galeni, Cam. Berberis dumetorum, C. B. 1. Germ. *Saurrauch, Versich, Saurdorn, Relisselbeern.*

Gaudet locis incultis, dumetis, &c.

OFFICIN. NAT.

Fructus (nomine Cerberis collectis Autumno.

Vire. Refrigerant & humectant 2. partium, tenuium, astringunt, appetitum excitant, roborant ventriculum ac Epar. Proin usus sunt frequentissimi in morbis ubi refrigeratione & astringitione opus, quales Diarrhæa, Dysenteria, &c.

PRÆPARAT.

1. Condus fructus.
2. Succus liquidus. Ex recentibus baccis expressus.
3. Syrupus de succo berberum.
4. Rotula. Ex succo & saccharo.
- N. Fit solâ misurâ sine coctione, Vid. lib. 2.
5. Trochisci. Vid. Dispensf.
6. Rob. de berberibus compos. Vide Dispensf.

L V. Beta.

Τέτραλον, Diosc. Germ. Mangolt, Ræmisch Kohl.

Beta $\left\{ \begin{array}{l} \text{alba} \\ \text{rubra} \left\{ \begin{array}{l} \text{vulgaris} \\ \text{radice rapæ, rapum rubrum.} \end{array} \right. \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Hæ sunt officinales, præferturque rubra.} \end{array} \right.$

Alba

Alba dicitur Beta, *Brunf. Tab. Ger.*
 Candida. *Trag. Fuchf. Cord. in D. Dod.*
 Beta alba, *Matth. Lob. Lon. Cast. Cam.*
 Beta alba vel pallefcens, quæ Cicla
 officin. *C. B. 2.*

Rubra vocatur. Beta rubra *Brunf.*
Trag. Lon. Dod. B. nigra, Matth. Fuchf.
 & rubra, *Cast. rubra vulgatioꝝ, Lob.*

OFFICIN. NAT.

Radices, Folia & Semina.

Vires. *Calf. & ficc. in princip. gr. 3.*
laxat aluum. ob nitrofitatem, errhinum
est. Vfus eius internus potiffimus culi-
naris est, in acetariis, &c. Externus in
errhinis.

PRÆPARATA.

Succus. Ex tota herba & præcipue
 ex radice.

LVI. Betonica.

1. Betonica, alba vel primula veris.
Hæc inusitata.
 2. Betonica vel Vetonica corona-
ria. Vide Cariophyllus hortensis.
 3. Betonica officinarum, *De qua hîc,*
 Dicitur Betonica, *Brunfels. Trag.*
Matth. Fuchf. Purpurea Fuchf. Dod.
Lob. Lon. Cast. Tab. Ger. Betonica vul-
garis, Clus. hîst. Vetonica, Cord. in D.
Betonica purpurea, C. B. 1. Germ Beto-
nien, braun Betonien.

Crescit in hortis ac pratis, locisque
 umbrosis: Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia (Maio legenda) & Flores

Vires. *Calfac & ficc. 2. acris est &*
amara: discutit. atten. aper. extergit,
inprimis Cephalica est Epatica, Sple-
netica, Thoracica, Vterina, nec non &
vulneraria, & demum diuretica: hinc
usu interno & externo creberrimo ve-
nit, maximè in morbis capitis.

PRÆPARATA.

1. ▽. Fit ex fol. antequam florefcit,
 vel ex flor. in *MB.*
 2. *Conserua.* Ex floribus.
 3. *Syr. simplex.* Ex succo & saccha-
 ro.
 4. *Compositus.* Vid. in *Dispensat.*
August.
 5. *Exempl. ex Betonic.* Vid. *August.*
 6. ☉ Ex incinerata planta.

LVII. Betula seu Betulla.

Betula, *Trag. Monard. Dod. Lon.*
Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Germ. Birch-
baum.

Crescit in syluis, locis gaudens as-
 peris. Iulos prodit Martio, quibus
 Aprili folia succedunt.

OFFICIN. NAT.

Folia, Cortex, Fungus, sed raro.

Vires. *Folia calf. ficc. resoluunt, at-*
ten. absterg. aperiunt, amara sunt. Se-
rum proliciunt. Hinc vsus non minim. in
hydrope, scabie, & sim. intus & extus
adhibita.

Cortex item quia bituminosus, cal-
fac, & emollit. Adhibeturque in suffi-
ribus aëri corrigendo dicatis.

Fungus vi pollet adstrictoria; unde
ramenta eius hamorroidibus inspersa
ad miraculum fluxum cohibent.

PRÆPARATA.

1. *Succus.* Ex perforato caudice verno
 tempore prolectus.

Vires. *Commendatur ad comminuen-*
dos calculos Renum & Vesicæ, macu-
lasque cutis abstergendas.

2. ▽ still. è succo.

M m m 2

LVIII.

LVIII. *Bistorta.*

Nattervurtz, } Maior radice } minus intorta } *ha sine discrimine officinales.*
Est C.B. } } magis intorta }
 } Alpina } Maxima } *minus officinales.*
 } } Media }
 } } Minima }

1. Dicitur *Bistorta*, *Cord. in D. Matth. Dod. Cast. Bistorta* foemina, *Brunf. Bistorta Britannica*, *Lob. Serpentaria* foemina & colubrina, *Fuchf. Colubrina*, *Lon. Colubrina* & *Dracunculus Maior*, *Brunf. Bistorta maior radice minus intorta C.B. 1.*

2. *Colubrina* & *Dracunculus minor*, *Brunf. Trag. Serpentaria mas* seu *Bistorta*, *Fuchf. Bistorta*, *Con. minor. Tab. latifolia. Ger.*

OFFICIN. NAT.

Radix & interdum *Fungus*.

Vires. Refrig. sicc. ad gr. 3. astringit valde. est austeriuscula, alexipharmaca, sudorifera. Vfus praecipui in vomitu compescendo, in abortu praecauendo, &c. *Extern. in catarrhis exiccandis, fluxu uteri sanguineque vulnerum sistendo.*

Fungus sanguinem in vulneribus ac haemorrhagia narium mire sistit.

P R A E P A R.

▽. *Ex herba.*

LIX. *Bombax.*

Arbuscula est exotica ferens fructus instar nucis crinitae, in qua semen latitat lanugine mollissima inuolutum.

Dicitur *Bombax* officinar. *Cortus* seu *Cotto* & *bombax Serapioni*. *Xylon* seu *Gossypium*, *Matth. Xylon*, *Fuchf. Lon. Gossypium*, *Dod. Lob. Cast.*

Cam. Tab. Gossypium frutescens semine albo, *C.B. 1. Germ. Baumvullbaum.*

Copiam eius plurimam producit Syria ac Cyprus.

OFFICIN. NAT.

Semen & *Lanugo* quae *Gossypium* officinarum, *Baumvull.*

Vires. Lanugo calfacit & siccatur: semen pulmonarium est, tussientibus & asthmaticis maxime proficuum, augeat semen.

N. Vsu tum seminis, tum lanuginis rarus est modernis

LX. *Borrago.*

Borrago Brunf. Trag. Fuchf. (icon.) Dod. Lon. Cam. Buglossum Matth. Fuchf. Cast. Buglossum verum, Cord. in D. Bulglossum latifolium, Lob. vulgare, Clusf. Buglossa urbana, Clusf. hist. Borrago floribus albis, Tab. hortensis, Ger. Buglossum latifolium, Borrago, C.B. 1. Forretsch.

Crescit ut plurimum in hortis, tum quoque locis incultis, officinalisque est sine discrimine siue caeruleos ferat flores, siue albos, quae hinc & que vulgaris, ac prior.

Floret mense Iunio, Iulio, Augusto, usque in Septemb.

OFFICIN. NAT.

Radix, Folia, Flores, (qui inter 4. cordiales

cordiales famofos, recenſentur.

N. Radix afferuatur excorticata.

Vires. Cordialis eſt è præcipuis, calf. & humect. 1. atram & aduſtam bilem corrigit, ſpiritus vitales ac animales fuligine atra biliaria inquinatos mundificat, unde & omnibus affectibus ex atra bile oriundis conuenit, v.g. hypochondiacris.

PRÆPARATA.

1. ∇ . duplex, 1. ex toto. 2. ex floribus.

2. Conſeru. Ex floribus.

3. Syrup. Ex infuſione triplici florum & ſacch. Diſp. Auguſt.

N. Alij R. ſucci ex ſol. expreſſ. ζ viij. flor. Recent ζ i. vel ζ ii. cum ſacch. ζ iiij. coquunt in ſyrupum.

4 Succus inſpiſſatus ſiue eſſentia. Vide l. 2. de ſuccis.

LXI. Branca Vrſina.

$\Sigma\pi\omicron\nu\delta\lambda\lambda\omicron\nu$, $\sigma\tau\omicron\nu\delta\lambda\lambda\omicron\nu$. Spondylium vulgare hirtutum, C. B. 1. Spondylium, Lob. Matth. Lon. Caſt. Tab. Vulgare, Dod. 8. Branca vrſina, Brunſ. Trag. Cord. in D. Acanthus vulgaris ſeu Germanica, Fuchſ. Barenklauv, Barvuntz.

Credidit paſſim in locis humidioribus: floret Maio.

OFFICIN. NAT.

Folia ſola.

Vires. Eſt è 5. herbis emollientibus calf. & ſicc. aperit. Uſus potiſſimum externus eſt in clyſteribus aliſque paregoricis. quaruncunque formularum, & ut plurimum in cataplaſmatis.

LXII. Braſſica.

$\kappa\rho\delta\mu\epsilon\eta$, Caulis, Kæl. Kalkyaunt.

Varia Braſſicæ ſunt genera, quæ his claſſibus comprehendì poſſunt.

{	Satiua	{ capitata.
		{ non capitata.
		{ criſpa.
		{ Apiana, i.e. apij flore.
{	Sylueſtris.	
	Marina, i.e. S. Idanella.	

Ex his magis medicamentofa eſt, teſte Matthiolo, non capitata minutis caulibus, tenerioribus foliis, lauis, tenera, C. B. 1. Braſſica alba vel viridis: huic ſuccedit non capitata rubra.

Dicitur Braſſica, Brunſ. J. Lauis, Matth. Caſt. Braſſica candida, Geſ. hortenf. lata alba, Lon. Braſſica vulgaris latiua, Lob. Dod. Ger. Braſſica prima, Tab. Braſſicæ ſatiuæ maioris ſpecies altera, Trag.

OFFICIN. NAT.

Folia Ius foliorum, Semen.

Vires, Folia calf. & ſicc. citra acrimoniam, vulneraria ſunt, ebrietatem arcant, aſtringunt & laxant, adeoque qualitatis mixte: Nimir. ut aiunt Salmernitani.

Ius caulis ſoluit, cuius ſubſtantia ſtringit.

Extrinſecus uſuratum eſt ruſticis, Vulneribus folia imponere ut conſolidentur quinimo & pleuritidis doloribus impoſita, eos mitigant.

Semen eadem pollet qualitate cum foliis.

PRÆPARATA.

Loch. de caule. Vide Diſpenſ.

LXV. *Buxus* seu *Buxum*.

πύξος, Buchs-
 baum,

{	Arborefcens. <i>Huius loci</i> . Fruticofa. Folii rotundioribus.
---	--

Chamepyxos, Trag. Tab. Hac ventur ad areolas hortorum.

Insignitur *Buxus*, *Brunf. Matth. Dod. Fuch. Lon. Cast. Cam. Tab. Buxus vulgaris, Trag. Buxus arborefcens, C. B. 1.*

Viret perpetuo, Aprili tamen germi-
 na nouella profert: locis gaudet alperis,
 faxofis.

Vires. *Rari vfu est in Medicina: sunt tamen qui oleum ex ligno deſtillant, ſummè narcoticum: idque non ſolum ſummopere commendant in Epilepfia, odontalgia (ſi dentis colpium ipſi intin-ctum in radicem dentis dolentis immit-tatur (dentibusque corroſis, verminatione, &c. ſed & pro oleo Ligni Heraclei Ru-landino venditant. Videatur Quercet. Terrad. p. 214. 215. 216. ubi buxum li-gnum efficaciffimum ſulphure narcotico ſcatere docet.*

Extractum Ligni. Vid. l. 2.

Vires. Inſigne eſt ſudoriſerum & ſpe-cificum ad Epilepfias, vermes, putre-dines.

Doſis: Exigua pilula *Quercetan. in Pharm. Reſt. cap. 26.*

C.

LXVI. *Calamus Aromaticus Indus*.

Calamus Aromaticus officinarum. Vide Acorum.

Calamus Aromaticus Indus, eſt plan-ta Indica & diuerſa ab Acoro. Super quo legi poteſt Garzias ab horto, lib.

1. aromat. cap. 23. & anotationes Cluſij in eundem.

Inſcribitur κάλαμος ſimpliciter & κάλαμος ὡρετικός: *Hippocr. & Galen. καλ' ἀρωματικό, Dioſc. Oribas. Aegin. Aërio. Calamus Alexandrinus, Celſo. Calam. aromaticus, Cord. in D. Fuchſ. Garz. Lob. Acoſt. Calamus aromaticus Indicus. C. B. 1. inter arundines odora-tas. Germ. vvolrichend Calmus.*

N. Rara planta eſt officinis noſtrati-bus & non niſi Folii ſolummodo arun-dinaceis (iſque raris) nota.

Subſtituunt itaque Acorum ſeu Ca-lamum Aromaticum officin.

Vires. Calfac. ſicc. 2. acris eſt. *Vſuſque præcipui in Vteri affectibus & neruorum doloribus. Garzias ab Horto.*

LVII. *Calamintha*.

Καλα- μινθα, C. B.	{	Incana, ocymifoliis.
		Pulegij odore ſeu Nepeta.
		Vulgaris, vel officinarum Hac vſualis.
		Magno flore.
		Exiguo flore.

Aruenſis verticillata.

Dicitur *Calamintha*, *Matth. Fuchſ. vulgaris, Cam. Cal. montana, Dod. Caſt. Calam. montana vulg. Lob. Tab. Ne-peta montana, Cord. in D. Mentha ſa-tiua rubra, Ger. Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ, C. B. 3. aliis calamentum, Germ. Ackermüntz, Ca-lament.*

Floret

Floret Iunio & Iulio, crescit in aruis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires *Calfac. sicc.* & aperit, attenuat, discutit, extergit partium tennium est, stomachica ac uterina imprimis, hinc & pectoralis atque Epatica: menses ciet, foetum elicit, urinam mouet, tussi medetur, Epar reserat.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex planta integra Iunio vel Iulio collecta.

2. *Sal.* Ex cinere.

3. *Syrup. compos. de calamintha.* Vid. Dispens. August.

4. *Spec. Diacalaminth.* Vid. Disp.

LXVIII. *Calcatrippa.*

Videatur consolidida Regalis, *Matthiol. Cast. Cam. Tab. Ger.* Consolidida Regia. *Lob. Flos Regius. Dod. Delphinium. Claus. Germ. Ritter spron.*

Varia extant genera, quoad colores, florum multipliciter, modum uenascendi differentia, adeoque alia est flore simplici, alia pleno, quædam hortensis, alia aruensis, Hortensis colitur in hortis, aruensis passim in aruis reperitur, præstantiorque habetur hortensi. Floret Majo, Iunio.

N. Sunt qui calcatrippam pro Delphico Dioscoridis reputant, alij Cuminum sylvestre Dioscoridis esse volunt. Sufficit nobis scire vires & usum.

OFFICIN. NAT.

Herba & Flores.

Vires. Omnes calcatrippæ species siccant, calore & frigore temperata sunt, subastringunt, vulnera consolidant, partum faciunt intrinsecus & extrinsecus adhibita.

PRÆPAR.

1. ▽. *stillat.* Ex herba cum floribus collecta initio Iunij.

Vires. Commendatur ad oculorum rubedinem & ophthalmias. Præsertim quæ e carulei coloris floribus prolecta est.

2. *Conserua.* Ex floribus.

Vires. Commendatur ad tormina ventris infantum, ut & ad ardorem stomachi.

LXIX. *Caltha.*

Calendula, Chrysanthemon, Ringelblum.

Est præcipue { vulgaris. *Hæc officinalis.*
palustris. *Hæc officinis ignota.*

Indigitatur. Calendula, *Brunf. Trag. Dod. Cam. Caltha sativa, Tab. Caltha, Matth. Fuchf. Lon. Cast. Chrysanthemum, Lob. Calendula simplici flore, Ger. Caltha vulgaris, C. B. I.*

Crescit in hortis, florere incipit Majo. Floretque per integram æstatem.

OFFICINALIA NATIVA.

Flores.

Vires. Flores Cardiaci censentur, hinc Epatici calf. & sicc. 2. (præcipue si sicci sint) aper. discut. subastring. menses ciet, partum promouent (funus subditus parturienti.) sudores mouent, alexipharmaci censentur, ictero medentur.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex fol. & flor. cum incipit florescere.

2. *Acetum.*

3. *Conserua.* Ex floribus.

LXX. *Cannabis.*

Est { sativa { fœminina } *Hæc vsuales*
sylvestris { masculina } *promiscue.*

Dicitur

Dicitur *Kayasis*, Diosc. Cannabis,
Brunf. Matth. Dod. Lon. Lob. Cast.
Cam. Tab. Ger. major, Trag. fatiua, Fu-
chs. Cord. in D. C. B. 1. vulgo, Canapus,
German. Hanff, zahmer Hanff.

Colitur in agris: Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Semen, raro Herba.

Vires. Semen calf. (aliis refriger.) sic-
catque, semen genitale immittit (usu
continuato) tussi opitulatur. Ictero sub-
uenit: at caput vaporibus replet.

Herba refrigerat & siccatur, ambustis
conuenit, aurum dolores (ab obstructio-
ne natos) sanat (succus instillatus.)

LXXI. Capparis.

Frutex est exoticus, ex quo flores
antequam è gemmis erumpant de-
cerpuntur, conditrique ad nos transpor-
tantur.

Nominatur Capparis. Trag. Mat-
thiol. Cord. in D. Lon. Cast. Cappar. 2.
Tab. Capparis spinosa, Bellonj. Cap-
paris retuso folio, Lob. Capp. rotun-
diore folio, Ger. Capparis spinosa fru-
ctu minore, folio rotundo, C. B. 1.
Germ. Cappern.

OFFICIN. NAT.

Cortex radice inprimis.

Vires. Calf. & sicc. est splenicus, acris,
amarus, austeriusculus, ideoque incidens,
aperiens, extergens, subastringens. Pro-
dest in affectibus Arthriticis, hypochon-
driacis, & simil.


PRÆPAR.

Conditi flores.

1. Condiuntur + affundendo.

2. Sal. aspergendo.

N. Nocere dæduntur stomacho im-
becilliori, Epatis è contra & Lienis con-
ferunt, obstructions eorum reserando.

1.  Compos. Vide Disp.
2. Trochisc. de Cappar. Vide Disp.
3. Extract. è corticibus Rad. Fit se-
cundum Quercetan. cum ∇ flor. Ge-
nistæ vel simili P. R. cap. 26.

LXXII. Caprifolium.

Περικλυσία, Matrifylua, Volucrum
maius, Lilium inter spinas, VVald-
vinde, Speck gilg. Geisblatt. Zann-
gilg.

(non perfo-)
est { liatum } utrumque promif-
{ perfoliatum } cue officinale est.

1. Non perfoliatum vocatur Capri-
folium, Brunf. Lon. Germanicum.
Dod. Periclymenum, Trag. Fuchs. Cord.
in D. Cam. Periclymenum non perfo-
liatum septentrionale, Lob. Pericly-
menum vulgare septentrionalium,
Clus. hist. Periclymenum non perfo-
liatum Germanicum, C. B. 1.

2. Perfoliatum dicitur Periclyme-
num, Matth. Cast. Periclymenum per-
foliatum, Lob. Tab. Ger. Periclymenum
vulgare alterum, Clus. hist. Periclyme-
num perfoliatum, C. B. 2.

Crescit in dumetis, fruticibusque
instar conuoluuli adhærescit. Floret.
Maio ac iunio.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. Calf. & sicc. diureticum va-
lidum ac splenicum est. Usus præcip. in
asthmate & tussi. Externè extergit ul-
cera sordida, sanat impetigines, aliasque
cutis maculas abstergit.

PRÆPAR.

∇ . Stillat. Ex floribus.

Vires. Confortat. nervosum genus,
auxiliatur asthmatis, tussi, palpatione cor-
dis: faciliat ac accelerat parium, oris

O o o siccitatem

fecitatem emendat (in gargariſmis.)
Succus ex foliis raro extat, inſignis ta-
men efficacia eſt in vulneribus capitis
ac cranij curandis.

LXXIII. Cardamomum & grana Paradysi.

Cardamo. mum C. B.	{	1. Granum Paradysi.
		2. Maius officinarum.
		3. Medium.
		4. Minus in officinis ſim- pliciter Cardamomum dicitur.
		5. Minimum.

Ex his officinis vſualiora ſunt Grana Paradysi, quæ officinis Cardamomi maioris nomine veniunt: tum cardamomum ſimpliciter ita dictum. quod officinarum Cardamomum minus audit.

Grana Paradysi inſcribuntur Cardamomum maius, *Matth. Lon. Caſt. Gran. Parad. Cord. in D. Milleguetra, Lob. Malaguetra, Garz. Cardam. Arabum maius, Tab. Germ. Paradiszkærner.*

Cardamomum ſimpliciter dictum videatur, Cardamom. minus, *Matth. Lon. Tab. Cord. in D. & hiſt. minus vulgare, Lob. Cluſ. in Garz. Germ. Cardamœlein.*

N. De Cardamomo veterum diſputatur, utrum ſub generalibus his 5. contineatur. Sunt qui Cardamomum maius, veterum Cardamomum eſſe contendunt: alij contra dicunt, obiiſcentes amaritudinem ac odorem grauem, quibus veterum Cardamomum celebre fuit, noſtrum non item.

Eligitur utrumque quod eſt fragenti contumax, plenū, oculus & caput odore tentans, guſtu acre & ſubamarum.

Afferitur utrumque in Europam Alexandria Egypti, ac etiam ex India Orientalis Prouinciis Malanar. Iana, & ſimil.

OFFICIN. NAT.

Fructus uterque Cardamomum ſcil. & grana Paradysi.

Vires. *Utrumque calſac. & ſicc. (maius gr. 2. minus 3.) partes principes re-creat, attenuat, ſtatuſ diſcutit, coctionem inuat, proin conducibilis eorum uſus eſt in affectibus capitis, ventriculi & inprimis uteri.*

P R Æ P A R.

1. Ol. Cardamomi.

2. Confectio.

LXXIV. Cardiaca.

Cardiaca, *Matth. Lob. Lon. Caſt. Tab. Ger. Fuchſ. Meliſſa ſylu Tiag. Marubium, mas, Brunſ. Marrubium Cardiaca dictum, forte primum Theophaſti, C. B. I. Germ. Hertgeſpan.*

Creſcit iuxta ſepes & vias, lociſque gaudet frigidis: ſtoret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. *Caſf. 2. ſicc. 3. attenuat, diſcutit, peculiariter medetur diſtentioni hypochondriorum & cardia infantum (quam affectum cardiacum ſeu cardialgiam appellant, ciet urinam & menſes, peſtus apertuſa detergit, difficulter parientibus opitulatur.*

P R Æ P A R A T A.

1. ∇. Ex herba quæ præcipue in uſu eſt.

2. Vnguentum Cardiacum. Videl. 2.

LXXV. Carduus Benedictus.

Dicitur Carduus Benedictus.
Brunſ.

Brunf. Trag. (cui & *Acantbus Germanicus.*) *Matth. Lob. Cast. Tab. Cam.* *Ger. Attractylis hirsutior, Fuchf. Acanthium, Cord. in D. Lon.* Cuius sylu. alter *Theophrasti, Cord. in D. Cam.* *Cnicus supinus, Cord. hist.* *Carduus benedictus & attractylis altera species, Dod. Cnicus sylvestris hirsutior, siue Carduus benedictus, C. B. (4. Cnici.) Ger. Cardobenedicten, gesegnere Distel.*

Crescit in hortis, floret Iunio & Iulio.
N. 1. *Tempus sationi aptum est & crescente.*

N. 2. *Carduus benedictus si sub initium Iunii collectus fuerit, vulnerata recentia mirabiliter curat, sin' alio tempore, nunquam id præstabit.*

OFFICIN. NAT.

Folia & Semen.

Vires. Herba Cardiaca, alexipharmaca, ac sudorifica est ex usitatissimis, calf. & sicc. 2. atten. aperit, disc. veneno ac putredini resistit, febres etiam inveteratas & quartanas curat. Laudatur à nonnullis peculiariter in Cephalæa clauodicta, ut & in surditate. Extrinsecus rarioris est usus, adhibetur tamen nonnunquam ad gangranam arcendam (in Epithem. vel cataplas.

Semin. vires easdem obtinet, sed usu non aque crebro adhibetur, commendatur imprimis ad Epar obstructum.

PRÆPAR.

1. *Pulvis.* Datur ad ʒj.
2. ∇ *Ex herb. integr.*
3. *Spir.* *Ex herb. fermentata.*
4. *Succus.* *Ex herba expressus.*
5. \odot . *Ex Cinere.*
6. $\odot\odot$ *Stillatit.*
7. *Conseru.* *Ex foliis seu summit.*
8. *Syrup.* *Ex succo.*

9. *Extract.* *Ex foliis c. X.*

LXXVI. *Carduus Mariæ.*

Carduus Mariæ, Trag. Fuchf. ico. Lon. Cast. Ger. Vulgaris, Cam. Carduus Lacteus, Matth. Spina alba hortensis Fuchf. Carduus albus & Chamæleon, Brunf. Carduus Marianus, Cord. in D. Tab. Carduus Leucographus. Dod. Carduus albismaculis notatus vulgaris, C. B. 1. Silybum, Lob. Germ Mariendistel, Fravvendistel, Bechedistel.

OFFICIN. NAT.

Semen inprimis, hinc Folia & nonnunquam Radix.

Vires. Pectoralis inprimis Carduus Mariæ censetur. Calf. & sicc. 2. subastring. incidit, aperit: in ceteris amulatur barduum benedictum. Usus præcipue in pluritide, Isterio ac hydrppe

Dosis feminis ad ʒj.

N. *Semen in emulsionibus crebri est usus.*

PRÆPARATA.

Δ . *Ex herbatenella.*

LXXVII. *Carlina.*

$\chi\alpha\iota\iota\lambda\acute{\epsilon}\omega\upsilon\ \lambda\epsilon\upsilon\kappa\acute{o}\varsigma$, *Apri radix, seu Ebervvurʒ, Brunf. Carduus panis seu pacis, Ericio Cord. Chamæleon albus, Matth. Cord. in D. Cast. Carlina herbarior. Lob. Chamæleon albus Diosc. Lob. ico. Clus. hist. Carlina humilis (vel altera,) Dod. Carlina sessili flore, Cam. Carlina acaulos magno flore, C. B. 1. aliis Carolina, cardopatium. Germ. vveiß, Ebervvurʒ.*

Crescit in locis montosis, v. g. in Alpibus Heluetiæ & alibi.

OFFICIN. NAT.

Radix collecta tempore verno.

$\odot\odot$ 2

Vires.

Vires. Calfac. & sicc. 3. e stale xipharmaca, sudorifera, diuretica, emmenagoga, tineas ventris necat.

LXXVIII. Carum.

Κάρος, κάρον, καρίον, Caros, Brunf. Trag. Carcum, Fuchf. Carum, Cord. in D. Matth. Lob. Dod. Cast. Tab. Ger. Carui, Lon. Cuminum pratense, Carui officinarum, C. B. 1. Germ. VVeiszkümmel, Feldkümmel, Mattkümmel.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. Calfac. & sicc. 3. discut. atten. Stomachicum est ac diueticum, lactis abundantiam præbet. Hinc usus eius insignis in colica, vertigine, &c. cum internè, tum externè applicatum.

PRÆPARATA.

1. Confectum Semen.
2. Condita Radix, sed raro.
3. ∇. Stillat. Ex planta integr.
4. Ol. Ex semine siccol. a. destillatum.

LXXIX. Cariophyllus hortensis.

Videatur Cariophyllus, Lob. Tab. Ger. Cast. Matth. Cam. Lon. Caryophylla, Trag. Vetonica, Dod. Betonica altilis coronaria, Tunica Fuchf. Nagelblümlein, Graszbäumlein.

[Hortensis, colitur in hortis varior. color. & discrepantis
Est { plenitudinis.
Sylvestris, qui rari usus.

Florescit Iunio arque in multam ætatem.

OFFICIN. NAT.

Flores potissimum rubri.

Vires. Moderare calf. & sicc. Cepha-

lici sunt ac cordiales. Usus præcip. in vertigine. Apoplexia, Epilepsia, aliisque capitis & nervorum affectibus. In syncope ac palpitatione cordis: fugant lumbricos, allenant partum: Extrinsecus adhibentur in vulneribus capitis: extrahunt ossa cranij fissa, leniunt Cephalalgiam & odontalgiam.

PRÆPAR.

1. Succus inspissatus, essentia dictus.
2. Flor. rubr. (cum primum gemmæ explicari incipiunt (resectitque albidis illis partibus conqussa irrorando, exprime, clarifica ac coagula lentissime.
- N. Calore nimio perdit vires, nimia agitatione cum spatula amittit calorem.
- Dosis à ʒss. ad ʒß.
2. Conserva ex floribus.
3. ∇ stillat. ex flor. cum herba lenissimo M calore.
- N. Ophthalmica insignis est, &c.
4. Syrupus. Ex infusione florum.
5. I. Ex infusione florum. Vide lib. 2.

LXXX. Cariophylli Aromatici.

Charunfel Arabibus. Caryophil-
li, Matth. Tab. Cariophyllus, Cord.
hi. st. Cast. Calafur Arabibus & plerisque Indis Cariophylli. Lob. Cariophyllus florens & Caryophylli veri
Ger. Caryophyllus aromaticus fructu oblongo, C. B. 1. Antophylli dicuntur reliqui maiores, Lon. Lob. Tab. Ger. Caryophylli maturi seu maiores, Cord. hist. Caryophylli mares, Auccenne.

Fructus seu si maior flos est aromaticus exoticus, Solis radiis induratus & nigrescens.

Duplicis fortis prostant : Nimirum

1. Caryophylli dicti, qui discussi sunt antequam maturuerunt, unde & minores esse solent. Germ. *Nelcken*.

2. Anthophylli, *Mutternelcken*, qui maturitatem assecuti sunt : unde & maiores existunt.

Delectus : Eligendi sunt suaue fragrantés, oleosam quandam humiditatem premendo exhibentes.

Vires. *Cardiacum*, *Cephalicum* ac *Stomachicum* insigne exhibent, *calf.* & *sicc.* 3. *discut.* Hinc prosunt in *Lypothymia*, *Odontalgia*, *cruditate ventriculi*, *vertigine*, arcens quoque morbos malignos, *uterinos*, &c.

P R A E P A R.

1. *Confect.* Fit l.a.

2. *∇.* } vt ex aromatibus reli-

3. *Oleum* } quis eliciuntur, vide l. 2. vel l. 4. in *Cinamomo*.

N. 1. *Caryophylli multum olei fundunt.*

Vires. *Oleum hoc denticauo inditum odontalgiam mirifice lenit.*

4. *Extractum.* Fit ex caryophyllis cum aq. stillat. & *∇* l.a.

5. *Θ.* Ex remanentiis incineratis elixiuatur

5. *Balsamus.* Fit l.a. ex ol. *Nucistæ* depurato ac ol. caryophyll. tingiturque puluere caryophyllor.

6. *Species diacaryophyllor.* Vide *Dispensator*.

L X X X I. *Caryophyllata.*

Caryophyllata, *Brunf.* *Trag.* *Lon.* *Math.* *Cast.* *Tab.* *Ger.* *Vulgaris*, *Lob.* *Cam.* *Clus. hist.* *Caryophyllata hortensis*, *Fuchf.* *Herba benedicta*, *Brunfels.* 4. *Caryophyllata vulgaris*, *C. B. I.* *alias* *Sanamunda.* *Herba beuedicta.*

German. *Benedictwurcz*, *Benedictkrant.*

Crescit locis incultis pinguibus iuxta sepes.

O F F I C I N. N A T.

Radix collecta mense Martio, quæ odoris fragrantis est (23. Martij circiter,) raro *Folia*.

Vires. *Calfac.* & *sicc.* 2. *subastring.* *robor.* *discut.* *cephalica* ac *cardiaca* est. *Vfus* præcipue interne in catarrhis exiccandis, sanguine coagulato resolvendo.

L X X X I I. *Castanea.*

Käsaror, *Castanea*, *Brunf.* *Trag.* *Fuchf.* *Dod.* *Lac.* *Lon.* *Lob.* *Tab.* *Ger.* *Castaneæ* minores, *Math.* *Castaneæ sylvestres*, *Cord. in D.* *Cast.* *Cathaneæ sylvestris*, quæ peculiariter *castanea*, *C. B. I.* *Germ.* *Kastanten.*

Castaneæ etsi omnium glandium sint præstantissima, teste *Galen.* attamen præter membranam rubram cortici ac carni intercedentem, nihil officinis exhibent.

Vires. *Membrana sistit valenter immodicos alui fluores & sanguinis reiectiones* (in vino austero sumpta.) *Quin etiam cum pari pondere ramentor. ebarris, alba fæminar. profluvia cohibet.*

Dosis *ʒij.* *Matthiol.*

L X X X I I I. *Centaurium minus.*

{ *Minus.* De quo hic.
Centaur. { *Mainus* Est *Rhaponticum*
 { *vulgare.* Vide suo loco.

Dicitur *Centaurium*, *Trag.* *Math.* *Fuchf.* *Dod.* *Lac.* *Lon.* *Lob.* *Cam.* *Cast.* *Tab.* *Centauureum paruum*, *Lob.* *Ger.* *Centaurea* *Brunf.* *Cast. minor*, *Brunf.*

Centaurium minus, C.B. i. alias febrifuga, fel. terræ Germ. *Tausen gülden-kaut. Erdgall.*

Nascitur solo arido & pratis sabulosis: Floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Planta foliis ac floribus, referta vel summitates solæ.

Vires. Spleneticum est & Epaticum. Calf. & siccatur, amarum est citra mordacitatem, unde & leniter astringens, extergens, aperiens vulnerarium: biliosos & pituitosos humores quam lenissime per aluum educit, serum per poros discutit. Hinc utile in febris (unde & nomen habet.) Ictero, menstruis suppressis, Scorbuto, Arthritis, lumbricis, & specificè in morsucanis rabidi.

N. Tanta estimationis est, ut vix vinum medicatum seu absynthites vulgus paret, eius partem non constituat.

PRÆPAR.

1. ▽ Ex integra planta.
2. Extract. i. e. succus inspissatus ex herbis ac floribus conquassatis atque cum aqua maceratis.

Dosis ad ʒj.

3. ☉ Ex Cinere.

LXXXIV. Cēpa, Cēpe.

Κόμμιον, Arab. Bassal. Cepe, Trag. Fuchf. Matth. Cord. in D. Cast. Capitata. Matth. Cēpa rotunda, Dod. Cēpa fatiua, Matth. Cēpa alba & rubra, Lon. Tab. Cēpa vulgaris, C.B. i. Germ. Zwiibel, Zwiiffel.

Ceparum etsi variæ dentur species, differentes pro diuerso colore florum & radicum, tum pro diuersa radicum, figura, rotunda, oblonga, sessili, &c. attamen conueniunt facultatibus, adeoque promiscue vsur-

pantur, aciores tamen sunt oblonge.

Coluntur in hortis, soloque gaudent optimo: Florent Iunio & Iulio.

OFFICINALIA NATIVA.

Radix sola.

Vires. Calf. & sicc. ad gr. ʒi. aper. incidunt, abstergunt, parium sunt crassurum, adeoque statulenta. Vsus præcipui in tartaro pulmonum incidendo & expellendo (cum melle cocta & estata) in vrina & menstruis ciendis, in lumbricis fugandis (ex infusione.) Extrinsecus maturant & rumpunt apostemata (cocta & imposita (etiam maligna in peste (implete Theriaca vel Mitridatio & cocta.) Vrinam proritant (tosta in axungia & imposita. N. idem facit membranula cuiuslibet carnea particula intercedens, glandi scilicet imposita.) Pernioni conferunt (cum adipe cocta & imposita) menses & hæmorrhoides proliciunt (subdite) ambustis medentur (cruda cum sale subacta ac statim imposita.)

N. Sunt qui contagioso aëre in conclauibus suspendunt, usque contagium colligi, adeoque conclauis purgatum iri autumant.

LXXXV. Cērasa.

Ceraforum varia producuntur genera, tam secundum colorem, quam secundum saporem differentia. Veruntamen in vsum pharmaceuticum duo potissimum accerfuntur, subacida rubra scil. (Amarenæ) & dulcia nigra.

Cerasa apud omnes ferè authores nomen suum retinent & dicuntur cerasa. Germ. *Kirschen.*

OFFICIN. NAT.

Cerasa vtriusque generis siccata, Nuclei & Gummi.

Vires.

Vires. *Acida refrigerant, siccant, astring.* Cor ac Stomachum roborant. Hinc utilia in febrili siti ac aestu mitigando, &c. Fernel. decoctum cerasorum in hypochondriaco affectu summè commendat. Dulcia temperata sunt ad humiditatem inclinantia, cephalica, unde & in morbis capitis Apoplexia, Epilepsia, Paralyti, &c. peculiariter proficua censentur.

Nuclei calculum comminuunt, adhibenturque contusi in frontibus, vnguentione refrigeranti commixti, ad dolores febriles capitis demulcendos faciunt.

Gummi celebratur vi lithontriptrica.

P R A E P A R.

1. *Condita.* Condiuntur acida cum saccharo. Vide supra.

2. *Succus sine Rob.* Ex acidulis fit, expressione scil. & inspissatione.

3. *Syrup.* Ex succo acidor. & saccharo.

4. ∇ . *stillat.* Ex dulcibus nigricantibus.

5. ∇ . Ex dulcibus nigris fermentatis. Dicitur & Q.E. Vide de Spirit.

6. ∇ . *Diuretica.* Ex nucleis utrorumque. Vide l. 2.

7. *Tactura ac Extractum.* Ex nigris fit cum ∇ vel ∇ propria l.a. *Querc.* Phar. Rest.

8. *Diama-* $\left\{ \begin{array}{l} \text{simplex. \& pulp. ceras. vino.} \\ \text{nos. (per cribrum) lb. iij} \\ \text{facch. lb. ij.} \end{array} \right.$
renatum $\left\{ \begin{array}{l} \text{compos. fit ex simplici ac} \\ \text{aromatibus.} \end{array} \right.$

9. *Oleum.* Ex nucleis exprimi potest, sed minus vsuale.

L X X X V I. *Cerefolium.*

Καρέφυλλον. *Chærefolium, Brunf.*

Dod. fatium, Trag. Cerefolium, Matth. Cast. vulgare, Ger. Con. Lob. Cam. Tab. Gingidium, Fuchs. Chærophyllum fatium, C.B. 1. aliàs Cerifolium. Germ. Kerbel.

Est $\left\{ \begin{array}{l} \text{fatium. Hoc officinale, \& iam nominatum.} \\ \text{sylvestre. Hoc minus vsuale.} \end{array} \right.$

Crescit in hortis, floret Majo.

O F F I C I N. N A T.

Folia & Semen.

Vires. *Calfac. \& sicc. discutit, est partium tenuium, dureticum, emmenagogon ac lithontripcticum, sanguinem coagulatum resoluit, somnum suauiter inducit. Extrinsecus usus insignis est in dolore colico, in urina retenta (imposit. in cataplas.)*

P R A E P A R A T.

1. ∇ *stillat.* Ex integra planta.

2. \odot . Ex cinere.

L X X X V I I. *Chamædris.*

Trixago, Trissago, Quercula Calamandrina, Gamanderlein, k'ein Balthengel.

Species dantur variæ, ex quibus officinalis præ reliquis chamædryis minor repens, C.B. 3. Chamæpytis, *Brunf. chamædryis, Cord. hist. Tab. chamædryis vera, Trag. Cord. in D. vera mas, Fuchs. cham. vulgaris mas, Lon. chamædryis major, Lob. ico. minor Ger. chamædr. minor repens, Dod. chamædr. major vel*
2. *Clus.*

Colitur in hortis, solo gaudens asperio, floret Iunio ac Iulio.

O F F I C I N. N A T.

Folia ac Flores.

Vires. *Calfac. \& sicc. ad gr. 2. Est splenetica ac Epatica, saporis amari, incid. atten. aperit, potenter vlnam ac sudorem*

dorem mouet. Hinc confert in febribus, Scorbuto, sanguine coagulato, Hydrops incipiente, mensibus obstructis ac inprimis in arthritide. Extrinsicus in ulceribus serpentibus, in dolore hamorrhoidum, in scabie ac pruritu, in catarrhis exiccandis.

P R Æ P A R.

1. ▽. Ex integra planta, foliis scil. & floribus.

2. *Conserua*. Ex floribus.

N. Est & *chamadrys frutescens*, quam *Teucrium* vocant, hac iisdem pollet viribus. Et præter hanc est *chamadrys vulgaris*, iuxta sepes nascens, quæ vere substitui potest.

L X X V I I I. *Chamæpitys*.

Aiuga, Abiga, Arthetica, Arthritica, iua arthetica, *Schlaffkrautlein*, *ie lauger ie lieber*, pidigiti. Arab.

Ex generibus variis *chamæpytios* officinalis præ reliquis est lutea vulgaris, C. B. 3.

Quæ dicitur *chamæpitys* 3. *Trag. Fuchs.* 2. *Lon.* *chamæpitys* 1. *Matth. Dod. Cord. hist. vera.* *Cord. in D.* *chamæpitys maior*, *Tab. mas, Ger.* Aiuga sine *chamæpitys* mas *Dioscoridis*, *Lob.* Aiuga, *Cast.* Aiuga luteo flore, *Clus. histor.*

Crescit in agris fabulosis, floret Iulio & Augusto, præcipue autem in hortis colitur.

O F F I C I N. N A T.

Folia cum floribus seu herba tota.

Vires. Nervosum genus roborat, *calf.*

2. *sicc.* 3. *incid.* *aper.* diuretica est, & *emenagoga*, confert in arthriticis doloribus.

P R Æ P A R.

1. ▽. Ex herba integra.

2. *Pilule de iua arthritica*.

L X X X I X. *Chamomilla*.

Χαμαίμων, ἄθεμις, *Leucanthemum*. *Dioscor.* *camomilla*, *chamomilla*, *Chamillen*.

Est { vulgaris. *Hæc usitatissima.*
Romana seu nobilis odorata.
Hæc itidem vsualis.
fœtida. *Hæc minus officinalis.*
Inodorata. *Itidem minus vsualis.*

Vulgaris insignitur *chamomilla* 3. & vulgaris, *Trag. Lon.* *chamæmelum* (*parthenij* 3. species,) *Brunfels. Cast. Tab. Ger.* *chamæmelum* *Leucanthemum*, *Fuchs.* *chamæm. sylu.* *Dod.* *arvense*, *Cam.* *Anthemis*, *Cord. in D. Matth.* *Anthemis vulgarior*, siue *chamæmilla*, *Lob.* *chamæmelum vulgare*, *Leucanthemum Dioscoridis*, C. B. 1.

Romana dicitur, *Parthenium* & nobililis *chamomilla*, *Trag. Lon.* *Leucanthemum odoratum*, *Dod.* *Anthemis* seu *Leucanthemis odorata*, *Lob.* *chamæm. odorat.* *Cam.* *Romanum*, *Tab. Ger.* *chamæmel. nobile* seu *odoratius*, C. B. 2.

Vulgaris nascitur passim, in aruis aliisque locis arenosis. Romana colitur in viridiis. Fœtida inuenitur itidem passim.

O F F I C I N A L I A N A T I V A.

Flores seu tota herba, tam vulgaris, quam Romana.

Vires. *Calf. & sicc.* 1. diger. laxat. mollit, mirigat dolorem, menses & urinam ciet. Eapropter vsus insignis est in dolore colico & hinc pedissequa paresi. Extrinsicus vsuatissimus eius vsus est in paregoricis, emollientibus, maturantibus, cataplasmaris, clysteribus, &c.)

P R Æ P A R A T A.

1. ▽. Ex vulgari.

2. ▽. Ex Romana.

3. ▽. *carminatiua* seu de *camomilla* composita. Vid. 1. 2.

4. *Ol. stillat.* Ex vulgari.

N. *Destil.*

N. Destillant alij cum Terebinthina, unde oleum caruleum.

5. Ol. Stillat. Ex Roman.

6. Ol. infus. Ex vulgari seu cum floribus ac oleo cummuni.

7. ① ex cinere.

8. Syl. de succo camomillæ.

X C. *Chelidonium maius.*

Χελιδόνιον μέγα. *Celidonia*, Brunf. *Chelidonium maius*, Trag. Matth. Fuchf. Cord. hist. Dod. Lob. Cast. Tab. Ger. vulgare, C. B. 1. aliàs, *Hirundinaria*, Germ. *Schwalbenwurtz*, *Schellwurtz*, *Goldwurtz*.

Crescit passim iuxta sepes, adhærescitque muris: Floret primo statim vere & per multam ætatem.

OFFICIN. NAT.

Folia c. floribus, Radix.

Vires. Calfac. & sicc. 3. valide absterg. atten. saporis est acris & amari, bilem per aluum & urinam educit, visum acuit. Hinc conducit in Ictero, obstructione Lienis & Epatis, Vreterum. Radix alexipharmaca statuitur. Extrinsecus oculorum imbecillitati, ulceribus, caterisque affectibus medetur, (Cuius rei gratia sunt, qui succum luteum ex rupto caule manantem, oculis indunt.)

N. Sunt qui ad Icterus sanandum plantis pedum supponunt.

PRÆPARATA.

1. Succus inspissatus

7. Ex herba cum floribus.

3. ① Ex cinere.

X C I. *Chelidonium minus.*

Χελιδόνιον μικρόν. *Ficaria* & *Scrophularia minor* vel 2. Brunf. *Chelidonium*

minus, Trag. Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. (ast. Tab. Ger. *Chelidonia rotundifolia minor*, C. B. 2. Arabib memiten, *Feigwartzennwurtz*, *klein Schellkraut*, *Schorbucktskraut*.

Crescit locis humidis & palustribus. Floret Martio.

OFFICIN. NAT.

Radix & Folia.

Vires. Refrig. & humect. spleneticum est. Usus præcipui, in Ictero, Scorbuto, hæmorrhoidum fluore. Extrinsecus specifice mariscas seu ficos ani curat, dentiumque purredini maximopere subuenit.

PRÆPARATA.

7. Stillat. Ex herba tota.

X C II. *Chermes.*

Kermes, coccum infectorium, Matth. coccus infectoria, Cord. in D. Cast. Tab. Granum & coccus baphica Dioscor. granum tinctorium, Lon. aliàs *Scarlatum*. Fructus est famosissimi fruticis, qui inscribitur *Ilex* in quo coccus baphica, Bellon. *Ilex coccigera*, Clus. hist. Ger. minor coccigera, Dod. *Ilex coccifera*, Cam. *Ilex acculeata cocciglandifera*, C. B. 4. Germ. *Scharlachbeer*, *Rermeakærner*.

Nascitur in Creta, teste Bellon. l. 1. obs. c. 17. vti & multis Hispaniæ locis, in Narbonensi etiam Gallia & Provincia, &c.

Delect. Eligenda sunt grana rubicundo-nigra, integra, vermiculum in se continentia.

Vnes. Cardiaca sunt grana calf. & sicc. adstring. vapores terros discutunt, spiritus vitales reficiunt, parturientibus subueniunt, vulneratis vernis medentur, morbillos erumpere faciunt.

P P P PRÆPAR.

P R A E P A R.

1. *Confectio Alkermes*. Vide Disp.Fit cum & sine moscho illa viris,
hæc mulieribus conuenientior est.2. *Extractum seu Essentia*. Fit è fructibus contulis cum ∇ vel ∇ Rosar. quæ acidula reddita sit guttulis aliquot. spir. \textcircled{P} aut \textcircled{A} ris. *Quercetan.*N. *Scarlatum pannus*, granis hisce,

(quibus tinctus est) admodum celebris est, adhibeturque non modo ad morbillos proliciendos. (Patientes in eum inuoluendo,) sed & ad cor roborandum (Epithemata eo suscepta cordis regioni imponendo,) ut & ad bubones venereos curandos (pannum iis imponendo.) Quin & filo sericeo huius coloris, ad arcendum Erysipelas, locum affectum circumligare vulgo vsitatissimum est.

X C I I I. Cheyri, Keyri, Leucojum.

Classes Leucojorum, C. {
1. Incanum (folio incano) hortense,
2. Incanum maritimum,
3. Luteum folio hirsuto,
4. Luteum folio viridi, }

singula sunt diuersorum generum.

Ex his placet officinis luteum vulgare, C. B. 5. inter Leucoja folio viridi, quod est Leucojum. *Brunf. Cord. in D.* Leucojorum, luteum, *Matth.* Leucojum Luteum, *Fuchsico, Dod. Lob. Cast. Cam.* Leuc. satium luteum, *Clus.* Keyri vel Cheyri, *Lon.* Viola lutea, *Trag. Fuchf. Ger.* Viola petraea lutea, *Tab. German. gelbe Biolen, Nagelveilen.*

Crescit nobis in hortis, raroque sponte prouenit: Floret Aprili, Majo & ultra.

O F F I C I N. N A T.

Flores, seu herba cum floribus, & raro Semen.

Vires. Cordiales sunt, calf. & sicc. 2. attenuant, discut. partium sunt tenuium, extergent, cordiales ac neruini sunt, dolores mitigant, menses cient, secundinam proritant.

P R A E P A R.

1. *Conserua*. Ex floribus.2. ∇ . Ex floribus vel integra planta.3. *Ol.* Ex infusis floribus in oleo veteri.

X C I V. China.

China radix, China radix, *Fragos. C. B. 1.* Cina alias China, *Matth.* China, *Garz. Acost.* Chinna seu Cinna, *Cassalp. Bockenhvurtz.*

Est { Orientalis. Ex regione Sinarum,
China dicta.
Occidentalis. Ex Hispania noua & Peru.

Praefertur Orientalis quæ exterius est colore rubente aut subnigro, interius candicante aut subrubente: & hæc, quò nigrior eò melior. Occidentalis colore est interius magis ruffo.

Vires. Calfac. leniter siccat. 2. substringit, est diaphoretica, diuretica, discutiens, aperiens, Epatica. Hinc conuenit in cachexia, hydropo, paralysi, artbritide, cephalæa, ictero, lue venerea, tumoribus scirrhopis & œdematosi.

P R A E P A R.

Extract. cum ∇ , quod tamen rari vsus: adhibetur crebrius in decoctis, sufficitque \mathfrak{zj} . vel \mathfrak{zij} . pro $\mathfrak{℥ix}$. ∇ x.

N. *Ves*

N. *Vesalius de China librum conscripfit integrum.*

XCV. *Cicer.*

Erbsen, Kücher, Ziser Erbsen.

Satiuum { album.
rubrum.
nigrum.
Syluestre.

Ex his aridetur officinis rubrum satium, cui tamen & album substitui potest.

Videatur *Cicer*, *Brunf. Matth.* (cui & Domesticum, *Cord. in D. Cast. Tab.* *Ciceris* altera species, *Trag.* *cicer nigrum*, *Fuchs.* seu *arietinum*, *Cord. hist.* *cicer arietinum*, *Dod.* *cicer satium*, *Ger. Arietinum*, *Lob.*

Vires. *Calf.* & *sicc. 1.* emoll. absterg. *discur.* diuretica sunt ac lenientia, proin conducibile est eorum decoctum nephriticis. Extrinsecus adhibetur farina in cataplasmatibus, &c.

XCVI. *Cichorium & Cichorea.*

Κικύριον, *Σέπτε* solsequium, intybus, Ambubeia, *Cicorea*, *Cichoren*, *VVegetari*, *Sonnenwendel*, *Sonnenkraut*.

{ Satiuum.
Syluestre flore { caeruleo. vel albo.
luteo.

Ex his stratum satium, tum syluestre caeruleum vel album.

Crescit iuxta vias, floret Junio.

Satiuum dicitur *Cichorium domesticum*, *Matth. Cast.* *Cichorium satium caeruleum*, *Lob.* *Cichorium latifolium*, *Lon.* *seris satium*, *Lob.* *Cichorium satium & album sat.* *Tab. Ger.* *Cichorium satium*, *C. B. 1.* Syluestre

dicitur solsequium, *Brunf.* *Cichorea*, *Trag.* *Syluestris*, *Matth.* *Seris syluest.* *Lob.* *Seris picris*, *Lob. ico.* *Cichorium syluestre*, *Dod. Cast.* *agreste*, *Lon.* *Intybum agreste*, *Cord.* *Syluestre*, *Fuchs.* *Cord. hist.* *Cichorium*, *Tab.* *Hieracium latifolium*. *Ger. ico.* *Cichorium syluest.* siue officinar. *C. B. 2.* *Seris* *πικris* *Dioscoridis.*

OFFICIN. NAT.

Flores, Folia (syluestris potissimum) *Radix* (satiui).

Vires. *Epaticum est nobilissimum frig. & sicc. 2.* (aliis calidum videtur ob amatorem) aperit, diureticum est, attenuat, extergit. *Vfus* precipue in *Epatis obstructione & febribus.*

N. Collectum in sua exaltatione (die festo *Natiuitat. Mariae*,) hemorrhagias sistere creditur.

P R A E P A R.

1. *Conserua.* Ex floribus.
2. *Condit.* *Radix* cum saccharo.
3. *Syrup. simpl.* Ex succo & sacchar. Vide *Dispens.*
4. *compos.* (Cordi.) Vide *Dispens. Norib.*
5. *de cichor. cum Rhab.* Florent. Vide *Disp.*

6. ∇ . Ex foliis & floribus.
7. ∇ *ophthalmica.* \mathfrak{z} . Flores caeruleos (collectos \odot in principio Ω collocato,) q.v. inde vitro orificij angustij, obruta optime & massa panis circumuolutum committe Clibano, vt pinsatur cum pane; hinc exprime ac destilla in MB.

Vires. Conuenit omnibus affectibus oculor. albugini, nubeculae, vngui, suffusioni, catigui, &c. Inungitur palpebrae mane & vespere. *Hartm. in Pract. Poppius in Herbar.*

8. ☉ *Ex planta incinerata. Attenuat, discutit, febrifugum est.*

XCVII. *Cicuta.*

Κόκκον, *Wüterich*, *Shcierling*.

Ex Generibus cicutarum infertur in Officinas, cicuta major, C. B. 1. quæ Cicuta, *Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lob. Lon. Cast. Tab. Ger.* Cicuta major, *Cord. hist. Cam. Vera Gesn. hist.* Cicutaria vulgaris, *Clus. hist.*

Nascitur passim in pratis, locis incultis & umbrosis: Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia & Radix, sed raro.

Vires. *Quamvis summe frigida censeatur, atque inter venenata referatur à Dioscoride; Nihilominus tamen frequens eius usus modernis est in tumore ac inflammatione lienis, succus Emplastro splenico incoctus extrinsecus adhibetur: hinc in inflammationibus aliis, quinimo adhibetur quoque nonnunquam in collyriis.*

Sunt qui radicem fodere monent tempore ☿ ♄ & ☉.

PRÆPAR.

Emplastr. de Cicuta splenetic. Vide lib. 2.

XCVIII. *Cinamomum.*

Cortices sunt arboris cuiusdam exoticæ, eiusdem nominis. German. *Zimmetrinde, Canel.*

N. De Cassia & Cinamomo officinar. quod & Canella dicitur, controuersæ occurrunt opiniones. Sunt enim qui inter se confundunt & pro vno & eodem utrumque habent Cortice, solisque nominibus differre, non re ipsa: alij ex sola loci

varietate ea distinguunt, non ex diuersa specie arboris: alij ex vna eademque arbore utrumque desumi volunt, cuius corticem exteriorem & crassiorem appellant cassiam ligneam seu odoratum; interiorem & tenuiorem Cinamomum. Alij diuersæ speciei arborum cortices faciunt, inter quos tamen maxima similitudo intercedat, adeo ut Cassia arbor in Cinamomi arborem transplantari facile queat: Hæc opinio Galeni. Recentiores prima ut plurimum subscribunt opinioni, Cinamomumque officinarum vulgo canellam dictum, legitimam antiquorum cassiam ducunt. Et in compositionibus Græcorum Xylocassiam, i. e. cassiam ligneam seu odoratam postulantibus, canellam nostram esse adhibendam. Si qua tamen distinguere libet, crassiorem cassiam appellare licet, tenuiorem Cinamomum, differentia suborta à differente loco natali arborum.

Videantur supra hæc re Garzias ab H. lib. 1. arom. hist. cap. 15. Ioh. Manard. lib. 8. Epist. 1. Matthioli. in Dioscor. Caspar Bauhinus Theatr. Botan. lib. 1. 1. 3. & sim.

Frequentes sunt hæc arbores in Zeylan, Cinamomumque præbent præstantissimum, ignobilius è contra Cinam. præbent arbores in Prouincia Malauar. & Iaba seu Iaua.

N. Roseum siue ex cinereo vinosum colorem contrahit Cinamomum, ex solis calore, cui cortex detractus exponitur: non probe idem paratus, candicans siue cinerei coloris fit, nimis vero ardoribus solis combustus niger.

Delectus Probatum subrubum odoris fragrantissimi, saporis subastringentis & acris.

Vires. Calf. & siccatur, aperit, discutit, menses & partum accelerat, omnia viscera

vera spiritusque singulos recreat, concoctiones innuat. Hinc usus eius frequentissimus est in virium imbecillitate, hypochondria, capitis, ventriculi & uteri affectibus frigidioribus.

P R A E P A R.

1. *Confect. Cinamom.*
2. ∇ . *Cinamon.* Fit l.c. ut ex aliis aromaticis. Vide l. 2. vel uti in destillatione olei.

3. *Tinctura seu Extract.* cum ∇ \square *sato.*

4. *Elixir. Cinam.* Fit ex Tinctura cinamomi, additis & croci & santali citrini Tincturis.

5. $\circ\circ$ Elicitur una cum ∇ beneficio destillationis, l. 2. ff. j. dat ζ ij. vel ζ iiij.

Nota de menstruo: Alij adhibent solum vinum; alij vinum cum ∇ mistum: quibus quoque \square aut \bigcirc commune insuper admiscunt.

6. *Sal.* Ex fecibus incineratis elixiuatur.

7. *Balsamus.* Ex ol. Cinam. ol. Nucist. depurato. Tingitur bolo Orientali vel pulvere Cinamomi.

8. *Syrup.* Vide Dispens. Norib.

9. *Magisterium.* Extrahitur cum ∇ opt. ac precipitatur cum ∇ font. vel cum ∇ Cinam. primum stillanti, retinetque colorem Cinamomi.

10. *Spec. Diacynam.* Vide Dispens.

X C I X. *Citrus.*

Malus Citria, Medica, Assyria. Arbor est exotica per totum annum virens, fructumque tenellum cum maturescere simul ferens.

Videatur Citrum, Brunf. Citria, Trag. Citrus. Tab. Cord. hist. Malus Medica, Math. Cord. hist. Dod. Lob. Malus ci-

ttia, Gesn. hort. Lon. Cast. Clus. hist. Cam. Citria & mala Medica, Bellon. Malus Medica, C. B. 1. Citronbaum.

Dicitur Medica & Assyria quia apud Medos & Assyrios & imprimis apud Persas frequens est. Hinc in Italiam translata fuit, postea & in Hispania in usum devenit, ut nemora & campos occupavit hodie. Colitur & apud nos in hortis.

O F F I C I N. N A T.

Fructus seu *Poma Citrea*, (citrea) Cortices & Semen raro Flores. Fructus variant magnitudine: quædam sunt majora instar melo-peponum: alia minora & vulgaria: alia Limonum magnitudine. Sic alia prælonga sunt, alia rotundiora: in officinis vltatoria sunt minora, utpote quæ carnosiora, tum quoque majora.

Vires. Citrium malum (cum cortice ac carne) alexipharmacum putatur cuiuslibet veneni, resistit putredini morbisque malignis, lumbricos fugat, diaphoreticum est. Cortex calf. 1. sicc. 2. (aliis calef. & sicc. 3.)

Caro: seu pulpa refrigerat & humectat & hinc succus expressus.

Semen: calf. & sicc. attenuat, digerit, abstergit, lumbricos fugat.

P R A E P A R.

1. *Condit.* 1. *Poma* maxima condiuntur nondum satis matura, cum cortice ac carne incisa, nucleis exemptis: dicuntur nostratibus Citronat.

N. Eodem modo condiuntur & minora, integra vel in taleolas dissecta.

2. *Cortices.* Condiuntur post mitigationem amaroris, cum saccharo.

3. *Flores cond.*

2. *Conserv.* 1. ex floribus.

2. Ex medulla, remotis sc. corticibus ac semine succoque expresso.

3. *Confect. cortic.*

N. *Maiores cortices conditi dicuntur.*
Citrinat. confect.

4. ∇ . Ex corticibus.

5. \odot itidem cum ∇ ex corticibus extillat.

N. *Potest & exprimi oleum ex semine; sed minus id usitatum.*

6. *Succus.* Ex carne exprimitur & referuatur pro usu, diciturque nonnullis Vinum citri, præcipue si cum tantillo sacchari sit fermentatus.

7. *Syr. acetositis citri.* Ex succo & saccharo.

Syr. citri simpl. Ex cortic. Vide Disp. *Compos.* Vide Disp.

8. *Morsuli citri.* } Vide suis
Citri laxativ. } locis

9. *Balsamus* Ex ol. stillat. & ol. Muscato.

10 *Electuarium de Citro solutivum.*

C. Citrullus.

Cochlearia Zæffelkraut, { folio subrotundo, cochlearia Batavica, quæ
 usualis.

Vocatur Cochlearia, Dod. Cam. Ep. *in hypochondriacis morbisque Tartareis*
Matth. Tab. Cochlearia Batava, Lob. *prima regionis, ac præcipue in Scorbuto,*
 Cochlearia fol subrotundo, C. B. 1. *in cuius medicatione celeberrima audit,*
 Crescit apud nos in hortis loca *adhibeturque intus & extus in gargarismis,*
 amans palustria rigua & umbrosa: flo- *(ad putredinem gingivarum) bal-*
 ret April. Maio. Videlicet anno secun- *neis, ad arrium resolutionem.*
 do à satione.

OFFICIN. NAT.

Folia, quæ recentiora abhibere præstat, quam siccata, quippe Sal volatile quo potissimum efficacia sunt arescendo evanescit.

Vires. Calf. & sicc. 2. ad 3. aper. est *spfenetica, ac diaphoretica, fixos ac erudos humores spirituales ac volatiles red-*
dens, putridinique resistens. Hinc utilis

Citrullus, Anguria, Angurien. Species Cucumeris est, fructu rotundo, quo reliquas cucumeris species quoad magnitudinem exuperat.

Dicitur Citrullus, *Trag. Lon. Tab. officinar. Lob. Ger. Anguria, Matth. Dod. Cast. Cam.* Cucumer vel cucumis citrullus, *Fuchsf.* Anguria citrullus dicta, C. B. 1.

N. *Variat Corticis colore, qui aliis viridis seu herbaceus, aliis candidus maculis aspersus: Caro aliis rubens & dulcis, aliis candida: Semina colore nigro, rubro, fulvo.*

OFFICIN. NAT.

Officinis tantum Semen in usu est, idque adhibetur vel cum, vel sine cortice.

Vires. Est ex 4. sem. frig. maj. Refrig. itaque & hum. ad gr. 2. est Diureticum, aperiens, acrimoniam obtundens. Inseruit præcipue Renibus ac vesica abstergendis, bilis ac sanguinis astui compe-
 scendo.

PRÆPARATA.

1. *Conserv.* Ex fol.

2. ∇ stillat. Ex fol. recent.

3. *Syrup.* Ex succo & saccharo.

4. \odot volatile. Ex succo.

5. *Spiritus* è foliis fermentatis.

6. *Succus* expressus.

N. *Recens maxima est efficacia ad arcendum oris ac gingivarum putredinem, etiam post morbillos. Inspissatus loco*

loco Extracti assumi poterit.

CII. Lignum Colubrinum.

Lignum serpentarium, Clematidis Indica, C. B. 2. Ligni colubri alterum genus Garzia, Trag. & Clus. Lignum colubrium, Tab. Germ. Sriesholz.

Aduerhitur ex Insula Zeilan. Eligendum amarum, non cariosum, graue.

Vires. Calidum est ac siccum (ut amaror arguit) abstergit morfibz serpentum, aliisque venenis medetur: bilem ac mucilaginem per aluum (nonnunquam etiam per vomitum educit) unde usus precip. est in febribus intermitentibus, tertiana ac quartana: Lumbricos necat & fugat. Extrinsecus maculas cutis abstergit.

PRÆPARATA.

Extractum, cum ∇ Centaurei vel simili factum.

Dosis ad \mathcal{Dj} .

CIII. Contrayerua.

Contrayerua, radix yerua, radix contrayerua, radix bezoartica, alexipharmaca, radix contra venena, rad. venenis aduersans. Monar. Siffert vurtz.

Ex radix Iridis vel Cyperi radicibus non absimilis, quæ annis abhinc aliquot ex Prouincia Peruana. Charcas apportari cepit.

N. Bauhinus facit speciem Cyperi, vocatque Cyperum longum, odorum Peruvianum.

Eligatur densa non cariosa, quæ aromaticum quiddam sapiat, cum acrimonia coniunctum.

Vires. Calida est 2. alexipharmaca & sudorifera, præstantissimumque remedium aduersus omne venenum, cui

inscunq; sit generis (excepto \mathcal{V}) vomitione id reiiciens, aut per sudores euacuans. Sed & amatoria pocula ex puluere hausto, educi ferunt. Venris etiam animalia pellit. Quin & in peste felix eius usus compertus est, ut & morbillis nigris.

Dosis \mathcal{Zj} .

CIV. Consolida.

1. Consolida seu cons. maior. Vid. *Symphytum*.
 2. Consolida media. Hæc huius loci.
 3. Consolida minor. Vide bellis hortensis.
 4. Consolida Regalis. Vide Calca-trippa.
 5. Consolida aurea & sarracenicæ. Vide *Virga aurea*, *Süldengünset*.
- Est { flore cæruleo. Hæc usualior.
flore purpureo. Hæc rari usus.
- Dicitur Consolida media. Brunf. *Marth. Fuchsf. Tab. Cast.* Consolida media prima, *Tab. prunella cærulea, Trag. Bugula, Dod. Clus. hist. Ger.* Bugula & prunella quibusdam, *Lob. Symphytum medium, Lon.* Consolida media pratensis cærulea seu N. I. C. B.

Crescit in locis campestribus: floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Herba.

Vires. Viraque vulneraria est, tam intrinsecus quam extrinsecus adhibita: confert & ictero, Epatis obstructioni, vrina retentioni, herniis, &c. Brenibus: ut eacum *Prunella* & figura ferè conueniunt, ita & viribus.

CV. Corallina.

Brady Salsedon. Dioscor. Muscus marinus,

rinus, *Matth. Cord. in D. Cast. Tab. Corallina*, *Lob. Lon. Muscus maritimus* feu corallina officinarum. *C.B. Germ. Meermoos, Corallenmoos.*

Inhæret scopulis & piscium testis
corallisque, eo sane modo, quo muscus
arboribus innascitur, optimaque est,
quæ à corallis detrahitur.

Eligatur colore cum sicca est, sub-
rubefcente, salso sapore, odore concha-
rum marinarum simili.

Vires. Refrig. & sicca. astringit. in-
crassat, ut lumbricos necandi & expel-
lendi celeberrima est, intus & extus
adhibita.

Dosis ad ℥j.

PRÆPAR.

Magisterium: fit cum lixiuo forti.
Vid. l. 2.

Dosis ʒ.

CV 1. *Coriandrum.*

Κόριον ή κορίαννον, *Dioscor. Coriandrum*,
Germ. *Soriander*.

est { 1. Maius. Hoc vtile solum.
C. B. { 2. Minus testiculatum } inusi-
{ 3. Sylvestre. } tata.

Insignitur Coriandrum, *Brunf. Trag.*
Fuchf. Matth. Cord. hist. Lon. Lob. Cast.
Cam. Tab. Ger.

Colitur nobis in hortis, solo gau-
dens pingui: floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Semin granosum, quod primum halitum grauem halat, resiccatum autem suauem acquirit odorem.

Vires. Stomachicum in primis est, calf.
& sicc. ad gr. 3. astring. Hinc celeberrimum in laxitate stomachi, si post cibum assumatur, claudit enim ventriculum,

*exhalationefque fupprimit , quo minus
caput grauent , ructufque producant.*

PRÆPARATA.

1. *Preparatum.* Præparatur sem.
Coriand. maceratione per noctem in
+ dein exsiccat.

N. Preparatio hac fit ob castigationem qualitatis noxiae (crudioris & excrementitiae) quam tamen & arescentia amittit.

2. *Confectio.* Ex semine præparato.

3. ∇ *stillat.* Rari v fusest.

4.000 cum Δ ascendit.

CVII. *Cornus.*

Cornus, Germ. *Cornerbaum.*

Est { Mas { hortensis, fatiua. *Hæc vfu-*
 { *alis*
 { syluestris.
 fœmina, *Lon.* sylueft.

Indigitatur Cornus, *Brunf. Trag.*
Matth. Lon. Ded. Lob. Cornus mas,
Tab. Cornus sativa & mas *Cord. in D.*
 Cornus vulgaris mas, *Clus. hist.* Cornus
 hortensis mas, *C. B. 1.*

Florere incipit initio veris : colitur
in hortis.

OFFICIN. NAT.

Fructus, rarissime Folia.

Vires. Viraque refrigerat, exiccant, astringunt, conspiciant. Hinc conveniunt precipue in diarrhæa & dysenteria. Exhibentur fructus exiccati & pulverisati ad ℥j.

Р Р Е Р А Р.

1. Condit. fructus, cum saccharo, l. a.

2. *Rod. de Cornis.* Vide Disp. August.
Ex succi pulpæ, p. ij. & sacch. p. i.

CVIII. *Corylus & Auellana.*

Corylus Hæsel- staudæ	{	Nostras	{	fructu albo minore. <i>Corylus vulgaris.</i>	{	fructu maiore { rotundo maximo. oblongo rubente.
				fatua		
				sylvestr. fructu est minore, albidior & rotundior quam		
				nativa.		
{	Peregrina	{	Humilis	{	Nostratibus non sunt vsuales.	
			fructu purgatrice Monard.			
			fructu osculi trisidi, &c.			

Ex his officinis in vsum veniunt no-
strates coryli, quæ describuntur ab au-
thoribus vel coryli vel auellanae titulo,
&c. Præfertur autem fructus oblongus
rubens in compositionibus.

Solo gaudet arenoso & opaco.

OFFICIN. NAT.

Lignum, Fructus & Viscum.

Vires Lignum per se raro officinale
est, nec asservatur, nisi pro parandis
inde spiritu ac oleo. Adhibetur autem
corylus sylvestris.

N. 1. *Serpens virgâ corylinâ percussus,*
torpescit; unde coniectare licet, facultate
antiserpentina corylum abundare.

N. 2. *Faciunt ex eiusdem coryli sylve-*
stris bifido furculo virgulam quâ metalla
scrutantur.

Fructus (auellanae καυκάσια) exhi-
bent vsui medico, nucleum, putamen &
membranulas.

Nuclei teste Gal. l. 7. simpl. med. plus
habent essentiaë terrestris ac frigidaë,
quam iuglandes. Venenis resistunt ve-
nenosorumque animalium ictibus,
(cum ruta & ficubus impositi) ex mulso
hausti veteri tussi medentur, utinaë ar-
dorem mitigant.

Putamen crudum in puluerem con-
tritum astringit, obstruit ac proin sistit
diarrhæam, albaque scæminarum pro-
fluua. Quercetanus specificum anti-

pleuriticum inde facit, cum corall. rub.
& mandibul. lucij.

Membranula nucleum ambientes
eiusdem cum putamine sunt faculta-
tis, eidemque præferenda. Eliguntur
rubei coloris.

PRÆPAR.

Ex ligno. 1. *Spiritus* fit per Retor-
tam igne nudo ex sarmentis exiccatis.
2. *Oleum* fit itidem per
Retortam vel per descensum.

Vires. Vim habet utrumque calfa-
cientem, incidentem, anodynam, antiepi-
lepticam ac præcipuè odontalgicam.

N. Sunt qui oleum hoc oleum ligni
Heraclei, Rulando dictum autumant,
nec sine causa quidem. Etenim non mo-
do viribus iisdem celebre est, quas Ru-
landus oleo suo Heracleino adscribit, sed
& nominis rationem habet. *Corylus*
enim, quia primum ex *Heraclea Ponti*
in Graciam translata fuit, heracleotica
seu pontica dicta est, adeoque & nucs
heracleotica.

PRÆPAR.

Ex auellanis. *Oleum expressum.*

Vires. *Articulorum dolores inunctum*
iuuat.

N. Ingrediuntur etiam nonnullas
compositiones alexipharmacas, ubi præ-
ferenda fatua rubescentes, & præcipuè
oblonga, ut dictum supra.

C I X. *Costus.*

Κόστος { verus { dulcis } hic officinalis,
 Cost- { amarus }
 vuriζ. { falsus { Costus, Matth. & Lon. i. e. Panax costinum, pseudocostus.
 { Costus Hortensis minor. Gesn. i. e. Ageratum.
 { Costus Horror. Lob. i. e. Mentha.

N. Officina in dulcem & amarum diuidunt, quam diuisionem non diuersa speciei, sed diuersa ætatis Clusius non sine causa statuit. Nimirum recentiores herba dulciores, cum vetustate tandem amarescunt.

Costus verus officinis nostratibus vsitatus, est cortex extrinsecus cinereus, intrinsecus candidans, C. B. 6. & 7.

Eligatur costus recens, densus, odoratus, subamarus, non cariosus.

Costus, amarus dicitur, Helenij Comagenij radix, Cord. in D. Costus comagerius, adulterinus officinar. Lob. costus officinar. amarus, Lon. Cast. Tab. costus amarus officinarum seu Helenium comagenium Dioscoridis, C. B. 6.

Costus dulcis dicitur, Costus dulcis officin. Lon. sed adulterinus, Tab. costi pharmacopolarum species major, Cam. in Matth. costus dulcis, Cast. costus dulcis officinar. centaurio magno cognatus, C. B. 7.

Vites. Stomachicus, Epaticus, Vterinus ac Nephreticus est calfac. sicc. 3. ætem. aper. disc. Hinc conuenit in colica, obstructis mensibus & urina, hydropo, paralyti.

P R E P A R.

1. *Costinum* Mesuæ. Vide Disp. (excost. p. ij. cass. lig. p. i. maior. p. viij. cum vino ac oleo sesamino.)

N. Febrilem rigorem spina inunctum mitigat.

2. *Pilula marocostina.* Vide 1. 2.

3. *El. caryocostinum.* V. D. N.

C X. *Crocus.*

Κρόκος, Planta est bulbosa, florem primo autumnno ferens purpureum, cuius flammea stamina (instar antheræ) officinarum *crocus* est. Germanicè *Saffran*.

Ex croci generibus plurimis officinal. est crocus satiuus, C. B. 1. Huius differentiam officinæ faciunt à natali loco, vnde Crocus Viennensis, i. e. qui ex Viennensi agro ad nos transportatur, vbi optimus hodie nascitur. Orientalis qui ex locis orientalibus ac præcipuè ex Sicilia transmittitur, in cuius monte (caryco nomine) omnium præstantissimus prouenire censetur. Vulgoque dicitur Crocus de Aquila. Germ. *Zinnmat, Saffran*.

Videatur Crocus, Brunf. Trag. Fuchs. Dod. Cord. Lon. Tab. Crocum, Matth. Cast. hortense, Cam.

Eliguntur crocus flexilis, tritu difficilis, albicantibus nonnunquam filamentis permixtus. Reprobatur è contra saturato nimis colore rubro, odore fugaci, utpote qui vel cnicifloribus, vel carnis bubulæ salitæ villis adulteratus.

N. Adulteratio croci adco impostoribus communis est, ut Emporiis nonnullis visum sit, certos deputasse inspectores, quorum

quorum iudicio ut bonus crocus venalis pronunciatur: ita adulteratus Neptuno, Vulcanove, non citra venditoris ignominiam consecratur. Cuius rei exemplum hic Francofurti aliquot abhinc retro annis observare licuit.

Vires. Cordialis est ac pulmonicus (ut quoque anima pulmonum audiat) vicerinus, & hinc ceteris visceribus familiaris, calf. 2. sicc. 1. aper. dig. emoll. anodynus est, somnum conciliat, menses ac fœtum pellit. Usus eius frequens in syncope, Apoplexia, gutta 1. ac 2. tinctura aspergitur lingua (in hystericis affectibus, in iëtero in peste aliisque venenosis morbis, in asthma (cum ol. amygd. dulc.

Dosis ad ʒj.

Extrinfecus collyriis, & sim. adhibetur.

NB. Vfus eius immodicus (scil. ad ʒij. vel iij.) lethalis censetur.

P R A E P A R.

1. Species diacurcuma. Vide Disp.

2. Tinctura seu essentia croci. R.

Croci Orient. q. v. extrahe cum V opt. abstrahe. lentiss. Δ ad consistentiam debitam. Begun.

N. 1. Alij extrahunt cum V is cordialibus, e.g. rosarum, jisque guttula una ac altera spir. ☉ i vel ☿ is roboratis: alijs fit extractio cum V vitis vel sero lactis.

N. 2. Spiritus vini abstractus croci facultate est impregnatus, idcirco cum successu in usum Medicum venire poterit.

N. 3. Alij collocant crocum cum syndone in alembicum, destillantque V ex cucurbita tantisper, donec colorem ex croco susceperit. Tinctum V iterum destillant ad remanentiam Tinctura in fundo. Tenzel.

3. Extractum.

4. Oleum croci Mesna, (compos.)

5. Ol. Stillat. paratur ut olea reliqua ex floribus, sed rarissimum est, ob nimios scilicet sumptus, quos requirit. Nimirum ex croci lbj. vix ʒj. elici poterit.

N. 1. Alij R. croc. or. lb. s. Terebint. ʒj. V. opt. q. s. destillant, sapiusque à fecibus cohobant. Alij R. croci opt. lb. s. terunt grosse ac admiscunt ☿ i, ☉ is, an. ʒss. circiter, cum albumine oui F. pulmentum, cui superfundunt Vm. fontan. calidam (vel Vm mellis) digeruntque dies (3. 4.) Hinc destillant per X ex cinere. Medull. destill.

N. 2. Habet potestatem prosternendi appetitum.

6. Trochisc. de croco. Vid. Disp.

7. Elect. de ovo dictum. Gûlden Ey. Vid. Disp.

8. Empl. oxycroceum. Vid. Disp.

C X I. Cubebe.

Koukila, Cubebe, Quabebe, Cubebæ vulgares. Germ. Cubeben.

Fructus sunt aromatici exigui, forma & magnitudine piper rotundum referentes, nisi quod ferè paulum sint minores. Adueruntur ex Iana, Ind. or. Insula, ubi decoquuntur antequam vendantur, ne apud externos plantentur. Præstant maiores, recentes, ponderosæ.

Dicuntur Cubebæ, Garz. Acost. Fragos. Cord. hist. Cast. Tab. Matth. (qui eas nec Arabum cubebas, nec Galei carpesium demonstrat.) Cubeb. vulgares, C. B. officinarum. Lob. carpesium Græcorum, Lon.

N. Quid sint cubeba, ambigitur: alij ex genere piperis & nigro piperi conge-

neres esse, Theophrastoque piper rotundum dici volunt: alij viticis fructum (ac facultates sunt diuersæ) existimant: Syluaticus, Rusci fructum: alij carpesium Galent statuunt. At Casalpinius, Amomi legitimi fructum pronunciat. Est autem fructus racemosus arboris cuiusdam malo vulgari similis, foliis vero piperis, sed angustioribus.

Vires. Calfac. 2. completè sicc. 3. compl. atten. disc. viscera omniaroborant atque inprimis caput, adeoque plurimè inserviunt compositionibus.

PRÆPARAT.

1. Confect. c. saccharo.
2. Ol. Cubebæ still.
- N. Rari vsus est.
3. Spec. Diacnbeb.

CXII. Cucumis.

Cucumis (*olus*) in genere notat omnes fructus horarios, adeoque sub eo comprehenduntur

{	Cucumis officinarum qui vel	Satiuus, <i>h. loci</i> .
	Pepones,	Sylvestris Afininus.
	Melones.	Vide in class.
	Anguriæ, &c.	4. Elaterium.

Dicitur cucumis satiuus, *Brunfels. Matth. Euchf. Lon. Cast. cucumis, Trag. Tab. cucumis vulgaris, Dod. Ger. cucumer satium, Cord. in D. cucumis satiuus & esculentus, Lob. cucumis satiuus vulgaris, C.B.I. German. Suckern.*

Suntque cucumeres vitides, albi, longi, recurui, læues, asperi.

OFFICIN. NAT.

Solum Semen, cui & ipsi Fructus addi possunt: hi enim etsi sint culinares; attamen cibum præbent medicamentosum.

Vires. Semen (seu nuclei) ex numero est famosior. 4. sem frig. maj. refriger. (præcipuè si aridum sit, aliàs) in fine grad. 1. absterg. aperit, urinam ducit, vsusque creberrimi est in emulsionibus antipleuriticis, antiphreneticis, & similibus.

Ipsa cucumerum substantia refrigerat & humectat. Excrementum est succi, adeoque non nisi robustioribus ventriculis edenda, idque non sine corrigentibus condimentis v.g. pipere, & sim.

PRÆPARATA.

Cord. fructus: cum ☉.

CXIII. Cucurbita.

{	fatua Kürbs. <i>Huius loci.</i>
	sylvestris. <i>Vide Colocynth. class. 3.</i>

Nomen cucurbitæ omnibus familiare est Botanographis.

N. Cucurbita fatua etsi variant magnitudine, colore, figura; conueniunt tamen natura & viribus.

OFFICIN. NAT.

Solum Semen & nonnunquam Folia.

N. Semen recensetur in numero seminum 4. frig. maj. venitque in usum cum vel sine cortice.

Vires. Cucurbita conuenit viribus cum cucumere tam in qualitatibus carnis quàm in seminis facultatibus. Folia recentia puerperarum mammis adhibita, monente Matthiolo, lac imminuunt.

Δ. scillas. Ex fructu immaturo.

Vires. Fert opem omnibus inflammationibus externis, oculorum, aurium, podagricis, &c. Intrinsecus quoque mirabiliter æstum corporis mitigat.

N. Succus

N. Succus expressus idem facit.

CXIV. *Cuminum.*

Cuminum } *fatium; quod hic.*
 } *pratense: quod carum.*

Kümmel, *Cuminum fatium*, *Brunf.*
Trag. Matth. Cord. hist. Lob. Cast. *Cu-*
mini sylu. 1. genus, Diosc. *Cyminum,*
Cord. in D. Tab. fatium, Cam. *Cumi-*
num semine longiore, C. B. 1. aliis cu-
minum domesticum, Romanum.
Germ. Kümmich, Kümmel, Römisch.
Kümmel, Pfeffer Kümmel, Krankkü-
mel, Gartentümmel.

OFFICIN. NAT.

Solum Semin.

Vires. Calfac. & succ. 3. atten. diger.
resoluit, status discut. utile in Colica,
Tympanit. vertigine.

PRÆPAR.

1. ∇ . *Ex sem. l. a.*
2. *Ol. stillat. Ex sem. l. a. cum ∇*
elicitur.
3. *Spec. Diacumin.*

CXV. *Cupressus arbor.*

Kύπαρισ } *Mas.*
 } *Fœmina.*

Arbor est procera conifera, foliis
pinum æmulans, iisque semper viri-
dibus.

Provenit copiose in Insula Creta,
Insignitur Cyparissus, Cast. Cupres-
us, altera siue syluest, Ger. Cupressus,
Matth. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cam.
Tab. C. B. 1. Germ. Cypressbaum.

OFFICIN. NAT.

Lignum, Fructus & raro Folia.
Vires. Lignum, refrigerat, siccatur,
astringit.
Fructus & Folia calfaciunt parum,

exiccant ad gr. 3. astringuntque valide,
proin usus sunt precip. in hæmoptysi, di-
arrhæa, dysenteria. Commendantur iti-
dem in mictione involuntaria ut & in
herniis curandis intus & extus, adhibita.

N. Fructus siue conos, nuce vel pilu-
las Cypressi officina nominant: aliis
Gabula dicuntur.

CXVI. *Cupressus herba.*

Chamæcyparissus, Trag. Fuchs. Cord.
Lon. Santolina altera, Dod. Abrota-
num fœmina, Brunf. Matth. Lob. Cast.
Clus. hist. Tab. Germ. Cam. Cupressus
herba, Cord. in D. Santonicum minus,
Cord. hist. Polium. Theophrast. Dioscor.
Abinthium marinum, Tab. Abrota-
num fœmina foliis teretibus, C. B. 1.
Germ. Gartencypresz.

Colitur in hortis nostratibus.

OFFICIN. NAT.

Herba seu folia, sed raro.

Vires. Convenit qualitatibus cum
abrotano, ususque precipui est in ob-
struct. Epatis Renum & Preterim: cu-
rat Icterus, lumbricos fugat. Extrin-
secus subuenit morbis uteri, &c.

CXVII. *Curcuma.*

Cyperus Indicus, Diosc. & Curcu-
ma officinar. Cord. hist. Clus. coroll. Lon.
Lob. Tab. Curcuma longa & rotunda,
Cord. hist. Cyperus altera, radice lu-
tea, Cast. Terra merita, Ruel. Lob. Cy-
peri genus ex India, Matth. Fuchs.
C. B. 1.

Est radix officinalis exotica, non
tantum croceo colore apparens, sed
& eodem colore alia tingens. Germ.
Gilbvrurtz, Geelsuchtrvurtz.

Duplex communiter est, aliquan-

do longa, aliquando radice rotunda:
Hæc multò acrior priori existit, atque
cum zinzibere sæpe affertur.

Vires. *Dicata est vesica biliaria, Stomacho & Epatis, hinc & Lienis ac Vtero. Calf. & sicc. 2. amara est: absterg. atten. aper. dig. disc. menses mouet. Usus in Ictero, Hydrope, cachexia.*

PRÆPAR.

Species Diacurcuma.

N. *Rectius spec. diacrocni nominantur, quippe curcumam non admittunt.*

CXVIII. Cuscuta.

Est { Major, colore scil. albo vel rubro:
Hæc huius loci.
Minor. Vid. Epithem. in purgantibus.

Dicitur Androsaces vulgo cuscuta, *Trag. Matth. Lon. Cast. Clus. Ger. cassutha, Lob. Tab. cassutha, Fuchsf. Dod. major, C. B. 3. Germ. Filtzkrant*

Floret Iunio, Iulio, Augusto: adnascitur passim herbis & fruticibus. potissimum vrticæ, lino, lupulo.

OFFICIN. NAT.

Folia seu herba tota villosa cum floribus, præcipuè lino adnata.

Vires. *Splenetica inprimis est, hinc epatica, Calfac. 1. sicc. 2. abstergit, substringit, aperit melancholicum humorem corrigit, utilis in scabie, ictero nigro, obstructionibus, epatis ac lienis.*

PRÆPAR.

Δ stillat. Ex tota planta.

CXIX. Cyanos.

Baptisecula, Blaptisecula, flos frumenti, Kornblum, bavv Kornblum.

Cyanos	{	Syluestris	{	Montanus.	
		Segetum:		Hic officinal.	
				Repens	Latifol.
					Angustifol.
		Hortensis.			

Dicitur Cyanus, *Lon. Cyan. flos, Dod. Cyanus major, Matth. Cast. Cam. Cyanus fylu. Fuchsf. Cyanus vulgaris, Lob. Ger. Cyanus cæruleus, Tab. Baptisecula, Trag. Lychnis agria & flos frumenti, Brunf. Cyanus segetum. C. B. 2.*

Crescit passim inter segetes: Floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. *Frigeſ. & sicc. 2. astring. utilis in oculor. inflammationibus, rubedine, lippitudine, doloribus, in hydrope (propinant.)*

PRÆPAR.

▽. stillat. ex flor.

CXX. Cyclamen.

Vocatur Cyclaminus, *Matthiol. Cord. in D. Lon. Tab. Cyclaminus major, Cast. cyclam. rotundus, Fuchsf. cyclaminus orbicularis rotundifolius, Dod. Cyclamen officinar. orbiculato-folio, panis porcinus & Arthanita, Lob. Cyclaminus flore odorato, Clus. hist. Cyclaminus vulgaris & cyclam. prior, Matth & Lob. Lugd. cyclam. æstivus vulgaris, Cam. Cyclamen*

men orbiculato fol. *Ger.* Cyclaminus minor & Umbilicus terræ, *Trag.* Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascente, *C.B.I.* Germ. *Erdapffel, Savvbrodt.*

P R Æ P A R A T A.

Radix colligenda autumnò,

Vires. *Calfac. & sicc.* 3. potenter incidit, aper. absterg. *Errhinum* est. *usus* præcip. in obstructis mensibus, in pellendo fœtum mortuo, in fœtero, in calculo expellendo, strumis ac tuberculis discutendis. Interne cauto opus habet, magisque externò *usui* præstat.

P R Æ P A R A T A.

Succus. Hinc cum raro nostratibus in præputi sit, eius locum subit decoctum.

Vnguentum de Arthanita maius. *V.D.*
minus. *V.D.*

C X X I. *Cynoglossum.*

Κυνόγλωσσον, Cynoglossa, lingua canina, Hundszung.

Diuersorum est generum è quibus magis officinale, quod indigitatur cynoglossa maior, *Cord. in D.* cynoglossum vulgare, *Matth. Lob. Cast. Clus. hist.* cynoglossum, *Dod. Tab. Ger.* officinarum, *Lon.* cynoglossum maius vulgare, *C. B. 2.*

Crescit passim locis aridis ponè muros: Floret Iulio.

O F F I C I N. N A T.

Flores, Folia ac Radix, sed raro.

Vires. *Refrig. & sicc.* 2. incrass. lenit, obstruit. *Usus* in sistendo fluxu alui, in gonorrhœa, ac catarrhis incrassandis: Verum quia in numero herbarum est, quæ marcosi virulentis suspecta sunt, rarissimè à practicis adhibetur.

P R Æ P A R.

1. *Pilul. de Cynoglossa.* Vide *Disp.*

N. Somnum conciliant, narcotica sunt.

2. *Vnguentum,* Vide *Disp.*

C X X I I. *Cynosbatus.*

Κυνόσβατος, κυνόσποδος, Rosa syluest. aruensis, canina, rubus caninus, wilde Rosen, Feld Rosen, Heckrosen, Heiderosen, Hainhecke.

Varia comprehendit genera. Est enim rosa syluestris, vulgaris, flore odorato incarnato, flore maiore & rubente, &c. Verum in officinas non nisi rosa syluestris, flore odorato incarnato infertur.

Insignitur *Cynosbatus, Diosc. Lon.* cynosbatus procerior & cynorrhodos, *Cord. in D.* sentis canis & cynosbatus, *Brunf.* Rosæ syluest. 1. genus, *Trag.* Rosa sylu. *Matth. Dod. Tab.* odora, *Ger.* Rosa syluest. vulgaris, *Cam. epit.* Rosa canina odorata & syluest. *Lob.* Rosa canina, *Cam.* Rosa syluestris vulgaris flore odorato incarnato, *C. B. 1.*

N. Matthiolus cynosbaton & cynorrhodon inter se differre statuit. Verum non male faciunt qui pro vno & eadem frutice habent.

Crescit in dumetis, floret Maio.

O F F I C I N. N A T.

Flores, fructus, Spongia, & interdum Radix.

Vires. Flores conueniunt in qualitatibus cum rosis satinis, sed maiorem vim astringendi habent, proinde in profluuiò vieri rubro & albo summe sunt æstimationis.

Fructus. (*Hagenbutten*), ut *Lithoratriptica* maximopere commendantur, in qua tamen excellunt exempti arilli.

Spongia. (*Bedeguar, Schlaffkuntz, Schlaffapfel, itiaem* calculosos effiacissime

cacissimè iuuare dicuntur & imprimis qui inibi continentur lapilli ac vermiculi, quorum hi quoque ad lumbricos fugandos commendantur. Potest propinari spongia puluerisfata vel aliter præparata.

Radix. Spicula ex corpore extrahit (imposita.)

P R Æ P A R.



1. *Fructus Cynosb. conditi.*

Condiuntur abrasa lanugine & exemptis prius arillis.

2. *Rob. Cynosbati. Fit leg.c.*

3. *Spiritus s. ∇ spongiarum, quæ sit:*

Glomi mense Majo vel Iunio collecti inciduntur, remotisque vermiculis aut aliis insectis inibi reperibilibus, digeruntur cum ∇ & fermento ut putrescant, dein elicitur ∇ seu spiritus per vesicam.

4. *Spiritus alcalisatus. Ex capite mortuo (in destillatione præcedenti residuo) vltius incinerato, elicitur*  *idque purificatum cum Spiritu coniunge & aliquandiu macera. Tandem cum argilla misce & propelle per Retortam ∇ nudo ut nempe totum*  *simul transeat. Postea rectificata si opus sit. Hartm. in præct.*

Vires. Spiritus huius guttulæ aliquot (ad 20.) in liquore conueniente exhibitæ, calculum insensibiliter expellunt.

CXXIII. *Cyperus.*

Κύπερος, wilder Galgan.

CXXIV. *Cydonia malus.*

Μαλιά κιδωνία, Cotonea malus, Quittenbaum.

Longus.

Rotundus.

Rotundus potissimum quidem usus est, tamen iudicio virorum etiam eruditorum parum vel nihil longum superat; suntque partus diuersi eiusdem radicis.

Crescit sponte in regionibus calidis, Italia, Syria, Alexandria, & simil. Nostratibus colitur quandoque in horto, gaudetque solo humido, sed minus efficax est peregrino.

Dicitur *Cyperus, Diosc. Alpin. Cyperus rotundus Orient. maj. vel Babylonicus; Ranvvolf, Cyperus major Syriacus, Cim. in Matth. Cyperus rotundus orientali major, C.B.I.*

O F F I C I N. N A T.

Sola *Radix* quæ eligenda grauis, densa, fractu contumax, plena, aspera, odoris cum quadam acrimonia iu-cundi.

Vires. Viraque Stomachica est ac vterina calfac. & sicc. 2. aper. Usus præcipuus in urina ac mensibus cœn-dis, cruditate ventriculi consumenda, hydrope inchoato præseruando, colica ac vertigine discutienda, ulceribus vesica solidandis: masticata emendat oris fœtorem. Cocta in oleo contusa & imposita renibus ac pectini urinam pro-ritat.

Varias quidem ingreditur compositiones, sed alieno titulo insignitas.

Mala Cotonea } hortenſis } Mala minora, quæ præferuntur.
 } ferens } Mala majora vulgo pyra ſeu ſtruthia.
 } ſylueſtris } Mala media, i.e. notha, quæ proueniunt ex cotoneis,
 quæ ſtruthiis inſita fuere vel contra.

Videatur malus Cotonea, *Brunf. Trag. Matth. Fuchſ. Caſt.* Malus cydonia, *Lon. Tab. Cam.* Cotoneus, *Cord. hiſt.* Cotonea & Cydonea mala, *Lob.* Mala rotunda minora, nonnullis χρυσοµυλδα ab exteriori cutis colore, *Dod.* Mala cotonea minora, *C.B. 1.*

OFFICIN. NAT.

Mala ipſa exiccata. Semen ſeu grana. Vires. Mala cotonea ſtomachica ſunt reſrig. 1. ſicc. 2. astringunt, nutriunt. *Vſus præc. in vomitu, alui fluxu, ſingultu, laxitate Stomachi.*

N. Ante cibum ſumpta aluum conſtipare creduntur, è contra à paſtu, laxare.

Semen: Reſrig. & hum. mucilagine ſua lenit, acrimoniã obtundit. *Vſus præc. ad linguæ ariditatẽ leniendam (gargarifm.) ad dolorem hamorrhoidum ſedandum (in clyſteribus) ad ophthalmiam ſanandam (mucilago cum Aq. roſarum facta & impoſita) ad ſciſſuras mammarum ſolidandas, ambuſtaque curanda, &c.*

P R E P A R.

1. *Condit.* Condiuntur Cydonia (ſiue integra, ſiue in fruſta concifa) ſeparato cortice ſemineque exempto: aromatizanturque cinamomo, caryophylliſque infixis.

2. *Vinum.* Eſt ſuccus liquidus, cui admixtum eſt tantillum ſacchari.

3. *Rob. Cydonior.* Eſt ſuccus inſpiſſatus ad mellis conſiſtentiam, dicitur aliàs ſyrupus Imperatoris.

4. *Diacydonium.* Ex ſucco acido & ſacch. 1. *Vide Diſp.*

6. *Marmelata.* Eſt citonior. dul-

cium decoctio (per manicam Hippocratis) filtrata, cum ſaccharo inſpiſſata & in ſcatulas vt congeſcant effuſa.

7. *Mina Cydonior. ſimplex.* Syrupus & ex ſucc. dulcior. p. xij. vini p. v. & ſacch. p. iij.

8. *Mina Cydonior. aromatizata.* Syrupus eſt ex ſucc. acidor. p. ij. vini p. v. mellis p. iij. & Cinam. V. Diſp.

9. *Diacydones vel Diacydoneum ſimplex.* Ex carne Cydonior. ſcil. atque ſacch. ana. V. D.

10. *Diacydones vel Diacydonium compositum.* Diuerſæ deſcriptionis extat. V. Diſp. A. & N.

11. *Diacydones Laxatiuum.* Vid. Diſp. Aug.

12. *Effentia ſeu ſpiritus.* Ex ſucco dulci fermentato: raro in uſu eſt.

12. *Ol. per infuſionem.* Ex cydoneis non excorticatis ſucco Cydon. & oö omphacino. V. D.

D.

C X X V. Daucus.

Δαῦκος. Daucus, Daucum, & Daucium, *Mohrenkümmel.*

N. Dauci nomine planta bina officinis veniunt. *Daucus ſcil. Creticus*, de quo hic; & *Daucus vulg. ſeu officinarum.* Vide Paſtinaca ſylueſtris.

Dicitur Daucus 1. *Matth.* Daucus Cretenſis verus, *Dioſc. Iob Ger.* Dauc. Creticus *Caſt. Tab.* Dauc. foliis ſceniculi tenuiſſimus *C.B. 1.*

Nāſcitur ſponte in Inſula Creta, R R r vnde

vnde nomen quoque habet, tum quoque in Italia: Semen solum nostratibus officinale est.

Vires. *Vterinum* inprimis est, & diureticum *Calſ.* & *sicc.* 2. aperit, incidit,

flatus discutit. *Vſus* præcip. in menſibus obſtructis, ſuffocatione & dolore matricis, in colica flatulenta, in ſingultu, dysuria, tuffi chronica.

N. Ingreditur Compositionē *Theriaca.*

CXXVI *Dictamnus Creticus.*

Dictamni officinales sunt { *Dictamnus Creticus, Eretischer Diptam.* De quo hic.
Dictamnus vulgaris ſen *albus* officinar. *Vide Fraxinell.*

Dicitur *Dictamnus, Brunſ.* *Dictamnium.* *Matth. Lob. Caſt.* *Dictamnium Creticum.* *Matth.* verum, *Dod. Di.* *Etamnus verus, Cord. in D.* *Dictamnus Creticus, Trag. icon. Cam.* *Dictamnus Creticus, C. B. I.*

Nascitur in Creta foliis craſſioribus & villoſioribus, in hortis Italiae maioribus, miuſque incanis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. *Vterina* inprimis eſt herba, ac alexipharmaca. *Calſ.* & *sicc.* atten. abſterg. aper. *Vſus* præc. in obſtructis menſibus, in partu accelerando (intrinſecus & extrinſecus) in ſtibus venenatis, in ſpeculis extrahendis.

CXXVII. *Dipſacus.*

Eſt { *Satiuus.*
 { *Sylueſt.* { *Maior. Hic uſualior.*
 { *Minor. Et hic adhiberi poteſt.*

Videatur *Διψακος, Fuchſ. Dod. Tab. Ger. Labrum Veneris, Matth. Cord. in D. Carduus Veneris, Carduus fullonũ, Lob. Trag. Diſp. ſylu. aut Virga paſtoris, C. B. 3. & 4. Germã. Rartendiſtei*

Creſcit locis aſperis arenofiſ: Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix ſed ratiſſime: hinc *Vermiculi*

in echinis reperti.

Vires. *Radix* teſte *Matthiolo ſicc.* abſtergit. *Vſus.* præcip. in Rhagadibus ani ſolidandiſ (decocta cum *Vino.*) commendatur in verrucis abigendis.

Vermiculi (vel *radix*) de collo ſuſpenſi quartanam arcere creduntur: eoſdẽ cũ oleo roſac. vel ſimili contuſos paronihiã ſanare, author eſt *Matthioluſ.*

CXXVIII. *Doronicum.*

Aconicum pardalianches Theophrasti, Matth. Tab. Doronicum Auſtriacum alterum. Cluſ. Cam. Doronicum 2. longifolium, Tab. minus, Ger. Doronicum radice repente; Eidem. Doronicum radice dulci, C. B. I. German. Gẽmſervurtz, Schvwindelkraut.

Creſcit in Auſtria, Styria, Heluetia, &c.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. *Accedit ad calſac. & ſicc. gr. 3. diſcut.* alexipharmaca eſt. *Vſus* præcipuus in Vertigine, *Vteri* inflatione, palpitatione cordis, venenofiſ morbiſ ac morſibus (nimirum ſignaturam *Scorpionis* habet.

N. Sunt qui *aconitum pardalianches* eſſe volunt, adeoque noxiũ (ut *Matth.*) Cui tamen moderni minime ſubſcribunt.

CXXIX.

E.

P R Æ P A R.

C X X I X. *Ebenus.*

Lignum exoticum est in medicina nullius usus, præter quàm quod Paracelsus oleum, ac sal eius maxime commendet. Ol. stillat. collaudat in doloribus arthriticis, Podagra, Paralyfi, morbis venereis & pustulis (extrinsecus scilicet loco affecto inunctum, Sal celebrat vi purgandi (forte facultatem purgatricem stimulandi) in podagricis, paralyticis, item virtute mundificandi vulnera. Vide Paracels. de Xylo Hebena. German. Ebenheltz.

C X X X. *Ebulus.*

Καμαϊάκη Dioscoridis. h. e. Sambucus humilis. Ebulus, *Trag. Matth. Fuchs. Lob. Cast. Tab.* Ebulus seu humilis sambucus, *Dod.* Ebuli & Sambuci alterum genus, *Lon.* Sambucus humilis seu Ebulus, *C. B. 5.* Germ. *Niderholder, Attech.*

O F F I C I N. N A T.

Flores, Folia Cortex interior, Semen & Bacca.

Vires. Flores calfac. & sicc. discut. emol. resol. sudores mouent ut sambuci flores.

Eadem vi pollent folia & imprimis ad podag. icos dolores sopiendos, tumoresque aquosos discutiendos, adeoque & hernia aquosa conueniunt.

Cortex interior maxime radices (præterquam quod aquosos & serosos humores totius corporis per aluum educit.) calf. & sicc. discutit, emollit. Usus præcip. (ut florum) in inflammationibus, Erysipelate, & sim.

1. ∇ stillat. Ex floribus.
2. Spiritus. Ex floribus fermentatis.
3. Rob. Ebulin. seu pulpa baccar. Vires. Aquas blande detrahitis, sudoresque mouet.

4. Tinctura seu Essentie granorum Ebuli. Fit & vsurpatur eodem modo, quo tinctura Sambuci.

Vires. Tinctura hac specificum est remedium contra hydropem, cachexiam, veteri strangulatum, cuius paroxysmum sudore mediante fugat.

De Cortice & semine, vide in purgantibus

C X X X I. *Endiuiia.*

Σέρον Intybus satiuia, *Endiuia.*

{ Maior latifolia, quæ intelligitur simpliciter sic dicta.
Est { Minor angustifolia (dicitur sca-
riola,) quæ priori substitui potest.

Prior dicitur Intubus siue Endiuiia, *Trag.* Intubus maior, *Matth.* Intubum satium latifolium, *Fuchs. Lob.* Intybum satium, *Cord. in D. Dod.* Ger. Intybus satiuia maior, *Cast.* Seris (siue Endiuiia alba,) *Lob.* Endiuiia hortensis, *Cam.* Intybus maior satiuia siue cichorium domesticum, *Tab.* Scariola Arabum interpretibus Seris domestica latifolia Dioscor. Intybus satiuia latifolia siue Endiuiia vulgaris, *C. B. 1.*

Colitur in hortis, solo gaudens optimo. Floret Iulio & Augusto.

O F F I C I N. N A T.

Folia, Semen, rarissimè Radix.

Vires. Epatica est nobilissima, refriger. & sicc. 2. absterg. aperit. diuretica est. Usus frequentissimi in febribus biliosis.

P R Æ P A R.

1. ∇ stillat. Ex integra planta.

R R r 2 2. Succus.

2. *Succus*. Ex foliis.

3. *Syrup. de Endiu. simpl. ex succo & saccharo.*

4 *De Endiu. compos. Vid. D.*

5. *Syr. Byzantinus. V. D.*

6. *Diafer. Andernac. V. D.*

7. ☉. Ex planta incinerata.

C X X X I I. *Epatica Nobilis.*

Epatica alba, *Trifolium nobile*, *Epatica*, *Brunf. aurea*, *Brunf. Tab. Trifolium magnum seu aureum*, *Trag. Trif. aureum*. *Dod. Lon. aureum magnum*, *Cast. Trinitas*, *Matth. Cord. h. Cast. Hepaticum trifolium*, *Lob. Cam. Ger. Hepatica trifolia*, *Clus. hist. Trifolium Epaticum flore simplici*, *C. B. 1. German. Hertz oder leberblümlein*, *gülden leberkrant*, *edel leberkrant*.

Florere incipit veris initio, colitur in hortis.

OFFICIN. NAT.

Folia ac Flores.

Vires. Calf. & sicc. moderate (al. refr.) sub abstring. sanguinem mundificat, Epatis ac Lienis obstructions reserat, urinas ciet. Renes & vesicam abstergit, Herniam curat.

PRÆPARATA.

▽. Ex planta integra.

C X X X I I I. *Epatica stellata.*

Hepatica stellaria, *Tab. Matrifylua*, *Trag. Cord. in D. Lon. Asperula*, *Lob. Ger. Asperula odorata*. *Dod. Cast. Clus. hist. Aperine sylv. quædam*, *Cord. Asperula seu Rubedo montana odora*, *C. B. 1. Caprifolium aliis*. *German. Steinleberkrant*, *Hertz frevvd*, *VValdmeister*.

Gaudet solo nemoroso; Floret April. Maio.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Calfac. & sicc. seu temperata potius est, *Epatis ac cordi familiaris. Usus præcip. in obstructo Epate ac meatu biliario & hinc in Ictero*; in Epate calidiore refrigerando. *Extrinfecus in temperie calida Epatis (cataplas.) in tumoribus calidis. Quin & pedibus alligata parturientium partum accelerare dicitur.*

N. Plantula est nostratibus familiarissima, quippe vix quidam è Francofurtensibus erit, cuius potum Maio mense non subernet, saporem conciliando gratissimum.

C X X X I V. *Equisetum.*

Ῥῥῖς, *Herba Equinalis*, *Cauda Equina*, *Rosßschvantz*, *Pferdeschvantz*, *Schafftentzevv*.

Varij est generis. Est enim Equisetum palustre varium, est sylvaticum, est pratense, est denique aruense. Et hæc et si viribus conveniant, attamen vsuale est pratense.

Dicitur Hippuris altera, *Trag. Equisetum alterum*, *Matth. Equisetum*, *Fuchsico. Cord. in hist. Hippuris maior prima*, *Lon. Hippuris fontalis & Equisetum 2. Diosc. Lob. Hippuris minor*, *Lob. Equisetum palustre maius*, *Tab. palustre*, *Ger. Equisetum pratense longissimis fetis*, *C. B. 8.*

OFFICIN. NAT.

Caules cum foliis suis

Vires. Vulnerarium est frig. sicc. 2. inspissat, astring. Usus præcip. in hemorrhagiis sistendis, in exulceratione & vulneratione Renum Vesicae, interaneorum tennium, &c.

PRÆPAR.

P R A E P A R A T A.

▽ *stillat.*C X X X V. *Eruca.*Εὐζωμῶν, Arab. Legit, *Raucken.*

Eruca { *Palustris*, crescit iuxta ri-
uulos.
Sylvestris, crescit in locis
arenosis, floret Iunio, Iulio,
&c.
Hortensis, Εὐζωμῶν, Legit,
vveisser Senff.

Ex his infertur in officinas potissi-
mum hortenſis latifolia, C. B. 1. quā
tamen acrior est sylvestris.

Dicitur *Eruca*, *Brunf. Matth. Cord.*
in D. Cast. *Eruca* siue *Rucula* marina
maior & *Sinapi* 8. *Trag.* *Eruca* sylue-
stris, *Fuchſ. ico. Lon.* *Sinapis* alterum ge-
nus, *Fuchſ. Erucula* maior, *Cord. h.* *Eru-*
ca sativa, *Matt. Lob. Dod.* *Eruca* maior,
Cam. *Eruca latifolia alba sativa* Dio-
ſcor. C. B. 1.

O F F I C I N. N A T.

Semen.

Vires. Calfac. sicc. intense. (3) vsus
præcipuus in Venere stimulan- & apople-
xia præſeruanda. Extrinſc. (impoſita ra-
dix) extrahit offacula fiſſa, pituitam è
cerebro prolicit (in apophlegmatiſm.)

C X X X V I. *Eryngium.*

Iringus, *Aster Atticus*, *Centum*
capita, *Inguinalis*, *Mannſtreuv*, *Re-*
dendiſtel, *Brackendiſtel.*

Gaudet locis herbosis, arenosis, flo-
ret Iulio.

Ex *Eryngiorum* generibus officina-
le est *Eryngium primum*, *Trag. Lon.*
Eryngium montanum siue *campestre*,
Matth. Cast. *Eryngium*, *Fuchſ. Cord. in*
D. Tab. *Eryngium mediterraneum*, *Ger.*
Eryngium campestre, *Dod. Cast.* Vul-
gare, *Cluſ. hiſt.* *Eryngium campestre*
mediterraneum, *Lob.* *Eryng. vulgare*,
C. B. 1.

O F F I C I N. N A T.

Radix colligenda Sole existente in
Cancro.

Vires. Epatica, nephritica & alexi-
pharmaca est, temperate calida, medio-
criter ſicca, aper. diſcut. Vſus præc. in
obſtructis menſibus, vrina, Epate, Veſi-
ca biliaria, Liene, &c. & hinc in ictero,
ut & (teſte Galeno) in Colica.

P R A E P A R.

*Conditaradix.*C X X X V I I. *Eryſimon.*

Variorum est generum è quibus
vſualius est *Ερύσιμον*, 1. *Tab.* *Eryſimon*
vulgare, C. B. 1. *Iris*, *Matth. Cord. in D.*
Lon. *Verbena fœmina* & *Sinapi* 7.
Trag. VVegſenff; Hederich.

Crescit iuxta vias: Floret Iulio,
Augusto.

O F F I C I N. N A T.

Semen ac Herba.

Vires, Calfac. & ſicc. 3. attenuat, ape-
rit, expectorat, Vſus præcip. in mucila-
gine contumaci pulmonum atque tuffi
chronica. Extrinſec. in Cancro non ex-
ulcerato, tumoribusque renitentibus
mammærum.

P R A E P A R A T A.

Syr. de Eryſimo Lobelij. Vid. l. 2.

CXXXVIII. *Eupatorium.*

Eupatorium { Veterum seu græcorum. *Vide Agrimonia.*
 { Mesuæ. *Vide Ageratum.*
 { Cannabinum: *Describitur hoc loco.*

Dicitur Eupatorium Cannabinum,
C.B.1. Herba S.Künigundis, Trag.1. Tab.
Eupator. aquaticum, Gesn. Salvia, Brunf.
Eupatorium vulgare, Matth. Dod. Cast.
Eupatorium adulterinum, Fuchsf. Eupatorium Auicennæ credi-
tum, Lac. Lon. Cam. Cannabina
aquatica mas, Lob. German. Waf-
ferdost, Künigkraut, Hirtzgüntzel,
Albkraut.

N. Plerique hanc herbam Eupato-
rium Auicenna censent. Bauhinus verò
Agrimoniæ pro Eupatorio & Græcor.
& Auicenna habendam esse monet.

Crescit locis viginosis: Floret Iulio
 & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Flores & Folia, sed raro.

Vires. *Calfac. & sicc. saporis est ama-*
riusculi, atten. aper. subadstr. Epatica
est vulneraria. Vfus præcip. in cache-
xia, catarrhis & tussi, mensibus retentis.
Extrinfecus è nobilissimis est vulnera-
riis (ut & intrinfecus) menses ciet bal-
neatione, &c.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex foliis & floribus.
2. Trochisci de Eupar. A.

CXXXIX. *Euphrasia.*

Euphrasia, Euphrasia, Eufrafia, An-
gentrost.

Eligitur Euphrasia vulgaris seu of-
 ficinarum, *C.B.1. Euphrasia alba, Brunf.*
Eufrafia, Matth. Cast. Euphrasia & Eu-
frasia, Fuchsf. Dod. Lob. Tab. Ger. Vulga-
ris, Lon. Euphrasia Argentinensium
vel 2. & 6. Trag. Ophthalmica siue
Ocularia, Cord.

Crescit locis apricis, sabulosis Floret
 Iunio, Iulio, Augusto.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. *Ophthalmica est & Cephalica,*
calf. & sicc. 2. adstring. disc. saporis
subacris. Vfus præcip. in oculor. suffusioni-
bus, caligine, memoria debilitata.

PRÆPARAT.

1. *Conserua.* Ex tota herba cum flo-
 ribus.
2. ▽ Ex integra herba Iulio col-
 lecta.
3. *Vinum* nonnullis vsitatum est; fit
 infusione summitatum pro potu ordi-
 nario.

F.

CXL. *Faba.*

Faba est { Vulgaris { farina { major } de quibus hic.
 { Sylvestris.
 { Phaseolus. *Faseln, VVelsche Bonen.*
 { Lupinus. *Feigbonen.*

Videatur

Videatur *Κωκός Faba*, Brunf. Tab.

P R A E P A R.

Matth. Fuchf. Cord. in D. Lon. Cast. Cam.
Faba vulgaris, Trag. *Fuchf. Cord. hist.*
Boona siue *phaselus major*, Dod. *Faba*
major recentiorum, *Lob. hortensis*, Ger.
C. B. 1. Germ. Bonen, gemeine Bonen.

1. ▽. Ex floribus.

Vires. Diuretica est, maximique
usus in maculis faciet extergendis, ea-
que fucanda.

2. ⊙. Ex stramine incinerato.

Vires. Summum diureticum est, usi-
tatissimumque in hydropo, calculo &
urina retenta.

C X L I. *Fabaria.*

Τηλέριον, Crassula, Crassula major, fa-
ba inuerfa, Knabenkraut, VVundkraut,
Donnerkraut. Donnerbonen.

Vsuale est *Telephium vulgare. C.*
B. 1. quæ est Fabaria, Matth. Telephi-
um, Matth. Lob. Tab. Cast. Cam. Tele-
phium album, Fuchf. acetabulum alte-
rum, Cord. in D. album, Fuchf. ico. Faba
inuerfa, Lob. Telephium alterum siue
crassula, Dod. vulgare siue secundum,
Clus. hist. Crassula seu faba inuerfa, Ger.
Cotyledon, alterum Dioscoridis, Col.
scrophularia media vel 3. Brunf.

Floret Iulio ac Augusto. Crescit
 circa muros, locisque saxosis.

O F F I C I N. N A T.

Folia tantum.

Vites. Matthiol. refrig. & hum. (Do-
donæo refrig. & sicc.) vulneraria est,
astring. mundificat, præcipique usus
est in consolidanda intestinorum erosio-
ne per dysenteriam introducta, in curan-
da hernia, in maculis cutis detergendis,
in ambustis medendis.

P R A E P A R A T A.

▽. Ex fol. & floribus.

Farfara, vide Tussilago.

C X L I I. *Ficus.*

Σίκον, Picus, Brunfels. Trag. Matth.
Dod.

N. 1. Sunt qui inter fabas & Boonas
 distinguunt, fabisque nos carere volunt,
 boonis è contra fuit. Verum enim vero
 etsi constet, fabas nostrates à veterum
 descriptione nonnihil differre: attamen
 verisimile videtur, differentiam hanc,
 à diuerso loco natali potius dependere,
 quam ex diuersa plantarum specie,
 adeoque secundum Botanicum huius se-
 culi sagacissimum & peritissimum, C. B.
 fabas magnitudine figura coloreque dif-
 ferre, & quo maiores, èò magis in lon-
 gitudinem eas esse depressas, quo minores,
 èò rotundiores. Vtut sit, sufficit nobis,
 quod viribus conueniant.

N. 2. *Fabarum usus prohibitus est à*
Pythagora, quia flores lituris suis nigris
signaturam referant lugubrem, & ani-
mas mortuorum, quæ in iis habitent: ab
aliis interdicitur, quia existiment sensus
iisdem hebetari, insomnia turbulenta
excitari.

N. 3. Est & faba Indica purgatrix,
 cuius historiam si quis velit ipsemet
 legere poterit 1. apud Clus. lib. 2. exot.
 c. 30. 2. in annot. ad Monard. 3. apud.
 Tabernam. Nimirum quia nostratibus in
 usu non est, describere supersedeo.

O F F I C I N. N A T.

Farina fabar. satiuar. & præcipue
maiorum.

Vires. Emplastica est, refrig. & sicc.
 1. in crass. exterg. utilis intra corpus in
 diarrhæa, lenteria, &c. Extra, in ma-
 culis è sole contractis, aliisque cutis sor-
 dibus extergendis (si illa fricentur) in
 suggillatis discutiendis.

Dod. Cord. hist. Bellon, Lon. Lob. Cast. rholdum. Dosis ʒj.
Tab. Ger. Ficus sativa, Fusch. communis
C.B. 1. Germ. Feigenbaum.

OFFICIN. NAT.

Fructus, (oliva.)

N. Primitia fructus dicuntur grosse
ficus, sicca in furno aut sole exiccata,
carica, aliis passa.

Vires. Carica calf. 2. (recentes mode-
ratus :) utraque humect. pulmonaria
sunt, & bechica, arenulis Renum & vesic-
ae medentur, venenis resistunt : precipui
usus sunt in variolis & morbillis ad cu-
tem pellendis, maturant, molliunt, attra-
hant, unde & bubonibus pestilentialibus
(innuente Scriptura) conferunt, mulierculis
nostratibus, appropinquante partu,
ficuum tostar. esus ad partum facilitan-
dum est familiarissimus. Quin & fami-
liare est super ficus V. accendere, bro-
diumque ad tussim sedandam propinare.

CXLIII. Filipendula,

Φιλιππύδα, Filipendula' oenanthe,
faxifraga rubra, rohter, Steinbrech.

N. Dicitur Oenanthe veterum, quia
viribus aliquantum conveniunt.

Vsualis est filipendula vulgaris, C.B.
7. Filipendula, Trag. Dod. Matth. Cord.
hist. Lon. Cast. Tab. (cui & faxifraga
rubra,) Ger. Oenanthe, Fusch. Cord. in
D. Lob.

Nascitur solo herbofo, Floret Iunio
& Iulio.

OFFICINALIA NATIVA.

Folia & Radix.

Vires. Calf. & sic. 3. attenuat, abster-
git, subastring. discut. diuretica est: Usus
precip. est in tartarea mucilagine pul-
monum, Renum vesicae ac articularum,
in colica flatulenta, in albo mulierum
profluvio. Extrinsecus in tumore hemor-

CXLIV. Filix.

Πτέρις, πτέρις, Fahrn, Fahrnkraut,
VValdfahrn.

{	Mas non ramosa (plurium)	{	utraque
	pedicillorum.)		promi-
	Fœmina ramosa (vnius)		scuè v-
	pedicelli.)		ualis.

Mas dicitur Filix, Brunf. vulgatis,
Trag. mas, Matth. Fusch. Dod. Lon. Lob.
Cost. Tab. Ger. fœmina, Gesn. Casalp. Fi-
lix non ramosa dentata, C.B. 3.

Fœmina inscribitur, Filix sylu Brunf.
Filicis majoris genus, Trag. Fil. fœmina,
Matth. Fusch. Dod. Lob. Cast. Tab. Ger.
Thylypteris, Filix fœmina, Cord. in D.
Filix mas major siue fœmina credita
vulgo, Clus. Filix ramosa major pinnu-
lis obtusis non dentatis, C.B. 1.

Nascitur locis opacis nemorum :
viret tota æstate, nocte D. Iohanni sa-
cra semen profert : noui qui dicto tem-
pore id collegerunt, verum, qua utilita-
te, signoro.

OFFICIN. NAT.

Radix inprimis Filicis fœminæ.

Vires. Splenetica est, calfac. & sic. amara est, subastr. aperit. Usus precip.
in obstructionibus viscerum & inprimis
Lienis & Vteri. Extrinsecus commen-
datur ad ambusta (extracta mucilago.)

N, Granidis infensa censetur.

CXLV. Fœniculum.

Μάραθρον. Fœniculum, Brunf. Trag.
Fusch. Cord. in D. Tab. Vulgare Ger.
fœniculū nostrum vulgare, quibusdam
Hippomarathrum putatum, C.B. 1.
Germ. Fenchel.

Crescit locis cultis, aridis; Floret
Iulio, Augusto.

OFFICIN. NAT.

Herba seu Summitates. Radix (quæ una ex radicibus 5. aperientibus famosis.) Semen.

Vires. Foliacalf. 2. sicc. 1. aper. resolu. discut. diuretica. carminativa & bechica sunt, ventriculū roborant, lac augent, visum confortant, asperam arteriam leniunt.

Radix & semen calfac. 3. adeoque insuper usus creberrimi in humorum & flatuum discussione, & ad peripheriam expulsiōe.

N. Semen adhibetur sepiissime ad corrigenda purgantia, ut & ad flatus discutiendos.

PRÆPAR.

1. Confectum Semen.

2. ▽. Ex integra planta incisa.

3. ▽. Ex semine.

N. Ophthalmica est inter visitatissimas.

4. ☉ stillat. Ex semine.

5. ☉ Ex planta incinerata.

CXLVI. Fœnum græcum.

Fœnogræcum, Fenugreck, Bocksborn.

Est { Satiuum: Hoc usuale.
Syluest. minus visitatum.

Dicitur fœnum græcum, Trag. Matth. Lob. Lon. Dod. Cast. Cam. Fœnogræcum, Fuchf. Cord. in D. fœnum græcum sativum, C. B. 1.

OFFICIN. NAT.

Semin solum ex satiuo scilicet desumptum.

Vires. Calfac. 2. sicc. 1. emollit, digerit, maturat, discutit, paregoricum est, ususque adeo famosi, ut cataplasma dictarum intentionum Chirurgis vix visitatum sit, quin fœnogræcum vel huius

mucilaginem contineat, Crebrique usus est in clysteribus emollientibus, mucilaginosa quippe sua substantia obtundit acrimoniam, intestinaque erosa oblinis. insuper conducit eius mucilago ad oculorum sugillationes discutiendas (imposita) Vide Hartm. præct.

PRÆPARATA.

Mucilago. Extrahitur beneficio cotinis in ▽.

CXLVII. Fragaria.

Κάριον, Fragaria, Brunf. Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lon. Lob. Cast. Ger. Fragaria vulgaris, C. B. 1. Fragula, Cord. hist. Fragula & Trifolium fragiferum, Tab. Srdbeerkraut.

Crescit locis opacis: Floret Martio & Aprili.

OFFICIN. NAT.

Folia seu herba & Fructus in præparatis.

Vires. Herba refig. & sicc. moderate, subastring. diuretica est, usque crebri in ictero, ut & in gargarismis & balneis, in cataplasmatibus, &c.

Fructus, (fraga.) Refriger. & humect. Splenetica sunt ac nephritica, Venenis resistunt, quia autem facile putrescunt, non adeo commode comeduntur.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra planta florida: Abstergit lentigines & maculas.

2. ▽. Ex fructibus.

N. Sitim & æstum febrilem extinguit, urinam ciet.

3. Syrup. Ex succo fragor.

4. Spirit. Ex succo fermentato, qui tamen usus rarioris.

5. Tinctur. E baccis cum ▽ propria.

CXLVIII. *Fraxinus.*

Eschbaum, { *Excelsior. Hæc officinalis*
Eschern, { *Humilior. Minus vsualis*
 Dicitur *Fraxinus*, *Brunfels. Trag.*
Matth. Dod. Lon. Lob. Tab. Cast. Fraxi-
nus excelsior, C. B. 1.

Floret Aprili & Maio: Semen fert
 Autumno. Crescit in sylvis opacis.

OFFICIN. NAT.

Folia. Cortex. Lignum, Semen.

Vires. Folia siccat validè, curantque
ictus serpentum, sed vsus sunt rarioris.

Cortex & Lignum, siccant itidem,
attenu: Splenis duritiem specificè emol-
liunt, diuretica sunt ac lithonriptica,
æque non è postremis.

N. Sunt qui lignum die Ioannis Ba-
piste casum, vulneribus ac contusio-
bus solo affricatu mederi credunt, cæ-
dunt autem id alij ante solis ortum, alij
ipso meridiano temporis puncto.

Semen (foliis adherens) calfac. &
sicc. validè, conducit Epaticis, Pleuriti-
cis, Calculosis.

N. Colligendum hoc est autumnali
tempore.

PRÆPARATA.

1. *Extract. Ex corticibus per ∇ ap-*
propriatam, liquore aliquo acua-
tam, vbi excellit ∇ ex tenellis fraxini
foliis destillata. Quercetan. in P. R.

2. *☉ ex ligno. Fit destillando modo*
communi.

3. *☉. Ex cinere corticum.*

N. Sal ex ligno incinerato, vulneribus
intus & extus cum felici successu vsur-
patum vidi.

CXLIX. *Fraxinella.*

Dictamnus albus (propter radicem
album) siue fraxinella, C. B. 5. Polemo-

nium, Tab. Dictamnus putatus, Brunf.
Dictamnus vulgaris, Trag. Cam. Offi-
cin. Lon. Dictamnium album, nonnulli
pumila fraxinus, Matthiol. Cast. Tra-
gium primum, Dioscor. Lob. Dictamnus
nostra, Cord. in D. Fraxinella, Cord.
hist. Dod. Clus. Ger. German. vveisser
gemeiner Diptam, Eschervvurtz.

Crescit in rupibus: Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Radix verno tempore colligenda.

Vires. Est cordialis, alexipharmaca,
uterina, cephalica, amara, calfac. & sic-
cat, aperit, vermes necat: Vsus præcipui
in morbis malignis, in Epilepsia, aliisque
affectionibus capitis, in obstructione uteri,
&c. Extrahere quoque dicitur spicula
cuti infixa.

CL. *Fumaria.*

Kâmos, Fumaria officinarum &
Diosc. C. B. 1. Fumus terræ, Brunfels.
Cam. Fumaria, Trag. Matth. Fuchs.
Cord. in D. Dod. Lon. 2. Flore albo, Tab.
Capnos, Lob. Fumaria maior, Cast. Fu-
maria purpurea & alba, Ger. Germ.
Daubenköpff, Daubenkörbel, Frd-
ranch, vvilde Rauten.

Crescit passim in hortis, vineis, &c.
 Floret Maio & Iunio.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Splenetica est ac Epatica: at-
tenuat, serosos, biliosos ac adustos humo-
res sensim expurgat, viscera reserat, re-
serata roborat, sanguinem purificat.
Hinc vsus præcipui, in scorbuto, aliisque
morbis mesenterij & Lienis, in fætero,
in scabie omnis generis, & sim.

PRÆPAR.

1. *∇. Ex herba cum floribus.*

2. *Oleum stillat. quod rarum.*

3. *Succus*

3. *Succus inspissatus.* Dosis ad ʒj.

4. *Conseru. summit.*

5. *Syr. simpl.* Ex succo.

Compos. Vide Disp.

6. *Pilul. de fumaria.* Purgant bilem, serofosque humores.

Dosis ʒj. ad ʒiʒ.

7. *Θ fumaria.* Ex herba incinerata.

CL I. *Fumaria bulbosa.*

Fumar. bulb. { radice caua 1. *Hæc usualior.*
 { radice non caua { maior 2. *Hæc surrogari priori potest.*
 { minor 3.

1. Dicitur, *Aristolochia* rotunda, *Brurf.* Arist. rot. vulgaris, *Trag. Fuchf.* (cui & *Pistolochia*,) *Cam.* *Fumaria* altera, *Matth. Cast.* Capnos *Chelidonia*, *Lon.* Radix caua maior, *Dod. Clus. hist.* *Fum.* Caua herbariorum, *Lob. Germ. Erdkrant, falsch Holzwurtz.*

2. *Fum. bulb.* radice non caua dicitur *Aristolochia* rotunda vulgaris radice solida, *Trag.*

Crescunt in dumetis, locis frigidis & opacis, vt & in vineis, Florent Aprili.

OFFICIN. NAT.

Radix: rato *Herba* cum floribus.

Vires. *Calf.* 2. sicc. 3. absterg. substring. aperit. Epatica est, *Vterina*, *Alexipharmaca*, sudorifera, diuretica, & vulneraria. *Vsus* præcip. inciendis mensibus, lochiis: foetum mortuum expellit, *Ictero* medetur, sanguinem mundificat, adeoque & scabiei succurrit. *Extrinsecus* commendatur quam maxime ad vulnera etiam inueterata & fistulosa, vtpote quæ mundificat & consolidat; ad scabiem, ad dolores podagricos (à frigidis humoribus) ad sanguinem coagulatum in contusionibus, ad putredinem oris.

G.

CL II. *Galanga.*

Galgan. { Maior, radice crassiore, rubra minus odorata, &c.
C. B. { Minor, radice tenuiori, nodosa intus & extra rubescens, sapore acri instar piperis odore suau.

N. *Hæc priori præfertur.*

Dicitur *Galanga Minor*, *Matthiol. Cord. b. Fuchf. Lob. Lon. Tab. Acost. Ger.* *Galanga minor* officinar, *C. B.* 2. *Galanga Indica*, *Amat.*

Maior vocatur, *Galanga maior*, *Matth. Cord. hist. Lon. Fuchf. Lob. Calsalp. Tab.* *Gal. crassa*, *Amat.* *Iridis* genus, *Clus. in Acost.*

N. *Galanga* (γαλγαν) quibusdam *Acori*, nonnullis *Iridis* species videtur, minor à recentioribus Græcis *Cyperus* *Babylonica* nominatur. *Arab. Galingia.*

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ eligenda saturatorum, ponderosa, bene odorata, saporis acris.

Vires. *Stomachica* est, *Cephalica* ac *Vterina*: *calf.* & sicc. 3. saporis acris, incidit, aperit. *Vsus* in cruditate ac inflatione ventriculi, vertigine, uteri obstructione aliisque totius corporis affectibus à frigidity ac flatulentia oriundis. *Extrinsecus* commendatur ad roborandum caput (in Errhinis.)

P R A P A R.

Spec. Diagalang. Vid. Disp.

SSI 2

CL III.

CLIII. Galega.

Galega, ruta capraria, *Matth. Cast.*
Cam. Ruta capraria, *Tab.* Galega, *Lob.*
Dod. Lon. Ger. vulgaris, *Clus.* Galega
 vulgaris, *C.B. 1.* Germ. *Genskraut*, *Fle-*
ckenkraut.

N. *Quidam* Onobrychin, alij *Glauc-*
um, nonnulli *Polemonium*, alij *Polyga-*
lam veterum esse indicant: verum his
 omnibus *Dioscoridis* descriptiones con-
 tradicunt.

Colitur apud nos in hortis: Floret
 æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba collecta Iunio & Iulio.

Vires. Celeberrimum est Alexiphar-
 macum ac sudoriferum, venenum, inpr-
 misque pestilentielle insigniter discuti-
 ens. *Vsus* eius precipuus est in petechiis
 expellendis, aliisque morbis pestilentiali-
 bus, ipsaque peste curanda. In morbillis.
 In Epilepsia infantum) exhibetur succi
 cochlear. 1.) in ictibus serpentum, in
 Lumbricis, (quos etiam extrinsecus ap-
 plicata fugat.)

N. Herba hæc secus ac alia citra sa-
 pore est, & insuper qualitatibus primis
 temperata.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra planta Iulio col-
 lecta.

2. Conseru. summit. seu flor.

CLIV. Gallium.

Γάλλιον, Γάλλιον, Γαλλίον, Γαλέριον, Germ.
Megerkraut, *Waldstroh*, *unsfer Frav-*
ven Bettstroh, *Wegstroh*, *lebkraut.*

N. Nomen habet, quod coaguli vice
 γάλα, i.e. lac coagulet.

{ Luteum flor. luteo { vulgare.
 { Album flore albo { palustre.
 { minus.

Ex his præfertur primum, *C. B.* seu
Gallium luteum, quod *Dioscoridis*
Gallium putatur.

Dicitur *Gallium*, *Fuchs.* *Dod. Lon.*
Gallium luteum primum, *Tab.* *Gallij*
 primum genus, *Trag.* *Gallium*, *Matth.*
Cast. *Luteum*, *Cord. in D. Lob. Cam.*
Ger. *Gallium luteum.* *C.B. 1.*

Crescit passim locis aridis & are-
 nosis, iuxta vias, &c. Floret Maio, & hinc
 tota æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. *Calf. & sic moderate.* *Vsus*
 eius potissimum externus est in hamor-
 rhagia narium sedanda (pulvis infla-
 tus) in scabie simplici & maligna, adeo-
 que in cancro mammarum, &c.

N. Rari *usus* est apud practicos, so-
 lumque asseruatur pro compositionibus,
 quas ingreditur: ut unguentum *Mar-*
tium, &c.

CLV. Genista.

Genista, *Genst.*, *Genster*, *Pfrimm-*
kraut.

Vsus est à Genistis non spino-
 sis, *C.B. 1.* *Genista angulosa* & *scoparia*,
spartium. *Lob.* *Genista*, *Brn f. Trag.*
Fuchs. *Dod.* *Cord. in D. Cam. Tab. Ger.*
Genista angulosa, *Cord. hist.* *Genista*
 minor seu non aculeata, *Lon.* *Genista*
scoparia vulgi. *Lob.*

Solo gaudet arenoso & aprico.
 Floret integra ætate.

OFFICIN. NAT.

Flores & Semen.

N. Flos communiter luteus, rarius
 albus

albus est.

Vires. Splenetica & nephritica cense-
tur, hinc & epatica, calf. & succ. 2. aper-
atten. absterg. calculum pellis, aquosos
humores educit, tam per vomitum, quàm
per aluum & urinas. Hinc usus eius
insignis in obstructione Epatis & Lie-
nis, Mesenterij, adeoque in Hydrope, ca-
tarrhis, arthriticis affectibus.

N. Semen extrinsecus applicatum
scrophulas consumere dicitur.

P R Æ P A R.

1. ▽. Ex floribus & foliis.
2. Conseru. Ex floribus.
3. ☉. Ex incinerata herba.
4. Conditiflores.

Condiuntur autem flores (seu po-
tius gemmæ (collecti mense Aprili, an-
tequam aperti fuerint, cum aceto &
sale, adhibenturque loco capparum,
vnde & nostratibus cippares. Germ. di-
cuntur, Teutsch. Zapern.

N. Cura vomitum assumi poterunt.

CLVI. Gentiana.

Gentiana (à Gentio inuentore sic
dicta,) *Entian.*

Gentiana	{	alpina	{	maior.	Gentia-
				minor.	
			nella.		
		pratensis.			
		palustris.			

Vsualis est ex his alpina maior lu-
tea, C. B. 1. de qua notandum, quod re-
periat quodque floribus flauis, imò
& albis, punctis carentibus.

Dicitur Gentiana, *Brunf. Matth.*
Fuchf. Dod. Cord. in D. *Lon. Cast.* Gen-
tiana maior, *Matth. Lob.* flore luteo,
Cam. Gentiana veterum, *Clus. hist.*
Gentianæ 1. species, *Trag.*

O F F I C I N. N A T.

Radix collecta mense Augusto ac
Septembri.

Vires. Calf. 3. succ. 2. Alexipharmaca
est, aperit, attenuat. Usus præcipui in pe-
ste, aliisq; venenatis affectib⁹, in obstru-
ctione Epatis, Lienis, &c. Et hinc in
hydrope, tñ in suffocatione Vteri, in im-
becillitate ventriculi, lumbicis, in fe-
bribus, in morsu canis rabidi. &c. Ex-
trinsecus adhibetur creberrime in vul-
neribus ac fonticulis mundificandis, re-
nouandis, &c. in morsu canis rabidi ar-
cendo (cum Theriaca imposita.)

P R Æ P A R.

1. Succus inspissatus.

N. Creberrimi usus est in febribus
intermittentibus, in quibus ante paro-
xysmum à ʒss. ad ʒj. vel ʒiij. exhibe-
tur, felici cum successu.

2. Extractum cum S. V. factum.

CLVII. Geranium.

Geranij multa recensentur gene-
ra, officinis nostris maxima ex parte
inuitata. Vsitatius tamen præ cæte-
ris est, quod Geranium Robertianum
dicitur, aliàs Gratia Dei, *Ruprechtss-
kraut, Gichtkraut, Gottes Gnad, Rotlan-
ffkraut,* (quia Erysipelati mederi dici-
tur.)

Dicitur Geranium 3. *Brunf. Matth.*
Fuchf. Lon. Geranium Robertianum,
Lob. Dod. Cam. Tab. Gratia Dei vel ge-
ranium quibusdam, *Trag.* Herba Ru-
perti & Geranium 2. *Diosc.* Geranium
Robertianum primum, C. B. 5. vii. elicit
inter species Geranij folio cicutæ vel
inyrrhidis.

Gaudet locis opacis ac desertis. Flo-
ret potissimum Aprilis & Maio.

O F F I C I N. N A T.

Folia.

SS f ;

Vires.

Vires. *Temperatum est in cal. & frig. moderatè siccatur, subastring. exterg. sanguinem in corpore coagulatum resoluit, vulneribus conuenit, sanguinem scil. cohibendo, vulneraque mundificando. Vfus externus* (omnium generum Gera-
ni), vulgaris est in cataplasmatibus, plan-
tis pedum cum sale & aceto applican-
dis, ad febrilem aestum compescendum.
adhibetur itidem ad mammarum fissu-
ras, lactisque discussionem (Robertia-
num impositum.)

P R Æ P A R.

▽. *stillat.* Ex integra herba in fine April. collecta.

C L V I I I. Glyzirrhiza.

Liquiritia, Brunf. dulcis radix, Trag.
Glyzirrhiza, Fuchf. Cord. in D. Cam.
Glyzirrhiza altera, Matth. vulgaris,
Dod. Cam. Epit. Glyzirrhiza siliquosa,
C. B. 2. Germ. Sützholtz.

Crescit locis sylvestribus & sabu-
losis. Floret Iulio.

O F F I C I N. N A T.

Radix ex Episcopatu Bambergensi, ubi in copia crescit, ad nos trans-
missa, quæ sole exiccata biennium in-
tegra manet.

Vires. *Calidit. & frigid. temperata est (seu moderatè calefacit) in reliquis ad humiditatem inclinatur, pulmonica ac nephritica est, acrimoniam mitigans, expectorationem promouens, asperitatem leniens, aluum infantum leniter molliens. Vfus precipui, in tussi, rauedine, vesicae erosionem, urinae acrimonia.*

P R Æ P A R.

1. *Succus inspissatus.*
2. *Syr. Compositus. Vide Disp.*

C L X. Gramen

Gramen absolute sic dictum. Of-

ficinis graminis speciem denotat, quam Dioscorides ἀρῶν καὶ ἐγὼ, vocat, estque Gramen caninum seu ar-
uense, C. B. 1. Gramen, Dod. Cord. in D. Cast. Gramen canarium medicatum,
Lob. Gramen caninum, Tab. Ger. Germ. Reb oder Oneckengrasz.

Passim spontè prouenit, felicius autem in terra arida & arenosa.

O F F I C I N. N A T.

Potissimum Radices (collectæ men-
se Maio vel Septembri) raro Caulis
cum foliis, rarius Semen.

Vires. *Radix cuiuscunque graminis refig. & sicc. aper. subastring. substantia est tenuis ac penetratiua.*

Herba seu folia intra siccitatē & hu-
miditatem moderata sunt, frigida gr. 1. Vfus precip. in obstructionibus Epatis,
Lienis, Vterum, in expuitione sangui-
nis (ubi succus ex integra planta valet) in lumbricis necandis. Extrinsecus in do-
lore capitis leniendo (seligunt gramen septem nodorum) in oculorum inflamma-
tionibus ac defluxionibus. (Has sedare dicitur gramen trium nodorum, decre-
scente Luna euulsum ac collo circumli-
gatum, (in auribus purulentis, in odon-
talgia, in tumoribus podagricis discutiendis.

Δ *stillat.* Ex radice Maio mense collecta.

N. Diarrheam sedat infantum si ab-
domen eâ lauatur.

Est & graminis species, Gramen
mannæ dictū, inter gramina dactilodea,
C. B. 8. Cuius semen in cibum venit
nomine Mannæ in German. ex Silesiæ
ac Poloniæ confinibus transportatum,
feminemilij foliis non ab simile. De hoc
vulgi opinio, quod ex aëre decidat, unde
& Mannæ nomen impositum est.

C L X.

CLX. *Granata.*

Mal' { Domestica, quæ pomifera est.
puni { Sylvestris, quæ flores solum
ca { fert.

Videatur Malus punica, Trag.
Math. Dod. Cord. Lon. Cam. Mala pu-
nica, *Cord. in D. Bellon.* Malum puni-
cum, *Lob. Cast.* Malus granata, *Tab.*
Malus punica, *C. B. Germ.* Granaten.

Vtraque arbor, quamvis exotica sit,
nostratibus tamen in hortis colitur.

OFFICIN. NAT.

1. *Poma*, eaque vel dulcia vel acida,
vel acidodulcia, i. e. vinosi saporis. 2.
Flores collecti ex Granata sylvestri
(*Balaustia* dicuntur) tum quoque in-
terdum ex domestica (appellantur *Cy-
tini.*) 3. *Cortex* pomorum (*malicorium*,
psidium.) 4. *Nuclei.*

Vires. *Poma*, in genere censentur bo-
ni succi, ventriculo conuentia, sed pauci
nutrimenti. Dulcia adhibentur in tussi
chronica.

N. Quia ventriculo inflationes cau-
santur, in febribus minus commode adhi-
bentur.

Acida, frigida sunt ac astringentia,
stomachica. *Vsus* precipui in febribus
biliosis, in Gonorrhæa, in pica gravidar.
compescenda, orisque putredine corrigenda,
& sim.

Vinosa, (acidodulcia. Granata mu-
za) media sunt naturæ, inter dulcia ac
acida, ad frigiditatem tamen aliquate-
nus accedunt. Cardiaca sunt ac Cepha-
lica. *Vsus* precipui in Syncope ac verti-
gine, &c.

Flores, tam *Balaustia*, quam *Cytini*
eiusdem sunt naturæ, terrestres scil. vali-
de astringentis, inspissantis, refrigeran-
tis, siccantis, unde & *balaustior.* creber-
rimus *usus* esse solet in omnis generis
fluxionibus, E.g. Diarrhæa. Dysenteria,

uteri fluore, & sim. in sanguine vulne-
rum cohibendo, in gingivarum laxitate
emendanda, in Hernia curanda, &c.

Cortex, (*malicorium*, *psidium*) eius-
dem cum floribus censetur natura, preci-
puique *usus* est in sedando fluxu hæ-
morrhoidum narium, uteri, &c.

Nuclei refrigerant itidè, astringunt-
que, in primis qui ex pomis acidis collecti.

PRÆPARAT.

1. *Succus liquidus.* Ex pomis ex-
pressus, fermentatus & depuratus, qui
nomine vini granatorum venit.

N. 1. Præstat Vinum ex pomis acido-
dulcibus.

N. 2. Ante præparationem huius
vini, extremam cutem granis detrahere
solent.

N. 3. Ad conseruationem, non nihil
seminis Coriandri puluerisati in Vino
eodem suspendunt.

2. *Syrupus.* Ex succo granator. dulc.
ac sacchar. $\frac{1}{2}$. Vid. Dispens.

3. Ex succ. granat. acidor. &
sacchar. $\frac{1}{2}$. Vid. Dispens.

Grana Paradysi.

Pariszkærner, vide Cardamomum.

CLXI. *Guaiacum.*

Lignum Indicum, Lign. Sanctum,
Guaacan, Guaiacan, Palus sanctus,
Frantzosenholtz, *Heiligh Holtz*. Arbor
est exotica, procera quæ ex India Occi-
dentali ad nos transportatur.

Estque Guaiacum	{	magna matrice. Guaiaci 1.
		genus, Monard. & Mat- thiol.
		propemodum sine matrice,
		quod priori præstantius.
		Guaiaci 2. genus, Mo- nard. & Matthiolo.

N. 1.

§12 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. IV.

N.1. Sunt qui prius Guaiacum appellant, posterius legnum sanctum: Verum quia apud Autores Synonyma sunt, præstat matrice, uti dictum ea distinguere.

N.2. Posterius diuiditur à nonnullis in plura genera, quæ tamen non re seu essentia, sed solo colore differre vult Matthioli, idque pro diuersitate maturitatis, quo enim maturius, eò ipsi nigrius est, & quanto minus adoleuerit, tantò magis ipsi albicat.

OFFICIN. NAT.

Lignum, Cortex, & Gummi, fed raro.)

Eligendum est Lignum recens ponderosum, succulentum (quod Carboni impositum fumigat.) Posterius præstat, quod colores rufum, spadicem, flauum, liuidumque simul mixtos habet.

Vires. Lignum calf. & sic. sudorem ac urinam largiter promouet, adeoque sanguinem mundificat, putredini resistit. Vfus præcipui in Arthritide, Hydropse. Catarrhis, aliisque morbis à phlegmate tartareo mucilagine aut flatibus oriundis: peculiari ter ac specificè curat luem Gallicam.

Cortex. Minus calidus est quam Lignum.

Gummi (Resina. Gummi hoc mecù communicauit Vir rerum nouarù curiosus Adrianus Sonnemann, Materialista huius Ciuitatis, Affinisque mihi dilectus, idque cù felici successu aliquoties in curanda L.G. fuisse adhibitum affirmavit. Sapore est acri, colore ac figurâ Laccam rerè repræsentante, pelucidam, friabile.


PRÆPARATA.

1. Decoctum. R. Guaiac. incisi ℥ij. Aq. fontan. ℔xij. post infusionem 24. horarum coque ad ℔vij. plus minusve; co-

letur pro sudorifero, reliquum coquantur cum ∇ tantundem pro potu ordinario.

N. Possunt & addit Liquiritia, passula, sem. anisi, &c.

2. Extractum viscosum & gummosum. Videl. 2.

3.  Rectificatum. Fit destillatione. Videl. 2.

Vires. Exhiberi commode poterit intrinsecus in lue Venerea, aliisque morbis diaphoresi opus habentibus.

Dosis gr. iij. v.

N. Sunt qui oleum hoc pro oleo heracleino Rulandi habent, eiusque vires admodum depredicant in Epilepsia, expellendo fœtu vino ac mortuo, in dolore dentium mitigando. Vide Brendel. in Chymia.

4. Spiritus. Est liquor acidulus, vna cum oleo in destillatione collectus ac rectificatus. Vid. l. 2. de Spiritibus.

N. Spiritus hic acidus præter medicinales virtutes descriptas, vim habet perlas, corallia, &c. soluendi. Intus exhiberi poterit à ℥ss. ad ℥j.

5. Θ. Ex cinere elixiuatur, sed paucum.

H.

C LXII. Hedera terrestris.

Ἡδέρῃ & hedera humilis vulgaris, corona terræ, Gundeireb, Grundreb, Grundmann, Erdepheuv, nostratibus Donnerreb.

Est { vulgaris. Hac vsualis.
montana. Inusitata.

Nuncupatur, Hedera terrestris, Brunf. Matth. Dod. Tab. Ger. Elatine, Brunf. 4. Chamæcissos, Trag. Fuchf. Cam. Chamæclema, Cord. hist. Corona terræ, Lob. Hedera terrestris vulgaris. C. B. I.

Crescit

Crescit passim circa sepes : floret
Aprilij potissimum.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Saporis est amari & acris
calf. & sicc. vulneraria est, aperit, abster-
git. Vfus creberrimi in tartaro, tam pul-
monum, quàm renum, aliarumque par-
tium, incidendo, resoluendo, adeoque con-
fert obstructionibus inde natis & ictero:
conducit erosionibus & ulceribus visce-
rum abstergendis, consolidandis, &c.
Extrinsecus adhibetur creberrimè ad
calculus renum resoluendum (in balne-
is) ad dolores colicos resoluendos (in cly-
steribus.)

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex herba Maio collecta.

2. Conserua. Ex floribus iunum.

N. Conseruam compositam habent
August.

3. Syrup. simpl. Ex succ.

4. Composf. Vide Disp.

5. Succus. Succum propinatum pluri-
mos à morte liberasse refert Hollerius.

CLXIII. Hedera arborea.

Κισσός, κισσός, Hedera, Brunf. Trag.
Cord. in D. Dod. Hedera arborea,
Matth. Nigra, Fuchsf. Lon. Hedera co-
rymbosa communis, Lob. Tab. Ger. He-
dera maior, Cast. Hedera arborea, C. B.

1. Germ. Fphee v, Fppich.

Arborea, Hac vsualis & iam no-
minata.

Est { Maior sterilis.
{ Minor.

Adhaeret muris, arboribus, aliisque
rebus in altum exurgentibus. Viret per
totum annum. Floret autumnò, baccas
fert hyeme.

OFFICIN. NAT.

Folia, Bacca, Lachryma seu Gummi.

Vires. Herba calf. & sicc. (Galeno est
mixta natura, calfac. scil. & frigida) su-
bastringit. Internus eius vsus, quia capi-
ti nervosque generi aduersatur, rarus
est. Externus crebrior in achoribus exic-
candis & sanandis, in fonticulis ab in-
flammatione tutandis (imponitur quoti-
die folium) in OXenìs curandis, in au-
rium purulentarum dolore sedando (mi-
scetur succus cum ol. e.g. liliaceo.

Baccæ: Purgant per superiora & in-
feriora, unde & contra febres à vulgo
exhiberi solent.

Gummi seu lachryma ex trunco he-
dera maioris vulnerato & interdum
sponte exit, colore ex flauo rubescens,
odore graue, sapore acre. Psyllothrū à
maioribus habetur insigne ac causticum
lentesque interimere dicitur.

N. Nostratibus in vsu non est, quippe
gummi hedera officinarum nec figura
nec viribus descripto gummi conuenit.
Purpureo nigricans est (adeoque Mu-
mia non absimile) fragile nec saporis
acris, sed velut adusti, lignosis segmen-
tis ac sordibus plerumque scatens.

PRÆPAR.

Ol. stillat. Ex baccis cum ∇ fer-
mentatis per Vesicam.

N. Alij lignum, baccas ac gummi
simulper Retortam destillando, oleum
parant.

CLIV. Helenium.

N. Dicitur Helenium, quod è lachry-
mis Helena natum dicatur.

Ελενιον, Elenion, Trag. Heleniū, Brunf.
Matth. Dod. Cord. in D. Lob. Cast. Cam.
Tab. Ger. Enula, Lon. Enula Campana,
Brunf Cam. Helenium vulgare, C. B. 1.
Alantwurcz.

TTT

N. Crescit

N. Crescit plerunque locis humidis:
Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ collecta antequam in stolones abierit, in taleolas secatur, inque umbra exiccatur.

Vires. Nonnullis calfac. & sicc. 2. (Fernelio calf. 3. sicc. 1.) abstergit, discutit, aperit, pulmonica est, stomachica, alexipharmaca, sudorifera, &c. Usus precipui, in tartaro pulmonum Renumque attenuando ac educendo, & hinc in tussi, asthmate, in cruditatibus ventriculi emendandis, ureteribus reseruandis, in peste contagiosisque morbis arcendis, in scabie, &c.

PRÆPAR.

1. Radix condita.
2. ▽. Ex radice destill.
3. Conserua Radicis.
4. Extract. Ex Rad.
5. Vnum Emulatum. Ex radice & musto.

CLXV. Herniaria.

Dicitur Herniaria, Dod. Cam. Tab. Ger. Herniaria multigrana serpillifolia, Lob. Herba Turca, Lob. Polygoni genus, Herniaria appellata, Clus. hist. Millegrana, Cord. hist. Herba canceri minor, Cord. Polygonum minus, Cast. Matth. Empetrum, Trag. Lon. Polygonum minus seu millegrana maior, C.B. II. (videl. inter Polygoni minores species) Germ. Hanukraut. Tauesenckærner.

Crescit locis aridis ac arenosis, nunquam tamen & circa ripas: Floret Iunio, Iulio.

OFFICIN. NAT.

Herba seu planta integra.

Vires. Resfrig. & sicc. Usus precipui est in Hernia curanda, urina cienda,

renum ac vesica calculo atterendo, ventriculi ac aliarum partium mucilagine, incidenda, educenda, bile ac aqua expellenda, adeoque in fetero curando.

PRÆPAR.

▽. stillat. Ex herba.

CLXVI. Hispidula.

Æluropus, pes Cati pilosella montana, hispida, C.B. 5. Ratzenfusz. Est species pilosellæ, (aliis Gnaphalii) parua admodum, totaque fere tométola, maxime verò flosculi, quos profert rubentes, interdum albidos. Videatur Renodæus.

Nascitur in collibus ac locis siccis & apricis: Floret Maio, Iunio.

OFFICIN. NAT.

Tota Herba cum floribus.

Vires. Easdem vires obtinet, quas reliqua pilosella genera, vide auriculā muris: peculiari tamen proprietate pulmonum exulcerationi conferre statuitur, & sanguinis expuitioni.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra planta cum floribus.
2. Syrupus simpl. Vide Renodæum.
3. Compositus de pede Cati. Vide l. 2.

N. Nostratibus Syrupus hic compositus vulgarissimus est.

CLXVII. Hordeum.

Gerste { hyemale. Hoc præstantius est { æstium.

Videatur Hordeum, Brunf. Matth. Lob. Dod. Lon. Cast. Ger. hordeum maius, Trag. Hordeum polystichum, Fuchs. Tab. Hordeum secundum hyemale, Cord. in D. Hordeum polystichum hybernum, C.B. I.

OFFICIN.

OFFICIN. NAT.

CLXIX. *Hyoscyamus*.

Semen & Farina.

Vires. Rosfig. & sicc. i. absterg. aperit, dig. emol. est diureticum, nutritivum.

N. Crudum ventriculo aliquatenus inimicum est, quippe flatulentum: tamen coctione corrigitur,

PRÆPARATA.

1. ▽. *Hordei grammis*. Fit mense Maio, colligiturque mane gramen rore adhuc madidum.

N. Insignis est efficacia in astu domando, extrinsecus in Cephalalgia mitiganda, oculorum defluxionibus calidis emendandis, &c.

2. Decoctum hordei, seu ▽ decoctionis hordei, *Gerstenwasser*.

N. Ad decoctum hordei sumitur hordeum non excorticatum si intentio sit abstergere, exiccare: Excorticatum si animus sit digerere, sitimque extinguere, &c. Formula decoctionum usitatissima, mulieribusque notissima sunt.

CLXVIII. *Horminum*.Sclarea { hortense odoriferum.
Schar- {
leyen, { sylvestre.Ex his officinale, quod Gallitricum, *Cam. Ger. Gallitrichum sativum, Trag. Sclarea, Matth. Cast. Cam. Tab. scarlea, Lob. Horminum sylv. i. Clus. hist. Orminum sativum, Fuchs. Cord. in D. Oruala Dod. Cast. Horminum sclarea dictum, C. B. 3.*

Floret Iunio. Iulio, solo gaudet opimo.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus, sed rato.

Vires. Cals. & sicc. abstergit, attenuat: Usus rari, nisi quod in vino cum floribus sambuci & vitis suspendi soleat.

Insciamus, Faba. suilla. Herba canicularis, Dens caballinus, *Bilsenkraut, Bilsen, Dollkraut, Schlasskraut, Sævvbõ, Rindsvurtz, Ziegennerkraut.*est { vulgaris vel niger, C. B. 1.
 { albus { maior, C. B. 2.
 { minor.

Ex his eligere monet Fernellius floribus albis, semineque albo, reliquis neglectis.

Insignitur *Hyoscyamus albus, Matth. Dod, Lob. Lon. Cast. Cam. Ger. Tab. Hyosc. candidus, Trag. Apollinaris 3. Cord. in D. Hyoscyamus albus maior vel 3. Dioscoridis, C. B. 2.*

Crescit incultus: Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix, Semen, Folia.

Vires. Refrig. 3. sicc. 1. emollit mire, somnum inducit, stupefacit, acrimoniam mitigat, rationem perturbat. Unde internus eius usus rarissimus est: exhibetur tamen ad hæmoptysin curandum. Externus aliquatenus crebrior, scil. in tumoribus calidis, in podagra, in odontalgia (suscipitur fumus seminis per infundibulum.)

N. 1. *Trallianus* amuletum antipodagricum ex radice facit: colligit eandem (existente in ☿ & ♀ ante ☉ lis occasum, radicem non attingendo, sed osse cuiuscunque animantis mortui effodiendo, peculiariaque insuper adiurationis verba superaddit, quæ cum superstitione videantur, adscribere supersedeo. Videatur *Trallian. l. 11. in fine.*N. 2. Antidota *Hyoscyami* sunt: lac caprinum, ▽ mulsæ, semen cucurbitæ sem. Vrticæ, Sinapi, Raphanus, Cæpæ, allium cum vino assumpta.

PRÆPAR.

1. ∇ . Ex fol. floribus ac semine immaturo destill.

2. S expressum. Ex semine albo recente, sicco, calida ∇ a asperso, in solato tritoque.

N. Alij macerant Hyoscyamum cum semine suo immaturo in Omphacino: Hinc exprimunt & coquunt.

3. Extractum seu succus Hyoscyami.

Ex radice mense Septembri vel Martio cum germinibus tenellis exprimitur succus, depuratur ac digeritur, ut rubicundo colore tingatur.

N. Ingreditur laudanum opiatum, Quercet.

CLXX Hypericum.

$\Upsilon\mu\epsilon\upsilon\delta\iota$, Hypericum, Brunf. Matth. Fuchs. Lon. Dod. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Herba perforata & Hypericum, Trag. Ascyron, Cord. in D. Androseni minus, Gesn. Hyper. vulgare. C. B. 1. aliis fuga Dæmonum, Iohann. skyaut.

Crescit passim in dumetis, aliisque locis incultis: Floret Iulio.

Folia ac Flores.

Vires. Calf. & sicc. est partium tenuium, diureticum ac vulnerarium. Vfus præcipui in vulneribus mundificandis, consolidandis (intus & extrinsecus in sanguine coagulato resoluendo, in calculo renum atterendo, in Lumbricis fugandis (scilicet si tempore exaltationis collecta fuerit, alias hac facultate destituitur.) Extrinsecus in contusionibus (præcipue nervorum (in tremore, in partu allenando)

N. Paracelsus refert inter herbas veneficia ac spectra arcentes, colligereque iubet sub influenza ♂ , ♂ ac ♀ ris (nullo modo sub ☾) tempore aurora, atque varium vñs vñs docet, loco amuleti

adhibet, pileo includit, noctu puluinari supponit, sæpius naribus admonet, sternit per domum, de parietibus suspendit, &c.

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex fol. ac flor. in siue Iunij collectis.

2. Oleum. Ex infusione florum in oleo communi.

N. Alij summitates cum flor. ad maturitatem seminis ferè accedentes macerans cum vino, exprimunt atque cum Therebinthina & oleo coquunt. Vide Disp. August.

3. ☉ Ex planta, integra incinerata,

4. Tinctura. Hanc habent Tentzel. in Exeg. Sala de Essentiis V. 1. 2.

N. Dos. gr. vj. ad ʒß.

CLXXI, Hyssopus.

$\Upsilon\upsilon\sigma\sigma\upsilon\pi\upsilon\varsigma$, Hyssopum, Isop, Ispen.

Est $\left\{ \begin{array}{l} \text{Hortensis. Hac officinarum.} \\ \text{Sylvestris.} \end{array} \right.$

Vocatur Hyssopus, Brunf. Tag. Cord. in D. Lon. Tab. Cam. Hyssopus hortensis, Fuchs. Hyss. vulgaris Dod. Clus. hist. sativa, Cord. hist. Hyssopus Arabicum, Lob. Ger. Hyssopus officinar. cærulea siue spicata, C. B. 1.

Crescit in hortis: Floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus collecta Aug.

Vires. Calf. & sicc. 3. partium tenuium est, atten. aperit, absterg. Vfus præcipuus in affectibus pulmonum tartareis, tussi, asthmate. Extrinsecus adhibetur crebro ad sugillationes oculorum, ad uterum mundificandum, auriumque tinnitus tollendos (per tritorium suffitus susceptus) ad oris absterisionem (in gargismo)

N. Sunt qui Absinthio in corroboracionem

tionem ventriculi preferunt.

PRÆPAR.

1. ▽ stillat. Ex herba & floribus in MB.
2. Ol. stillat.
3. Conseru. Ex floribus.
4. Spec. Diabysso. Nic. Vid. D.
5. Syrup. simplex. Ex succo.
6. Compos. Vid. Disp.

I.

CLXXII. Iacea.

Herba Trinitatis, *Brunf. Fuchs. Lon.* fatiua, *Trag.* iacea siue flos Trinitatis, *Matth.* iacea maior siue viola tricolor, *Cast. Dod. Clus. Ger.* Viola Hammea, *Coloria, Lob.* Viola Trinitatis 1. *Tab.* Viola tricolor hortensis, *C. B. 5.* inter violas martias. Germ. *Freysamkraut, Dreyfaltigkeublum, Stebenfarbenblum, Vnnützelserge, ie langer ie lieber.*

Floret Aprili, Maio ac toto ferè æstate: Crescit locis arenosis.

Colitur in hortis, crescit & in agris. Illa licet præferatur: attamen non licet non recipere & syluestrem.

OFFICIN. NAT.

Herba integra cum floribus

Vires. *Calf. & sic. ad gr. vsque 3.* (aliis remissius) subamara ac acris est: hinc abstergit, penetrat, incidit, discutit, vulneraria est ac sudorifica. *Vsus præcip. in estu (maxime infantum) domando, in scabie ac pruritu, in mucilagine viscosa pulmonum: in uteri obstructione. Extrinsecus itidem in pruritu, in abstergendis vulneribus. in mucilagine pulmonum incideada, in uteri obstructione. (baln.)*

PRÆPAR.

- ▽. Ex integra herba.

CLXXIII. Iasminum.

Is. Luc. Iosinenum, Ieseminum, Gelfeminum, Arab. Zambach, Iesemin, Iasme, *Brüel: Reben.*

Vsualè est, Iasminum vulgatiùs flore albo, *C. B. 1.* quod est Iasminum, *Dod. (cui & Apiaria,) Cord. in D.* album, *Tab. Ger.* Gelfeminum vel Iasminum, *Matth. Cast. Cam. Alpin.*

Gaudet locis calidis ac apricis. Nostratibus colitur in hortis: Floret fere integram æstatem.

OFFICIN. NAT.

Soli Flores, sed raro. Nimirum nostratibus non nisi Oleum in vsu est, quod, si tex reiterata infusione vel coctione florum in oleo veteri. (N. Aliis in oleo amygd. dulc.)

Vires. Easdem ferè vires obrinet, quas chamamelini. *Dig. calf. emoll. aper. Vsus præcipuus internus ad uterum calfaciendum & laxandum, eius scirrhum sanandum, ad partum facilitandum, ad rursim anhelitusque difficultatem, ad plurim, dolores stomachi, intestinorum, uteri, (oleum Iasmino, amygd.) Externus in catarrhis frigidis, in membris ac articulis resolutis, in dolore pleuritico, colico ac uterino (in clysmate vel vnguentis.)*

N Sunt inter mulieres, quæ oleo Iasmino amygdalino capillos pectunt, ut eò felicius crescant. Verùm caueant ab eo biliosa, utpote quæ facile capitis dolore remillo sibi conciliare possunt.

CLXXIV. Imperatoria.

Ostrutium, *Lon.* Ostrutium, Astrutium, Astrentium, Astrentia, *Brunf. Dod. Clus. hist.* Magistrantia, *Cam.* Struthium, *Cord. hist.* Laserpitium Germanicum

T T t 3

nicum, *Fuchf.* Smyrnion hortense,
Trag. Imperatoria, *Matth. Lob. Cast.*
Tab. Ger. Imperatoria maior, *C. B. 1.*
Meisterwuritz, Mueistrantz, Ostritz.

Floret Augusto, colitur in hortis.

OFFICIN. NAT.

Sola radix.

Vires. Saporis est acernimi: calf. & sicc. 3. alexipharmaca ac sudorifica est, atten. aperit. *Vsus* præcip. in venenatis morbis ac iſtibus, in pulmonum Plo. resoluendo, expectorando; in fœtore anhelitus corrigendo, in capitis affectibus phlegmaticis, paralyſi, Apoplexia, &c. in cruditate ventriculi, & colico dolore, in feбри quartana. Extrinsec. in Odon- talgia (gargarif.) in catarrhis exiccandis (suffitu) in tumoribus ac arthride fri- gida. In scabie capitis exiccanda (lorio- ne) in serpigine in veterata sananda cum adipe ſuillo illita in globulis sagi- tisſe corpori extrahendis (imposita.)

PRÆPARAT.

▽stillat. Ex herba floſcente col- lectâ Iulio.

CLXXV. Iris Noſtras.

Iris, Beyelwuritz, Himmelschvver- zel, blavv Gilgen.

Iris in offi-
cinis vſita-
ta est

Noſtras: Hec huius loci.
Peregrina Illyrica ſcil. &
Florentina. *Vid. infra.*

E variis Iridis no- ſtratis ſpeciebus inferitur ſolum in officinas Iris vulgaris Germanica ſeu ſylueſtris, (latifolia,) *C. B. 1.* Quæ inferibitur, *Iris, Brunf.* Sylue- ſtris, *Matth. Cord. b. Caſt. Tab.* ſylueſt. 1. *Lob. ſylu. maior, Matth. Epit.* Iris Germanica, *Fuchf. cærulea, Dod. Gla- diolus cæruleus maior, Trag.* Iris lati- folia maior vulgaris, *Ciuf. hiſt.*

Floret tempore verno, Aprili ſcil. & Maio.

OFFICIN. NAT.

Radix, colligenda vere antequam germinare cepit.

Vires. *Calf. ſicc. 3.* valde hydragoga eſt, ac errhina. *Vsus* præcip. in hydropi- cor. aqua educenda. Extrinsecus in im- petigimbus, aliisſque corporis maculis deicgendis.

N. Ventriculo reliquisſque viſceribus inſenſa eſt, proin corrigitur ſtomachicis.

PRÆPAR.

1. Succus. Exprimitur ex radice, de- puratur (digestione) adhibeturque re- cens prohydragogo.

Dofi ʒj. ad ʒiij.

N. Juſſiſſatur nonnunquam, reſerva- turque pro Errhinis.

2. Fecula. Fit ex ſucco la.

N. Non aque purgat ac ipſamet radix.

Oleum inſuſum, Vide Diſp.

CLXXVI. Iris Illyrica ac
Florentina.

Præualeť Illyrica, ſequitur Floren- tina; vtriuſque itidem ſola radix in vſu eſt. Germ. *Violwuritz.*

Vires. *Calf. & ſicc. 2.* incid. atten. ex- pectorat. diger. abſterg. emollic. *Vsus* præ- cip. in mucilagine ſeu Pro pulmonum, tuſſi, aſthmate, obſtructione menſium, torminibus ventris infantum, Extrinſe- cus abſtergit cutis maculas & lentigi- nes (cum Elleboro & melle mixta) oris fœtore emēdat. creberrimus vſus moder- nis eſt in pulveribus, qui capillis inſper- guntur. Vulgus vocat pulueres de Cypro.

PRÆPARATA.

1. Extractum.

2. Spec. Diateneos ſimpl. V. D.

3. Salomon. V. D.

CLXXVII.

CLXXVII. *Iuglans.*

E Iuglandum generibus vsualior est, quæ dicitur nux Regia, *Brunfels. Cord. in D. Nux iuglans, Trag. Matth. Lon. Dod. Lob. Cast. Tab. Cam. Iuglans, Fuchs. Nux iuglans seu regia vulgaris. C. B. I. Nuszbaum, VVelsehe Nusz.*

Iuli & folia erumpunt Martip:
Nuces maturescunt autumno.

OFFICIN. NAT.

Nuces, Putamina nucum externa, eaque viridia, Cortex internus ipsius arboris, Cortex interior nucleum ambiens, Iuli ante oculos apparentes & decedentes.

Vires, Nuces recentes calf. 1. sicc. 2. sicca sunt facultatis calidioris ac siccioris. Comestæ difficilis sunt digestionis, pauci nutrimenti, ventriculo infensa, bilem argent, cephalalgiam excitant, pulmonum affectus ac precipue tussim exasperant. Dicuntur tamen à peste præservare.

Putamina externa Viridia, vi vomitum leniter mouendi prædita sunt.

Cortex interior, de arbore decerptus, dum adhuc succulentus est, siccatuque ciet vomitum sat valide.

Dosis à ʒß. ad ʒj.

Cortex nucleum ambiens inuat colicos (potus.)

Iuli idem vomitum excitant, sed lenius. Vsu præcipuus in colico, nephriticoque dolore, sistunt diarrhæa, exhibiti.

PRÆPAR.

1. Nuces conditæ. R. Nuces virides circa Festum Ioannis collectas, perfora aliquoties, vt penetrabilia putamina sint, ac macera (ʒ7. vel 10. in ∇ frigida, ∇ quotidie semel ac iterum permutando, vt aliquo modo dulcescant. Hinc coque l. Δ vt mollescere inci-

piant. Postea sicca & confige Cinam. Garyophil. &c. atque cum saccharo vel melle coque ad consistentiam. Vide l. 2. Confortant stomachum, iuantque digestionem, vnde & bellariorum loco apponi solent. Specificæ eas eiere menses, testis est Matthiolus.

2. ∇ Vomitoria ex nucibus. Vide l. 2. c. 38.

N. Alij destillant ∇ m ex nucibus immaturis contusis, alij ex solis putaminibus viridibus.

3. Succus mense Februar. è radicibus perforatis destillans.

Vires. Podagricos dolores ad miraculum lenire dicitur, illius.

4. Rob. nucum: Diacaryon. Fit ex corticum viridium succo & mellis.

Vires. Destillationi rennium catarhorum confert. Vide Disp.

5. Oleum. Fit expressione ex nucleis maturis.

Vires. Flatus potenter dissipat, adeoque in colico dolore multum fert auxilij.

Dosis ʒij. iij. ad iiij. &c.

Extrinfecus tumores discutit, contractos nervos emollit, scabiem antiquam sanat.

6. Electuarium. Vid. l. 2.

N. Variæ Electuarij nucum inueniuntur descriptiones, quæ tamen Basin minime à nucibus participiant, vnde nec huius loci sunt.

CLXXVIII. *Iuiuba.*

Zizæo, Iuiubæ maiores oblongæ, C. B. I. Iuiubæ, *Trag. Cord. hist. Lō. Tab. Iuiubæ Arabum, Lob. Zizipha, Matt. Cast. Ziziphus, Dod. Clus. hist. Ziziphus rubra, Cam. Brustbeerlein.* Fructus sunt arboris Ziziphi, magnitudine Oliuas, sapore passulas maiores ampulantes,

æmulantes, vnicum referentes lapideum nucleum.

Asportantur ex Italia.

Vires. Moderatè calf. & humect. Vfus præcip. in pulmonum asperitate, tussi, pluritide, urina acri, feruescentia sanguinis, erosione renum ac vesicæ.

PRÆPAR.

Sr. de iuinibis. Vid. Disp.

CLXXIX. Iuniperus.

Ἰουνιπέρης, Ἰουνιπέρη, Iuniperus, Brunfens. Matt. Dod. Lon. Lob. nostras, Cam. vulgaris, Trag. Clus. hist. Minor, Fuchf. Cord. in D. Syluest. Cast. Iuniperus & Iuniperus baccifera, Tab. Iuniperus vulgaris fruticosa, C. B. 1. German. VVeckholder, VVachholder, VVachholderbaum, Kramerbaum.

OFFICIN. NAT.

Lignum, Bacca, Gummi, Fungus.

Vires. Lignum calidum ac siccum est 3. suave olet (præcipue si Martio mense cadatur,) unde & rasura eius non sine causa in cucuphis adhibetur, quippe cephalicum est, nervosumque genus insigniter roborat.

Baccæ, Calf. 3. succ. 2. discut. incid. atten. Vfus præcipui, in cienda urina, sudore, obstructis mensibus, obstructo liene, in affectibus capitis, nervorum, pectoris (tussi) in morbis à flatu, (ut colica) in mucilagine renum & vesicæ, &c. Suffitus vſitatus est tempore pestis, rùm è baccis, tum è ramusculis suscitatus. Colliguntur bacca sole in virgine existente.

Gummi, (Arab. Sandaraca vernix) truck per Firmis, calf. & succ. 1. (aliq 2.) condens. discut. Vfus præcipui in nervorum affectibus, resolutione, frigidityte, contractura, &c. conuenit & in capitis

affectibus reliquis, à frigidityte subortis.

N. 1. Vernix liquidus, factitius est liquor, ex gummi hoc, i.e. Sandaracha in oleo lini soluta. Valet ad ambusta, lenit dolores præcipue hæmorrhoidum.

N. 2. Sandaracha Græcorum est Auripigmentum.

Fungus. Maio mense instar musci adnascitur, Inferuit aqua ophthalmica.

PRÆPAR.

1. ∇ . Ex baccis sine præmissa fermentatione raro destillatur.

2. Spiritus. Fit ex baccis cum ∇ (♂ 4.5. fermentatis & per vesicam destillatis. Vide l. 2.

N. Alij loco ∇ æ sumunt cereuisiam, spiritusque copiam sibi persuadent maiorem: Verum enim verò maior illius pars cereuisia debetur.

3. Oleum ex baccis. In destillatione ∇ æ vel spiritus simul extillat.

4. Oleum ex ligno. Fit per descensum vel Retortam. Applicatur extrinsecus in morbis, ut supra diximus, nervinis.

N. Melius elicitur per vesicam, extillatque clarum.

5. Sal. Ex cineribus baccarum elicitur, tum quoque ex ligno combusto.

6. Rob. Iuniperinum. Mel Iuniperinum. Theriaca Germanorum. Fit coctioe cum ∇ , hinc expressione ac inspissatione.

N. Quercetanus macerat ac coquit cum Vino. Ph. Rest. c. 23.

7. Extract. gummosum. Ex ligno & cortice fit l. a. Quercetan. Ph. Rest. cap. 23.

8. Extract. è baccis siccis. Fit l. a. cum ∇ vel cum ∇ , i.e. Spiritu Iuniperi. Dosis ℞j. ℞ij.

Vires. Virumque Extractum excellens est sudorificum & Bezoarticum aduersus Epilepsias, pestes & affectus alios

alios contagiosos atque venenatos.

9. *Elyxir. Iuniperium.* R. Baccar.

Iuniper. maturar. ac electar. q. v. contundantur crasse, digeranturque affusa aliqua ∇ diuretica. Hinc exprime, abstrahendoque inspissa ad consistentiam mellis. Huius mellis Iuniperi cochl. 10. 11. 12. &c. misce optimè cum ∇ vitæ iuniperina, digereque aliquandiu, lenissimo calore (\odot lis, & sim.) sic confecisti Elixyr Iuniperinum admirandarum virium, in calculo, quod insuper stomachicum

insigne est, aliasque facultates eximias obtinet, de quibus in baccis.

Dosis cochl. j.

N. *Vir Generosus ac Nobilissimus Dn. Chun. Quirinus Schürke ab Holtzhansen, Illustriss. aula Darmstadina olim Marechallus, vir in omni scibili solertissimus, iam morte immatura non sine plurimorum querela, ereptus, creberrimo Elixyris huius usu annos plurimos à calculi iniuriis, quibus alias obnoxius maxime fuit, liber vixit, eoque nomine id mecum communicavit.*

L.

CLXX. *Lactuca.*

Lactuca, { Hortensis } vulgaris
Lattich, { capitata }
est { crispa }
Sylvestris.

Vsuales sunt promiscue.

N. *Nomen Lactuca Botanicis omnibus vsuale est.*

Solo gaudet pingui & stercoreato. Floret æstiuo tempore.

OFFICIN. NAT.

Folia ac Semen.

Vires. Refrig. ad gradum vsque 3. siccatur mitius, conciliat somnum, bilis feruescentiam ac æstum compefcit, lac anget, aluum leniter mouet, ventriculo conuenit, multi ac laudabilis nutrimenti est, unde & in acetariis vsurpari crebrius solet. Extrinsecus sedat dolorem capitis, medetur ambustis, somnum conciliat (in lotionibus pedum,) &c.

Semen. Est ex seminibus frigidis famosis illis, quæ minora dicuntur. Valet ad Gonorrhæam virulentam, ad urinæ ardorem, ut & ad reliqua quibus folia conuenire diximus.

PRÆPAR.

1. ∇ . Ex foliis.

2. Succus inspissatus.

3. *Caules conditi.* Fiunt è stolonibus nostratis lactucæ, dum caulescunt.

CLXXXI. *Lagopus.*

E generibus Lagopi vsitatus est, quod inscribitur *λαγῶπις*, Dioscorid. *Plin. λαγῶπις*, Hippocr. Lagopus seu pes leporinus, *Matth. Fuch. Dod. Lob.* (cui & lagopyton.) Lag. maior, *Cas. minor, Cam. Lagopodium, Tab. Ger. Lepor. pes, Cord. in D. aliis trifolium leporinum, Germ. Hasenklee, Hasenpfotelein, Ratzenklee.*

Crescit inter segetes. Viget Iulio potissimum.

OFFICIN. NAT.

Herba cum Spicis.

Vires. sicc. & adstring. vsus præcip. in profluvio alui, vteri (fluore albo) in dysenteria, hæmoptoei, stranguria vulceratione vesicæ, &c. Extrinsec. in hæmorrhæ-

V V u

gia

gia hamorrhoidum. *Vulnerum*, in tumo- ad cutim Solis ardore induratum leni-
ribus inguinum & herniis, &c. *Quin* & endam adhibetur (lotione.)

CLXXXII. *Lapathum.*

Est vel { *Acetosum. Vide Acetosam.*
 { *Hortense. Vide Spinachiam.*
 { *Sylvestre* { *Angustifol. De quo hic.*
 { *Latifol. Vid. Rhabarb. Monachorum.*
 { *Aquaticum.*

Dicitur *Rumex acutus*, *Cord. in D.*
Oxylapathum, *Fuchf. Matthiol. Cast.*
Germ. Oxylapathum, Dioscor. Lapa-
thum acutum, Trag. Lob. Dod. Lapa-
thum satium, Cam. Lapathum seu
Rumex, Lon. Cast. Lapathum folio acu-
to plano, C.B. 1. German. Menge v-
vurtz, Grindvurtz, Streiffvurtz, Bu-
benkraut, vilder Mangolt, vilder
Ampfer, Lendenkraut.

Prouenit in locis incultis : Floret
Maio ac Iulio.

Radix ac Semen sed raro.

Vires. Lapathum temperata cense-
tur natura in actiuis, alias ad siccitatem
inclinat. Semen aliu obstruit: Folia sub-
ducunt: *Radix* vsus crebri & praeipui est
in scabie extergenda ac siccanda, idque
extrinsecus, potissimum in lotionibus.

P R A E P A R.

∇. stillat. Ex radice.

Vires. Commendatur maximopere ad
cutis maculas & pustulas, alphos, iun-
thos, vitiligines & lichenas.

CLXXXIII. *Larix* seu
Larex.

Adolē. Larix, Brunf. Matth. Dod.
Fuchf. Lon. Lob. Cast. Clus. hist. Tab. Ger.
Cam. German. Lerchenbaum, Lerchen-
dannen.

Gaudet montanis, vnde & in Hel-

vetia ac territorio Tridentino vulga-
ris est, viget ac Floret vere.

O F F I C I N. N A T.

Resina & Fungus trunco adnatus
Agaricum dictus. Vide infra.

Resina fluit ex arbore ad medullam
vsque perforata, venditurque titulo *Te-*
rebinthina vulgaris. De hac vide infra
Terebinthina.

CLXXXIV. *Laurus.*

Δάφνη, *Lorberbaum.*

Est { *Hortensis* { *Latifolia Hec vsua-*
 { *lis.*
 { *Angustifolia vulga-*
 { *Sylvestris.* { *ris. Hec priori sub-*
 { *stui potest.*

Dicitur (*latifolia*) *Laurus* latiore
folio, *Matth. Cast. L. Latifolia, Cord. in*
D. L. Latifolia mas, Tab. Laurus lati-
folia μαυρίδα Dioscor. C. B. 1. Angu-
stifolia dicitur Laurus, Brunf. Trag.
Lon. Lob. Laurus tenuifol. Matthiol.
Cord. in D. Cast. Cam. Lauri altera spe-
cies, Dod. Laurus mas, Tab. & Ger. Lau-
rus vulgaris, C. B. 2.

Crescit sat copiose in Italia, apud
nos non nisi in hortis colitur.

O F F I C I N. N A T.

Folia & Bacca.

Vires. Calf. & sicc. 3. (bacca paulo
calidiores

calidiores sunt) emolliunt, resolunt.
Vsus *præcip.* (baccarum) in mensibus &
 urinis ciendis, in affectibus nervorum,
 paralyfi, in colica, in dolore post partum,
 in cruditatibus ventriculi. Extrinsecus
 conferunt folia ad ictus vesparum, mol-
 liunt tumores, promouent menses (in suf-
 fitu ac balneo) leniunt dolores, odontal-
 giamque mitigant (gargar.)

P R A E P A R.

1. *Electuar.* de baccis lauri. V. D.
 2. *Emplastr.* de baccis. V. D.
 3. *Oleum laurinum.* Vel ex baccis
 recentibus exprimitur, vel coquendo
 elicitur. August:

4. *Oleum stillat.* R. Bacc. lb. ij. contu-
 sis superfunde ∇ æ tepidæ lb. iij. vel iij.
 Postquam aliquandiu steterint, destilla
 per \times vel vesicam. Sic prodibit oleum
 ac ∇ per tritorium separanda.

Vires. Oleum hoc stillat, discutit in-
 signiter flatu ac ventositates, præcipue
 in spasmo granidarum, ut & in calicibus si-
 derata membra illitu restituit, auribus
 inditum dolores compescit, auditumque
 confortat, delet impetigines, lentigines
 & quasunque faciei maculas. Denique
 ichorosis capitis ulceribus medetur,
 phthiriasin & tineas curat.

Dosis gr. ij. iij. iij. Videatur Tentzel.
 in Exeg.

5. *Spiritus.* Fit ex baccis cum ∇ fer-
 mentatis.

6. *Essentia.* Fit ex baccis que in spiri-
 tu infusæ, vires suas eidem comunicant.

C L X X X V. *Lens palustris.*

Lenticula lacustris, aquatica, Len-
 ticula aquatica, Brunfels. Palustris,
 Matth. Cord. in D. Lon. Ger. Dod. Len-
 ticula palustris vulgaris, C. B. 2. Germ.
 Wasserlinsen.

O F F I C I N. N A T.

Folia aquis supernatantia.
Vires. Refrig. humect. 2. *Vsus* præcipuus
 ad extinguendas inflammationes ætusq;
 sanguinis. Extrinsecus ad scabiem etiam
 malignam.

C L X X X V I. *Lentiscus.*

Exi. & Dioscor. Lentiscus, Matth.
 Dod. Lon. Clus. Cob. Cas. Cast. German.
 Mastirbaum. Arbor est baccifera, in
 Italia, Gallia Narbonensi, & præcipue
 in Insula Chio copiosè nascens.

N. Bellon. lib. 2. obseru. c. 8. Solas
 Lentiscos in Chio Insula Mastichen
 proferre asserit, cui Experientia recla-
 mat. Nimirum ex donatione Affinis mei
 dilecti D. Joh. Glaferi, Pharmacopæi hu-
 ius Reipub. solertissimi, frustulū obtineo
 mastiche dirissimum, quod sibi ex Hel-
 uetiis alpibus transmissum fuisse asserit.

Exhibet officinis Gummi resinam
 Mastichen dictam, quam vide infra. Ex
 ligno fiunt vulgariter dentificalpia, quæ
 reliquis laudem præripiunt.

N. Hippocrates adhibet & baccas,
 quas quidas appellat.

N. 2. Exprimitur & oleum ex bac-
 cis, Clus. in hist. Verum nobis vulgare
 non est.

C L X X X V I I. *Leuisticum.*

Ligusticum vulgare, C. B. 7. (inter
 Libanotides,) Laserpitium Europæum
 Germanicum, Leuisticum, Brunf.
 Lob. vulgare, Matth. Dod. Ligusti-
 cum. Brunf. Cord. in D. Lon. Tab. sa-
 tiuum, Trad. Cord. hist. vulgare, Cam.
 Lybisticum vulgare, Fuchf. con. Laser-
 pitium, Ger. Smyrniun, Fuchf. aliàs
 Hipposelium, Germ. Liebstackel.

V V u 2 N. Est

N. Est & *Ligusticum verum. V.d.*
Seceli offic. Est *in idem Laserpitium*
aliud Dioscoridis, ex quo Laser Gummi,
modernis incognitum.

Floret in primis Iulio mense, gaudet
solo umbroso.

OFFICIN. NAT.

Folia, Radix, Semen.

Vires. Calf. & sicc. 3. incid. aper. ala-
xipharmacum est ac diureticum, vulne-
rariumque. Ventriculū roborat, asth-
mati subuenit, menses & lochia ciet, fœ-
tum mortuum. eiicit (semen) tartarum
lentum resoluit, doloresque inde natos
sedat, Epatis, Lienisque obstructions
referat, adeoque præcipue Ictero conue-
nit. Extrinsecus usus eius creberrimus
est in balneis, cataplasmatibus (utero &
veteribus dicatis) in Emplastris vul-
nerariis, & sim.

N. 1. *Vulgus per caulem cauum po-*
tum haurire iuenit, quo tussim sedatum
iri, sibi persuadet.

N. 2. *Radicem effossam, dum ☉ in V*
intrat amuleti loco appendunt in atro-
phia. Fel. Würtz.

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex integra herba cum
rad. ac flor. mense Iulio collectis.
2. Oleum stillat. Cum ∇ ascendit.
3. Sal. Ex cinere.

CLXXXVIII. Lichen.

Lichen petraeus, Lichen saxatilis,
Muscus saxatilis, Hepatica, *Brunfels.*
Lob. Lon. Tab. hepatica saxatilis, fon-
tana, C. B. 1. Iecoraria seu hepatica fon-
tana, Trag. Lichen, Matth. Fuchf. Dod.
Cord. in D. Cast Lichen 1. petraea, Ger.
Germ. Leberkraut, Steinleberkraut,
Steinstechten, Mooskraut, Brunn-
kraut.

N. Huic surrogatur muscus arboræus
crustaceus. Vide *Pulmonaria arborea.*

Floret Maio & Iunio, floresque fert
instar stellarum. Crescit locis vdis &
umbrosis in puteis, iuxta fontes, &
simil.

Vires. Refrig. & sicc. absterg. Epati-
ca insignis est. Usus præcipui in Epatis
obstructione & Vesicis (quarum signatu-
ram in foliis gerit.) Hinc in Hætica,
in Ictero, in Scabie & Lichenibus, in
gonorrhæa, in febris. Extrinsecus sistit
sanguinem in vulneribus.

PRÆPAR.

∇ stillat. Fit in fine Maij ac princi-
pio Iunij.

CLXXXIX. Ligustrum.

Küders, Ligustrum, Brunf. Matth.
Fuchf. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Ger Li-
gustrum Germanicum, C. B. 1. vulgare,
Trag. maius, Lon. Phyllirea, Dod. Arab.
Kenne. German. Hartriegel, Beinholtz,
Reinweiden, Mundholtz.

Est <	{	Vulgare; quod officinarum & hu- ius loci.	} officinis inusitata.
		Myrtifolium	
		Foliis laci- niatis.	
		Ægyptiacum latifolium	
		Angustifo- lium.	

Crescit passim in sepibus. Floret
Maio Iunio.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores.

Vires. Refrig. & sicc. astring. incid.
(folia efficacius, flores imbecillius) proin-
de conducunt ad infamatioes, putredini-
nes, exulcerationes oris & faucium, ad
precidentiam & tumorem vnae, laxita-
tem

tem gingivarum (in collation.) Quin & intrinsecus ad scorbuticam folia maxime facere compertum est. Adhiberi quoque possunt in profluviis sistendis, &c.

P R A E P A R.

1. ▽ stillat. E floribus.

N. Hac commendatur præter dictas qualitates ad oculorum inflammationem & rubedinem.

2. Oleum infusum, sed raro.

C X C. Liliū.

Лилий, Liliū. Germ. lilien, Gilgen.

Liliorum genera diuersa sunt, album scilicet aureum ac cruentum: Officinis tamen vsitatus est album, quod insignitur liliū, Brunnf. Matth. Cast. Liliū album, Trag. Fuchs. Lon. Tab. Lil. candidum, Cord. in D. Lob. Dob. Liliū album vulgare, Cam. Liliū album flore erecto & vulgare, C. B. 1.

Gaudet solo pingui stercore ac vmbroso, Floret Iunio.

O F F I C I N. N A T.

Flores, Radix, Stamina.

Vires. Flores moderatè calf. & humect. partium sunt diuersarum, & anodynæ, digerunt, maturant.

Radix, absterg. & sicc. 1. digerit itidem, emollit maturat. Vfus internus rarus est, externus crebrior, isque tumoribus maturandis & leniendis, in clauis pedum, &c. sanandis, in pudendis parturientium molliendis, in ambustis emendandis, &c.

Stamina exhibentur ad faciendum partum cum ▽ verbenæ vel simili.

P R A E P A R A T A.

1. Conseru. Flor. alb.

2. ▽. Ex florum foliis recentibus, iisque tum folis, tum concisis cum radice.

Vires. Vfus est crebri in affectibus pulmonum, asthmate, tussi, & simil. Extrinsec. in facie dealbanda (cum camphora & oleo ☞.)

3. ☞ Liliū simplex. Ex floribus foliis in ol. oliuar. veteri infusis. Vide Disp.

4. ☞ Lilior. compos. Ex iisdem floribus ac aromatibus. Vide Disp.

C X C I. Liliū conuallium.

Liliū conuallium album, C. B. 2. Ephemerum non lethale, Fuchs. Cacia Liliū conuallis vel sylu. Brunnf. Liliū conuallium, Trag. Matt. Dod. Cast. Tab. Ger. Clus. hist. Liliū conuallium vel vernum Theophrasti. Lob. Germ. Meyenblümlein.

N. Est & Liliū conuallium flore rubente, sed minus vsitatum.

Gaudet solo humido, nemoroso, Floret initio Maij.

O F F I C I N. N A T.

Soli Flores raro Radix.

Vires. Calf. & sicc. cephalici sunt. Vfus præcipui in morbis capitis frigidis vt Apoplexia, Paralyti, Vertigine, Epilepsic. Hinc & in Lypothymia. Insigne itidem errhinum exhibent puluerisati.

P R A E P A R.

1. ▽ simplex. Ex floribus.

2. Spiritus Vini Liliatus. Ex floribus cum Vinovel Maluatico destillatis.

3. Spiritus Lilior. Ex floribus fermentatis destill.

4. Conserua. Ex floribus.

5. Oleum. Ex infusion. florum recentium in oleo veteri.

6. Puluis sternutatorius. Ex floribus puluerisatis.

N. Sunt qui succum instar olei præparant. Floribus implent vasculum, occluduntque:

duntque hinc per mensem in formicarum aceruo sepeliunt, ut in succum lique-
scant. Anodynum hoc censetur in signe
antipodagrici, curatiumque serpiginis.

CXCII. Limonia mala.

Λιμωνια μᾶλα, Germ. Limonien. Po-
ma sunt mali limoniæ, C. B. 1. Videat-
tur malus Limonia, Matth. Dod. Lon.
Cast. Tab. Limones, Cord. in D. Bellen.
Lob. Clus. hist. Limon arbor ex citri
genere, Cord. hist. Malus Limonia aci-
da, C. B. 1.

Vires. Citri mali virtutes emulan-
tur, nisi quod ut magis acidiuscula sunt,
ita & magis refrigerantia ac siccantia.
Vsus præcip. in febribus aliisque morbis
calidis, in calculo, & sim.

PRÆPAR.

1. Succus expressus.
2. Syr. de succ. express. & sacchari 1.
Vid. Disp.

3. ▽ Ex floribus quæ raro extat.

N. Sunt qui cortices cum succo clau-
so vase macerant, & postea destillant.

CXCIII. Linaria.

Linariæ genera plurima occurrunt,
ex his solummodo inferuit Officinis,
Linaria vulgaris luten flore maiore,
C. B. 3. Olyris, Matth. Cord. in D. Lob.
Cast. maior Tabinaria, (& pseudoli-
num.) Brunf. Ger. 1. Dod. Lon. Linaria
vulgaris, Trag. Cam. Germ. Leinkraut,
wilder Flachs, Hankraut.

Crescit locis incultis & cultis iuxta
sepes. Floret Iunio, Iulio ac Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Calf. & sicc. est diuretica,
amari saporis. Vsus præc. in Ictero &

obstructo Epate. In urina difficultate, in
hydrop. Extrinsecus imponitur abdo-
mini in stranguria; ano, in hamorrhoi-
dum dolore.

▽ stillat. Ex integra planta in fine
Maij collecta.

Lingua Ceruina, vide Scolopendria.

CXCIV. Linum.

Linum { sativum. Hoc usual.
Flachs, { sylvestre. Minus usuale.

Dicitur Linum, Brunfels. Matth.
Fuchs. Tab. Cord. in D. Lon. Cast. Linum
sativum, Trag. Dod. Linum vulgare cæ-
ruleum, Lob. Linum sativum, C. B. 1.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. Calf. 1. in reliquis tempera-
tum est, digerit, emollit, maturat. Vsus
præcip. in tussi, pleurisi, phthisi. Extrin-
secus maturat tumores, lenit dolores,
fætum expellit.

PRÆPAR.

1. Mucilago. Fit coctione vel infu-
sione seminis in ▽.

2. Farina.

3. Oleum expressum.

Easdem vires retinet, quas semen.
Prodest etiam ad pterigia oculorum,
(instillatum) imprimis cum successu ex-
hibetur pleuriticis atque dolore colico
vexatis, in quibus & extrinsecus pro-
dest, ut, & in Liene duro.

Dosis ad ʒij.

N. 1. Stupa & tela inseruiunt nō raro
aliorum medicamentorum susceptioni &
applicationi. V.g. Tela recens anodynus
nephriticis suscipiendis familiaris est.

N. 2. Huc oleum dictum è chartis
combustis, videlicet charta accenditur,
imponiturque lamina stannea ut com-
buratur.

buratur. Sic adhaerefcit ftanno liquor craffus, colligendus.

Vires. Anodynum eft ac confolidatium. Hinc utile in odontalgia, lichenibus, &c.

CXCIV. Lotus.

Lotus hortenfis, Tab. hortorum odora, Lob. fylueftris, Matth. Caft. fatiua, Cord. in D. & hift. Cam. Trifolium Dioscoridis, Trag. Trifol. odoratum Fuchf. Lon Trifol. odor. alterum feu Lotus fatiua, Dod. German. Siebengezelt, quod fepties in die odorem mutare dicatur, ramer Steinklee, Gartenklee.

Seritur in pratis. Floret Iunio, Iulio, Augufto, eiuſdem anni quo ſata eft.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus & Semen ſed raro.

Vires. Calfac. temperatè ſicc. digerit, abſterg. alexipharmaca, anodyna, diuretica ac vulneraria eft. Uſus præcip. in pleureſi, dyſuria, Epilepfia uterina, Hydropſe incipiente, &c.

Extrinſec. in vulneribus, ab inflamm. defendendis & consolidandis, eorum veneno corrigendo (ſotu) hamorrhoidibus leniendis (balneo vel ſotu) in oculorum nubeculis (ſuccus inſtillatus).

PRÆPAR.

1. ∇. ſtillat. Ex herba cum floribus.
2. Ol. infuſ. Fit ex fol. & floribus in ol. comm. maceratis.

Vires. Ad vulnera glutinanda, Herniaſque puerorum ſonandas, tumoresque molliendos & maturandos plurimum commendatur.

N. Herbarum aridarum interponunt veſtimentis ne à tineis rodantur.

CXCVI. Lupulus.

Βρῶν, Lupulus ſaliſtarius, Hopffen. Domeflicus. Hic præfertur. Sylueſtris.

Dicitur Lupulus, Brunf. Matth. Dod. Cluſ. hift. Tab. Lupulus ſatiuus, Trag. Lon. Caſt. (mas) Cam. in Matth. Lupus ſaliſtarius, Fuchf. Lob. Lupulus mas, C. B. I.

Floret Auguſto: Solo gaudet pingui OFFICIN. NAT.

Flores & Iuli. Martio menſe prorumpentes.

Vires. Flores calf. & ſicc. 2. amari ſaporis, anodynique ſunt, diſcutiunt. Uſus præcip. in obſtructione Lienis ac Epatis & inde in Iſtero, in hypochondriacis aſfectibus, &c. ciēt menſes & urinam. Extrinſecus ſedat dolores, auxiliatur conuulſionibus, luxationibus, tumoribus.

Iuli (turiones, aſparagi) mundificant ſanguinem, adeoque à ſcabie præſervant (in acetariis aſſumpti.)

N. Nimius eius uſus granat caput.

PRÆPARATA.

1. ∇ è flor.
2. Syrupus de lupulo. Ex ſucci turionum ante enata folia expreſſi, ꝛ iij. ſucc. fumar. ꝛ ij. cum ſaccharo.

M.

Macis & macer, vide Moſchata.

CXCVII. Maiorana.

Μαράκος, Σάμψνον, Maioran, Maſeran, Maſeron, Meyran.

Maiorana	{	peregrina. Vide Marum.	{	latifolia vulga-	{	mi-
				ris		
		fatiua		tenuifolia		
				nor.		
	{	fylueſtis.				

Ex

Ex his vsualis est fatiua vtraque, è quibus tamen latifolia præfertur, *C. B.* 5. quam nostrates rubram vocant, cò, quod caulis nonnihil ad rubedinem inclinet.

Vocatur Maiorana, *Brunfels. Dod.* Amaracus, *Matth. Fuchf.* Sampfuchus siue Amaracus, Latinis Maiorana, *Cord. in D. hist.* Amaracus vulgatiore, *Lob. ico. maior. Cast.* Sampfuchus, *Lob.* Maiorana vulgo, *Maron. Diosc.* Maiorana siue amaracus maior, *Tab. Ger.* Amaracus sylvestris annua, *Cam.* Maiorana vulgaris, *C. B.* 5.

Gaudet solo vmbroso, stercoreato humido. Floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia, Semen,

Vires. *Calf. & sicc. initio. est partium tenuium, digerit, attenuat. Vfus præcip. in affectibus capitis ac nervorum, hinc & vteri & ventriculi: ciet menses (in pessario.) Confortat cerebrum, eiusque flatus discutit: errhina est & apoplegmatisans.*

PRÆPAR.

1. ∇ . Ex foliis recentibus in **MB.**

N. Præstat gemmas cū vino destillare.

2. *Conserua.* Ex foliis seu summit.

3. *Confect. Sem.*

4. *Ol. stillat.* Ex foliis.

5. *Balsamus.* Fit ex oleo destill.

CXCIII. Malabathrum.

Malabathrum, *Malabathrum*, *Matth.* (cui & Folium,) *Lob. Tab.* Folium Indiseplariariorum, *Trag.* Cassia folium, *Cord. in D.* Tamalapatra, *Garz. Clus.* Cadegi Indij, e folium Indum, Arabibus, *C. B.* 1. German. *Indianisch Blas.*

Dioscorides folia hæc in aquis crescere locis aquisque innatare scribit, vti lens palustris. Garcias ab horto autem esse folia arboris ait, inueniri que copiose in India ac maxime in Cambaia, procul ab aquis. Vtrum ergo folium modernum cum veterum idem sit, est de quo ambigitur.

Eligenda sunt recentia, viridiuscula (non nigra.)

Vires. *Iisdem facultatibus pollent, quibus spicanardi, sed fortioribus: vrinam potenter mouent.*

CXCIX. Malua.

Malua { Sylvestris { folio rotundo } huius loci.
 { folio sinuato }
 { Hortensis seu arborea. Loci sequentis.

Appellatur Malua, *Brunf. Matth. Cast.* Malua vulgatissima, *Trag.* Malua syluest. pumila, *Fuchf. Dod.* Malua sylu. repens pumila, *Lob. Ger.* Malua sylu. supina, *Cord. hist.* Malua minor, *Lon. sylu. minor, Tab.* vulgaris minor, *Cam.* Malua syluest. folio rotundo, *C. B.* 1. Græc. *μαλάχη*, Germ. *Pappeln*, Ræszpappeln, *Hafzappeln.*

Crescit passim inculta, gaudet solo

pingui ac humido: Floret Maio ac seq.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores, Semen, Radix.

Vires. Herba (folia & flores) moderate *calf.* (aliis *refrig.*) humect. emollit, lenit dolores, laxat aluum, vrina acrimoniam mitigat. *Vfus præcip. in affectibus pulmonum, Vesicae, Intestinor. Vteri.* E.g. phthisi, tussi, raucedine, calculo, *erosione vesicae ac intestinor. in duritie vteri.*

uteri, febribus, &c. Extrinsecus in tinea capitis (dum urina in lixinium cocta) intumoribus maturandis, doloribusque sedandis (cataplasma) in aluo lenienda, dolore nephritico mitigando (clyster.)

N. Semen & radix isdem pollent viribus, sed usus rarioris sunt. Præferuntur nihilominus in medicamentis internis.

Radix cocta furfures capitis cadere facit (lotione.)

P RÆ P A R A T A.

1. ∇ stillat. Ex fol. & flor. Maio collectis.

2. Conseru. flor. Verum rari usus est.

C C, *Malua arborea.*

Malua rosea folio subrotundo, Malua hortulana, Brunf. hortensis, Trag. Fuchf. Dod. Lon. Ger. Malu. maior, Matth. Malu. arborea, Tab. Malua Romana, Gesn. Malu. maior vnicaulis, Matth. Cast. Malu. rosea fruticosa, Lob. Germ. Herbstrosen, Winterrosen, Erndrosen, Gartenpappel, Bavvrosen.

Est flore simplici vel pleno, eoque coloris albi, purpurei, incarnati.

Crescit in hortis: Floret in fine æstatis, initioque autumnii.

O F F I C I N. N A T.

Flores foli.

Vires. Calf. & hum. minus tamen quam vulgaris malua: substring. usus præcip. in consillarum morbis oris putredine (gargar.) in fluxu menstruo. in reliquis, malua vulgari similis est.

C C I. *Mandragora.*

Madragora. Arab. Iabora. Hebr. Duldaim. Germ. Allraun, herba est baccifera, radicem habens, quæ hominis par-

tes, inferiores aliquatenus representant.

Estq; mas vel fœmina, ille vsualior. Insigniturque Mandragora mas, Trag. Fuchf. Matth. Cord. in D. Lob. Cam. Mandragoras albus seu masculus, Cord. hist. Mandrag. mas vel alba, Cam. Mandragora fructu rotundo, C. B. I.

O F F I C I N. N A T.

Cortex radicis, qui ad nos aliunde potissimum ex Italia asportatur.

Vires. Refrig. 3. sicc. 1. emollit mire, Narcoticus est ac saporiferus, rari usus intrinsecus. Extrinsecus usus eius est in oculorum rubore ac dolore, in Erysipelate, in tumoribus duris, struma, &c.

P RÆ P A R.

Ol. Fit ex decoct. cortic. aliorumque narcoticor. succis, atque oleo. Vide Disp.

C C I I. *Marrubium.*

Marrubium { *Nigrum Ballote. Hoc minus usuale.*
Album, Hoc officinale est.

Dicitur Marrubium album vulgare, C. B. I. Marrubium, Matth. Cord. in D. Fuchf. Dod. Cast. vulgare. Clus. hist. Lob. Tab. Ger. Marrubium fœmina, Brunf. Candidum, Trag. Germ. vveisser Andorn.

Crescit incultum iuxta vias. Floret Iulio.

O F F I C I N. N A T.

Folia sola.

Vires. Calf. 2. sicc. 3. aper. absterg. atter. saporis amari. Usus præc. in obstruct. pulmonum Epatis Lienis, Uteri, adeoque in Phthysi, in expuitione sanguinolenta, in partu difficili, lochiisque remoratis. Extrinsecus usus eius rarior est.

X X x

N. Vesica

N. Vesica ac renibus censetur noxium, correctum tamen Glycyrrhiza ac passulis nihil nocere dicitur.

P R A E P A R.

1. ∇ still. Ex integra planta, Iunio ac Iulio collecta.

2. Syrup. de prassio. Fit ex herbis petoralibus, radic. aperient. emoll. &c. Vide Disp.

3. Spes. Diaprasii. Vid. Disp.

CCIII. Marum.

Planta est exotica, Maioranæ, in facultatibus ac figura similis, adeo ut pro una eademque herba à nonnullis habeantur. Quamobrem cum maioranæ in regionibus destituamur, Maioranam vel Dictamnium Crepicum substituere solemus.

P R A E P A R A T A.

Pilula Marocostina Mindereri. Vide lib. 2.

CCIV. Matricaria.

Arthemisia tenuifolia, Tab. Fuchsf. & nostras, Lob. Parthenium, Martb. Dod. Cord. in D. Cast. Amaracus, Galen. Matricaria parthenij. 1. species, Brunf. Matricaria. Trag. Lon. Cam. Ger. Matricaria vulgaris. C. B. 1. Germ. Metram, Methran, Meter, Meterkraut, Mutterkraut, Feberkraut.

Crescit in hortis, floret Iunio Iulio.

O F F I C I N. N A T.

Folia cum floribus.

Vires. Calf. 3. sicca. 2. attenuat, incid. Usus precip. in affectibus Vteri frigidis ac flatulentis, in obstruct. mensium, in impotentia Veneris, in hydrop. (purgat per urinam nonnunquam & per aluum,)

&c. in febribus putridis; in calculo renum, in vertigine. Extrinsecus in suffoc. matricis (decoct. cum + variis applicatum) in mensibus ciendis (peffar.) in duritie mammar. (catapl.) in æstu febrili mitigando (fricando dorsum) in arthritico dolore sedando, &c.

P R A E P A R.

1. ∇ still. Fit ex integra herba mens. Maio & Iunio.

2. \odot Ex cinere.

3. Syr. de Matricaria. V. D.

4. Ol. stillat. raro extat.

CCV. Matrisylua.

Matrisyluæ vocabulum, diuersis plantis attribuitur, Epaticæ stellate, 2. Caprifolio ac 3. Hormino. Vide suis locis.

CCVI. Melilotus.

Melilotus vera, maior vulgaris, Trag. Lotus Urbana, Martb. Syluestris, Fuchsf. ico Tab. officinarum Germaniæ, C. B. 1. Melilotum maius, Brunf. Melilotus, Lon. saxifraga lutea, Fuchsf. Loti siue trifolij species, Cord. in D. Melilotus Germanica, Lob. Cam. Ger. Trifolium odoratum, 1. & 2. Dod. Honigklee, Steinklee edler Steinklee.

Gaudet locis saxosis. Floret integra æstate.

O F F I C I N. N A T.

Flores seu integra Herba, Semen.

Vires. Calf. 1. emoll. disc. dolores mitigat. Usus creberrimi precipue extrinsecus, in tumoribus, doloribus, oculis rubicundis, in clysteribus, & sim.

N. Quoties simpliciter Meliloti fit mentio, semen recipiendum.

1. ∇ . Ex herba cum flore still.

2. Emplastrum

2. Emplastrum de Meliloto. V. D.

CCVII. Melissa.

Μελισσόφυλλον, Melissophyllum, *Matth. Cast. Tab.* Melissophyllum vulgare vel adulterinum, *Fuchsf. Apiastrum, Matth. Cord. in D. Lob. Citrago, Gesn. Melissa, Brunf. Dod. Ger. Melissa domestica vel 2. Trag. nostras Cam. hortensis. Lon. & I. C. B. Germ. Melissen, Ivenblat, Biersaug, Mutterkraut.*

N. Est & Melissa peregrina, qua à loco natali unde asportatur, Turcica, Italica, &c. dicitur, coliturque iidem nonnunquam apud nos in viridariis, sed manus ea est usualis.

Floret Iulio: crescit in hortis.

OFFICIN. NAT.

Vires. *Calx. 2. succ. 1.* Vires magni est in affectibus cephalicis, cardiacis uterinis, hinc & in stomachicis, adeoque, in Melancholia, in somnis turbulentis, Paralyti, Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Lipothymia, cruditate ventriculi, remoratis mensibus ac lochiis puerperarum, suffocationeque uteri, emendant insuper fetorem anhelitus. Extrinsecus in uterinis balneis, cataplas. in ictibus venenatis, apum, vesparum, &c.

N. Recensentur inter herbas cordiales.

PRÆPAR.

1. ∇ still. Ex herba integra in **MP.**
 2. Ol. Ex herba sicca, raro extat.
 3. Extract. Ex foliis.
 4. Conserua. Ex floribus.
 5. Syrupus simpl. Ex succ & sacch.^{1.}
 6. Compos. Fernel. V. Disp.
- Noriberg.

CCVIII. Melo.

Πέπων, Melo, *Brunf. Tab. Trag. Ger. Melo siue melopepo vulgi. Cucumis, Gal. Dod. Melo vulgi seu cucumis antiquorum, Melopepo Dioscoridis, Lob. Melo pepo, Lon. Pepo, Matth. ico, Fuchsf. Cast. Pepo, grandis Melo, Cord. hist. Melo vulgaris, C. B. I. Germ. Melonen, Pfeben.*

N. Matthiolus maiores vocat Pepones, minores, melopepones.

Gaudent solo aprico & versus meridiem sito, pingui, æstareque serena. Colligendi sunt ante ortum solis.

OFFICIN. NAT.

Semen excorticatum & non excorticatum.

Vires. Ipse fructus seu pulpa refriger. & hum. nutrimenti est mali, putrescibilis, febribus ac torminibus generandis apti.

N. Minus nocet coctus, potiusque vini & pipere correctus.

Semen, est è 4. seminibus frigidis maioribus, aperit ac abstergit, Epaticum est & nephriticum, ea propter confert tussi, phibisi & febribus medetur stranguria, ardorem urinae, sitimque sedat, &c. Vide & reliqua semina frigida maiora, cum quibus in omnibus convenit.

PRÆPARATA.

Melones conditi. Inciduntur melones nondum maturi, secundum longitudinem, maceranturque in + o dies aliquot (10) hinc effuso + recens affunditur maceranturque denuo. Tandem exempta ac siccata in melle vel saccharo syrupisato sensim coquantur admistis aromatibus pro libitu.

Mintz, in Bo. Mos. Müntz, Balsam.

Est { *Acuta* } *huius loci.*
 { *Crispa* }
 { *Sarracenicæ* *Vide loco sequenti.*
 { *Sylvestris. Mentha caballina, mentastrum, minus officinalis est.*
 { *Aquatica. Vide sisymbrium.*
 { *Cattaria. Vide Nepeta.*

Esti mentha utraque tam acuta, quam crispa earundem virium adeoque officinalis utraque sit, præfertur tamen à nonnullis Crispa cœu nobilissima, siue verticillatam vel siue spicatam & potissimum cuius caulis ad rubedinem inclinat, rubra inde vulgo dicta.

Videatur Mentha sativa seu crispa, *Trag. Cord. in D. Mentha sativa altera, Matth. Fuchs. Dod. Crispa, Lon. Cam. siue Balsamita. Mentha rotundifolia altera flore spicato, siue cruciata Mentha, Lob. Mentha sativa minor, Cast. Mentha rotundifolia crispa spicata, C.B. 5. Germ. Krausemüntz.*

Mentha angustifolia spicata. C.B. 7. Mentha, Brunf. 1. Matth. Cast. sativa vel hortensis 3. Dod. Fuchs. acuminata, Lon. acuta, Tab. Roman. Lob. cruciata, Ger. odorata angustifolia, Cam. Germ. Spitzmüntz.

N. *Hæc foliis est tum latioribus, tum angustissimis & longissimis.*

Colitur in hortis: gaudet locis apicis. non pringuibz quidem, sed humidis. Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Calfac. & sic. in princ. 3. paritum est tenuium, subastring. Vfus præcip. in ventriculi imbecillitate, cruditate, singultu, vomitus flatibus, ardore, Epatis obstructione, intestinor. dolore, capitis

vertigine, lactis coagulationem impedit. Extrinsecus corrigit ventriculi imbecillitatem doloresque colicos sopit (cataplas.) duritiem mammarum lactisque coagulationem, capitis achores sanat, &c.

N. *Mentha aquatica easdem cum sativa vires habet, adeoque in defectu substitui poterit.*

PRÆPAR.

1. ∇ *Stillar. Ex herba.*

N. *Mulierculis vstissima est, ad tormina ventris in infantibus compescenda.*

2. *Syrup. de mentha minor. Ex succis menthæ granatorumque añ. Vide Dispens.*

3. *Syrup. de mentha maior. V D.*

4. *Conferua. Dx foliis.*

5. *Olenm stillar.*

6. *Oleum. infus. Ex mentha crispa.*

7. *Balsam. Rarus est.*

8. \odot . *Ex cinere.*

CCX. *Mentha Sarracenicæ.*

Balsamita, Brunf. Mentha Sarracenicæ, Cord. in D. Lon. Cam. Mentha corymbifera maior, Cord. hist. Costus hortorum, Lob. M. Græca, Matth. Cast. Alisma, Trag. M. hortensis Corymbifera, C.B. 1. (& 2.) aliis mentha Romana, Mentha S Mariæ, Germ. Iravvenmüntz, Marienmüntz, Psannkuchenkrant.

Colitur in hortis & cæmeteriis.
Floret

Floret Iunio, Iulio.

Officinalis quidem est, sed rarissime, non è re tamen esset, asseruare *Folia* grati odoris & saporis; vt & *Radices*.

Vires. *Calf. sicc. aper. attin. discut. absterg. auxiliatur uterinis affectibus, menses ciet, iecur corroborat, peculiari- que vt opij aliarumue venenorum ma- lignitatem retundere statuitur.*

Dosis ad ʒij. præcipuè radix.

Extrinfecus adhibetur in balneis ad- ciendos menses, &c.

C C X I. *Mercurialis.*

Ανθός, Germ. *Bingelkraut*, nostra- tibus, *VVincergrün.*

{ *Mas testiculata,*
C. B. 1. } *usurpantur pro-*
{ *Fœmina spicata* } *miscuè.*
C. B. 2.

Mas insinigitur *Mercurialis*, *Trag. Brunf. M. mas. Matth. Fuchf. Dod. Lob. Cast. Tab. Ger. Cam. Mercurialis mascu- la, Cord. Phyllon arthenogonon The- ophr. Cord. in D. Mercurialis testicu- lata siue mas, Diosc. C. B. 1.*

Fœmina dicitur: *Mercurialis vul- garis* & 1. *Trag. M. fœmina, Matth. Fuchf. Dod. Lob. Cast. Tab. Ger. M. spicata seu fœmina, C. B. 2.*

Nascitur in campestribus cultis, vinetisque. Floret per integram æsta- tem.

N. Est & *mercurialis sylvestris seu montana*, sed minus vsualis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Mercurialis calf. & sicc. 1. ab- sterg. aluum mouet (bilem ac ʒas pur- gat.) Extrinfecus vulnè adhibita men- ses & secundinas trahit, tumores emol- lit, creberrimi vsus est in clysteribus.

N. Sunt è nostratibus mulierculis, qui *Mercurialem infantulis cum pappà ex- hibent, vt aluum solutam retineant, tor- minaque præcaneant.*

PRÆPARAT.

1. ʒ stillat. Ex herba florescente.
2. Syrup. de succo *Mercurialis*, & saccharo ʒ. Vide Disf.

3. Mel. *Mercuriale*. Ex succo & mell ʒ. Vide Disf.

N. *Adhibetur potissimum in clyste- ribus.*

C C X II. *Mespilus.*

Μέπωλον, *Mespilus*, *Brunf. Trag. Lon. Lob. Dod. Mespilus altera, Matth. Mespeli altera species sponte proue- niens, Cord. in D. Mespilus vulgaris, Clus. hist. Cam. Epir. Mespilus vulgaris Germanica folio laurino non serrato, C. B. 1. siue Mespilus syluest. Germ. Nesselbaum, Mespelbaum.*

Crescit in hortis. Floret Iunio, Fru- ctus fert Octobri.

OFFICIN. NAT.

Fructus (πέπων) Officula, Folia.

Vires. Fructus. (mespila.) Refrig. sicc. saporis sunt austeri, astringunt, consti- pant valide, ventriculo noxia sunt. præ- cipue dum duriuscula adhuc extiterint, emollita enim astringunt lenius, nocent- que minus, ac facile putrescunt. Vfus esse possunt in diarrhæa, dysenteria, Extrinfecus in vomitu, fluxuque alui sistendo (cataplasf. imposui)

Officula (lapilli, acini) commendan- tur summpere ad calculum atteren- dum & expellendum.

Folia, similem vim cum fructibus obtinent, adeoque & iisdem induratio- nibus inferniunt. Et præcipue in garga- rismis, Balneis uterinis.

XXX 3

PRÆPAR.

PRÆPAR.

Condit. fructus: cum melle.

CCXIII. *Meum.*

M̃on., Officin. *Meu* indeclinabiliter. *Meum*, *Matth. Tab. Cam. Ger. Cast. Dod. Daucus, Cast.* Tordylium, *Cord. in D.* *Meum* vulgare tenuifolium, *Clus. hist.* *Daucus Creticus, Trag. Fuchf.* *Seseli Creticum, Fuchf.* *Meum foliis anethi, C.B. 1.* *Beervvurtz, Bavvurtz, vvilder Dill, Barendill, Barenfenchel, Mutiervvurtz, Hertzvvurtz.*

Crescit copiose in sylva hercinia, aliisque locis montanis, vt & in montibus campestribus & apricis: apud nos non nisi in hortis cultum inuenitur. Floret Iunio ac Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Calf. 3. succ. 2. atten. aper. flatus discutit, Ṽsus precip. in inflatione ac ructu ventriculi, in mensibus ac vrina ciendis, in uteri suffocat. in torminibus ventris, in catarrhis tartaroque Pulmonum expectorando. *Extrinfecus* in balneis, cataplasmatibus, &c.

PRÆPAR.

Multas ingreditur compositiones, vt & ipsam *Theriacam.*

CCXIV. *Milium.*

Κέϋϋ, *Milium*, *Brunfels. Trag. Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cast. Tab.* *Milium aureum & album, Cam.* *Milium* semine luteo vel albo, *C.B. 1. Hirs, Hirschchen.*

Gaudet solo arenoso humido. Floret Augusto.

OFFICIN. NAT.

Semen ac Farina seminis

Vires. Refrig & succ. 3. aluum constipat, est difficilis digestionis, plurimi tamen ac laudabilis nutrimenti. Decoctum sudorem ac urinam potenter mouet. Extrinfecus exiccat catarrhos, dolores capitis & ventris sedat (costum cum ☉ calidè vertici vel ventri impostum) consumit lac, pellit calculum renum (in baln.) *Diarrhaam infantum* sistit (cataplas.) cum decocto *sumach.*

PRÆPAR.

1. ∇ *stillar.* Ex herba florescente. Insigne præseruatuum censetur in calculo.

2. *Decoctum D. Ambrosit. ℞. Milij lbj. coq. in ∇ lbij.* ad crepaturam, coletur.

Vires. Magnarum virium censetur in febribus, imprimis tertiana, si in declinatione paroxysmi exhibetur ad sudorem eliciendum.

N. Aliis vinum adhibuisse placet.

CCXV. *Milium solis.*

Λόβος σπυρίον, *Lithospermum*, *Brunf. Fuchf. Cord. in D. Lon. Lithospermum minus, Matth. Dod. Lob. Cast. Ger. Vulgare minus. Cam.* *Lithospermum legitimum. Clus. saxifraga tertia, Brunf.* *Milium solis satium, Trag. Fuchf.* *Lithosper. aruense, Tab. maius erectum, C.B. 3. minus, Matth. Germ. Meerbirse, Steinsamen.*

Crescit in hortis, inter fruges incultum. Floret Maio.

OFFICIN. NAT.

Semin. raro Folia.

Vires. Calf. & succ. 2. calculum insigniter comminuit ac expellit, Renes abstergit, urinas ciet, partum pellit.

Dosis sem. ʒj. ad ʒij.

N. Sunt qui pro certo experimento iactitant,

institant, in febris quotidiana ante inuasionem semen exhibere, idque vicibus iteratis.

PRÆPARATA.

▽ stillat. è foliis.

CCXVI. *Millefolium.*

Στρατιώτης ὁ χλιδώτατος, *Stratiotes millefolia, Fuchsf. Cast. millefolium terrestre maius, Tab. Cord. millefolium album, Brunf. millefol. vulgare, Trag. Achillea, Lon. dod. millefolium, Cam. millefol. stratiotes, Cord. in D. millefol. album, C. B. 2. German. Garbe, Taubentblatt, Garbenkraut, Schaffgarbe, Schaffripp.*

Crescit passim locis aridis iuxta vias in cæmiteriis, &c. Floret Iunio.

OFFICINALIA NATIVA

Folia cum floribus.

Vires. Exiccac, astringit cum temperato calore ac amarore: hinc medetur vulneribus, tumoribus ac inflammationibus sine repulsione. Vsu itaque interno conuenit, in hamorrhagiis ac fluxionibus omnis generis, narium, uteri, alui, vulnerum, creatu sanguinolento, vomitu, urina retenta, calculo, mictione sanguinolenta gonorrhœa, hamorrhoidibus, fluore uterino, mariscis, cruore, vulneribus. Extrinsecus adhibetur feliciter cephalalgia, pterigio oculorum, hamorrhagia narium, vulnerum, odontalgia (mastigando vel Emplastrando) mensibus superfl. fluori albo, diarrhœa, vulneribus consolidandis, tumoribus hamorrhoid. Hernia, istibus venenatis, contracturis, tumori penis,

N. 1. Sunt, qui herbam cum floribus in peste præseruanda & curanda, pro secreto peculiari venditant.

N. 2. Herba recens naribus indita

hamorrhah, am causatur.

PRÆPARATA.

▽. Ex herba cum floribus.

N. Medetur putredini ginginarum quam optime.

CCXVII. *Momordica.*

Balsamina, *Matth. Fuchsf. Balsamina cucumerina punicea, Lob. Tab. Mas, Cam. Ger. Pomum mirabile, Trag. Pomum Hierosolymitanum, Balsamina rotundifolia repens seu mas, C. B. 1. Germ. Balsampffel.*

Colitur apud nos in hortis.

OFFICIN. NAT.

Folia & Fructus (Poma dicti.)

Vires. Refrig. parumque siccac, vulneraria est, dolores ac præsertim hamorrhoidum mitigat. Extrinsecus sauciatis confert neruis, hernia, ambustis, &c.

PRÆPARATA.

Oleum. Fit ex infusione & decoctione fructus (exempto semine) in oleo amygd. dulcium.

CCXVIII. *Morus.*

	alba, album ferens fructum.
Mor' d, Maulbeerbaum.	{ nigra, celsa, nigrum ferens fructum. Hæc præferuntur.

Dicitur Morus, *Trag. Matth. Fuchsf. Dod. Lon. Tab. Ger. vulgaris. Cam. Morus nigra, Cord. in D. Cast. Morus celsa officinis, Lob. Morus fructu nigro, C. B. 1.*

Maturescit fructus Augusto.

OFFICIN. NAT.

Cortex (præcipuè radice,) Folia & Fructus exiccatus sedrato.

Vires. Cortex radice calf. & sicc. amari

amari saporis est, absterg. adstring.
Epar ac Lienem aperit, aluum laxat,
tineas latas enecat.

Fructus nigri immaturi (mora im-
matura) (refrig. & sicc. 3. valide astring.
Vfus precip. in omnibus fluxibus. E. g.
diarrhea, dysenteria, fluxu menstru-
o, expuitione sanguinis. Extrinsecus in
faucium ac oris inflammationibus, vlce-
ribusque.

Mora matura, refriger. & sicc. parum
(aliis humect.) solvunt aluum (initio pa-
stus) (sitim sedant, appetitum excitant.

N. Nutrimenti sunt pauci & putre-
scibilis.

Folia vel sola vel cum cortice cocta
odontalgiam sedant (gargar.)

PREPAR.

1. ▽ stillat. Ex moris immaturis.

N. Raro prostat.

2. Rob., Diamoron simpl. Ex succ. &
mell. j. Vide Disp.

3. Diamoron Compos. Fit vt simpl.
addendo myrrh. croc. omphac. Vid.
Dispens.

4. Diamoron Nicolai Ex succo mo-
ror. Celsi lbss. mororum rubi lbj. mell.
lbj. sapæ ℥iij. V.D.

N. Hoc usitatissimum est.

5. Diamoron Cordi. Ex succo moror.
Rubi, Rubi Idæi, Celsi, siagor. & melle.
V.D.

N. Mororum succi ex immaturis
moris exprimendi sunt.

CCXIX. Moschata, Macis.

Nux maschata & muscara, Lon.
Lob. Fragos. Cord. Tab. Acost. Nux Aro-
matica, moschocaryon, moschocary-
dion, Nux myrista seu vnguentaria,
Matth. Cast. N. myristica, Clus. exor.
Nucista, Nux moscata fructu rotundo,

C.B.I. Germ. Muscatnus.

N. Clusius duplices statuit minores
(feminas) maiores seu oblongas (mares.)

Crescit in Insula Banda India oc-
cidentalis.

Duplici cortice vestita est: altero
exteriori & crassissimo, per maturitatem
dehiscente, vt in iuglandibus; altero te-
nuiore, necleum proxime instar reticuli
ambiente, eoque primum coloris rube-
scentis, postmodum flavescentis, & hæc
officinarum Macis est. Germ. Musfi-
barblüht.

N. 1. Macer veterum est ligni cuius-
dam cortex lignosus, crassus, rubescens,
ex Barbaria afferri solitus, gustu valde
amarus & astringens, adeoque differt à
maci, quanquam interdum modernis
confundantur.

N. 2. Est & genus Maceris Insul.
Oriental. quod forsan idem cum vete-
rum. Vid. Christ. Acost. c. 12.

OFFICIN. NAT.

Nux ac Macis.

Eligenda Nux recens, grauis, pin-
guis & quæ acu puncta, succum oleo-
sum emittit.

Macis probatur odore suavi, sapore
subacri, colore flauo.

Vires. Nux calf. & sicc. subastr. est
stomachica, cephalica, uterina, discutit
flatu, coctionem inuat, halitum fetidum
oris emendat, fetum recreat, lipothymia
ac palpitacioni cordis succurrit, Lienem
minuit, alui fluores compescit, vomitum
sistit.

Maci eadem vires adscribuntur, quia
tamen partium tenuiorum existit, ideo
& operando efficacior & magis pene-
trans habetur.

PREPARATA.

1. Condit Nucist. Condiuntur nu-
cistæ virides, integræ vt iuglandes,
conditæque,

conditæque, ad nos transportantur.

Condiuntur sine inuolucris.

N. Possunt & apud nos condiri: vide-
licet. 3. Nucistas quoad fieri potest re-
centissimas, macerari in lixio forti, dies
(9. 10) ut mollescant: dein abrade extre-
mam cuticulam, lauaque donec lixio
penitus exuta sint: hinc sicca accum sac-
charo syrupisato condito.

2. Confectio Macis.

N. Conficiuntur ut Nucista, sed ra-
rissime.

3. ▽ Nucista. Parari potest ut Ci-
namomi. Vide lib. 2.

4. Oleum Nucistæ still. extillat vna
cum ▽. Prodest in cardialgia, & sim.

Dosis gr. ij. iiij.

5. Ol. Nucistæ expressum. Exprimi-
tur ex nucibus recentibus contusis &
in sartagine feruefactis l. communi.

Vires. Prodest. in torminibus ventris
ac nephriticis (in liquore calido exhibi-
tum. (Extrinsicus conciliat blande sō-
num (temporibus illitum) tormina in-
fantum sedat (umbilico inunctum.)

N. Ex oleo expresso paratur corpus
balsamorum.

6. G Nucista. Ex remanentia inci-
nerata elixiuatur.

7. Ol. Macis stillat. Eodem paratur
modo.

Dosis gr. ij. iiij.

8. Ol. Macis expressum. Exprimi-
tur idem ut dixi.

9. Extract. 3. Ol. Nucist. express. q. v.
extrahe secundum artem digerendo
cum ▽ rectificatissimo: decanta, filtra
& abstrah ad consistentiam olei.

Vires. Præter utilitates alias, Balsa-
mo nucistæ consciendo inseruit.

N. Album corpus post extractionem
residuum, aliquoties ▽ calida ablatur,
serueturque pro corpore Balsamorum.

quod præstat tamen, si extractio cum ▽
sato peracta fuerit.

10. Balsamus Macis. Fit ex oleo ex-
presso additis guttulis aliquot destil-
lari olei.

11. Balsamus Nucistæ. Fit similiter

C C X X. Muscus.

Br̄v̄or, Arab. Vinea, Moos.

Muscus { Arboreus. De quo hic.
Terrestis. De hoc sequenti
loco.
Saxatilis. Vide Lichen.
Marinus. Vide corallina.

Muscus qui arboribus accrescit, fi-
guræ ratione potissimum triplicis est
fortis, 1. capillaceus, i. e. habens formam
capillorum, adnasciturque caudici, (C.
B. 1. seu vsitatus officinarum) 2. Fœni-
culeus, i. e. fœniculi folia æmulans, (C.
B. 3. seu muscus arboreus cum orbicu-
lis, Tab.) Muscus ramosus floridus &
non floridus. Adnascitur ramis. 3. Cru-
staceus, habens formam crustarum, (C.
B. 7. seu muscus pulmonarius, Tab.
pulmonaria.) Vide pulmonariam ar-
boream.

Ex his huius loci sunt priores, quo-
rum vsualior primus, adeoque vinea
officinar. dictus. Hic tū tenuior est,
tū crassior: alias breuior aut prolixior:
omnes candescentes, pauci rutilantes,
quandoque nigri, Primæ nobilitatis
sunt muscus lariceus, piceus, pineus &
abietinus. Hinc populeus, sed candidus
(nigricans enim improbatur) vtilissi-
mus omnium est quernus.

Videatur Muscus arboreus, Trag.
Matth Dod. Cast. Muscus. Cord. in D.
Musc. arborum, Lon. Tab. Musc. quer-
nus, Lob. Ger. Muscus arboreus: Vinea
officinar. C. B. 1. inter species
YYy musci

musci arborci.

CCXXII. *Myrtillus*.

Colligendus est initio veris.

Vires. *Muscus omnis astring. Vfus precip. in Ictero, vomitu, diarrhæa, dysenteria, abortu præcauendo. Extrinsecus in laxitate gingivar. in sanguinis fluxu comescendo.*

N. 1. *Quia signaturam capillor. habet, ideo & capillis muscum dictum esse volunt.*

N. 2. *Huius loci est muscus Cranio adnatus, quem peculiari vi commendat in vulnere hemorrhagia & consolidatione, adeoque Unguentum magneticum ingreditur. Præstantissimum itidem medicamentum exhibet in dysenteria, & simil. Surrogari autem eidem potest muscus aliis ossibus adnascens.*

CCXXI *Muscus terrestris.*

Musci terrestris varix itidem dantur species, è quibus in officinas solum venit, quæ repens vocatur, C. B. 10. seu muscus terrestris clauatus, muscus terrestr. *Trag. Matth. Dod. Cast. Lycopodium, pes Lupi, Tab. Pes Leoninus, Lob. Ger* Cui tamen affinis est muscus terrestris ramosus, C. B. 2. muscus terrestris, *Tab. Germ. Berlapp, S. Iohannis Gürtel, Gürtelkraut, Newnheil, Tenffelsklavv, Lævenfusz.*

Crescit in sylvis desertis ac myricetis. Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Muscus, Flos citrinus & Farina.

Vires. *Refrig. & sicc. Vfus precip. in calculo atterendo ac expellendo (landatur summopere flos eius citrinus) in fluxu alui. Extrinsecus in laxitate dentium, in consolidatione & siccatione vulnere (farina excussa, inspersa)*

Myrtillus, Matth. Lon. Cast. Myrtill. vulgaris baccis nigris, Clus. hist. vitis idæa, Tab. vitis idea nigra, Cam. Myrtillus Germanica, vaccinia nigra, C. B. 1. seu vitis idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante. German. Heidelberg.

OFFICIN. NAT.

Bacca. Vaccinia seu Myrtilli Germanici.)

Vires. *Refrig. 2. sicc. & subastring. sedant sitim. Vfus vari sunt, adhiberi tamen possunt in febribus, vomitu ac diarrhæa. Alij exiccant, inque dysenteria utiliter propinant.*

CCXXIII. *Myrtus.*

Mupolen n muppiu, Myrtus & murtus. Germ. Myrtenbaum.

E variis myrtorū generibus vsualior est Myrtus, *Tab. M. minor, Lob. & Tarantina, Clus. hist. M. Tarantina, Matth. Cast. Cam. M. minor vulgaris, C. B. 9.*

Huic substitui poterit Myrtus foliis minimis & mucronatis, C. B. 8. M. prior, *Doa angustifolia 9. Lob. M. domestica fructu albo, Clus. hist.*

Crescit in regionibus calidis Italia ac Gallia Narbonensi iuxta ripas maris.

OFFICIN. NAT.

Folia, Bacca (Myrtilli officinarum) myrta.

Vires. *Vtraque refrigerant temperate, sicc. valide, astringuntque. Vfus internus rarior est, nihilominus tamen adhibetur in fluxu alui ac expuitione sanguinis. Extrinsecus usus utriusque crebrior.*

Folia emendant fetorem sub axillis acinguinibus (pulvis aspersus:) sudorem corporis immod. cum sistunt (frictione:) membris

membris catarrhosis opitulatur, alui fluxui succurrunt, defensionum exhibent in herpetibus, puiredinem oris sanant, hemorrhagiam narium sistunt, polypo medentur (cum melle ac vino.)

Baccæ mitigant oculorum inflammationes, iuvant luxatos articulos ac ossa fracta, subueniunt precidentia uteri ac ani, capitis tinea, furfuracea que excrementa abigunt.

P R Æ P A R.

1. *Syr. myrtilloz, seu myrtinus.* V. D.
2. *Ol. myrtilloz.* Ex fol. myrti & ol. communi infusis.
3. *Ol. myrtinum.* Ex fol. myrti & ol. communi.

N.

CCXXXIV. *Napus.*

Bevis { fatiua vsualis.
 { syluestris.

Vid. *Napus*, *Brunf. Matth. Dod. Cord. in D. Cast. Cam. Lon.* *Rapum* fatiuū alterum, & *Napus* veterum, *Trag.* *Napus Bunias* fatiuus, *Fuchf.* *Bunias* seu *napus*, *Lob.* *Napus fatiua*, C. B. I. *Germ. Steckrüben.*

N. Recensentur *Napi* in genere *Raporum*, quod caule, floribus, semineque *Rapa* emulentur. quæquam folio & radice *Raphanos* magis referant. Est autem genus plantar. fatiuar. notissimum, quod colunt non modo ob radicem usum escule ærum, sed & ob seminis oleum expressum, quo cum fercula impinguant, tum lampades instaurant.

Florêt à vere in æstatem.

O F F I C I N. N A T.

Semen.

Vires *Calfac.* sic absterg. aper. digerit, atten. & incidit, venenis potenter resistit, (vnde & *Theriacam Androm.*

greditur) mortillos ac variolas peculiari facultate a centro ad circumferentiam corporis pellit, ideoque in febribus malignis & petechialibus crebri vsus est, (in emulsionibus.) Confers & in Ictero, vrina remorata, &c.

Dosis ʒj.

P R Æ P A R.

Oleum expressum ad omnia vtile, ad quæ semen. Vsitatum est plebeis, ad compescenda tormina ventris infantibus exhibere.

CCXXX *Nasturtium Aquaticum.*

Kapstaim. *Nasturtium aquaticum* (& 2.) *Trag. Lon. Dod.* *Cressa*, *Lauer* odoratum, *Cord.* *Sylimbriem* *cardamine*, *Fuchf.* *Sylimbrium aquaticum primum*, *Tab.* *Sylimbrium alterum*, *Card. in D.* *Sion* *Crateuæ*, *sylimbr.* 2. *Diosc.* *Sion* *Crateuæ* *Erucæ* folium, *Lob.* *Sium* maius, *Ger.* *Sylimbrium aquaticum*, *Matth. Cast.* *Nasturtium aquaticum*, *supinum*, C. B. 1. *German.* *Brunnenkresz.*

Crescit in riuiis vel paludibus. Floret Iulio & Augusto. Viret perpetuo, adeoque hyemali tempore acetaria exhibet non vituperanda.

O F F I C I N. N A T.

Folia seu herba cum floribus.

Vires, *Calfac.* & sic. 2. (exsiccatum 3.) atten. aper. Vsus præcip. in calculo ac sabulo, obstructione Lienis ac Epatis mensiumque, specificè in *Scorbuto* commendatur.

N. Præstat recens adhibuisse quàm exsiccatum, ob Æ volatile paulatim euanescent.

P R Æ P A R.

1. *Succus inspissatus.*

Y Y y 2

N. Cum

N. Cum aceto naribus illitus, arcet immoderatas vigilias. Polypum extirpat, succus naribus inditus.

2. ▽ stillat. Ex planta integra collecta Augusto.

3. Spiritus. Ex herba contusa addito tantillo fermenti, fermentata.

CCXXVI. Nasturtium hortense.

Κάπρις } Latifolium.
est } Crispum vulgatum. *Vsita-
tius.*

Nasturtium, Brunf. Matth. Cast. Tab. Nasturtium hortense, Trag. Enchf. Lob. Dod. Ger. Nasturtium hortense vulgatum, C. B. 2. Gartenkresz.

Colitur in hortis.

Seritur vere: floret æstate.

OFFICIN. NAT.

Vires. Semen & herba sicca calf. & sicc. 4. (Herba viridis, mitior est) utrumque attenuat, aperit, abstergit. *Vs*us præc, est in tumido Liene, mensibus obstructis foetuque mortuo expellendo, ♀ ream mucilaginem Pulmonum incidit; Scorbuto confert. Vulgo itidem ad expellendos morbillos inseruit semen. Extrinsecus vsuuenit in apophlegmatis, errhinis, phœnigmis: furfures ac scabiem fœdam capitis aliarumque partium sanat (tritum aut frixum, cumque porci axungia illitum.)

N. Nasturtium pratense (quem florem cuculi appellant, alibi Iberim, Lepidiumue minus,) ut & Nasturtium montanum seu alpinum nec non & nasturtium hybernium (eruca lutea vel barbarea dicta) officinis incognita sunt.

CCXXVII. Nepeta.

Mentha felina, Tab. Ger. Cattaria,

Dod. Lob. Mentha non odorifera, Nepeta vulgaris, Trag. Nepeta fruticosa, Cord. in D. herba gattaria, Matt. Cast. Calaminthæ 1. genus. Fuchf. Nepeta Germanica, Cam. Calamintha montana, Lon. Mentha cattaria vulgaris & maior, C. B. 1. Germ. Katzenkaut, Katzennept.

Crescit ut plurimum in hortis, tum quoque iuxta vias: Floret Iunio, Iulio, Augusto.

OFFICIN. NAT.

Herba.

Vires. Calf. & sicc. 3. partium est tenuium, attenuat. aper. *Vs*us præc, in morbis uterinis (scil. obstruct. sterilitate, foetu pellendo, tum quoque in ♀o pulmonum incidendo, &c. Extrinsecus in balneis pro utero.

N. Ob grauem odorem raro intrinsecus exhibetur.

CCXXVIII. Lignum Nephriticum.

Est ligni genus crassum & enode, aquam infusione cæruleam reddens. Germ. dici potest Grüsholz.

Videatur Lignum nephriticum seu Lignum ad Renum affectiones & vrinæ incommoda, Monard. Lignum ex nouo mundo pyro simile, Fragos. Lignum peregrinum aquam cæruleam reddens, C. B. 4. Inter genera Fraxini.

Afferitur ex noua Hispania.

Vires. Calf. & sicc. gr. 1. *Vs*us eius receptus est ad Renum vitia, vrinæque difficultates & incommoda. Hinc in Epate & Lienis obstructionibus.

PRÆPAR.

Infusio, quæ in ▽ fontan. facta, nonnullis potus est sat expetitus, tum ratione saporis, quem ferè nullum exhibet

bet, tūm quoque coloris cærulei, adeoque amicabile. Potest illā dilui vinum.

N. *Adulteratur alioligno simili, quod*
▽m croceo colore inficit. Monard.

CCX^x XIX. *Nicotiana.*

Tabacum, Tobacum, Tabacca, Tubac, Petum. Herba sanctæ Crucis, sana sancta, Torna boña. *Indianisch. Beinwuelle, Indianisch WWundkraut, heilig WWundkraut, Toback.*

N. Ante annos aliquot ex America primum adferri cepit, unde postmodum in nostris hortis colitur & cepiose ab Hanouiensibus, qui officinas nostrates suo Tabaco sufficienter instruunt: Huic tamen Indicum preferendum censemus ex Indica Occid. Insula virginea Florida seu patria genuina ad nos allatum.

Est { Maior { latifolia seu fœmina,
 { C. B. 1.
 { angustifolia mas, C. B. 2.
 { Minor, C. B. 3.
 { Minima, C. B. 4.

1. Videatur. *Nicotiana, Lon. Maior, Tab. Tabacum* (ab eius nominis Insula,) *Monard. Fragos. Tabac. latifol. Cam. Petum, Clus. ad Monard. Hyoscyamus Peruvianus, Dod. Cam. Epit. Sana sancta Indorum, Lob. Ger.*

2. Tabacum seu herba sancta minor, *Lob. Tab. angustifol. Cam. Petum angustifol. Clus. ad Monard. Hyoscyamus Peruvianus alter, Dod.*

3. Petum 4. *Clus. ad Monard. Hyoscyamus niger vel 3. Matth. Cast. Hyoscyamus luteus, Dod. Lon. Cam. Ger. Hyosc. Peruvianus, Tab.*

4. Tabacum minimum, *Cam. Tabac. seu sana sancta minima, Lob. Petum 3. Clus. ad Monard.*

N. *Nicotiana dicitur à Nicotio, Re-*

gis Gallia Legato, qui herbam eam Vlissipona Zeelandia accepit è Florida allatam, postmodumque Gallis innotescere fecit.

Gaudet solo pingui ac lato, area plana, opaca, aqua mirè delectatur, frigoris impatientissima est. Seritur felicissime tempore verno, in principio April. ☾ crescente, colligitur herba ☉ in ☾. 15. gr. 18. 19. 20 ☾ decrescente, Semen ☿ rio & ☿ est dicatum.

OFFICIN. NAT.

Folia seu herba & Semen.

Vires. Herba recens calf. & sicc. 2. siccata 3. (aliis calf. 1. sicc. 2. aliis refig.) abstergit, incidit, resoluit, aliquantulum astringit, resistit putredini. Sternutatoria est, apoplegmatica, anodyna, vulneraria, vomitoria. &c. *Vsus* precipue externi ad catarrhos cerebri exiccados, somnum inducendum, lassitudinem ex labore discutiendam, uteri strangulatum compescendum: à peste præservat (in suffitu) sedat dentium dolores, discutit tumorem vulva (ingargar.) medetur lichenibus, phthiriasi, porrigin, achoribus ac fauo, mundificat ac consolidat vulnera ac ulcera in veterata, sanat ambugta quoquomodo adhibita, (balneatione scil. vel sola impositione foliorum recentium nostratis *Nicotiana*, &c.) Nec tamen prorsus usum quoque subterfugit internum, dum pro vomitorio exhibetur (at violento) qua ratione curat febres similesque morbos, sed cautione hinc opus est.

N. 1. Non adeo proficius Tabaci usus est inuenibus ac biliosis.

N. 2. Noni qui mictionem nocturnam vespertino Tabaci suffitu præcauebat.

PRÆPARAT.

1. ▽ Ex foliis

2. *Syrupus de Nicotiana.*

Vires. Et aquam & Syrupum cum
 Y Y y 3 successu

successu exhibent in asthmate, pulmonumque Proquin & in febribus.

3. Ol. peti stillat.

4. per infusionem.

5. Sal. Ex cinere.

6. Unguentum de Nicotiana. Vid. Disp. August.

N. Parari itidem potest ex solis foliis recenter contusis, seu si manus ex succo ac pinguendine.

7. Balsamum. Vide lib. 2.

N. Sunt qui folia minutissimè incisa (zerhackt) in vitro optime clauso dies 40. tepori, (e.g. fimi vel acerui formicarum) exponunt, atque hac ratione Balsamum acquirunt. VVittich.

Peculiarem Tabacologiam conscripsit Ioannes Neander, Medicus olim Bremanus, & inde Alstedius in sua Encyclopæd. Satis itidem prolixus in descriptione Tabaci est Nicol. Monard. in simpl. medic. hist. c. 14.

CCXXX. Nigella.

Melady Stor. Gith. melaspermum, Cuminum nigrum. Germ. schwarzer Coriander, schwarzer Kummich, Römischer Coriander, Nardenkraut.

Est	{	Aruensis corn uta, Raden.	{	flore carul.	{	maiore	{	simplici
		Hortensis satiu.				minore		pleno.
								simplici
								pleno.
{	Cretica.	flore candido	{	simplici				
				pleno.				

Ex his Nigella aruensis officinas subit, & ex his præcipue flore candido minore simplici, C. B. 5. Melanthium sativum, Matth. Dod. Cast. Tab. 1. Melanth. 1. Fuchsico. Mel. seu Nigella Romana odora, Lob. Melanthium, Ger. Mel. Damascenum, Cam. Huic tamen & reliquæ surrogari non nequeunt.

Non nisi Studiose culta nobis crecit, gaudetque solo pingui. Floret Iunio ac Iulio.

OFFICIN. NAT.

Semen solum.

Vires. Calf. & sicc. in princ. gr. 3. at-ten. aper. Vfus præcip. in mucilagine pulmonum resoluenda & expectoranda late augendo, urina ac mensibus eiendis, morsibus venenatis corrigendis. Specificè in febribus quartanis ac quotidianis.

Extrinfecus crebri usus est in cephalalgia sedanda, catarrhis exiccandis (sternutando, suffiando.) in cucuphis, Epithemat. & c. applicatum.

Radix sistit proprietate sua hamorrhagiam, si dentibus massicetur, nariusque imponatur.

PRÆPAR.

1. Semen preparatum. Maceratur in + atque exiccatur.

2. ∇. stillat. Ex semine.

3. ∅∅ stillat. Ex semine.

CCXXXI. Nummularia.

Centummorbia, Hirundinaria, Serpentaria, Egckkraut, Schlangenkraut, klein Natterkraut, Pfenningkraut.

Est { Maior lutea. *Hæc usualis.*
C.B. { Minor purpureo flore. *Hæc incognita.*

Dicitur *Serpentaria* 3. & centum-
morbia. *Brunf.* *Nummularia*, *Trag.*
Matth. *Fuchf.* *Dod.* *Lob.* *Lon.* *Cast.* *Cam.*
Tab. *Ger.* *Hirundinaria* minor, *Tab.*
Nummularia maior lutea, C. B. 1.

Crescit in campestribus ac locis
herbosis, humidisque. Floret Maio.

OFFICIN. NAT.

Herba seu folia.

Vires. Refrig. sicc. subastring. vulne-
raria est. *Vfus præcip. in Pulmonum*
exulceratione, venis ruptis, tussi sicca
infantum, in fluxu cuiusunque generis,
diarrhæa, dysenteria, hæmoptoyfi, Com-
mendatur in Scorbuto, herniisque omnis
generis.

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex herba collecta cum
floribus mense Maio.

CCXXXII. *Nymphaea.*

Nymphaea, *Nenuphar.* Arab. *Nen-*
nufar. *Seebium*, *Hartzvurtz*, *Vasser-*
lilgen.

Est { Alba floribus albis { maior.
{ minor.
{ minima.
Lutea floribus luteis { maior.
{ minor.

Ex his præfertur quidem alba eaque
maior, quæ intelligenda quoties *Nym-*
phæa simpliciter mentio fit. Verunta-
men nec negligenda est lutea.

Alba dicitur *Nenuphar* album,
Brunf. *Nymphaea* alba, *Brunf.* *Matth.*
Dod. *Lob.* *Tab.* *Ger.* *Clus.* *Nymphaea*
Candida, *Trag.* *Fuchf.* *Nymphaea* maj.
alba *Cast.* C. B. 1.

Lutea vltatior est quæ inscribitur

Nenuphar luteum, *Brunf.* *Nymphaea*
lutea, *Trag.* *Matth.* *Fuchf.* *Fuchf.* *Dod.*
Lon. *Lob.* *Cast.* *Tab.* *Ger.* maior, *Clus.* *b.*
Nymphaea lutea maior, C. B. 1.

Crescit in lacubus. Floret Maio &
Iunio.

OFFICINALIA NATIVA.

Radix, *Folia*, *Semen*, *Flores.*

Vires. *Radix* & *semen* refrig. & sicc.
gr. 3. astring. *Flores* & *folia* refrig. &
humect. *Singula sunt usus præcip. ad flu-*
xum alui, ad pollutionem nocturnam, se-
minis acrimoniam, sanguinis æstum &
tenuitatem. Extrinsicus crebro adhiben-
tur folia & flores ad febriles æstus &
vigilias sopiendas (in lotionibus pedum,
in impositione foliorum scil. lumbis,
oemporibus, plantis pedum.)

PRÆPARATA.

1. ∇ stillat. Ex floribus albis.
2. ∇ stillat. Ex floribus luteis.
3. *Syrupus Nymphaeæ simpl.* Ex infu-
sione florum.
4. *Syrupus de Nymphaea compos. siue*
de Nenuphate. Vide. *Disp.*
5. *Conserua.* Ex floribus albis.
6. *Ol.* Ex infusione florum.
7. *Unguentum de Nymphaea.* Vid. l. 2.

O.

CCXXXIII. *Olea.*

Fraxia *Olea*, *Oliven-* { *Sativa.*
baun, *Oelbaum*, { *Sylvestris*, oleo-
ster.

Prior insignitur olea, *Brunf.* *Trag.*
Cord. hist. *Lon.* *Dod.* *Lob.* *Cam.* *Bellon.*
Olea fatiua, *Matth.* *Cord. in D.* *Cast.*
Tab. *Ger.* *Olea* fatiua, C. B. 1.

Posterior, *Olea* sylu. *Matth.* *Tab.*
Ger. *Olea* sylu. seu *Oleaster*, *Lob.* *Cast.*
Oleaster, *Lon.* *Clus. hist.* C. B. 2.

Crescit vtrique in regionibus ca-
lidis,

lidis. Italia, Hispania, &c. Gaudet locis siccis argillofis. Floret Iunio. Fructus decerpuntur mense Nouembri & Decembri.

OFFICIN. NAT.

Folia, Fructus (sed conditi.)

Vires. Folia refriger. & exiccant. astring. Vfus externus & prapip. in fluxu alui, mensem, in herpetibus, & fim. Fructus immaturi siccant & astring. inprimis syluestres.

N. Exhibet iidem (tùm olea, tùm oleaster) lachrymam resinofam, refina Elemi non abfimilem, sed hac in vfu non est.

PRÆPAR.

1. Condit. Oliuæ. Condiuntur muria antequam plane maturuerint, in Hispania & Gallia Narbonenfi: interdum etiam maturæ & nigrae.

Vires. Comefta initio pafus excitant appetitum, mouent aluum, humentem ventriculum exiccant ac confortant.

N. Rancida subuertunt ventriculum.

2. Oleum, (fimpliciter ita dictum.) Exprimitur ex oliuis maturis, diciturque oleum (fimpliciter,) oleum commune oliuarum, Baumöl.

Vires. Calfac. & humectat moderatè. (N. Vetus calidius est recenti) emollit, digerit, vulnerarium est, aluum laxat (cum cereuiffa calida affumptum ʒj.) ariditatem pectoris corrigit, tormina Ventris mitigat, vrinarios meatus laxat, erosos abftergit & consolidat. Extrinfecus creberrimi vfu est in clysteribus, tumoribus calidis, &c.

N. 1 Cum ∇ tepida affumptum mouet vomitum.

N. 2. In patria mea VVestphalia vfitatiffimū est vulneratis quotidie exhibere oleum oliuarum cum cereuiffa calida, quo adeo largè vtuntur, vt quoque

sudor oleum redolet.

4. Oleum omphacinum. Exprimitur ex oliuis in maturis.

Vires. Refrigerat, fccat, astringit, adeoque multis compositionibus inferuit.

5 Oleum Philofophorum. Fit destillando oleum oliuarum, cum lateribus ignitis mixtum ex Retorta Aug.

Vires. Difcutit, maturat, emollit. Prodest tumoribus frigidis duris, &c.

CCXXXIV. Ononis.

Anonis, Dioscor. Onores, Theophr. Havnhechel.

Est	{	Spinofa	{	purpur. (flor.)	Hac
				usualior.	
				lutea. (flor.)	
		non spinofa	{	purpur	maior.
	lutea	minor.			
				luteo variegata.	

Videatur Recta bouis, Trag. Lon. Anonis feu Ononis, Matth. Tab. Anonis, Fuchf. Dod. Cast. Ononis, Cord. in D. Lob. Anonis, Ger. Anonis spinofa flore purpureo, C.B. 1.

Crefcit in Campeftribus, dumetis, aruis, iuxta vias. Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Radix ac potiffimum huius Cortex.

Vires. Calf. & fcc. in princ. 3. abfterg. atten. difcut. Vfus prapip. in diurefi, lithiafi, ictero, obftructione Epatis, in carnofo ramice abfumendo. Hemorrhoidibus cacis, marifcisue difcutiendis (infufum aliquandiu bibitum.) Extrinfecus in putredine oris ac dolore dentium (gargaris).

N. Antequam spinas protudit conditur cum fale pro cibario.

PRÆPARATA.

∇ stillat. Ex integra planta cum radicibus

radicibus nouellis eruta.

CCXXXV. *Origanum.*

Origanum, 'Brunf. Orig. vulgare, *Trag. Matth. Lon.* *Origanum syluest.* *Dod. Cord. in D. Fuchs. Tab. Cam.* *Agri-
origanum* seu *Onitis maior*, *Lob.* *Origanum Anglicum* *Ger.* *Origanum sylv.* *Cunila Bubula* *Plinij*, *C. B. 1.* *German.* *Dosten, VVolgemuth.*

Crescit in locis Campestribus opacis. Ploret Iunio ac Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus seu *Summitates*.

Vires. Calf. & sicc. 3. aper. absterg. astring. *Vsus* *præcip. in obstructione Pulmonum, Epatis ac uteri & hinc intussi, asthma, Ictero, auget lac, ichorosa excrementa per sudorem expellit (ante balneum assumptum.)* *Extrinfecus* *usu* *venit crebriori, eoque in balneis uterinis, cephalicis, totius corporis (contra scabiẽ.)*

PRÆPARAT.

1. ∇ stillat. Ex integra planta cum floribus.
2. *Oleum stillat.* Raro prostat.
3. Θ ex cinere. Raro itidem paratus.

P.

CCXXXVI. *Palma.*

Φινξ. Palma, Trag. Matth. Dod. Alpin. Cord. in D. Lob. Cast. Cam. *Palma maior*, *Tab.* *Dactyliscum palma elate*, *Matth.* *Palma elate*, *Cord. in D. Dod.* *Caryotæ*, *Carotides*, fructus palmæ *dactyli*, *Cast.* *Palmarum fructus* siue *dactyli*, *Lob. Dod.* *Palma maior*, *C. B. 1.* *Dattelbaum oder Dattelbaum.*

Crescit in Iudæa Syria, Ægypto, Africa, & sim. locis calidis.

N. *Palmas fœminas non sine asper-*

sione pulueris vel florum è palmis maribus parere asserit Alpinus.

OFFICIN. NAT.

Fructus (officinis.) *Dactyli*, *Palmula, Datteln.*

Eligendi magni flauis, parum rugosi, molles, pleni, Carnosi carne sub dura ad nucleum candicante, ad corticem rubescente, & qui concussimino sonant, sapore vinoso. Deteriores sunt graciles, flaccidi, duri & exarnes.

Vires. Dactylorum maturorum pulpa calf. subastring. (immaturi astringunt fortiter.) *asperitatem faucium leniunt, fœtum in utero roborant, fluxus ventris sistunt, vitiis renum ac vesicæ succurrunt. Extrinfecus conueniunt in cataplasmatis astringentibus, & simil.*

N. Concocti sunt difficiles, capiti dolorem inferunt. (inprimis exiccati) crassum ac melancolicum humorem generant.

PRÆPARATA.

1. *Species seu Ele*
ctuarium Diaphanicon. *Fernelij.*
 2. *Diaphenicum*
in solido, i.e. Tabellæ
El. diaphænic.
- { Horum basis est
Turbith ac diagrid. Vid. D. &
Turbith. infra
de purgant.

CCXXXVII. *Papauer satium.*

Mhuay, Papauer (simpliciter,) Arab. Thaxthax, Magfamen. Oelmagen, Oelsamen, Mæn.

{ *Album, quod tutius intra corpus adhibetur.*

{ *Nigrum, quod non aquè tutum est,*

Videatur prius; Papauer, Brunf. Lon.
papauer satium, Matth. Tab. papauer album, Trag. Dod. papauer album satium, Lob. Cast. Ger. papauer satium

ZZZ semine

semine candido, *Fuchf.* papauer hortense semine albo, *C.B.* 1

Nigrum vſitatus inſcribitur Papauer nigrum, *Brunf. Caſt. Pap.* ſatiuū 2. vulgo nigrum, *Cord. in D.* pap. ſat. ſemine atro, *Fuchf.* papau. hortense nigro ſemine, ſylueſt. Dioſcoridi, nigrum Plinio, *C.B.* 2.

Colitur in hortis. Floret media æſtate.

OFFICIN. NAT.

Flores, Senen albi & nigri. Capita cum & ſine ſemine.

Vires. Reſig. & hum. 3. (ali. 4.) *Uſus præcip. in ſomno conciliando, in affectibus peſtoris ac pulmonum & inprimis in tuſſi, raucedine, phthiſi. Hinc & in fluxu alui. Extrinſecus in dolore leniendo, ſomno introducendo (capite pedibusue adhibutum.)*

PRÆPAR.

1. Succus inſpiſſatus. Ex Foliis.

N. De opio ac Meconio, quæ ſucci ſunt papauerum exoticor. Vide ſis infra.

2. Extractum. Ex floribus ſiccis cum

▽ papau.

N. *Quercetanus in Pharm. Reſt. c.*

25. parat hoc modo. *R.* Capit. papau. q. v. (cum flores expandere incipit, præſtatque papauer quod flores fert rubicundos, contunde ac digere in *MB* cum Hydromelite viſoſo. *vel Vino Canaria dies (12. 15.)* ut liquor intenſiſſimè rubefcat.

Exprime fortiter, ut omnis virtus gummoſa & reſinoſa eliciatur. Abſtrahel.

▽ (*VB*) ad remanentiam gummoſa & reſinoſa ſubſtantia, quam adhuc calentem ſi voles effunde in frigidam & ſubito coagulabitur. Et hoc, ait, eſt verum probatumque opium ac nullo modo ſophiſticum (intellige Germanicum,) quod loco opij exotici adhiberi poteſt, de quo

clafſe ſequenti.

3. *Aqua.* Ex floribus vel capitibus florentibus.

4. *Syrup. ſimpl.* Ex decoct. capit. papau. vtr. c. ſem. an. & penidio. Vide Diſpenſ.

5. *Compoſ.* Fit cum aliis peſtoralibus. Vide Diſpenſ.

6. *Electuar.* 1. *Diacodium ſimpl.* Ex Decoct capit. papau. albi & mille, (vel ſaccharo, vel ſapa cum Glyzyrrhiza.

7. 2. *Diacodium Montani,* ſeu *Syrupus de Siliquis.* Ex decoct. capit. papau. alb. ſiliquis. Rad. Althe. & Glyzyrrhiza, cum ſaccharo cando & penidio.

8. 3. *Diacodium Actuarij.* Hoc ex aſtringentibus.

9. 4. *Diacodium inſolid.* c. i. c. Rotulæ ex Emulſione & ſaccharo. Vide Diſp.

10. *Loboch.* Vid. Diſp.

11. *Oleum.* Ex ſemine exprimitur.

C C X X V I I I. Papauer Erraticum.

Μακρον ῥόδιον, Ρόδας, Papauer fluidum. Papauer rubrum. Rlapperroſe, Rornroſe, Ieldmagſamen, Grindmagen.

Eſt } maius. Hoc officinarum eſt.
 } minus. Inuſitatum.

Dicitur papauer Erraticum, *Matth. Cord. in D. Lon. Dod. Caſt. Tab.* Papauer Erraticum primum, *Fuchf.* Papauer Rhæas, *Lon. Ger.* Papauer Rhæas ſiue flore caduco puniceo, *Lob. ico.* Papauer Erraticum maius, *C.B.* 10. inter ſpec. papaueris.

Creſcit in aruiſ iuxta vias ac inter ſegetes. Floret Maio, Iunio.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. Refrigerat valide, somnum conciliat, dolorem sedat. *Vsus* praecep. in febris, pleurisi (cui specificè prodest,) angina, aliisque morbis (in primis pectoris) refrigeratione opus habentibus. In inordinato mensium fluore (infus. flor. in *V.*) Extrinsecus sunt, qui herba Hepati imposita, hemorrhagiam narium sistere conantur, quam vim & radici adscribunt.

N. Galenus semen multo frigidius esse ait, quam sem. papaveris sativi, unde & internum eius usum interdicat.

PRÆPAR.

1. *∇ stillat.* Ex floribus.
2. *Syrup.* Ex infusione florum triplici.
3. *Conseru.* Ex floribus.
4. *Extractum.* Cum propria aqua acuata Spir. *Æris. Quercet. Ph. Rest.* cap. 26.
5. *Accuum.* Ex floribus.

CCXXXIX. Parietaria.

Ægyn. Parietaria, Vrceolaris, vitraria, herba muralis, *Tag und Nacht, S. Peterskraut, Glaszkraut.*

(Maior vulgaris. *Hac. officinar.*

(Minor. *Tragi.*

Dicitur Parietaria, *Brunf. Cord. hist. Dod. Tab. Ger. Parietaria vulgaris & maior, Trag. Helxine; Matth. Fuchf. Lon. Cast. Cam. Helxine altera, Cord. in D. Perdicium. Lob. Pariet. officinarum & Dioscoridis, C. B. I.*

Crescit iuxta sepes, muros ac parietes. Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refrig. & humect. parum,

emollit, maturat, exterg. subastring. *Vsus* eius internus licet rarus sit, tamen prodest in pectoris mucilagine & hinc in tussi, in renibus extergendis & hinc in stranguria & calculo. Extrinsecus crebrior eius est *usus*, isque in tumoribus, erysipelate, ambustis, vulneribus & ut plurimum adhibetur in clysteribus & cataplasim.

PRÆPAR.

∇. stillat. Ex integra herba mense Iulio collecta.

CCXL. Herba Paris.

Herba paris, *Matth. Dod. Cast. Ger. Paris herba, Lon. Cam. Aconitum pardalianches, Fuchf. Aconitum sine pardalianches monococcon, Cord. in. D. Solanum tetraphyllum, Lob. Solanum quadrifolium bacciferum seu 10. C. B. Aconitum salutariferum, Tab. Vua versa, Vua vulpina, Einbeer, Walffsbeer.*

Crescit in sylvis opacis. Floret Aprili & Maio.

OFFICIN. NAT.

Bacca, raro Folia.

Vires. Bacca ac folia refrig. & sicc. *Vsus* baccarum internus est alexipharmacus in peste, venenatis morbis, venenisque assumptis. (E.g. *Arsenico.*) Extrinsecus foliorum *usus* est in bubonibus pestilentialibus, aliisque calidis tumoribus, in paronychia, in inueteratis ulceribus.

PRÆPARATA.

Pulvis Saxonicus. Vide D. A.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Latifolia [Elaphoboscum]} \\ \text{Tenuifol.} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Sylvestris} \\ \text{Satiua} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{minus} \\ \text{vsuales.} \end{array}$$

Pastinaca est tum $\left\{ \begin{array}{l} \text{Satiua seu domestica, Huius loci,} \\ \text{Sylvestris. Hec loci sequentis.} \end{array} \right.$

Estque Past. fetiua $\left\{ \begin{array}{l} \text{lutea. Carota lutea, gelbe Mobren, gelbe Pastenach, gelbe Ruben.} \\ \text{alba, Carota alba, vveisse Pastenach, vveisse Nuben.} \\ \text{rubra. Carota (simpliciter,) rothe Ruben.} \end{array} \right.$

Videatur Pastinaca satiua, 1. & 2. Fuchsf. 1. (& Elaphoboscum,) Tabern. Lon. Satiua Diosc. Lob. Cord. in D. tenuifolia (& latifol.) satiua, Dod. Ger. Pastin. 3. Daucus staphylinus atilis & hortensis vulgo Carota, Cam. hort. Carota ex albo hauescens, & pastinaca domest. Cast. nostra lutea, Cam. Staphylinus 1. & 2. Trag. Staphyl. satius & Daucus domesticus, Galeno. Sifer alterum, Matth. Tab. Pastin. tenuifolia satiua radice lutea vel alba, C. B. 5.

De rubra vid. Pastinaca satiua, 2. Fuchsf. lat. rubens, Dod. Tab. atrorubens, Lob. Carota, Matth. radice rubra, Cast. vulgaris, Lob. Staphylinus 3. Trag.

OFFICIN. NAT.

Semen, raro Herba. (Radices culinae sunt.

Vires. Semen & herba calf. 3. sicc. 3. Vfus precip. in vulneribus, singultu, pleurisi, torminibus ventris, calculo ac menses pellendis. Specificum habetur ad veri suffocationem.

Dosis seminis ʒj.

N. Para planta hac in officinas infertur.

CCXLII. *Pastinaca sylvestris.*

Pastinaca tenuifolia sylu. Dioscoridis, vel Daucus officinarum, C. B. 1. Daucus agristis Gelen. Dauc. vulgaris,

Clusf. hist. Pastinaca erratica Plinio, Fuchsf. Cord. in D. Tab. Staphylinus syluest. Trag. Pastinaca sylu. Matth. Lon. Cast. sylu. tenuifolia, Dod. Ger. sylu. genuina Dioscor. Lob. Pastinaca 4. Cam. Germ. Bogelsnest.

Crescit passim locis campestribus siccis & arenosis. Floret Iulio & Augusto.

Semen, raro Radix & Herba.

Vires. Eisdem praedita est virtutibus quibus Daucus Creticus, cuius quoque loco, in compositionibus adhiberi commode potest. Semen calfacit & sicc. 3. radix paulo imbecillius, herba adhuc minus; atten. aperit. Vfus praecipui in tussi, pleurisi, stranguria, reserat Epar, Lienem, veteres, ciet menses & molas, sedat matricis suffocationes, stimulat Venerem. Extrinsecus conuenit radix pessariis, exiccat herba catarrhos (in lotionibus capitis) parturientium partum promouet (in suffitu.)

P R A E P A R.

1. *Confect. sem. sed raro.*
2. ∇ *stillat. Ex tota herba cum floribus ac radicibus Iulio collecta.*
3. *Ol. stillat. Ex semine.*

CCXLIII. *Perfoliata.*

Perfoliata vulgarissima seu arvensis, C. B. 1. Perfoliata, Brunf. Matth. Fuchsf. Dod. Cord. in D. Lon. Tab. maior, Trag.

Trag. perfoliatum vulgare flor. luteo, folio umbilicato, *Lob. perfoliata* vulgaris, *Ger. Germ. Durchwachs, Bruchvurtz.*

Crescit in locis sabulosis. Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Folia & Semen.

Vires. *Calf. & sicc.* (amari saporis) vulneraria est. *Vfus* prapicui in vulneribus recentibus, *Enterocelis* (inprimis umbilici) tumidis artubus strumis, sine intrinsecus sine extrinsecus adhibere volupe sit.

OFFICIN. NAT.

▽ *Stillat.* Ex integra herba florente.

CCXLIV. *Malus Persica.*

Persicus, Brunf. persica, Fuchs. Cam. persica malus, Lob. Tab. Ger. malus persica, Dod. persica arbor & eius 1. genus, *Trag. persica* molli carne & vulgaris viridis & alba, *C. B. I. persicus* alba & popularis, *Lon. persica* viridia & alba, *Matth. Cast. German. Pferschbaum.*

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores, Nuclei, Fructus sed raro, quippe hi facile putrescunt.

Vires. Fructus (mala persica, *Arab. Sanch. reffrig. & humect.* 2. nutrimenti sunt pauci, facileque putrescunt. Verum initio pastus laxant aluum. Exiccata constipant, landanturque in fluxu alui, &c.

Flores, Folia ac Nuclei, *calfac. & sicc. absterg.* *Vfus* prapic. (florum) in lumbricis infantum, in alui laxatione, mesenterij obstruptione, seri purgatione, & sim. (Nucleorum) in diureticis ac lithontripicis, in obstruptione Epatis, ardore Stomachi. Extrinsecus adhibentur crebro in Emulsionibus dolori capitis

dicatis, &c.

PRÆPARATA.

1. *Condit. fructus*, subtrahitur sc. exterior cuticula, hinc condiuntur. 1. a.

N. Aptiora ad condituram censentur mala minora quàm præcocia.

2. ▽ Ex floribus.

N. Aluum infantum lubricam reddit, lumbricosque educit.

3. ▽ diuretica. Vide l. 2. c. 38. ▽ diuretica ex nucleis.

4. Syrup. de floribus persica. Fit ex iteratis infusionibus, vt syr. ex infusione violarum.

Vires Bilem ac serosos humores educit, mesenterium referat, vermes enecat.

Dosis ad ʒij.

5. Conserua florum Persica.

6. Oleum. Fit expressione.

Vires. Sedat aurium, hemorrhoidumque dolores ac tumores, colicos iuuat (assumptum.)

CCXLV. *Persicaria.*

Persicaria est C. B.	{	1. mitis maculosa & non niac.
		2. vrens, hydropiper. Hoc officinale
		3. angustifolia.
		4. minor, pulicaria pumila.

Dicitur *sponte æsti*, *Hydropiper, Fuchs. Dod. Matth. Cord. in D. Cam. Cast. Ger. persicaria, Trag. Tab. Mas, Lon. mascula, Brunf. Pers. vrens, Lob. aliis pulicaria. Germ. Ilæhkraut, Wasserpfeffer, Muckenkraut.*

Crescit locis vdis ac palustribus. Floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Hydropiperis Folia.

Vires. *Calfac. & sicc. Vfus* prapicui extrinsecus in vulneribus tumoribus, induratis,

induratis, ulceribus in veteratis (in cataplasm.)

N. 1. *Perficaria* visis habetur frigida, sed officinis inusitata est, ut species reliqua.

N. 2. *Paracelsus* in *Hydropiperis* descriptione admodum prolixus est.

N. 3. Sunt qui hac herbâ, ad transplantationem morborum, praesertim incantatione introductorum utuntur.

CCXLVI. *Petasites.*

Petasitis, Pestilentzwurtz, Negenkrafft.

{ Maior, mas flore luteo. Hac usualis est.
{ Minor, foemina, flore albo.

Dicitur *Petasites*, *Trag.* *Fuchf.* *Dod.* *Cord.* *Lob.* *Lon.* *Tab.* *Ger.* mas. Cā. maior, *Math.* *Cast.* maior & vulgaris, C. B. 1.

Crescit in locis humidis. Floret initio vitis.

OFFICIN. NAT.

Radix quæ gummosa est.

Vires. *Cals.* & *sicc.* 2. part. est tennium, amari saporis: atten. aper. sudorifica est ac alexipharmaca in paste, in lipothymia uterina, morbis pectoris, à mucilagine creta oriundis. E.g. tussi, asthmate. Extrinsecus commendatur ad bubones & ulcera maligna.

N. Substitui potest costo, quippe viribus eidem aequipollere compertum est.

PRÆPAR.

1. ∇. Ex Radicibus vel ex tota h.
2. Oleum stillat. sed rarum est.
3. Extractum.

CCXLVII. *Petroselinum.*

Apium hortense seu *petroselinum* vulgare, C. B. 1. *Petrosel.* *Trag.* *Brunf.*

Cord. vulgare seu nativ. *Lob.* hortense, *Math.* *Lob.* *Dod.* *Cast.* *Ger.* sativum, *Tab.* *Apium* *selinum* *Diosc.* *Petroselinum*, *persilium* *oreselinum*, *Fuchf.* *Arab.* *Karphi.* *Peterlin*, *Petersilg*, *Gartenepich.*

N. *Petroselinum* verum seu veterum est petros. *Macedonicum* (quod sequitur.)

Gaudet solo humido, colitur in hortis. Floret Iunio, Iulio & Aug.

OFFICIN. NAT.

Radix, (colligitur vere.) *Semen*, colligitur August.) & *Folia*.

Vires. *Cals.* & *sicc.* in princ. 2. atten. aper. exterg. diuretica sunt, Epatica, &c. *Vsus* praecip. in obstructione Pulmonum Epatis, Lienis Renum ac Vesicae & hinc in tussi, Ictero, Cachexia, calculo, sabulo, mensibus obstructis, asthmate, &c. Extrinsecus resolvunt humores calidos (inprimis oculorum sugillationes) impediunt capillorum casum (cum *Abrotan.*) imminuunt lac (mammas imposita) adeoque mulierculis nostratibus vsui sunt in ablactatione infantum.

N. *Forest.* l. 16. 6. commendat ad tussim puerorum. R. *Succ. Petr.* ʒß. *Lact.* muliebr. ʒj. *Cumin.* ʒj. *M. da tepide.*

PRÆPAR.

∇ stillat. Ex integra planta cum radice, coll. initio veris.

CCXLVIII. *Petroselinum Montanum*

Ορειόσῆλιον, *Dod.* *Lob.* *Clus.* in D. f. 1. *Tab.* *Apium montanum*, *Cast.* folio ampliore, C. B. 1. *Elaphoselinum*, *polychreston*, *Cord.* *Bergpeterlein*, *Bergpich*, *Hirschpeterlein*, *vulde Peterfilien*.

Crescit

Crescit in locis montanis, sabulosis, vt & in hortis.

OFFICIN. NAT.

Radix arque Semen.

Vires. Calf. & succ. 3. est alexipharmacum, sudoriferum, diureticum, discutiens. Vfus præcip. in calculo Renum & vesicae, in Peste (sudorem eliciendo) in morbis & flatibus, in stranguria.

CCXIX. Petroselinum Macedonicum.

Πετρώσλιν Μακεδονικόν. Matth. Lob. Cast. Dod. Tab. aliàs Apium saxatile, Peterlein, Steineppich, Stempeterlein.

Colitur apud nos in hortis. Gaudet solo sabuloso ac saxoso.

OFFICIN. NAT.

Semen raro Radix.

Vires. Calf. & succ. (3.) absterg. atten. aper. alexipharmacum est, vnde & Thoriaca compositionem ingreditur. Vfus præcip. in urina ac mensibus ciendis; in reliquis cum viribus petroselinorum speciebus adscriptis vponuenit. Adhibetur & morbis veneficio introductis.

CCL. Peucedanum.

Πευκεδάρις. Peucedanum, Trag. Fuchf. Dod. Cord. in D. Lob. Lon. Ger. Tab. 1. Cam. Matth. Cast. Peucedanum, C. B. 1. & 2. aliis Fœniculum porcinum. German. Haarstrang, Savvfenchel, Schvuchelwurtz, Himmelgall.

Crescit in montibus opacis. Colitur & in hortis: Floret Iulio.

N. 1. C. B. duplex facit Peucedanum alterum Italicum, alterum Germanicum: Verum omnivero promiscuè in usum accersiri poterunt.

N. 2. Radicem Peucedani officinis vsualem, non esse legitimam, Vid. ap. Matth. & Castor.

OFFICIN. NAT.

Radix colligenda, vere Autumno.

N. Radix impragnata est succo resinoso, qui tamen in usum medicum nondum venit, licet alias magnifiat.

Vires, Calf. & succ. 3. aper. atten. expectorat, mucilaginem tartaream bilen. que educit. Vfus præcip. in affectibus pectoris, tussi, inflationibus (so die lung in den Hals steigt,) & sim. in obstruct. Epatis, Lienis, Renum, ciet urinam, calculum arerit & expellit. Extrinsecus in Hemicrania, aliisque generibus cephalalgia à catarrhis ortum ducentibus, in tumoribus renitentibus, vlceribus inueteratis mundificandis, promouet castillorum prouentum, &c.

PRÆPAR.

1. Sal. } quæ raro pro-
2. Oleum fiat. } stat officinalia.

CCLI. Pimpinella, Bimpinella.

Τριπυδάριον, Bibinella, Bimpinella, Bibernell, Bibinell, Steinpeterlein, Bockspeterlein.

Bibi- } saxifraga { maior } promiscuè
nella } sanguifraga { minor } vsuales.

Maiores est Pimpinella saxifraga maior candida, C. B. 1. Pimpinella, Cord. Lon. Trag. Fuchf. Lob. Cast. Pimpinella saxifraga, Matth. Cam. Pimp. Saxifraga maior, Dod. Tragofelinum maius, Tab.

N. 1. Huius radici adnascitur quibusdam in locis granum rubrum, quo vtuntur

tur Tinctores ad colorem Carmesinum, unde sunt qui pro cocco habent.

Minor, est pimpin. minor, C. B. 4. minor, Fuchs. pimp. faxifrag. minor, Cam. Tragofelinum petræum, Tab. faxifrag. parua, Dod.

N. 2. Hac præstantissima est, petro, selini Macedonici loco compositiones ingredi potest, si id deficiat.

Gaudent solo pingui, sed inculto: Florent Iulio, Augusto.

OFFICIN. NAT.

Radix, Folia, Semen.

Vires. Calf. & sicc. (maior in princ. 3. minor. compl. gr. 3.) atten. aper. absterg. sudorifica est, lithonriptica vulneraria, &c. saporis acris. Usus præcip. in præcauendis ac curandis venenis ac contagiosis morbis, in referandis obstructionibus hepatis, Renum, Pulmonum, mensium. In arena, calculo ac stranguria, in colicis

doloribus, tussi, asthmate, peripneumonia: in cruditate ac imbecillitate ventriculi: in lue venerea: Antidotos item est argenti vini. Extrinsecus valet: in maculis faciei abstergendis: in odontalgia: auget lac, maturat bubones, cancrasosque tumores, mundificat ac consolidat vulnera, tam recentia, quam inveterata.

PRÆPAR.

1. Condit. Ex Radice.
2. Confect. Ex radice vel ex femine.
3. Conserua. Ex femine.
4. ∇ stillat. Ex radice ac integra herba florente Iunio mense collecta.
5. Oleum stillat. Ex tota planta cum Radice.

N. Sunt qui in vino rubello semen macerant, rursum exiccant atque hinc oleum exprimere conantur.

6. Sal. Ex cinere.

CCLII. Pinaster seu pinus sylvestris.

Pinus	{	Satiua. Vide loco sequenti.	{	1. Fructifera.	{	promiscue vsuases.		
		Syluest.					montana	2. 3. Steriles.
							maritima maior & minor, &c.	

Videatur Pinus sylu. Brunf. Trag. Lob. Matth. Cast. Dod. Tab. &c.

OFFICIN. NAT.

Cortex, Folia, Nuces, Resina.

Vires. Cortex & folia refrig. & sicc. adstringunt. Usus præcip. (externi) in dysenteria, flore mensium (suffiundo.)

PRÆPARATA.

1. ∇ still. Ex conis viridibus.

Vires. Rugas faciet delet & mammas admodum in virginibus extuberantes cohibet (imposita cum linteolis.)

2. Oleum. Fit ex ligno per descensum igne leni, ut oleum ex abiete.

N. Forsan hoc oleum est officinis Tem-

plinum dictum.

Vires. Impetigines sanat inunctum: Verrucas consumit vulneratis verrucis inditum.

CCLIII. Pinus & Pinee.

Pinus, Pinus, Brunf. Trag. Dod. Cord. in D. Lon. Cast. Pinus domestica, Matthiol. Tab. Pinus satiua, Ger. Pinus vulgarissima, Lob. Pinus Italica, Cam. Pinus satiua, C. B. 1. Arab. Sonabar. Ichtenbaum, Hartbaum, Rinholdtz, Iorenholdtz.

OFFICIN. NAT.

Nuces

Nuces Pineæ, Cortex & Folia.

Vires. Nuclei Pineæ (strobili, Coni coccali & conaria veteribus) caliditate temperata sunt & humidia, maturant, leniunt, agglutinant, resoluunt, impinguant, adeoque nucleorum Vfus precipuus est in phthisi, (quia nutriunt bene) tussi, stranguria ac acrimonia urinae mitiganda: segnem excitant Venerem, vlcera Renum mundificant, &c.

Cortices & folia viribus conueniunt cum cort. & fol. pini sylvest.

PRÆPARATA.

1. *Oleum.* Exprimitur ex nucleis.
2. *Confect.* nucleorum.

CCLIV. Piper.

Indi, Arab. Fulfel, Filfel, Pfeffer.

{	Rotundum	{	Album: hoc omnium præstantissimum.
			Nigrum: succedit albo.
{	Longū. Ma cropiper	{	Oriente minus, Tab. Hoc vsuale.
			Occidentale maius. Tab.

Album, dicitur piper album Matth. Lob. Fragos. Clus. Cast. Tab. Piper rotundum album, Cord. hist. Piper rotundum album, C. B. 2.

Crescit rotundum in Malauar ac finitimis Insulis Iauæ, Sunda, &c. fructusque est plantæ cuiusdam, quæ arboribus instar conuoluuli circumducitur.

Eligendum recens, ponderosum plenum, acre non cariosum.

N. 1. Calf. & sic. 3. incid. atten. aper. resol. Vfus precip. in frigiditate ac cruditate ventriculi, colicis doloribus (præstat album) in visus imbecillitate (quia flatus discutit.) Extrinsecus in apople-

gmatis, gargarismis, sternutatoriis, sedat odontalgiam, columellam tumidam imminuit, nervorum affectus frigidos iuuat.

N. 1. Vis piperis volatilis valde est. Videntur ergo præparationes in quibus volatile euanescit, e.g. Extractorum præparationes.

N. 2. Vulgus piper longum in paroxysmis febrium exhibere solet, id quod non nisi in principio locum habere potest.

PRÆPARATA.

1. *Spec. diatrion pipereon.* V. D.
2. *Tragea seu species fortes.* V. l. 2.
3. *Oleum piperinum stillat.* Fit ex nigro, ad modum, quo ex reliquis aromaticis.

N. Piper parcissime oleum dat (scil. 1 lbj. dat 1j. circiter) ideoque ∇ destillata aliquoties super remanentiam seu caput mortuum refundenda erit.

Vires. Admodum penetrabile est, flatus discutit, paroxysmum tertianæ præcauet, si hor. 2. ante paroxysmum exhibeatur, purgato tamen corpore. Extrinsecus admiscetur inunctionibus dorsi in febribus.

Dosis gr. ij. iij. iiij. &c.

4. *Ol. de piperibus.* V. D.

CCLV. Pistacia.

Pistacia, Pistacia, Matth. Cord. Lon. Dod. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Terebinthus Indica Theophrasti, Lob. C. B. 1. Arbor est Indicæ Terebintho similis.

Nascitur in Persia, Arabia, Syria, India. Quin & Italiæ indigena facta est.

OFFICINALI NATIVA

Fructus (Pistacia phistacia, Bisania, Fistici, Pimpernisz l. v.) Sunt nuclej

A A a a duplici

duplici vestiti putamine, primò exteriori coriaceo, hinc lapideo, quod nucleum proxime continet, membranula rubella circumdatum.

Eligendi nuclei recentis ponderosi, extrinsecus albi, intrinsecus virides, non rancidi, in apice aliquantulum patentes.

Vires. *Calf. 2. hum. 1. atten. aper. Vfus* *precip. in mucilagine pulmon. obstruct. Epatis, roborant stomachum, arcant nauseam ac vomitum, excitant appetitum, bonum suppediat nutrimentum.*

PRÆPAR.

Oleum, exprimitur ex nucleis.

CCLVI. *Plantag.*

Ἀγρό-λαόςον, Vegerich.

Species plantag. vsualiores sunt res.

1. Dicitur plantago latifol. sinuata, *C.B. 2. rubra, Trag. Brunf. maior & 1. Lon. maior, Matth. Fuchsf. Dod. Cast. Tab. Cam. latifol. Cord. latifol. leuis, Lob.*

2. Plantago latifolia incana, *C.B. 3. Plant. maior, Matth. Lon. Cam. latifol. minor Dioscoridis, Tab. maior incana, Lob. Plantago media, Fuchsf. Dod.*

3. Plantago angustifolia maior, *C. B. 1. plant. minor, Fuchsf. Dod. Lon. media, Cast. plantago lanceolata. Trag. Tab. plantago longa, Matth. plantago quinqueruia, Lob.*

Crescunt locis herbosis. Florent Majo & Iunio.

OFFICIN. NAT.

Semen, Folia, Radix.

Vires. Refrigerant & sicc. 2. absterg. incrass. epatica sunt ac vulneraria. *Vfus* *precip. in fluxionibus cuiuscunque generis. E.g. alui, expuitione sanguinolenta, gonorrhœa, mictione inuoluntaria in*

mensium profusio, in febribus, & sim. Extrinsecus in mundificandis consolidandisque vulneribus ac ulceribus inueteratis.

PRÆPAR.

1. *Succus inspissatus.* Extractus ex foliis.

2. *Stillat.* Ex herba integra.

3. *Syrupus de succo.*

CCLVII. *Pæonia.*

Pæonia, Arab. Feonia, Pæonien, Benigrosen, Pfingstrosen, Gichtrosen, Kænigsblum.

Mas, C.B. 1. Hæc præpollet.

Fœmina { *flor. simpl. C.B. 1. & c.*
 flor. pleno, C.B. 1. 2. & c.

- *Mas dicitur: Pæonia nobilior vel*

2. *Trag. pæonia mas, Matth. Cord. in D. Lob. Dod. Tab. Ger. Pæonia folio nigricante splendido, C.B. 1. Fœmina nuncupatur pæonia, Trag. Lon. pæon. fœmina, Brunf Fuchsf. Cord. in D. Lob. Cam. pæonia fœmina altera, Dod. pæonia vulgaris fœmina. Clus. hist. pæonia communis vel fœmina, C.B. 2.*

N. Discernuntur innicem Mas & Fœmina foliis & radice. Mas est foliis nigricantibus splendidis, inglandis folia amulantibus, radice digitali crassa, alba, seu mas non una radice nixtus est, sed plures habet Fœmina variat colore foliorum. Est folio utrinque virente & glabro, calice hirsuto, flore vel simplici, vel pleno, foliis helleborum amulatur, radicibus, cœn balani longiores circiter octo aut sex adherent. Mas plures habet, & c.

Coluntur in hortis. Florent Majo.

OFFICIN. NAT.

Radix, Semen seu grana: Flores.

Radix

Radix effodienda est vere, ☿ de-
crefcente (3. ☿ ante nouilunium.)
Alij effodiunt ☉ existente in ♀ die-
que achora solaribus, ☿ decrefcente.
Flores colligendi sunt Maio. Semen
Augusto.

N. Pæonia flore multiplici raro se-
men producit.

Vires. Calf. ☿ sicc. 2. saporis est sub-
dulcis ac subacris, seu amari; suba-
stringit. Vfus præcip. in affectibus Ce-
phalicis, Epilepsia, incubo, &c. Vteri-
nis, mensibus obstructis, lochus purgan-
dis, doloreque post partum mitigando,
Epatis obstructione. Extrinsecus suspen-
duntur grana ac radix de collo pro ar-
cenda Epilepsia.

P R Æ P A R A T A.

1. ▽. Ex floribus additaque, si placet
radice.

2. Syr. Ex infusione florum.

3. Extract. Ex floribus exiccatis.

4. Conseru. Ex floribus.

5. ☉. Ex incinerata integra planta.

6. Fecula. Ex radice, l.a.

7. Oleum stillat. Ex granis elicitur
cum ▽ fermentat. l. comm.

C C L V I I I. Polygonum.

Maius, varij generis est, è
quibus vsuale latifolium,
C. B. 1.

Poluzerov, { Minus, variorum itidem
generum, quæ cuncta
minus vsualia sunt.

Dicitur centum nodia, Lob. Brunf.
Polyg. mas, Matth. Fuchf. Dod. Cord.
Cast. Trag. vulgare, Cam. maius, Len.
Tab. German. VVe grasz, VVe gdritt,
Deengrasz, B'ukkraut.

Crescit locis incultris, aridis ac iux-
ta vias. Floret integra ferè ætate.

O F F I C I N. N A T.

Herba.

Vires. Refig. 2. (al. in princ. 3.) sicc.
astring. vulneraria est. Vfus præcip. in
sistendis fluxibus quibuscunque, diar-
rhæa, dysenter. Fluxu vter. vomitu. Hæ-
morrhagia narium. Extrinsec. prodest
vulneribus, ulceribus, inflammationibus
oculorum, mamma tumoribus, febriter-
tiana (carpis imposita.)

P R Æ P A R.

▽. still. Ex herba collecta in prin-
cipio Augusti.

C C L I X. Polygonatum.

Est { Latifolium, varij generis, è qui-
bus vsuale vulgare, C. B. 1.
Angustifolium, varij generis,
quæ minus vsualia.

Dicitur Sigillum Salomonis. latifo-
lium, Trag. polygonatum. Matth. Cast.
vulgare, Cā. latifolium. Fuchf. Dod. Tab.
maius, Lon. German. VVeiszwurrtz.

Crescit in syluis & collibus, Floret
Maio.

O F F I C I N. N A T.

Radix, raro Folia, raro Bacca.

Vires. Temperamenti est mixti, sub-
astr. exterg. saporis est subamari ac sub-
acris. Vfus internus est in fluore albo
mulier. Bacca pituitam mucilaginosam
per vomitum ac secessum educunt. (Dos.
℥. 14. 15.) Idem dicitur ☿ de radice
(3j.) ac de foliis Extrinsecus faciei ma-
culas abstergit, cutem dealbat, resoluit
sugillationes ac tumores rennentes, lotione
fugat lenticulos capitis, scabiemque in-
fantum exiccet, cicatrices maculasque
morbillo. emendat, &c.

P R Æ P A R.

▽. Ex radice cum foliis ac flori-
bus.

Maliz, Malus, Appfelbaum.

Poma sunt { Domestica
 Sylvestria. { acida.
 dulcia.
 subacida.

Vires. Acida sunt natura frigidioris
 as astringentis. Verum cum butyroco-
 cta cibum febricitatibus præbent com-
 modum.

Dulcia. Sunt natura calidioris ac la-
 xantis.

Subacida seu vinosa, natura sunt
 mixta, conveniuntque Ventriculo &
 Cordi.

Sylvestria. Astringunt.

Extrinfecus (dulcia sub cinere cocta)
 sedant dolorem oculorum, pleuritidis
 (cum myrrha imposita).

PRÆPARATA.

1. Succus fermentatus, seu vinum po-
 morum, pomaceum.

N. Vulgatissimum est in Normannia
 Gall. & Pronincia, adeo ut non modo po-
 tus loco habeant, sed & ex eodem in
 vite destillent, & aceta conficiant, quæ
 vel cum Spiritu ac acetis ex vino, certare
 videntur.

2. Syrupus de pomis simpl. Ex succis
 pomor. dulcium ac vino forum.

Vires. Succurrit affectibus cordis,
 syncopa, palpitat ac aliis ab atrabile or-
 tis. Ventriculo gratus est, sedat situm,
 febribus auxiliatur.

3. Syrup. de Pomis Regis Saborum,
 V.D. & infra de Sena.

4. Extract. seu succus inspissatus
 pomorum dulcium fragrant.

5. Extract. è radice arboris fructus
 acidus ferentis. fit l.a. cum ex pomis
 propriis destillata.

Vires. Summum est medicamen. con-

tra omnia ventris profluvia, dysente-
 riam, enteriam, diarrhaam, fluxum
 epaticum. Quercet. P.R.c. 26.

CCLXI. Populus.

Est { alba latifolia, vveisz Pappel-
 Baum, Aspen.
 nigra, Jchwarz Pappelbaum
 Hæc usualis.

Alba dicitur, Pop. alba, Matth. Dod.
 Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Ger. Populi
 albæ aliæ species, Trag. C.B. 1.

Nigra dicitur: Populus alba, Trag.
 Lon. Populus nigra, Matth. Dod. Cord.
 in D. Lob. Cast. Tab. Ger. C.B. 3.

OFFICIN. NAT.

Cortex, Pop. albæ, sed rara. Oculi.
 Pop nigra.

Vires. Viraque natura est mixta, (sed
 humido sicca) ceterum ad frigiditatem
 inclinantis, abstergitque. Cortex pop. al-
 bæ præcipue adhibetur in dolore sciatico
 intus & extra, in stranguria, in ambu-
 stis. Oculi seu gemma (æspuala) pop.
 nigr. adhiberi solent à sexu multebri
 ad capillos ornandos & promouendos,
 profunt iidem ad dolores sedandos.

N. 1. Est & Gummi pop. nigra, quod
 calfac. 2. sed minus id usuale est.

N. 2. Succus in foraminibus populi
 collectus, Verrucas ac impetigines cura-
 re creditur.

PRÆPARATA.

1. Oleum populinum. Ex oculis pop.
 nigr. (primo vere collectis) & oleo ve-
 teri. Vide Disp.

N. Alij addunt quoque vinum & co-
 quunt ad huius consumptionem.

2. Unguentum populeon. V. D.

Vires. Refrigerat, somnum conciliat.

CCLXII. Porrum.

capitatum

OFFICIN. NAT.

Folia, Semen.

Vires Rej. *ig. 3. sicc. 2. adstring. pauci nutrimenti est, lumbricos fugat & expellit. Vjus præcip. in mitigando feruore bilis, & hinc in febribus putridis ac malignis, ardore urinae, ut & in scorbuto, apprimè succurrit febricitantium aestui (folia recentia applicata lecori, Renibus, &c.)*

N. In tabe prodesse, succulentia & crassities foliorum arguunt.

PRÆPAR.

1. Succus inspissatus.
2. ▽ stillat. Ex herba.
3. Syrupus simpl. Ex succo.
4. Compos. Vide Disp.

N. Solet & condiri ad modum quo Cappares condiuntur.

5. Conserua. Ex foliis.

CCLXIV. *Primula veris.*

ἄλσιν Herba Paralysis, *Cast. Brunf.* vulgaris, *Trag.* *primula veris*, *Matth. Tab.* maior, fl. luteis odoratis, *Dod.* *primula pratensis*, *Lob.* *verba sculum odoratum*, *Fuchsf.* *Arthriticum*, *Gesf.* *simpl.* luteo flore, *Cam.* *verba sculum pratense odoratum*, *C. B. I.* *German. Schlüsselblumen*, *Himmelschlüssel*, *S. Peters Schlüssel*, *vers. Beronien.*

Crescit in campestribus ac syluis. Floret April.

OFFICIN. NAT.

Flores ac Folia.

Vires. *Calfac. leniter, siccatur fortius, saporis est subacris ac subamar. subastring.* *Anodyna est. Vjus præcip. in affect. capitis Apoplexia, Paraly. In articulo doloribus. Extrinsecus in Arthritide ac tumoribus qui Ictus venenatorum animalium subsequuntur.*

A A a a 3 N. Acetum

Πόδορον Capitatum, *Aesch-lauch.*
 { Dome-
 { iticum { sectile, *Schnitt-*
 { lauch.
 { Vuale syluestre.

Dicitur Porrum, *Brunf. Cord. in D. Dod. Cast. Tab.* Porrum commune, *Matth.* vulgare, *Lob.* porrum capitatum, *Fuchsf.* por. capitatum vulgare, *Cam.* porrum commune capitatum, *C. B. I.*

N. Capitatum & sectile non differunt genere, sed solum cultura. Sectile enim dicitur, quod detondetur ad culinares usus: capitatum, quod sine detensione linquitur & autumno transplantatur, ut capitatum fiat.

Gaudet solo pingui. Seritur Martio & Aprili.

OFFICIN. NAT.

Rdaix, Herba, Semen.

Vires. Porrum calfacit insigniter siccaturque, attenuat, aperit, incidit, resoluit. Vjus præcip. in serpentium moribus & uestionibus, mucilagine pulmonum. Extrinsecus in in aurium linnitum ac suppurationibus, in venis hemorrhoidum tumidis ac dolentibus, &c. Semen urinam ciet.

N. Frequens eius usus, somnos turbulentos inducit, visuique officit.

CCLXIII. *Portulaca.*

Ἀνθρακίς, *Arab.* *Backaleancha*, *Porcellana*, *Burtzel*, *Bortzel*, *Genfel.*

- { Latifolia fatiua. Hac præfertur.
- { Angustifolia syluestris.

Inscribitur Portulaca, *Lon. Cord.* hortensis, *Trag. Fuchsf. Dod.* Domestica, *Matth. Lob. Cast. Tab. Ger.* maior, *Cam.* Portulaca latifolia seu fatiua, *C. B. I.*

Floret Iunio: Crescit locis arenosis & sabulosis.

N. *Acetum radicibus impragnatum ac loco errhini in nares attractum, odontalgiam mirabiliter sedat.*

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra herba (caule, foliis ac floribus.)

2. *Conserua*. Ex floribus.

CCLXV. *Prunella.*

Brunella, Dod. Brunf. Lob. Brunella vulgaris & 6. Trag. consolida minor, Matth. minima, Cam. Prunella, Fuchf. Cam. Tab. Ger. symphytum petræum, Lob. ico. Cord. in D. German. Brunellen, Gottheil, S. Anthonikraut

Nomen ducit ab Angina, quam Brunellam alij vocant

Crescit in campestribus ac locis herbosis. Floret Iunio & hinc ferè integra æstate.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores.

Vires. *Calf. & sicc. (subamara est) abstergit, consolidat, vulneraria est. Usus præcip. in vulneribus imprimis Pulmonum, in sanguine coagulato. Extrinsecus vulneribus & creberrimè in angina, aliisque affectibus oris ac faucium (gargaris.)*

N. *Author est Crollius, radicem aridam denti dolenti affricatam, ut sanguinem susceperit, magnetica vi doctorem sopire, si salici indatur perforata, foramenque mox tubulo ex salice obturetur.*

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra planta Augusto collecta.

2. *Conseru.* ex florib.

CCLXVI. *Prunus.*

Prunus } *Domestica sativa, huius loci. Sylvestris, vide Acacia.*

OFFICIN. NAT.

Крыжовник Pruna, Pflaumen, (fructus pruni.)

Varij sunt generis colore, sapore, figura & magnitudine differentia. Sunt enim dulcia, subacida, acida. Sunt purpureo-nigra, rubra, lutea, (cerca, *Spillina*,) alba: sunt oblonga, rotunda: sunt denique maiora, minora, &c. In officinis autem vltatiora sunt pruna Damascena (*Zvertschen*,) cuius vicem subeunt pruna Vngarica, tam quoque nostratia dulciora in clibano exiccata. Præterea sunt & Pruneola, (pruna de Brignioles, è loco natali in Galliis,) quæ enucleata & exiccata afferuntur, *C. B. 15.* pruna ex flauo rufescentia, mixti saporis, gratissima. Germ. *Pflaumen, Prunellen.*

Palma datur Damascenis, quæ ex Syria Venetias sicca afferuntur, nucleoque sunt longo & plano porius quam rotundo. Secundo loco sunt, quæ ex Pannonia; vnde Vngarica, dicta sunt, aliis etiam Damascena, *Cord. in D. & Transyluania* adferuntur, at *Dod.* Morauica magis ad aluum leniendam probantur. His 3. subiungi poterunt & nostratia, sed viribus ea minora sunt.

N. *Est & gummi prunor. ad calculum atterendum utile, sed rari usus.*

Vires. *Pruna natura refriger. & humect. Recentia cruda, emolliunt aluum quidem, verum facile putrescunt & proinminus commodè (inprimis post cibum) esitantur, maxime si immoderatio- rior usus sit. Pruna Damascena esui aptiora sunt, laxant, acrimoniam humorum obtundunt, linguam (macerata in frigida*

frigida ac oreretenta (humectant, sitim mitigant.

Pruneola (seu prunella dicta) refrigerant magis quam reliqua, humectantque, sed citra alui commotionem, adeoque esus aptiora censentur, gratumque refrigerium in febris exhibent.

P R Æ P A R.

1. *Condita pruna (cerea) cum mell. p.ij. & Vini p.j.*

2. *Pulpa prunor. Ex magnis acidis & vinosis fit, coctis scil. perque setaceum traiectis & cum saccharo, circiter inspissatis.*

3. *Electuarium Diaprunis simp. Eodem modo paratur, ex pulpa & saccharo.*

4. *Diaprunum compositum. Ictenium Diadamascenon. Vide Dispensat.*

5. *Diaprunum non laxativum. V.D. Norib.*

CCLVII. *Parmica.*

Parmica, Matth. i. Fuchf. Lon. Cast. Lob. folio Taraxaconis, Lob. Pratenfis, Cam. Germ. Draco sylvestris saparmica, Dod. Tanacetum album seu acutum. Trag. (& millefolium 3.) Tab. Pyrethrum, Brunf. ico, aliis Pseudopyrethrum, Dracunculus pratensis ierrato folio, C.B. 2.

Crescit in pratis, vt & aruis etiam incultis, aliisque locis saxosis. Floret Maio, Iunio ac Iulio.

O F F I C I N. N A T.

Radix & Folia.

Vires. Calf. & sicc. sternuatoria sunt (ob acrimoniam,) sed rarioris usus.

CCLXVIII. *Pulegium.*

Γαλήνη, βαλήνη, { Latifolium { *scæmina. Hoc vsitatus.*
Pulegium { Angustifolium { *mas. Hoc subiungitur.*
Ceruinum, cui subiungitur Creticum & Massilioticum, quæ minus usualia.

Insignitur pulegium, Brunf, Trag. Matth. Fuchf. Cord. Dod. Lon. Cast. Cam. Pulegium Regium, Lob. Pulegiū, latifolium, C.B. i. Germ. Poley Flachkraut, (quia fumus eius pulices fugare creditur.)

Crescit locis cultis & incultis, humidis ac campestribus. Floret Iulio & Augusto.

O F F I C I N. N A T.

Folia, quæ eligenda caulibus ad rubedinem inclinantibus.

Vires. Calfac. & sicc. 3. (saporis subacris & subamari) partium tenuium, attenu. incid. aper. resolu. Vsus præcip. in mensibus ciendis, fluore albo, sætu cii-

ciendo, confert Epaticis ac pulmoniacis: nauseam ac tormina ventris discutit, calculum ac urinam pellit, Ictero ac Hydropi medetur. Extrinsecus, prodest capiti somnum arcet, vertiginem discutit, doloribus arthriticis convenit, dentes abstergit, pruritum cutis curat, &c.

P R Æ P A R.

1. *Conseru. è summit.*

2. *▽ stillat. Ex herba.*

3. *▽ bis destillata. Ex herba.*

4. *Ol. stillatitium.*

Pulmonaria arborea.

Musculus pulmonaria, Lob. C. B. 7. pulmona

pulmonaria, *Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lon. Tab. prima, Cast. Germ. Lungenkraut.*

Adnascitur arboribus præsertim, v.g. Quercui & aliis: tum & petris; sed hic candidior est. Vide Lichen Petreus.

Vires. Refrig. & sicc. moderatè (aliis calefacit.) *Vsus* præcip. in affectibus pulmonum scilicet erosione, tussi, asthmate, in profluvio alui, ac Vteri. Extrinsecus in vulnere sanguine compescendo. Vide & Lichenem cum quo, ut figura ita & viribus ferè convenit.

CCLIXIX. Pulmonaria.

Lungenkraut, { Latifolia.

Pulmonaria { Angustifolia { vulgaris, Schmalblatterich *Lungenkraut.*
{ Plinij, Schmalblatterich *Hirschmangolt.*

Crescunt in dumeris opacis ac umbrosis. Florent Aprili.

Eligitur præ cæteris latifolia. Hæc insignitur symphytum maculosum seu Pulmonaria latifolia, C. B. 1. Pulmonaria altera, *Matth. Cast.* maculosa, *Lob. Cam. Tab.*

N. Foliis variat, quæ aliquando albis punctis notantur, aliquando carent: Floribus est communiter caruleo rubentibus, rarius albis. Sunt qui in marem & fæminam distinguunt.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refr. & sicc. consolidant, conglutinant (al calf.) *Vsus* præcipuus in affectibus pulmonum phthisi, expuitione sanguinis. Extrinsecus in vulneribus.

CCLXX. Pyrethrum.

Περσικον, Pyrethrum flore bellidis, C. B. 1. pyrethrum, *Brunf. Trag. Fuchf. Dod. 2. Matth. Cam. Tab. maius, Lon. verum, Cast. officin. Lob. Germ. Bertram, Zahnwurrtz, Speichelwurrtz, Geiservurrtz.*

Crescit in Italia, aliisque locis calidis ac orientalibus, ut & in Helnetia, apud nos non nisi in hortis colitur.

N. Pyrethrum Germanicum seu pseudopyrethrum V. Ptarmica.

OFFICIN. NAT.

Radix Sola.

Vires. Calf. & sicc. ultra 3. atten. incid. sudorem validè monet. *Vsus* præcip. sed rari in viscoso phlegmate corporis, ac præcipue pulmonum, quod attenuat atque per expuitionem ac urinam expellit, ad Venerem stimulat, quartanam curat, Extrinsecus in Odontalgia frigida, in Bêtracho apophlegmatizans insignis est: inuat & in Hemicrania: Paralyfin ac stupida membra sanat, rigores febris præcænet (inunctum dorso ac plantis pedum.)

CCLXXI. Pyrola.

Pyrola rotundifolia maior, C. B. 1. Pyrola, *Matth. Brunf. Dod. Lob. Cast. Tab. Limonium, Fuchf. sylvestre, Trag. Limonium & Pyrola, Lon. German. Winterarün, Waldmangolt.*

Crescit in sylvis humidis. Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Refrig. & sicc. astring. consolidant, vulneraria sunt. *Vsu* interno & externo

externo celeberrima.

CCLXXII. *Pyrus.*

Am^Q, & Am^Q, Birnbaum.

1. *Pyræ* { *Domestica* } 2. { *Dulcia.*
 { *Sylvestria.* } { *Acida.*
 { *Acerba.*

Vires. Refrig. astring. *Diaperla* sunt. Cocta vero melioris nota consentur, & ut schola *Salernitana* habet.

Cruda grauant Stomachum, releuant pyra cocta grauatum.

Differre tamen viribus, prout sapore differunt, non difficile est colligere, dulcia laxant, acida & acerba adstringunt, &c.

N. Arefacta cocta & comesta commendantur in fluxu alui.

P R A E P A R.

Ex pyris vulgaribus fit, 1. *Pyraceum* vinum, Germ. *Birnwein*, quod rusticis nostratibus loco vini inferuit, paraturque ad modum quo Vinum.

2. Ex eodem pyraceo fit acetum rusticis nostratibus vulgarissimum.

3. Condita pyra muscatellina cum decocto proprio.

Q.

CCLXXIII. *Quercus.*

Am^Q, *Quercus* C. B. 4. *Quercus* *Math.* *Fuch.* *Dod.* *Trag.* *Lon.* *Tak.* vulgaris, *Lob.* *Cord.* Germ. *Eichbaum.*

O F F I C I N. N A T.

Folia, Glandes, earumque Capula, Cortex, Viscum, Fungus.

Vires. Folia, Grandes, Cortex, Capula glandum refrigerant, sicc. astring. Vfus in fluxu alui, uteri, seminis. Extrinsecus in Odontalgia, profluvio uterino, &c.

Viscum, (quod præ reliquis visci ge-

neribus probatur,) calfac. moderatè, sed paulatim emollit, discut. Vfus præcip. ac specificè in Epilepsia. Extrinsecus maturat tubercula, parotides, cæterisque abscessus (cum Resina ac cera mixtum.)

Fungus *quercinus*, hemorrhagiam narium ac sanguinem vulnerum, non minus ac *betulinus* cohibere dicitur.

P R A E P A R.

1. ∇ stillat. Ex foliis quercuum novellar. Majo collectis.

2. *Gluten.* i.e. Extractum viscosum è visco (*Bogellein*) quod ingreditur nonnulla Emplastra.

CCLXXIV. *Quinquefolium.*

Πεντάφυλλον, *Quinquefolium* maius repens flore luteo, C. B. 1. *pentaphylon* minus, *Brunf.* vulgare, *Trag.* *Dioscor.* *Tab.* luteum maius, *Dod.* 1. & 2. *Lon.* repens, *Cam.* *Quinquefolium*, *Matth.* *Lob.* Germ. *Fünffingerkraut*, *Fünffblat.*

Crescit passim locis arenosis, campestribus. Floret Majo & Iunio.

O F F I C I N. N A T.

Herba colligenda cum floribus. Radix colligenda vere.

Vires. Temperatum est caliditate & frigiditate, sicc. 3. astring. vulneraria est. Vfus præcip. in affectibus à catarrhis oriundis, paralyti, phibisi, arthritide, in uteri humiditate corrigenda, in sanguinis expuitione ac ruffi, in Ictero, in obstructione Epatis & Lienis, obtundit acrimoniam bilis adusta, sistit fluxus alui, hemorrhoidum, hemorrhagiam narium. Prodest in calculo ac erosione Renum, in Hernia, in febris. Extrinsecus prodest in oculis inflammatis (succus instillatus) in oris putredine, la-

B B b b x i s a t e

xitate dentium, abstergit ulcera etiam maligna.

tam ad hemorrhagiam narium sedandam commendant.

N.1. In febribus tertianis exhibens folia trina, in quaterna quaterna, &c.

PRÆPAR.

▽. stillat. Fit ex herba collecta

N.2. Sunt qui radicem pugno detenen-

Majo.

R.

CCLXXV. *Raphanus.*

Raphanus { maior orbicularis vel Raph. rotundus domesticus.
Huius loci.
niger. Idem hic cum priori.
minor oblongus. Est esculentus & minus officinalis.
Rusticanus seu marinus. Vide in sequenti.
aquaticus. Non est in usu.
sylvestris. V. *Armoracia.*

Paparis, papayr, Arab. Fugell. Raphanus magnus, Lob. Raphanus sativus, Fuchf. Cast. Raphanus rotundus, Lon. Tab. orbicularis, Tab. & Ger. Radicula sativa, Dod. Raphanus maior orbicularis vel rotundus, C. B. 1. Rettich.

Crescit in hortis, gaudet solo humido.

OFFICINALIA NATIVA

Semen. Radix. sed raro, quia culinaris potissimum est.

Vires. *Calif. 3. sicc. 2. aper. absterg. atren. Usus. precip. in calculo atterendo ac expellendo, urina ac mensibus ciendis, in obstructionibus Epatis ac Lienis, attenuat mucilaginem viscosam in ventriculo, confertque ad distributionem chyli, chymique. Extrinsicus apponitur plantis pedum in febribus, sicuti & Cervici in capitis dolore febrium malignarum comise.*

N. De usu interno notandum quod nauseam & ructus ciere soleat.

PRÆPARATA.

▽ stillat. Ex radicibus.

CCLXXVI. *Raphanus marinus seu Rusticanus.*

Raphanus Rusticanus, C. B. 5. sylvestris Dioscor. *Fuchf. Armoracia aut Raphan. maior, Brunf. Raphan. maior, Trag. marinus, Tab. vulgaris & rusticanus, Matth. Radicula magna, Dod. rustican. Lob. Cam Germ. Marrettich.*

Gaudet solo humido.

OFFICIN. NAT.

Radix, effodienda Martio.

Vires. *Calif. & sicc. ad gr. 3. incidit, atren. easdemque cum priori qualitates habet. sed fortiores: tartaream mucilaginem incidit, ciere vomitum, (si succus vel infusio in aceto cum melle tepide assumatur & aqua superbibatur.) specificè scorbuticis prodest. Calculum pellit, menses ciere. Extrinsicus prodest in febribus (tertiana & quartana) succus cum o. piperino dorso inunctus, pulsibus cum o. impositus, vel umbilico applicatus, donec sentiat pruritus.*

PRÆPARATA.

▽ stillat. è radicib.

CCLXXVII.

CCLXXVII. *Rapum* &*Rapa.*

Γογγυλη, *Rüben*, Arab. Seliom, Selgem, Selgrem, *Rapum* Dioscor.

longum, foemina.

Est rotundum, mas.

(sylvestre, quod minus vsitatum.

N. Nomen *Rapi* omnibus vsuale est.

Vires. *Calfac.* 2. *sicc.* 1. *Seminis* vsus *pracip.* in *antidotis*, *Venerem* ciet, *morbillos* expellit, *Dosis* ʒß. *Radix* magis *culinaria* est, sed *ventriculo* flatulenta, *Succus* & *Decoctum*, leniunt *acrimoniam* bilis ac *asperitatem* *bronchiorum*, *asperaque* *arteria*, &c. *Extrinfecus* imponitur *Pernioni* (cocta) adhibeturque in *gargaris*. Vide & *Napum*.

CCLXXVIII. *Rhodia*,*Radix.*

Ῥοδια πικρα. *Radix Rosea*, *Trag.* *Matthiol.* *Dod.* *Cord.* *Cam.* *Fuchf.* *Lon.* & *Tab.* *Germ.* *Rosenwurrtz.*

Crescit sponte in *Alpibus*, solo gaudet *ymbroso*.

OFFICIN. NAT.

Radix sola.

Vires. *Natura* censetur *temperata* (*Fuchf. calf. & sicc.* 2.) *cephalica* est. *Vsus* *pracip.* in *dolore capitis* (cum ∇ *ros. contusa*.)

CCLXXIX. *Rhodium Lignum.*

Aspalathus, *Rodiser Holtz.*

Aspalathorum 4. quidem *modernis* innotuerunt genera. 1. *Cortice cinereo*, *Ligno purpureo* seu *Dioscoridis*. 2. *Asp. colore buxi*. 3. *Aspalat. albicans torulo citreo*. 4. *Aspal. rubens*. *Vtrum officinis nostratibus* non nisi se-

cundum & *tertium* suppetunt. Prius est *Aspalati* 1. genus. *Lob.* Posterius dicitur *Rhodium Lignum*, quibusdam *Agallochum*, oleaque *Aethiopica*, *Cord.* in *D.* *Agallochum* forte, i. e. *xyloaloe solida*, quibusdam *Lignum Rhodium*, *Rhodium* & *aspalathum*, aliis *oleastrum lignum*, *Cord. hist.* *Aspalathus roseus* seu 3. *Lob.*

Vires. *Dioscoridi* & *Galeno* *calfac.* & *sicc.* & *astringit*, unde *commendabile* ad *ulcera oris*, ad *nomas genitalium* & *sordida ulcera*, ad *alui fluxus*. *Verum* enim verò an *hac nostrati* conueniant, cuius licet *experiri*, *Vix* enim *modernis* *practicis* in *usu* est, nisi quod *interdum* ad *renum calculos decoctis* incoquatur.

PRÆPAR.

Oleum still. quod communiter pro *oleo rosarum* habetur.

CCLXXX. *Rhaponticum*

vulgare,

Rhaponticum seu Centaurium maius	{	folio in lacinias p'u-
		res diuiso, C. B. 1.
		folio non dissecto,
		C. B. 2.
		Alpinum luteum,
		C. B. 3.

Ex his vsualius est primum, quod insignitur *Rhapontica*, quæ hodie *centauria maior*, *Trag.* *Cord.* *Centaurium maius*, *Lon.* *Lob.* *magnum*, *Matthiol.* *Dod.* *Cast.* *Cent. maius* seu *Rhaponticum pharmaceuticum*, *Cord.* in *D.* *Cam.* *Tab.* *Germ.* *groß tausent gulden Kraut*, *Rhapontic.*

Crescit in *alpibus* & *vallibus* *pin-*
guibus apricis, *Apulix*, *Sabaudix*.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. *Natura* est *temperata sicc.* *astring.* *vulneraria* est *saporis* *subdul-*

cis ac subracis. Vſus in fluxibus alui, Dyſenteria: ciet menſes, profluuiumque è contrario ſiſtit: prodeſt in hernia ſanguine coagulato, expuitione ſanguinis in febribus ſtomachicis: Epar aperit ac roborat, ſummopere laudatus à nullis in obſtructione venarum meſeraicarum, & in morbis hinc ortis.

CCLXXXI. *Rhaponticum verum.*

Rheum, Rha. Dioſcoridis, C. B. 3, Ponticum Rha antiquorum, Lob. Rhapont. verum officin. Germ. Rhapontic.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ ad nos ex Aſia aduehitur.

Eligenda quæ non cariola, rubeſcens, in ore lentorem referens,

Vires. Calſac. & ſicc. 2. ſeu mixtura temperata eſt, terreſtris & ignea, ſaporis ſubacris. Stomachica, ſplenica acheptica. Vſus præcipui in doloribus arthriticis, febribus, venenatorum animalium Ictibus, &c.

PRÆPARATA.

Extract. fl. c.

Vires. Summum eſt Cardiacum. Quercet. Phar. Reſt.

CCLXXXII. *Rhus.*

Rhus folio vlmī, C. B. 1. Rhus, Matth. Tab. Rhus coriaria, Dod. Rhus obſonior, Lob. Cam. Sumach. Arabum. Lon. Caſt. Rhu, Rhoe, Rhus culinarium. Germ. Ferberbaum, Schlingbaum.

Gaudet ſolo petroſo. Floret Iulio. Fructus fert; autumnō.

OFFICIN. NAT.

Semen, Folia.

Vires. Reſtig. 3. ſicc. 2. aſtring. Vſus præcip. in fluxu alui, uteri ſeu menſum: hamorrhoides compeſcit, bilem obrundit. Extrinſecus reſiſtit putrefactioni ac Gangrena in paronychio.

N. Gummi dentibus inditum odontalgiam ſedat.

PRÆPARATA.

Succus Sumach, i. e. Pulpa ſine offeis feminibus.

N. Aly R. Decoct. Rhois ex ramuſculis & Tamarind. conquaſſatis macerant ac coquunt ad conſiſtentiam. Tabern. in Herbario.

CCLXXXIII. *Ribes.*

Groſſularia multiplici acino ſeu non ſpinola, hortendiſ rubra ſeu ribes officinar. C. B. 5. Ribes hortendiſ, Trag. vulgaris domeſtica, Matth. Caſt. Ribes. Fuchſ. Lon. Tab. Vua Vrſi, Ribetiſum fructu rubro, Dod. Ribes Arabum. Lob. Germ. Iohannisbeerlein.

Rubra, Huius bacca officinales.

Nigra, Vſualis non eſt.

Alba. Et huius bacca in officinas inferuntur, gratioresque ſunt guſtu iſiſ rubris.

Coluntur in hortis, matureſcunt circiter Feſtum S. Ioannis.

Vires. Reſtig. & ſicc. 2. partium tenuium: ſubſtring. ventriculo conueniunt. Vſus præcip. in profluuiis alui, dyſent. choleram ſedant, in febribus bilioſis proſunt, putredini reſiſtunt, ſitim reſtringunt.

N. Alba ut minus acida, ita minus frigida cenſende ſunt.

PRÆPAR.

1. Condita bacca, cum decocto proprio & ſacch.

2. Rob. de Ribib. ſimpl. Eſt ſuccus inſpiſſatus

in spissatus ad mellis consistentiam

3. *Rob. de Ribib. compof.* Est fyrupus ex succo & faccharo $\frac{1}{2}$.

4. *Vinum*, i.e. succus liquidus.

CCLXXXIV. *Rosa.*

{ Domestica $\rho\acute{o}\delta\omicron\nu$, *Rosen*, huius loci.
{ Sylvestris, $\rho\acute{o}\delta\omicron\nu\ \rho\acute{o}\delta\omicron\nu\ \rho\acute{o}\delta\omicron\nu\ \rho\acute{o}\delta\omicron\nu\ \rho\acute{o}\delta\omicron\nu$. Vide
{ *Cynosbator*.

Rolarum varia sunt genera, coloribus ac foliorum multiplicitate differentia. Sic est *Rosa* (*Millesia*) rubra, rubrapallidior, saturatius rubens, purpurea (hæc colorem carnis referens *Zeberina* dicitur.) *Verficolor*, alba, moscata seu *Damascena*, spinis carens, subviridis. &c. In officinis autem tria precipuè genera vsualia sunt. *Rosæ* scil. rubræ (quæ præstantissimæ) pallidæ (quæ rubris succedunt) & albæ, quæ infimæ fortis. Omnibus tamen laudem præripiunt *Rosæ* moscatæ s. *Damascenæ*.

Florent Maio & Iunio. Coluntur vbiuis in hortis.

OFFICIN. NAT.

Flores (rubri & pallidi asservantur exiccati,) *Anthera*, i.e. capillamenta.

Vires. Rosa ut variant generibus: ita & qualitatibus. Sunt enim qui non sine causa rosas partim calidas & acres, partim frigidas volunt, caloremque residere in superficie à frigore scil. eo expulsam, qui in marcescentibus euanescat, in genere tamen omnes refrigerant. i. ac astringunt. spiritus vitales animalesque recreant, ac roborant. Pallidæ seu incarnatæ laxant. Rubræ ac albæ astringunt (alba lenius, rubra fortius.) Vfus præcip. in fluxionibus, febribus, siti, appetitu prostrato, &c. Extrinsecus in vomitu, cephalalgia, vigiliis, dolore antri-

um, gingivar, sedis, recti intestini (cum Vino cocta & imposita:) in ulceribus & inflammationibus oris, faucium, oculorum.

Flosculi lutei capillamentis in medio florum adhærescentes, (Anthera offic.) exiccati immiscentur dentifriciis ad gingivarum astrictionem, fluxionumque exiccationem.

PRÆPARATA.

1. *Acetum*, è flor. rubris.
2. *Stillat.* è florib: pallidis (præferrunt ad oculos. morbos.)
3. è florib. rubris.
4. albis.
5. *Balsamus*. Ex ol. stillat. & cera depurata.

6. *Conserua*, 1. ros. rub. recens.

7. 2. antiqua.

8. 3. *Ros. Rub.* (D ta.

N. Præstat ex tempore (D tam hanc conseruam conficere, affusione scil. guttularum aliquot, quippe quæ ad tempus asservatur, & amittit colorem & saporem mutat.

9. 4. *Conseru. ros. pallid.*

10. *Elect.* 1. *Rosatam Mesua.* V. D.

11. 2. de succ. *Ros. solidū* } Aug.

12. 3. liquidū }

13. *Morselli*, i.e. faccharum rosat. Ex succo & facchar.

N. Morsuli de spec. è succo rosar. sunt idem quod Elect. solidius.

14. *Rosula Manus Christi*, officinis dictæ, simplices & perlatae.

15. *Ol. stillat.* ascend. cum spiritu.

16. *Ol. infusum* 1. vulgare.

17. 2. *omphacin.*

18. 3. *Compof.* Aug.

19. *Pilula Rosata*, i.e. de aloë rosata.

20. *Spec. Elect* de succ. rosar. Aug.

21. *Aromatic. ros.* Aug.

22. *Diarrhod.* Abb. Aug.

BBbb 3 23. *Rosat.*

23. *Rosat. nouell.* Aug.

24. *Spiritus*, è rosis rubris fermentatis.

25. *Syrupi*, 1. *rosatus simplex*, seu *laxatiuus simplex*. Ex infus. 3. ros. rub.

26. 2. *rosat. solutiuus Muscharum*, (è Damascen.) Aug.

27. 3. *Laxatiu. compos.* seu *elleboratus*. Aug.

28. 4. *sine elleboro*. Aug.

29. 5. *de rosis siccis*.

30. 6. *Rosatus regius seu Iulep. Rosatum*.

31. *Mel Rosatum Mesue*.

32. *simplex*.

33. *Citratum*.

34. *Laxatiuum*: fere idem est cum syr. simplici.

35. *Tinctura* Fit ex ros. rub. sicc. ʒj. infusis in ∇ rosar. (vel fontanæ) tepefact. lbiiij additis spir. ʒ vel ʒris ʒij. facta digestionem F. Expressio & si opus sit filtratio.

39. *Trochise. Diarrhod.* Aug.

37. *Vnguentum rosatum*.

CCLXXXV. *Ros solis.*

Rorella, Saluara. *Sonnendauv*, *Son-thauv*.

Est { folio rotundo.
folio oblongo.

Ex his visualis quidem, veruntamen non nisi rarissime maior, qui inscribitur Ros solis, *Dod. Lon. Cast.* Rorida siue Ros solis maior, *Lob.* Rorella minor. 1. *Tab.*

Crescit locis, capestribus & palustribus, inter muscum albicantem & subrubentem. Floret Maio.

OFFICIN. NAT.

Herba colligenda quando ☉ in ♋ (medio ♋is) crescente, die sereno ac

calido: asseruaturque sine lotionem. Item succus foliis instar sudoris adhærescens.

Vires. *Dodonæus* facit calid. & sicc. 4. unde internum eius usum vetat: verum enimvero, sunt qui e contra magni faciant, maximopereque commendent ad Phthisin a (quia calidissimo etiam tempore sudat) ad pestem, ad vulnera (in potu, &c.) ad Epilepsiam arcendam & precauendam. Extrinsecus promouere dicitur partum in puerperio (abdomini imposita) odontalgiam sedare (in ore deserta) affectum mitigare mania- (cum collo appensa) curare quartanam (pulsibus 6. horis applicata ac dein hor. 6.) aqua imposita: vicissim pulsibus applicata, idque multoties (10. & 12.ies.)

a *Forest. lib.* 16. § 8.

N. Noui qui infusionem Rorella in aqua vita factam, pro cordiali usitato habet.

Succus dicitur humiditas, quæ instar sudoris diebus quoque calidissimis, imò in maiori copia, quàm aliàs herbæ adhæret, atque concutiendo in patellam suppositam colligitur

Vires. Confortat Cor, Epur ac ventriculum: capitis dolorem à causa calida sedat, pestem precauet ac curat. Extrinsecus adhibetur in affectibus oculorum, dolore, scil. inflammatione, &c.

PRÆPARAT.

∇ stillat. ex tota herba.

CCLXXXVI. *Rosmarinus.*

Ῥοσµαρίνῃς, ῤεσµαρίνῃς, Rosmarinus, *Brunf. Trag. Fragos. Lon.* Rosmarinum coronarium, *Matth. Lob.* Rosmarinus coronarius, *Cam.* Rosm. coronaria, *Dod.* Hortensis angustiore folio. C. B. I. Libanoris coronaria, *Cord. in D. Germ.* Rosmarin.

Crescit

Crescit in locis apricis, Floret Maio, Iunio.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores (specialiter Anthos offic.) Semen.

Vires. Cal. & sicca 2. lenta incidunt, saporis sunt mixti acris, amari: subastring. cephalica sunt è præcipuis, ut & uterina. Usus præcip. in affectibus Capitis ac Nervorum, Apoplexia, Epilepsia, Paralysis, Vertigine, Caro, &c. Visum acuiunt, fatorem anhelitus emendant. Epatis, Lienis ac uteri obstructiones resolunt, Ictero ac fluori albo mulierum medentur, corque confortant. Extrinsecus profunt, in catarrhis (suffitu) & exinde natis affectibus. In utero corroborando, &c.

N. Flores asseruari possunt per biennium.

PRÆPARATA.

1. ▽. E planta integra.
2. Ol. stillat. Vna cum ▽ exstill.
3. Balsamus. Fit ex oleo l.c.
4. Conserua. Ex floribus Anthos.
5. Species. Dianthos.

CCLXXVII. Rubia.

Ερυθρόδαρον, Rubia tinctor. sativa. C.B. 1 Rubia, Cord. in D. Dod. Lob. Clus. Rub. sativa, Brunsf. Matth. Fuchs. Lon. Cast. Germ. Roche, Ferberæthe, Ferberwurcz.

Adfertur ad nos ex Silesia, ubi copiosè feri colique solet. Gaudet solo pingui, floret, semenque fert æstate.

OFFICIN. NAT.

Radix sola, collecta Maio ac Iunio.

Vires. Calf. 2. sicca. 3. (al. refrig.) aperit. disc. dissol. subastr. Vulneraria est. Usus præcip. in obstruct. Epatis. Lienis & in primis uteri. Proin in Ictero, Hydro-

pe, Urina obstructa, sanguine coagulato. Extrinsecus in obstructione mensium (in pessis,) &c.

N. Adhibetur & à Tinctoriis ad coloris rubri præparationem.

CCLXXXVIII. Rubus.

Rubus offi- § vulgaris. Huius loci, cinalis est idæus. Locis sequentis.

Insignitur: Rubus vulgaris seu rubus fructu nigro, C.B. 1. Bât & græc. Sentic Latin. Rubus, Dioscor. & Plinio. Rubus, Brunsf. Matth. Fuchs. Dod. Cord. in D. Lon. Lob. Cast. Rubus grandis & secundus, Trag. Rub. arvensis, Tab. Germ. Brombeer, Bromen.

Crescit inter dumeta. Florescit initio æstatis, maturescit in fine eiusdem.

OFFICIN. NAT.

Folia. Fructus (Mora rubi, mora bati, bati, Bâtina.) Radix, sed raro.

Vires. Folia ac Fructus immaturus refriger. sicca. astring. potenter. Fructus verò maturus caliditate est temperatus ac subastringens. Usus præcip. in quibuscumque profluviiis, vomitu, fluxu alui, uteri, navium. Extrinsecus in aphthis, aliisque oris affectibus abstergendis, in vulneribus astringendis, capillos nigrat, scabiem curat.

Radix lithontripica censetur, sed rari usus est.

PRÆPAR.

1. Rob. Diamoron. simpl. Ex succo fructuum immaturor.

2. Diamoron. compos. V. Disp.

3. Diamoron Nicolai visitatum, Vid. Disp.

CCLXXXIX. Rubus idæus.

Rubus

Rubus idæus { spinosus. *Hic vsualis.*
læuis.
fructu albo.

CCXCI. Ruta.

Inscribitur rubus idæus spinosus, C.B. 3. B&T. *idæa*, rubus idæus, *Trag. Matth. Dod. Lob. Lon. Cast. Tab.* Rubus idæus exilibus spinis, *Cord. in D.* Rubus id. vulgaris, *Clusf. Germanicè Hindtbeer.*

Crescit ittdem inter dumeta. Floret initio æstatis, maturefcit Augusto, &c.

OFFICIN. NAT.

Fructus.

Vires. *Easdem vires obtinent, quas precedentia mera, cordiales tamen praiis peculiariter censentur.*

PRÆPARATA.

1. ▽ ex baccis.
2. Syrup. Ex succo fructus & saccharo.
3. Acetum. Ex fructibus infusis.

CCXC. Ruscus.

Ὠζουπόλην, Ruscus, *Matth. Trag. Cord. in D. Lob. Cast. Cam. Tab.* Ruscum, *Dod. Myrthacantha, Lob (icon.)* aliis Bruscus & Bruscum. German. *Mauszdorn.*

Crescit copiosè, in Italia, vt & quibusdam locis Germaniæ. Locis gaudet asperis. Primo vere turiones promit, autumnno semen.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. *Calf. & sicc. temperatè, saporis est austeri & subamari, incid. atten. aperit. Vfus precip. in obstructione Epatis, urina, (stranguria.) Menstruum, &c.*

N. Recensetur inter 5. Radices aperientes

Πιζαυορ, Ruta hortensis, Rauten, VVeinraut.

Ruta est C.B.	{	Hortensis	{ 1. latifolia. 2. tenuifolia.	{ <i>huius loci.</i>
		Sylvestris	{ 3. major. 4. minor. 5. flore magno albo.	

Ornat officinas hortensis vtraque è quibus vulgatioꝝ quidem est latifolia, eaqꝝ maior, cælique coloris: præstantior verò tenuifolia minor & nigricantior.

Latifolia inscribitur Ruta, *Brunf. Matth. Cast. Domestica, Trag. Hortensis, Fuchf. Lob. Cam. sativa, Cord. in D.* graecolens hortensis, *Dod. latifolia, Tab. Ruta hortensis latifolia, C. B. 1.*

N. *Hæc diligenti cultura arborescere solet, cuius exemplum nobis præbuit huius Cimitatis ciuis è primariis Phil. leutvveim.*

Angustifolia insignitur Ruta hortensis altera, C.B. 2. Ruta hort. minor, *Trag. Ruta sativa tenuifolia, Cord. in D.* Ruta tenuifol. *Tab.*

Gaudet solo arido ac calido: Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Herba ac Summitates cum seminibus.

Vires. *Calf. & sicc. 3. incid. atten. diger. discut. est alexipharmaca, cephalica ac nervina. Vfus precip. in variis morbis, peste aliisque affectibus malignis præservandis ac curandis, veneno arcendo, visu acuendo, lascivia reprimenda, pluritudine curanda, imbecillitate ventriculi corrigenda, colica discutienda, morsu canis rabidi debellando, &c.*

Extrinfecus

Extrinfecus in ictibus serpentum, carbunculis, in febrium paroxysmis arcendis (inunct. dors.) Cephalalgia ex craspula, hemicrania, in febribus malignis (pro Epithemate pulsum cum ☿ & +) in dolore capitis febrium ardentium & malignarum. (similiter pedum plantis adhibita.

N. Nimiis usus internus officit gravidis

P R A E P A R.

1. ▽ still. Ex plantacum cauliculis Maio collectis.
2. Oleum stillat. Cum ▽.
3. Oleum infusum. Ex infusa herba in oleo communi.
4. Sal. Ex herba incinerata.
5. Acetum. Ex infusione.
6. Balsamus. Ex ol. stillat.

C C X C I I. *Ruta muraria.*

Ruta muraria, C.B. Dod. Ger. Capillus ♀ is, Brunf. Trag. Adiantum candid. Cord. in D. & hist. Ad. album, Lon. Cam. Tab. Adian. nigrum, Casalp. Gesn. Saxifraga seu Empetron, Fuchsf. Paronychia, Matth. Cast. Salvia vitæ, Lob Germ. Maurrauten, Steinrauten, Ben-shaar.

Nascitur in parietibus ac muris iuxta aquas, locis videl. irriguis & non apricis. Viuax est toto anno, ætate tamen amplius viret, flore & semide caret.

O F F I C I N. N A T.

Folia seu herba cum caule.

Vires, Calid. & frigid. temperata est, fœcat, digerit, discutit. ☿ eam & viscosum mucilaginem in Pulmonibus, &c. incidit. Vsu præcip. in tussî, asthmate, pleuresi, tætero, obstruct. splenis. Valet ad Renum & vesicæ dolores, urinam clemeter ciet, calculosque expellit. Peculia-

riter præstare eam perhibet Matth. ad Enterocelas puerorum (& 40. pulvis exhibitus, & sim.)

Extrinfecus capillos crescere facit, ulceraque manantia capitis abstergit, strumas & abscessus digerit.

N. 1. Vbi Adiantum verum & Trichomanes desunt, aut vetusta sunt, hac uti licet. Hac sumenda quoque ubi Medici recentiores Adiantum præscribunt à capillo ♀ diuersum, C.B.

N. 2. Matthiolus hanc Paronychiam Dioscoridis esse disputat, contra Dodonaum, qui id negat.

S.

C C X C I I I. *Sabina.*

B. dydus, Sauina, Sevrubaum, Slebenbau. Sabina } Tamarisci. Hac vsualis. folio } Cupressi. 1. & 2.

Dicitur Sabina, Brunf. Trag. Fuchsf. Dod. Lob. vulgaris, Cam. Sabin. Myrtifolio, Cord. in D. Sauina, Lon. Sauina mas, Tab. Sabina folio Tamarisci Dioscorid. C.B. 1.

Colitur in hortis: Viret perpetuo.

O F F I C I N. N A T.

Folia.

Vires. Calf. & ficc. 3. partium tenuium, incid. atten. discut. Vsu præcip. in mensibus fortiter ciendis, fœtu eiiciendo, vrina pellenda, asthmate medendo. Extrinfecus in affectibus vterinis, ulceribus serpentibus arcendis, scabie præcipue capitis infantum exiccanda ac curanda (cum cremor lactis.) in maculis faciei abstergendis.

P R A E P A R A T A.

▽. Ex foliis.

C C X C I V. *Salix.*

Iris, VVeiden, VVeidenbaum.

Salix multorum est generum, quæ sine discrimine in usum medicum accersi poterunt.

Crescunt in locis vdis: Florent Majo & Aprili.

OFFICIN. NAT.

Folia, Iuli, Cortex & Viscum.

Vires. Folia refriger. & sicc. subastring. citra morsum. *Usus* præcip. in libidine arcenda. (Decoctum potum.) *Extrinsecus* in lotionibus pedum pro vigiliis ac æstu febricantium arcendo, in

hemorrhagia vulnerum, narium, & sim. abstringenda. In aëre refrigerando (strata in paupimentis.)

Iuli sistunt hemorrhagiam quamcunque (impositi.)

Cortex similem facultatem habet. Insuper verrucas & clauos pedum corticum cinere (cum imposito) extrahi tradit Dioscor.

Viscum commendatur præ aliis ad partum facilitandum.

PRÆPARATA.

▽ stillat. è foliis

CCXCV. Salvia.

Ελαίσφακον, Arab. Æliffacos, Salben.

Est { Maior, Breit salben.
Minor acuta, nobilis, Spitz salben, Creutz salben, } sunt vsuales, sed minor
Edel salben. } præstantior est.

{ Sylvestris. Hæc officinis ignota, aliàs conuenit viribus cum Hormino.

Major inscribitur, *Salvia latifolia, Trag. Lon. Clus. Cam. Salvia major, Matth. Fuchf. Dod. Cast. Tab. Salvia, Cord. in D. major scabrior. Dioscor. Lob. C. B. 1.*

cæruleo, rarius albo.

Hæc variat in foliis & floribus: foliis est viridibus, iisque crispis & non crispis, purpurascens, versicoloribus: sic vel totis vel partim albidis, floribus communiter cæruleis, rarius candidis.

Gaudet solo sæcundato argilla, &c. Floret Iulio ac Augusto. Transplantatur Martio, cum ruta intermixta, quæ Serpentes & Bufones saluæ viciniam amantes arceantur.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores.

Vires. Calf. 1. succ. 2. subastring. absterg. Usus præcip. & diureticus: menses ob crassitiem remoratos ciet; nimios emendat. Prodest in paralyti, verrigine, tremore, catarrhis. *Extrinsecus* aphthas oris abstergit (in gargaris.) &c.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex herba cum floribus.
2. Oleum stillat.
3. Sal. Ex herba incinerata.
4. Conserua. Ex floribus.

Minor vocatur. *Salvia minor aurita & non aurita, C. B. 2. Salvia nobilis, Brunf. angustifolia & minor, Trag. Salu. minor, Matth. Fuchf. Cord. in D. Lob. Tab. pinnata Pena. Salvia acuta, Lon. angustifol. Clus. Salu. tenuifolia auriculat. Cam.*

Variat foliis auritis vel pinnatis & non auritis: foliis aliquando Læuendulæ concoloribus, sed latioribus & grauioris odoris: rarius luteolis, flore

CCXCVI. Sambucus.

Ακτι, Sambucus, Holderbaum, Hol-
lunder.

⌋ *Vulgaris. Huius loci.*
⌋ *Humilis. Vide Ebulus.*

Insignitur, Sambucus faustu in
ymbella nigro, C. B. 1. Sambucus,
Brunf. Matth. Fuchf. Dod. Lon. Lob.
Tab. Sambucus vulgaris, Trag. Domes-
tica, Cast. Sambucus Campestris seu
vulgaris, Cam.

Gaudet locis opacis, sepibus, po-
meriis & asperis vallibus. Floret Ma-
jo, Iunio, Iulio. Baccæ maturescunt
Augusto.

OFFICIUM NAT.

Flores, Bacca, Liber, Spongia, Turio-
nes.

Vires. Sambucus integra calfacit &
siccatur, resoluunt, hydropicos iuuat.

Flores discutiunt insuper, emolliunt,
resoluunt, sudoriferi ac anodynii sunt.
Virus precip. intrinsecus in Erysipelate
precauendo & abigendo, quartana cu-
randa. Extrinsecus in colico dolore, in
Erysipelate, combusti, &c. (impositi.)

Baccæ sudorifera itidem sunt ac ale-
xipharmaca.

Liber (cortex interior) educit serosos
humores. Extrinsecus easdem vires ha-
bet, quas flores.

N. Ellgendi cortices radicis.

Turiones & Germmæ adhibentur in
acetariis, aliumque mouent & nonnun-
quam etiam vomitum, præcipue si sursum
decerpantur: idem facit & puluis.

Spongia (Auricula Indæ) oculorum
affectibus medetur (macerata in ∇ ap-
propriata & imposita).

N. 1. Sunt qui infusum spongia bibunt
ad hydropis curam.

N. 2. Sambucum, visci instar, in sali-
ce nascentem, pro peculiari commen-
dant antiépiléptico.

P R A E P A R.

I. E FLORIBVS.

1. ∇ stillat. Ex flor. l. a.
2. Spiritus. Fit rectificatione ∇ stil-
lat, vel ex floribus in dolio querno
fermentatis.

3. Vinum. & flor. in umbra exiccat.
℥j. circiter, infundantur musti men-
suris 8.

4. Oleum infusum. In ol. cydon.

5. Oleum stillat Cum ∇ extillat,
sed raro prostat.

N. Potest idem elici hoc modo. &
Flor. q. v. macera cum Vino Maluatico
vel Hispanico vitro bene occluso calo-
re solis per tempus (septim. 6.) hinc ex-
prime fortiter, ac moderatè calfacito: sic
supernatabit oleum. Blochvvirtz.

II. E BACCIS.

1. Rob. Sambuci. Ex pulpa baccar.
maturarum.

Virus est frequentissimum ad sudorem
ciendum. Prodest & peculiariter in af-
fectibus uterinis, assumptum. Extrin-
secus imponitur ad refrigerandum:
quin & plantis pedum in febribus inun-
gitur.

2. Tinctura ac Extractum. Fiunt ex
Rob. Sambuci (Quercetanus & baccas
umbra exiccata) beneficio V (qui
acidulus redditus sit cum liquore aci-
do aut ☉ iaut ☿ is.)

N. Dicitur Tinctura antequam V
fuerit separatus. Extractum si idem
V abstractus sit.

Vires. Suffocationi uterina succur-
rit. Dos: tincturae, cochlear ℥. Extra-
cti ℥j.

3. Spiritus. Fit è succo ex baccis ma-
turis expresso vel ex baccis ipsis sali-
tem contusis & fermentatis, l. a.

N. Sunt qui baccis exiccatis crasse-
qui contusis farina hordeac. 1. addunt,

CCcc 2 affusaque

affusaque ∇ feruente digerunt.

4. *Oleum.* Ex arillis baccar. post succi transcolationem in filtro relictis, videlicet hæ benè elotæ & in aëre exiccata, Vino albo irrigantur ac fortiter exprimuntur.

Vires. Est vomituum egregium.

Dosis ℥j. vel ℥j℥. in cereuisia tepida, &c.

N. Non est officinale.

His 5. addi potest *Tragea granorum Actes*, *Quercetani*: &c. succum baccar. maturar. expressar. q. v. adde farinam fecalinam, fac pastam & exinde panes exiguos, in furno ad duritiem biscotti coquendos. Hos puluerisa, puluerem cum eodem succo iterum impasta, atque ut prius in furno coque, idque tertio repetatur. Tandem puluerisa ac ferua.

Vires. Specificum est arcanum aduersus dysenteriam.

Dosis. ℥j cum *Nucista* ℥j.

N. Anatomiam Sambuci conscripsit Martinus Bloch Vitzius, M.D. in qua & preparationes & usus sambuci in plurimis affectibus curandis exhibet.

CCXCVII. *Sanguisorba.*

Pimpinella sanguisorba. Sorbaria, Welsch Bibenell.

{ *Maior.*

{ *Minor* { *Hirsuta. Hac sola officinis cognita.*
 { *Læuis.*

Dicitur *Pimpinella sanguisorba minor hirsuta*, *C.B.* 7. *Pimpinella*, *Lob. Italica*, *Trag. Lon. minor Pimp. sanguisorb. Dod. minor, Matth. Cast. Cam.*

sanguisorba minor, Fuchs. Cord. hist. Tab.

Colitur nobis in hortis. Floret Maio & Iunio.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus. Radix.

Vires. Refrig. moderatè. sicc. astring. Vulneraria ac pulmonica est, saporis grati. Usus precip. in catarrh. affectibus pulmonum, phthisi, ex erosione, in morbis malignis, in profluviiis, alui, hamorrhoidum: præcænet abortum Extrinsecus in hamorrhagia quacunque utiliter adhibetur.

PRÆPARATA.

1. ∇ *stillat.* Ex integra planta cum radice ac floribus collecta Iunio.

2. *Syrupus.* Ex succo & saccharo.

3. *Conserua* ex floribus

CCXCVIII. *Sanicula.*

Sannicula officinar. C.B. Sanicula, Trag. Brunf. Cam. Tab. Dod. Lon. Diapensia, Brunf. Matth. Cast. San. mas, Fuchs. Sanic. & diapensia. Lob. Ger. Germ. Sannickel, Sanickeil.

Crescit in montibus ac vallibus: solo gaudet pingui ac opaco: colligitur Iunio mense cum floribus.

OFFICINALIA NATIVA

Folia raro Radix.

Vires. Calf. & sicc. astring. saporis est amari. vulnerari aque una ex precipuis, utilis in consolidandis ulceribus, fistulis, rupturis, erosionibusque, tam interne quam externè adhibita.

PRÆPARATA.

∇. Ex herba florente.

Σάνδαλον } Album, *Matth. Lon. Cord. hist. Cast. Garz. Tab.*
 Sandel, } Rubrum, *Matth. Lon. Cast. Garz. Tab.*
 } Citrinum, *Cord. hist. Lon. Flauum, Tab. Pallidum, Matth. Garz.*

Ligna sunt exotica ex Indiis ad nos transportata.

Præstantissimum est, citrinum, succedit album, infimas tenet rubrum, plane inodorum. Eligendum autem citrinum suauiter fragrans, magnam habens medullam, graue, nodosum. Huius in defectu recipi potest album.

Vires. *Refrig. 3. (al. 2.) sicc. 2. aperiant, Epatica sunt, ac cardiac. Vfus præcip. in lipothymia, palpitatione cordis, obstructione Epatis, &c. Extrinsecus in catarrhis, Cephalalgia, Vomitu, Epatis intemperie calida (in Epithemat. &c.)*

N. Santalum rubrum magis refrigerat ac astringit, quam reliqua.

P R Æ P A R.

1. *Extractum Gummosum.* Fit vt aliorum lignorum extracta cum Ψ .

N. *Quercetanus parat eum v aliqua Epatica. E.g. Agrimonia.*

2. *Spec. Diatrion santal. V. Disf.*

3. *Unguentum santalinum. V. D.*

4. *Cerotum seu Emplastrum santalinum. Vide Disp.*

5. *Trochisci de Santalis. V. Disp.*

CCC. *Santonicum.*

Absynthiacum
 Santonicum,
VVurmkrant
 est C. B. { Judaicum.
 Alexandrinum. *Huius semen officinale solum.*
 Egyptiacum.
 Gallicum.

Insignitur Semen sanctum seu Sementina, *Matth. & Semen Zedoaria, Lob. Cast. Absynthium Seriphium,*

Alexandrinum. Semen Cina, *Cord. Sementina, Dod. Tab. (cui & santonicum.) Santonicum & semen sanctum.) Lon. German. Zidvvensamen, VVrmsamen.*

O F F I C I N. N A T.

Semen quod affertur ex Alexandria Egypti.

N. *Sunt qui & ex absynthio (santon.) Egyptio, semen zina colligi volunt. Hoc videatur apud Matth. Dod. Lob. Tab.*

Vires. *Calfac. & sicc. saporis amari est. Vfus in lumbricis cuiuscunque generis enecandis, fugandis & expellendis*

P R Æ P A R.

1. *Semen santonicum preparatum. i. e. in X. σ ρ (4. 5.) maceratum atque exiccatum.*

2. *Confectio seminis Cina, uber Zogen VVrmsamen.*

CCCI. *Saponaria.*

Σάπων, Diosc. *Fuchs. Lon. Saponaria, Trag. Dod. Lob. Tab. Cam. Ger. viola agrestis, Trag. Saponaria maior læuis, C. B. I. German. Sciffenkrant, Speichelwurtz.*

Crescit passim iuxta riuulos & vias: Floret Maio.

O F F I C I N. N A T.

Folia sed raro & Radix.

Vires. *Calf. & sicc. strenuè attenuat, aperit, sudorifera est. Vfus in asthmate, utero, mensibus ciendis, lue Venerea. Extrinsecus ptarmica est, tumores ac pricipue pranos discutit.*

CCCCI. *Sarsa parilla.*

Salsa parilla, Smilax aspera Peruvia-
na, C. B. 4. Tab. Ger. Zarzaparilla, Matt.
Mon. Garz. Zarzaparilla Peruviana,
Dod. Zarza seu sarsaparilla, Cast. sarsa
parilla, Lon. Trag. Lob.

Nomen accepit à similitudine quam
cum similace aspera (Hisp. Zarza paril-
la) habet.

Triplex est ea. (Nicol. Monardo mo-
nente) adfertur scil. 1. Ex Hispania no-
ua, quæ candidior ad pallorem ten-
dens & gracilior. 2. Ex Prouincia Hon-
duras, quæ cinerea nigrior & crassior,
priorique melior est. 3. Ex Prouincia
Quitto, locis Vrbi Guaiacuil vicinis
(vnde Zarzaparill. Guaiacillana dici-
tur,) quæ ex cinereo nigricans, maior &
crassior adhuc est cæteris.

OFFICIN. NAT.

Radix lignosa, prælonga, fibrosa,
vniformis.

Eligenda quæ coloris aliquantulum
nigri, recens, (non cariota, grauis, flexi-
lis, nec fragibilis.

Vires. Calfac. moderatè sicc. partium
tenuium sudoriferaque. Vfus præcip. in
lue venerea, quam specificè cura, in Ca-
tharris atque inde natis affectibus. E. g.
Arthritide, &c.

CCCCIII. *Sassafras.*

Arbor est prægrandis, nascens in
Florida, folio ficulneo, cortice ex fuluo
nigricante, aliquantulum acris sapore,
sed aromatico, odore fœniculum re-
dolente.

Dicitur pauama seu sassafras, Mon.
Frag.

OFFICIN. NAT.

Lignum & Cortex, qui præfertur

ligno, maxime si ex radice sit, quippe
radix reliquis partibus præualeat, adco-
que & eius cortex.

Vires. Cortex calf. & sicc. ad gr. 3.
Lignum calf. & sicc. 2. atten. aperit. di-
scut. sudores monet. Vfus præcip. in omni
morbor. genere, præsertim obstructioni-
bus tollendis, paribus internis roboran-
dis, in sterilitate emendanda & vene-
rea lue curanda.

N. Instar Panacea in Catarrhis ha-
betur.

PRÆPARAT.

1. Extract. Fit. l a. Vid. l. 2.

2. Ol. stillat. Vid. l. 2.

CCCCII. *Satureia.*

Θύμλα, θυμλαρ, Saturen, Sengen-
kraut.

1. Hortensis seu cunila sati-
ua. Hac vsualis.
Satureia 2. Montana.
est C. B. 3. Spicata.
4. Cretica.
5. Thymi folio.

Insignitur Hyssopus agrestis, Brun-
fels. Satureia, Trag. Lon. Dod. Lob. Tab.
Cam. Sat. altera, Matth. satiua, Fuchs.
Cord. syluestris, 2. Cast.

Colitur in hortis. Floret integra fe-
rè æstate.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. Saporis ac odoris est acris ac
calidi, vnde & calida ac sicca censetur
gr. 3. atten. aperit. disc. Vfus in affecti-
bus ventriculi: cruditate, anorexia,
&c. Pectoris: asthmate, vteri, mensibus
obstructis: visum acuit. Extrinsecus di-
scutit tumores, doloresque aurium sedat.

N. Pulices necare dicitur strata in
Cubili.

PRÆPA.

P R Æ P A R.

1. ▽. Ex herba florente.

2. Oleum stillat. cum ▽a.

CCC. *Satyrion* seu *Orchis*.

Satyrion seu *Orchis*, Germ. *Rnabenkraut*, *Stendelwurtz*.

N. *Dioscor.* distinguit inter *Orchides* & *Satyrion*, *orchidesque* vocat, quæ radicem bulbosam habent, eamque geminam: *Satyrion*, quod unicam. *Plinius* verò utraq; confundit.

Genera *Orchidum* seu *Satyrionum* passim quamplurima nascuntur, quæ etsi promiscue in usum accersi queant attamen eligunt officinæ præ reliquis cynosorchim.

Crescunt in *Campestribus*, *Sylvis* ac *Vineis*: *Florent* *Aprili* & *Majo*.

O F F I C I N. N A T.

Radix cuius bulga distentior eligenda, rejecta flaccidiore. Colligitur ineunte vere vel exeunte Autumno.

Vires, *Calf.* & *hum.* *saporis* *dulcis*.

Usus *pracip.* (ex signatura lasciva) ad virilem fortitudinem restaurandam. Sic & vterum confortare creditur & ad conceptionem disponere.

P R Æ P A R A T A.

1. *Condata Radix*. ꝛ. *Orbiculum* distentio-rem, purga bene ac coque: hinc exicca ac confice saccharo.

2. *Electuar.* *Diasatyrion*. V. D.

3. *Extractum* seu *sanguis*. Fit ex radice conquassata & cum paneatque vino (✓) digesta. Vide l. 2. & *Quercet.* in ph. R. c. 26. Ab Heer. obseru. 8. qui ita parat: ꝛ. *Rad. Satyr.* aquæ iniice, duobus quibus constar orbiculis diuulsis, quæ fundum petierint (abiectis quæ supernant,) contuu-

de ac adde sensim *micæ panis alb.* ac propter lentoris dilutionem Ve maluatico, vt irroretur. Dein digere in MB vase clauso septim (6.) Tum exprime, expressum iterum per mentem digere. Innabit liquor rubicundus, hunc inclinando collige abiectis fecibus. Hinc paratur *Extractum* compositum. *Vid. l. 2.*

CCCVI. *Saxifraga*.

Saxifraga, *Lon.* *alba*, *Trag. Dod. Fuchs.* (icon.) *Cam. Tab.* *Saxifraga*, *Brunf.* *major*, *Fuchs.* *Saxifraga alba chelidonides*, *Lob.* *Saxifr. alba tuberosa radice*, *Clus. hist.* *German. Steinsbrech.*

Crescit in locis asperis ac sabuosis: Floret Maio.

N. Sunt & alia *saxifragarum* genera, verum officinis vel alio nomine veniunt, vel insu-ritata sunt. Sic est *saxifraga lutea*. 1. *Melilotus rubra*. 2. *Filipendula saxifraga*, *Pimpinella*. *Vide* suo loco.

O F F I C I N. N A T.

Folia cum floribus, *Radix* quam *Se-men* vocant.

Vires. *Calfac.* & *sicc.* *evidentissime* (3.) *diuretica* est, *aperit*. *Usus* *pracip.* in sabulo ac calculo *Renum* ac *Vesicæ* atterendo, & expellendo, tum & in mucilagine eorundem atteruandam mensibus obstructis. *Extrinscus* in balneis diureticis.

P R Æ P A R A T A.

▽. Ex planta integra, *Majo* collecta.

Scabiosa } Pratenfis & aruenfis, va-
 C. B. est } riarum specierum, ex
 quibus *usitata* est, C. B. I.
 Montana. Variarum spe-
 cierum.
 Capitulo globofo. Varia-
 rum specierum.
 (Stellata. Variar. spec.

Dicitur scabiosa pratenfis hirsuta,
 C. B. Scabiosa, *Lon.*, vulgaris, *Luchf.* ma-
 ior, *Cast.* aruenfis, *Tab.* (cui & maior
 flore caruleo purpureo.) Scabiosæ 1.
 genus, *Tab.* Scab. fegetum, *Ger.* German.
Scabiosen, *Apostem* rant,
Grindkrant.

Crescit in aruis. Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Radix (colligenda vere.) Folia, Flores.

Vires, *Calf.* & sicc. usque ad 2. ab-
 sterg. atten. discut. sudorifera, alexiphar-
 maca ac pulmonica est. *Usus* prapip. in
 apostematibus (vnde & nomen habet)
 pleuresi, angina, tussi, asthmate, peste, fi-
 stulosis seu manantibus ulceribus
 (mammarum, crurum, &c.) Extrinsecus
 in scabie, pruritu, impetigine ac prapipue
 in achoribus ac tineæ capitis (Erbgrind)
 in furfuribus ac lendibus capitis, in sug-
 gillatis, maculis faciei, dolore hamor-
 rhoidum (in suffitu vaporoso.)

N. Radix scabiosæ maioris flore pur-
 pureo, specificè curare dicitur L. vene-
 ream, adeo, ut salsa parilla vel parum,
 vel nihil cedere censeatur.

PRÆPAR.

1. ▽. stillat. Ex integra planta cum
 radice ac floribus.
2. Sympus. Ex succo & saccharo.
3. Conserua. Ex floribus
4. Sal. Ex planta incinerata.

Σχιον, Σχιονδο, *Lon.* Iuncus odo-
 ratus, *Matth. Lob. Clus. Cast.* Squinan-
 thum officin. fœnum Camelorum,
 Stramen Camel. *Camelsheew*, *Camel-
 stroh.*

Affertur ex Arabia.

OFFICIN. NAT.

Culmi seu furculi (stramen) Flores,
 Radix.

Vires, *Calfac.* subastr. tenuium est
 partium, discutit. *Usus* prapip. in obstru-
 ctis mensibus, Epate, Liene, in Ventricu-
 li inflatione, vomitu ac singultu, in vrina
 difficultate, Renum, Vesica ac Vteri do-
 lore. Extrinsecus corrigit fœtorem oris,
 roborat caput (lotione) discutit vniule tu-
 morem, roborat ventriculum, &c.

CCCIX. Scolopendrium
 verum.

Ἀσπληνιον, ἀσπληνιον, Arab. Scolofen-
 drium, Ceterach Officinis, Scolopen-
 drium, Cord, vera, *Trag. Lon.* Asplenium
 num & nion, *Matth. Lob. Cast. Cam.*
Dod. Cord. in D. Germ. Miltzkrant.

{ Scolopendria vera. Hic describitur.
 { Vulgaris. Loci sequentis.

Crescit in rupium fissuris, locisque
 asperis sine floribus.

OFFICIN. NAT.

Folia collecta Septembri.

Vires, *Calfac.* & sicc. saporis acerbis,
 absterg. spleneticum est. *Usus* prapip. in
 duritie Lienis, Ictero, febr. quartana:
 urinam mouet, calculum comminuit,
 menses ciet, semen imminuere creditur
 (illum nocte effossum.)

N. Dioscorides folia in + serue facta
 ac per dies 40. pota, Lienem absumere
 scribit.

P R Æ P A R.

Syrupus de Scolopendria. Ex meris splenicis fit V.D.

CCCX. *Scolopendria vulgaris.*

Ουλλίτις, Lingua ceruina officin. C. B. Scolopendrium, *Brurf.* Scolop. vulgare, *Matth. Dod. Cord. Lob.* Hamonitis, *Fuchf.* phyllitis seu lingua ceruina, *Tab. Germ.* Hirschzung.

N. *Scolopendria vulgaris vel lingua ceruina dici potest, ad differentiam Ceterach.*

Crescit in syluis, locisque umbrosis ac opacis, in puteis. Viret per totum ferè annum.

O F F I C I N. N A T.

Folia.

Vires. Refrig. ac sicc. substring. *aten.* Splenica itidem ac Epatica sunt. *Vfus* prap. in Liene tumido, fluxu alui, expuitione sanguinis. Extrinsecus mundificant vulnera ac vulcera.

P R Æ P A R.

∇. Ex foliis.

CCCXI. *Scordium.*

Σκώρδιον, Scordium, C. B. I. *Trag.* *Matth. Dod. Lon. Lob. Cast. Cam. Tab.*

minus, Ger. Germ. *Wasserbathenig, Lacken Knoblauch.*

{ Maius, quod vsitatum est.
{ Minus.

Crescunt in locis humidis. Florent Iunio ac Iulio.

O F F I C I N. N A T.

Folia.

Vires. *Calf. & sicc.* 2. absterg. atren. incid. putredini resistit, alexipharmacum ac sudoriferum est. *Vfus* prap. in peste, spectilentialibusque morbis, febribus malignis (tam praeservando, quam curando) in obstruct. Epatis ac Lienis, in Palmonibus purulentis ac mucilagine refertis. Extrinsecus mundificat vulnera ac ulcera: Lenit dolores podagricos.

N. Sunt qui in mensum profluvio cum successu exhiberi velint.

P R Æ P A R A T A.

1. ∇ stillar.
2. Succus inspissatus,
3. Syr. de scordio simpl. Ex succo & saccharo.
4. Compos. Hier Mercurialis. Vide Disp.
5. Conseru. ex fol.
6. Elect. Diascordium. *Fracastorij.* Vide Disp.
7. Sal. Ex cinere.

CCCXII. *Scorzonera.*

Scorzonera { Latifolia { 1. Hispanica. *Hac vsualis.*
 { 2. Germanica, *Tab. Boemica, Matth. Lob.*
 { 3. Foliis neruosis, Germanica angustifol.
 { 4. Humilis neruosa, Pannonica, *Tab.*
 { Angustifolia.

Dicitur Scorzonera, *Dod. Lon. Lob. Cā.* Hispanica, *Matth. Cast. Tab.* (cui & Germanica 1.) Scorz. latifolia sinuata,

C. B. I. aliàs Viperaria, *Schlangenmord.*

O F F I C I N A L I A N A T I V A

Radix.

DD d d

Vires

Vires. *Calf. hum.* 1. alexipharmaca est. *Vsus* precip. in moribus serpentum, peste, melancholia, epilepsia, vertigine. &c. *Quin* commendatur maximopere ad uteri suffocationem.

PRÆPARATA.

1. Δè radice.
2. Extractum.
3. condita Radix.

CCCXIII. *Scrophularia*.

Scrophularia, *Matth. Dod. Calf. major*, *Brunf. Lon. Lob. Cam. Tab. Cer. nodosa* fœtida, *C. B. I. Ocymastrum*, *Trag. Galeopsis*, *Fuchf. Aliis Ficaria*, *Ferraria*, mille morbia *Calstrangula*, *Braunvvurtz*, *groß Feigvvuarizenkraut* *Knodenkraut*, *Sauvvvurtz*.

Crescit in locis umbrosis, iuxta sepes ac in cœmiteriis. Floret Iunio ac Iulio.

N. Est & fœmina dicta qui non nisi in locis palustribus nascitur, sed priori bonitate cedit.

OFFICIN. NAT.

Radix nodosa.

Vires. *Calf. & sic.* digerit, incidit, saporis amari. *Vsus* precip. in strumis seu serophulis, ficiis & mariscis ani (unde & nomen accepit) in cancris ac similibus serpentibus ulceribus malignaque scabie, extrinsecus in tumoribus renitentibus, malignisque molliendis. E.g. *serophulis*, & simil.

PRÆPAR.

Δstillat. Ex herba cum radice.

CCCXIV. *Scilla*.

Squilla, *Brunf. Scilla*, *Trag. Matth. Fuchf. Cord. hist. Lon. Cam. maior* *Pan-craticum*, *Dod. Tab. rubentibus* tuni-

cis *Lob. Aarab. Haspel. German. Meer-vvibel*.

Crescit copiose in Apulia, Sicilia, Portugallia.

OFFICIN. NAT.

Radix bulbosa, quæ eligatur recens succi pleni, collecta Iulio.

Vires. *Calf. sic.* 2. saporis acris & amari, atten. incid. absterg. discut. putredini resistit. diuretica est. *Vsus* precip. in obstructione Epatis, Lienis, meatus bilarij, mensium urina: in mucilagine pulmonum, tussi, &c. Extrinsecus in achoribus capitis (infus. in el.) in per-nione.

N. Veneficia ac incantationes arcere dicitur.

PRÆPARATA.

1. *Preparata radix*. Inuoluitur mase panis atque cum eadem in Clibano coquitur: hinc eximitur atque exiccatur. Vide Disp.

N. *Preparatio* hac instituitur ad obtundendam acrimoniam.

2. *Syr. Oximel. scylliticum simpl.* Ex scyllitico & melle.

3. *Oxymel compositum*. Vide Disp.

4. *Loch. de scilla. Loch. ad asthma.*

Ex succo ac melle.

5. *Acetum scillaticum*. Ex infusione radices in aëre exiccatae (℞ 40.)

6. *Fecula. & Syllæ* Cor incide minutim vel conquassa, digreque a iquod tenuporis spacium in Mj. Hinc transcola & inspissa. *Quercet. Ph. R. cap. 24.*

7. *Extractum*. Vide *Querc. Ph. R. c. 24.* vbi & Saccharum seu conferuam *Scyllæ* parare docet.

CCCXV. *Sebesten*.

Sebesten, *Trag. Prunus* *Sebesten. Matth. Sebestena*, *Myxæ*, *Myxaria*, *Tab.*

Tab. Alpina.

OFFICIN. NAT.

Μοΐαρια, μωζα, myxæ, myxaria Sebesten Brustbeerlein. Sunt fructus arboris pruno similis, assimilati parvis prunis, referentes nucleum cortice triquetrolapideo inclusum.

Alportatur ex Syria ac Ægypto,

Vires. *Sebesten* inter caliditatem ac frigiditatem temperata sunt, humectant, emolliunt, acrimoniam humorum obtundunt. *Vsus præcip.* in catarrhis acris, urina acris, febribus biliosis, alui obstructione: summatim ut figura ita & viribus pruna *Damnascena* emulantur.

PRÆPAR.

Electuar. de Sebesten. V.D.

Vires. Purgat leniter, obtunditque acrimoniam humorum.

Dosis à $\frac{3}{4}$ β. ad $\frac{3}{4}$ j.

CCCVI. Secale.

Farrago Rogga, Siligo, Briza, German. *Rogten Korn*, (nostratibus),

Est { Hibernum vel maius, C.B. 2.
Vernum vel minus, C.B. 3.

1. Dicitur. Rogga siue secale, *Dod.* Siligo *Brunf. Lon.* Veterum & Secale, *Trag.* Secale (Secla,) *Matth. Fuchs. Lob. Tab. Ger.* Secale & Farrago *Plinij Cass. Olyra Cord. in D.* Tiphæ cerealis *Portæ. C.B.*

2. Appellatur, Rogga seu Secale æstivum, *Dod.* Siligo æstiva, *Trag.*

N. Veterum siliginem à secali nostro esse differentem, vide sis apud *Tabern. l. 1. f. 7. c. 1.*

Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

1. Farina. 2. Furfures.

Vires Secale calefacit moderate, minus tamen quam triticum, magis vero

præ hordeo. *Vsus* eius potissimus culinarius est, adhibetur tamen non raro farina extrinsecus ad tumores & dolores discutiendos, adcoque imponitur *Erysipelati, podagricis doloribus, & sim.*

Furfures abstergunt, emolliunt, discutiunt, (calidi impositi in sacculo.)

PRÆPAR.

1. Panis. Adhibetur in doloribus capitis & aliarum partium (impositus) in ventriculi imbecillitate, in cordis palpitatione, in sætu roborando (tostus & vino alioque liquore convenienti imbutus, vel in micæ redactus, & cum aliis impositus,) in tumoribus maturandis (masticatus cum butyro & impositus) in dentificiis (crusta tosta & trita.)

2. ∇ still. è pane, Fit è micis panis vi *MF.*

N. Commendatur in Diarrhæa & Dysenteria.

3. ∇ Siliginis officinarum. Fit è gramine *MB.*

4. Emplast. De Crusta panis V.D.

CCCCVII. Scam.

Sedum { maius, arborefcens.
{ minus, insitatum,
{ vulgare, hoc vsuale.
{ Minus Hæmatoides, &c. Officinis incognitum.
{ Minimum, vide vermicularis.

Insignitur semper viuum maius, *Brunf. Matth. Ger. Lob.* Sedum maius, *Fuchs. Cord. in D. Tab.* Semper viuum 1. *Lon.* Semperv. maius 2. seu Iouis barba, *Dod.* Aizon maius, *Cam.* Sedum maius vulgare, *Clus. German. Hauszwurtz, Donnerbart, Maupsfesfer.*

OFFICIN. NAT.

Folia.

DDdd 2 Vires

Vires. Refrig. 3. astring. incrassat.
Vsus prapip. intrinsecus in febribus bilio-
 sis, sedat scil. sitim, compescit ardorem.
 Extrinsecus in Angina, &c.

N. Vulgare est plebi nostrati, expres-
 sum succum cum saccharo in febribus
 morbisque calidis propinare.

PRÆPARATA.

1. ▽. Ex foliis stillat.

2. Succus ex foliis expressus.

N. Adhiberi solet recens in febribus
 malignis & biliosis.

CCCXVIII. Senecio.

Senecium *ἡνιπάρ* herba pappa
 Germ. *Creutzvuntz*, *Grindkraut*.

Est { 1. Senecio minor } indiffe-
 { vulgaris, }
 C. B. { 2. Senecio minor } renter
 { montana, } vsuales.

1. Appellatur Senecio, *Matth. Fuchsf.*
Cord. in D. Lon. Lob. minor, *Cast. vul-*
garis & 1. *Trag. Tab. Erigerum minus*,
Dod. Verberna fœmina, *Brunf.*

2. Senecio 2. *Tab. Erigerum*, *Ger.*
maius, *Dod.*

Nascitur passim in hortis, in agris
 secus vias, &c. maius syluosis gaudet
 & arenosis. Vere florere incipit, flo-
 resque per totam ætatem producit,
 aliàs hyberno quoque tempore viret.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus & caule.

Vires. Mixtas vires habet, refriger. ac
 simul modicè discut. consolidat. *Vsus*
 prapip. in cholera. Ictero, intemperie ca-
 lida Epatis, lumbricis, vomitu & expui-
 tione sanguinis. Ischatico dolore, fluore
 muliebri. Extrinsecus in mammis in-
 flammatis, scabie (capitis) struma, dolore
 ventriculi, *Vrina* remorata, arthritide,
 vulueribus.

▽ still. Fit è sol. flor. ac caule, tota
 æstate.

CCCXIX. Serpyllum.

Ἐρπιδος, *Diosc.* Serpyllum, *Brunf.*
Trag. Fuchsf. Lon. Lob. vulgare, *Dod. Ger.*
Serpyllum syluest. *Matth. Cord. in D.*
syluestre alterum, *Cast. Serpillum mi-*
nus fl. albo & fl. purpur. *Tab. Serp. vul-*
garis repens, *Clus. hist.* *Serp. vulgare*
minus, *C. B. 6. Germ. Quendel*, *Rünlin*,
Hünkerkøl, *vild Polen.*

N. Sunt species plures, sed hac officini
 usitator.

Crescit locis sabulosis, apricis. Flores
 Majo mense protrudit, integraque æ-
 state fouet.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires. *Calf. & sic. princ. 3.* saporis
 acris, atten. aperit. Cephalica est, *Vte-*
rina ac stomachica. *Vsus* prapip. in men-
 sibibus ac vrina cienda (balneo) in expui-
 tione sanguinis, spasmo, &c. Extrinsecus
 arcet vigilias, cephalagias, vertiginem.
Ciet menses (balneo.)

PRÆPARATA.

▽ stillat. Ex planta cum floribus In-
 niocollecta.

CCCXX. Sesamum.

Σάμουν Veterum, C. B. Sesamum,
Alpin. Matth. Lob. Dod. Cast. Tab. ve-
rum, *Cord. in D. Cam. Germ. Leindotter.*
Flachsdotter.

N. Est & Sesamum, *Myagrum di-*
etum, ac officinis inusitatum.

OFFICIN. NAT.

Semen quod affertur ex Alexandria,
 Crera & Sicilia.

Vires. *Calf. ac modicè humect. emollit,*
paregoricum,

*paregoricum, viscosum pingue, adeoque
& Emplasticum est: nervorum duritiem
illius discutit, coli doloribus medetur.*

PRÆPAR.

*Ol. Expressum: Hoc eligatur candi-
dum, syncerum: adulteratur enim oleo
Nucum & Papaveris, qui dolus tamen
odore & sapore faciliè dignoscitur.*

*N. Olim solum ex Alexandria
Ægypti Venetias, atque inde ad nos
comportabatur. Hodie & apud nos ex
sesamo paratur.*

*Vires. Moderatè calfitidem emollit,
maturat, pulmonicum est. Vfus præcip.
in tussi ac asperitate pulmonum (lin-
ctum) in pleuritide: impinguat, semen
genitale auget. Extrinsecus in duritie
nervorum, aurium doloribus, in ulceribus
serpentibus ac malignis*

*N. Quia nanseam excitare solet, raro
internum vsum subit.*

CCCXXI. Sefeli Officinarum.

*Λγυστικός, Diosc. Αιβιστικός Gal. Ligusti-
cum quod seseli officinar. C. B. 1. Siler
montanum, Trag. Lob. Dod. Clus. hist.
Ligusticum, Matth. Cast. verum, Tab.
Sefeli Massilioticum, Cord. in D. Sefeli
Italicum, Cast.*

Crescit copiose in Liguria Italiæ.

OFFICIN. NAT.

Semen.

*Vires. Calfac. sicc. menses & urinas
ciet, flatus discutit.*

CCCXXII. Sefeli Massi-
lioticum.

*Σέπελι, σέπελις, Hippocr. σίλι, σίλι, Sife-
lios indeclinabiliter, Germ. Sefel. Se-
felkraut, Marfilischer Sefel, Roszküm-
mel, Zirmet, Silermontan.*

*Est { ferulæ folio } promiscue
{ fœniculi folio } vsumalia.*

*1. Dicitur Sefeli Massiliense, Matth.
Lon. Cast. Tab. nupetorum, Lob. Sefeli
Mass. ferulæ aut Dauci Cretici facie,
Lob. Siler montanum, Ger. C. B. 8.*

*2. Sefeli Massil. fœniculi folio, quod
Dioscor. censetur, C. B. 9. Lob. Sef.
Massil. Dod. Diosc. Clus. hist. nonnullor-
um, Cam. Fœniculum petræum, Tab.*

*Crescit sponte in Gallia ac Italia,
apud nos non nisi in hortis colitur, so-
lo gaudet fabuloso.*

OFFICIN. NAT.

*Radix atque Semen, quod verum in
modernis officinis prostat, secus ac an-
tea, vbi semen brancæ vrsinæ, monente
Tabernemontano, eius loco venū iuit.*

*Vires. Calf. & sicc. ad gr. vsque 3, in-
cid. aperit, discut. Vfus præcip. in morbis
capitis. Epilepsia (cui tota sua substantia
resistit.) in imbecillitate visus, spasmo,
&c. in Pulmonum ac pectoris affectibus,
tussi, catarrhis; in Epatis obstructione,
Hydrope, ventriculi cruditate ac infla-
tione; in calculo Renum ac Vesica: in
mensibus obstructis. Specifica antidotus
est cicuta. Extrinsecus in spasmo, contra-
cturis, in lacte mammarum coagulato,
in uteri impuritate, ac obstructione.*

CCCXXIII. Sefeli Cre-
ticum.

*Τορδαίον, Dioscor. Sefeli Creticum
minus, C. B. 4. Cam. Sefeli Creticum,
Lob. Dod. Cast. Tab. Ger. Pimpinella
Romana, vulgo Arab Arturtillon, Cre-
tischer Sefeli, Candischer Sefel.*

*Crescit sponte in Provincia Gallia,
apud nos non nisi in hortis.*

OFFICIN. NAT.

Semen.

DDdd 3 Vires.

Vires. Calf. & sicc. 2. est nephriticum, *concoctu est difficilis.*
 uterinum pulmonicum. *Vsu* prap. in
 stranguria, & urina remorata: dolores
 discut. menses ciet, catarrhorum expecto-
 rationem promouet.

CCCXX Sinapi.

Σινάπι, Arab. Cardel. Serff.

CCCXXIV. Sideritis

Σιδερίτις. Sideritis 1. Fuchf. Cord. in
 D. vulgaris, Cam. in Matth. 2. Clus.
 hist. 4. Len. Sid. Heraclea, Cord. hist.
 Tab. Sideritis seu ferruminatrix, Lob.
 Sid. vulgaris hirsuta erecta, C. B. 4.
 Arab. Tetrahit. Sidrichis. German.
 Gliedkraut.

N. Matthiolus Marrubiastrum pro
 Sideritide Dioscoridis habet, cui contra-
 riatur Tabern.

Crescit locis apricis montanis fa-
 bulosis: Floret Majo.

OFFICIN. NAT.

Herba sed raro.

Vires. Absterg. astring. vulneraria
 est intus & extra adhiberi apta. *Vsus*
 prap. in herniis.

N. Adhibetur itidem in morbis in-
 cantatione introductis.

CCCXXV. Siliqua.

Κεράτια, Siliqua edulis, C. B. 1. Sili-
 qua, Matth. Cord. in D. Lon. Cast. Cam.
 Ceratonia, Dod. Cerata vel Siliqua,
 Lob. Tab. Ger. Clus. hist. Sil. dulcis Ca-
 rub & Carnub. vocata, Alpin. Germ.
 Johannisbrodt.

Crescunt in Regno Neapolitano,
 tum in Insula Creta & Syria.

OFFICIN. NAT.

Fructus (scil. siliquae, cuius succus
 melligineus in usum solum venit.

Vires. Siccat & astringit. *Vsus* prae-
 cip. in ardore stomachi, tussi, &c. alias

rapifolio: Huus
 semen purple-
 um & vsuale
 potissimum,
 apij folio: Huus
 semen rubescens,
 & minus vsuale.
 Hortense
 Sylvestre, &c.

Dicitur Sinapi, Cast. Matth. Sinapi
 hortense, Cord. in D. Lon. satium pri-
 us, Dod. Sin. sat. Erucæ aut rapi folio,
 Lob. Tab. seu. album, Cam. C. B. 1.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. Calf. & sicc. 4. incidit atten-
 attrah. rubificat. *Vsus* prap. in appeti-
 tu excitando chylicatione promouenda:
 in affectibus hypochondriaciis ac quar-
 tana ex mucilagine tartarea, item in
 quotidiana (ante paroxysmum Dos. ʒj.
 exhibita) in calculo: caput purgat. Ex-
 trinsecus in sinapismis, in arcendo caro,
 (naribus inditum vel in sinapismo ad-
 hibitum) tumores maturos aperit, sternu-
 tationem mouet.

PRÆPARATA.

Oleum. Ex semine expressum.

Vires. Nervorum affectibus frigidis
 confert.

CCCXXVII Sifarum.

Σίσαρον, Sifar, Sifer, Brunf. Matth.
 Cord. in D. Lon. Cam. satium, Fuchf.
 sifarum, Trag. (& Rapunculus hor-
 tensis,) Dod. Lob. Tab. Ger. Sifarum
 Germanorum, C. B. 1. Germ. Gierlein,
 Garlin, Klingel Rüblein, Zuckerrwurzel,
 Colitur.

Colitur in hortis : solo gaudet pingui.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. *Calif.* 2. saporis subamari, subastring. ventriculo conuenit, appetitum excitat, diuretica ac lithonriptica est, bene nutrit, faciliè concoquitur, specifica antidormi censecur ☿ uiui.

N. Est usus potius culinaris quàm officinalis

CCCXXVIII. Solanum.

Στόρυξ Solatrum, Nachtschatten, Savvkrant.

Solani varia occurrunt genera, quorum alia baccifera sunt, alia pomifera. Verùm officinis quod vſitatus Solani Titulo, est solanum officinarum, C. B. 1. Solatrum, *Brunf.* vulgare, *Trag.* Solanum, *Lon.* hortense, *Matth. Fuchf.* *Dod. Cam. Ger.* fatium, *Tab.* Solanum nigrum, *Cord. in D.*

Crescit iuxta sepes ac vias : floret æstate integra.

OFFICIN. NAT.

Herba bacca.

Vires. *Refrig.* 2. reliquis temperata sunt, adstring. appellunt. *Vsus* præcip. externè in *Erysipel.* in dolore capitis, in æstu febrili mitigando (capiti ac pedibus applicata) in parotidibus.

PRÆPARAT.

▽ stillar. Ex herba cum floribus.

N. Sunt qui ante Biennium exhibere vetant.

CCCXXVIII. Sorbus.

Ön, ⁱⁿ, Sorbus, Sperberbaum.
Sorbus fatiua. Hac officinalis.
C. B. syluestris

Insignitur sorbus, *Brunf. Trag. Dod. Cord. in D. Lon. Tab. Ger.* Sorb. Domestica. *Matth. Lob. Cast.* Sorbum ouatum, *Fuchf.* Sorbus legitima, *Clus. hist.* esculenta, *Cam.*

Crescit in hortis: maturos fert fructus autumno.

OFFICIN. NAT.

Fructus, (Sorbum. *Speyerling*, öör.)

Vires. *Refrig.* & sicca. astring. *Vsus* præcip. in fluxionibus alui, uteri, &c. Extrinsecus adstringit vulnera (fructus puluerisatus.)

N. Sorba colliguntur potissimum immatura, exiccanturque tum in aëre, tum in Clibano: siccata puluerisantur pro usu Medico, pauci enim sunt nutrimenti.

PRÆPAR.

Condit. Fructus cum melle.

CCCXXIX. Spica.

Spica mas.

Spica fœmina. Lauandula.

Non discrepant nisi magnitudine, quæ tam flor. quam foliorum in Spica major est, in Lauandula minor: odor itidem Spicæ grauior est, Lauandulæ gratior, ideoque promiscuè vsurpari possunt.

Mas insignitur Lauandula latifolia, C. B. 1. Spica nardus Germanica, *Trag.* Nardus Italica, *Matth. Lob.* Germanica, *Lon.* Lauandula, *Dod.* major, *Cord.* Pseudonardus, *Matth. Cast.* mas, *Fuchf.* at in ico: fœmina, Lauandula latioribus foliis 1. *Cam.* 2. longiore folio, *Clus.* Lavendel.

Fœmina dicitur Lauandula angustifolia, C. B. 1. Lauandula, *Trag. Matth.* vulgaris, *Cord. in D.* minor, *Cord. hist.* Pseudonardus fœmina, *Matth. Fuchf.* (at in icon. mas) Lauandula, *Lob.* Spica

ca nardi, *Cam.* breuiore folio & Spica, *Clusf.* *Spicanard.*

Colitur vtraque in hortis, nobisque vulgatiores est Spica fœmina: Floret lunio ac Iulio.

OFFICIN. NAT.

Flores vtriusque.

Vires. Calf. & sicc. 3. (præualet tamen Spica) saporis subacris ac subamari, parrium tenuium, cephalica est ac neruina. Vſus præcip. in catarrhis, paralyſi, ſpaſmo, vertigine, lethargo, tremore artuum. In vrina, menſibus ac fœtu pellendo (unde parturientibus exhiberi ſolet.) in torminibus ventris flatulentis. Extrinſecus in lixiuiis, capitis ac artuum, in Maſſicatoriis (pro catarrho exiccando ac reuellendo ad palatum, ne ad pulmones deſnuat.)

N. Odore ſuo fugat pediculos.

PRÆPAR.

1. *Conſeru. Flor. Lauendulæ.*
2. *Conſect. Flores.*
3. *▽ ſtillat. Ex floribus irrigatis ſc. vel vino vel aqua.*
4. *Ol. ſpice ſtillat. cum ▽ aſcendit.*

N. Aſportatur ad nos ſat copioſe ex Prouincia Gallie regione, ubi copioſe creſcit. vteri motus ac dolores compeſcit umbilico illitum.

CCCXXX. Spica Celtica.

Nardum Celticum, Matth. Cord. hiſt. Lob. Caſt. Cam. Tab. Ger. Nardum Celticum Dioſcor. C.B. 4. Nardus alpina ſeu Celtica, Cluſ. aliis, Romana, Galatica, Saliunca, Germ. Celtiſcher Narden.

Creſcit in Liguria: in Carinthia, Styria, in albis Tyrolis, &c.

OFFICIN. NAT.

Radicula cum adnatis, colligenda

Iulio & Auguſto.

Eligenda recens, iucundi odoris, radiculis numeroſis, cohærens, non fragilis, & plena.

Vires. Calf. & ſicc. viriumque eorundem eſt cum ſpica Indica, ſed imbecilliorum, maiore tamen cum vtilitate adhibetur in vrina cienda, ventriculo corroborando, flatibus deſcendiendis, Extrinſecus additur malagmatis, vnguentiſque calfaſcientibus.

CCCXXXI. Spica Indica.

Nardus Cord. in D. Lob. Nardus Indica, Matth. Cord. hiſt. Lon. Caſt. Ger. Nardus ſeu Spica Indica, Spica nardi officin. C.B. 1. Arab. Stumel. Indianiſch. Spicanarden.

Radix eſt officinalis ex India Alexandriam, atque inde Venetias & in Germaniam transportata. Dicitur autem Spica, quod ſpicæ ſimilitudinem habeat.

N. Eſt & Nardus ſpuria Narbonenſis, ut & Nardus montana, valeriana non abſimilis; Verum officinis noſtratiſque peregrina.

Eligenda recens, leuis, longam comâ habens, ſpicam vero breuiem, colore flaua, aliquantulum redolens Cyperum, ſapore amaro ac linguam ſiccante, quæ diu in ſua odoris gratia permanet.

N. Madaſta dolose vendi ſolet, quæ frans deprehenditur, quod Spica ſit candida, ſqualida, nulloque puluere obſita, filiſue lane inſtar crinita.

Vires. Calf. 1. ſicc. 2. atten. aſtring. nephritica & ſtomachica eſt. Vſus præcip. in vrina ac menſibus ciendis, in ventriculi roſione, inſtatione, in ſtetro, &c. Extrinſecus in lixiuiis Cephalicis, balneis.

balneis uterinis, &c.

PRÆPAR.

1. *Oleum Nardinum simplex.* Fit ex coctione in ol. communi, Vino ac Aqua.
2. *Oleum Nardinum compos.* Fit vt simplex additis nonnullis aromatis.

CCCXXXII. *Spinachia.*

Spinachia, (Spinacia,) Brunfels. Fuchf. Dod. Tab. Lon. Cast. Matth. Lob. Ger. mas, Cam. vulgaris, Trag. Lapathum hortense seu spinachia semine Spinoso, C. B. 2. German. Binesch, Spinat.

Colitur in hortis: Floret vt plurimum Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia seu Herba. Potissimum culinaris est.

Vires. Refrig. & hum. 1. utilis cibis in omnibus morbis, laxat aluum, lenit asperitatem pulmonum. Extrinsecus refrigerat ventriculū ac Epar (imposita.)

N. Continuus vsus melancholicum generat sanguinem.

CCCXXXIII. *Staphisagria.*

Staphisagria, Trag. Matth. Fuchf. Dod. Lob. Cast. Cam. Herba pedicularis, Cord. in D. Arab. Alberas, Leuskyant, Speichelkraut, Biszmuntz, Mausz, und Kattenpfeffer.

Crescit in Apulia, Calabria, Dalmatia, Istria.

N. Crescit & apud nos species quedam, verum minus illa usitata est.

OFFICIN. NAT.

Semen triquetrum & asperum.

Vires. Internus vsus purgatorius est, sed rarus. Extrinsecus eius vsus est apoplegmatisans in masticatoriis, garga-

ris, odontalgicis (cum +) ac abstergentibus, in ulceribus ac papulis, &c. Adhibetur & in phthiriasi.

CCCXXXIV. *Stæchas.*

Στοιχάς, Stæchas, Trag. Matth. Lob. Lon. Cast. (Stichas) Fuchf. Dod. Stich. Arabica, Cord. in hist. Cam. St. breuioribus ligulis, Clus. hist. St. purpurea, C. B. 1. Arab. Astochodas, Kæmischer, VVelscher, frembder Rummeloder Thymian, Stechaskrant.

Crescit copiose in Insulis Galliae, quæ Stæcchades dicuntur, optima tamen censetur Arabica (vnde ad compositiones recipere monent Arabiam.) Huic succedit Cretica.

OFFICIN. NAT.

Flores seu potius spicæ compressæ, inter florum ac seminum prouentum collectæ.

Eligendæ spicæ recentes odoratæ, & subamaræ, si haberi possunt Arabicæ.

Vires. Calfac. 2. & sicc. 2. absterg. at-ten. aperit. Vfus præcip. in affectibus capitis & nervorum, scil. in vertigine, Apoplexia, Paralyti, Lethargo: In morbis pe-ctoris itidē præstat quod Hyssopus: insu-per urinā & menses ciet, venenis resistit, affectibus hypochondriacis succurrit. Ex-trinsecus in lotionibus capitis, suffitu, &c.

PRÆPARATA.

1. *Syr. de Stæchade simplex. V. D.*
2. *Syr. de Stæchad. compos. V. D.*
3. *Syr. de Stæchad. Fernelij. V. D.*

CCCXXXV. *Stæchas Citrina.*

Ελίζουρον. Elichrysum seu Stæchas citrina angustifolia, C. B. 4. Stæch. ci-trina,

trina, *Matth. Gesn. Dod. Cast. Tab.*
Amaranthus luteus, Fuch. Lon. Coma
aurea, Lob. aliis Tinearum (quod tineas
abigat,) Germ. Rheinblumen, Mot-
tenkraut.

Crescit locis aridis & sabulosis, &
 conuallibus frequens iuxta Rhenum.
 Floret Iunio.

OFFICIN. NAT.

Flores.

Vires. Calf. & sicc. incid. aperiunt
 diuretici ac vulnerarij sunt. *Vsur prac.*
in obstructione Urinae, Lienis, mensium:
coagulatum sanguinem resoluunt, ca-
tarrhos exiccant, menses nimis fluentes
siccando sistunt, lumbricos fugant: com-
mendantur & imprimis ad exiccandas
defluxiones acres Pulmonum, & Extrin-
secus faciunt ad emolliendam uteri
duritiem, (in balneo) lentes abigunt (in
lixivio capitis) defluxiones siccant &
discutiunt (suffitu,) &c.

N. Sunt qui amuleti loco de collo su-
 spendunt, lumbricosque ventris eo fugari
 volunt. *Dn. D. Arnold. Weichard. in*
Thesauro pharmaceutico.

CCCXXXVI. Succisa.

Succisa, *Matth. Fuchf. Dod. Cast.*
glabra, C.B. I. Iacæa nigra, Brunf. Mor-
fus Diaboli, Trag. Lob. Lon. Tab. Germ.
Abbisz, Teuffels Abbisz.

Crescit passim in campestribus, pra-
 tis ac iuxta arua: Foret Iulio, Augusto,
 Septemb.

OFFICIN. NAT.

Radix, Flores: nonnunquam &
 Folia.

Vires. Calf. & sicc. 2. amara, alexi-
 pharmaca ac vulneraria est, ut Scabio-
 sa, cum qua & reliquis facultatibus
 conuenit. Imprimis celebratur in Epi-

lepsia, Peste, Vteri dolore, sanguine coa-
 gulato, abscessibus occultis, lue venerea,
 eiusque ulceribus, in vulneribus recenti-
 bus, &c. Extrinsecus in angina, tumori-
 bus tonsillarum diuturnioribus, qui ad sup-
 purationem agrè perueniunt (gargaris.)
 in sugillationibus, buboni bus, &c.

PRÆPAR.

▽ Stillat. Ex integra planta (cum
 rad. & flor.) collecta in fine Iulij.

CCCXXXVII. Symphytum.

Symphy- tum	Officin. Huius loci.	
	Maius tuberosa	} Minus usualia.
	radice	
	Minus tuberosa	
	radice	
	Minus borragi- nis specie	
	Maculosum, vi- de Pulmonaria.	
	Petræum, minus usuale.	

Insignitur consolido maior, *Brunf.*
Targ. Cam. Ger. symphytum, Lon. ma-
ius, Matthiol. Cord. hist. Cam. Cast. Tab.
magnum, Fuchf. Dod. alterum, Cord.
in D. Symphytum Alum & Alus, Lob.
Consolida vulgo, Solidago, German.
Vallvurrz, Schvartzvurrz, Schm-
eervurrz, Reinvvell.

Crescit in pratis, & hortis, gaudet
 loco humido: Floret Maio & Iunio,
 floresque fert purpureos vel albos: illud
 marem vocat, hoc foeminam, quæ hoc
 tractu vulgarior crescit.

OFFICIN. NAT.

Radix, Folia, Flores.

Vires. Caliditate temperatum est,
 sicc. 2. vulnerarium est è præcipuis cele-
 berimum, mucilaginosum, incrassans,
 acrimoniamque humorum obtundens,
 imò

imò & incidens, adeoque partium mixtarum. *Vsus* precip. in fluxionibus quibuscunque, in primis alui, in Erosione Pulmonum ac phthisi in herniis, ruptis venis, fractis ossibus, &c. Extrinsecus vulnerum sanguinem sistit, fracturas ossium ac vulnera consolidat.

P R Æ P A R A T A.

1. ▽. Ex herba cum radice.
2. *Conseru.* Ex floribus
3. *Conditā Radix.* V. Renodæum.
4. *Syrup. de Symphyto.* V. Disp.
5. *Extract.* Symphyti. R. mucilaginem radices coctæ inspissatam. Extrahere cum V ac abstrahere.

6. *Extractum sanguineum.* Sanguis. R. Rad. recent. simph. maj. & min. conquassa in formam pulvis. Hinc adde panis 4. (scilicet fecalini vel triticei.) M. ac irriga cum Vino generoso, inde Phiolæ vitreæ oclufæ cera Hispanica, digere aliquandiu in fimo vel V. Hinc exprime, digere, fecesque subsidentes separa, reliquum inspissa. Vide Quercet Ph. R. c. 26.

Vires. Præstat ad hernias & ulcera omnia.

Dosis ʒj. ad dies pluresculos.

7. *Oleum stillat.* Ex radice sicca per Retortam elicitur.

N. *Oleum* hoc ut per paucam elicitur, ita viribus pretiosum est in herniis curandis intus & extra adhibitur.

T.

CCCXXXVIII. Tamariscus.

Tamariscus { 1. Germanica. Hac vsualis.
C. B. est { 2. Gallica.
3. Ægyptia.

Dicitur Tamariscus, Brunf. Lon.

fœmina, Cord. hist. Myrica, Trag. Clus. sylvestris seu Tamaryx, Matth. Cast. Dod. Tab. Tamaryx sylvest. fœmina, Fuchf. Tam. humilis, Cord. in D. Myr. sylu. altera, Clus. hist. Myr. altera in Germania, Cam. Tam. fruticosa folio crassiore, C. B. al. Murica. Arab. Tarfa, Tamariscenboltz.

Frutex est arborefcens similis Sabinæ, in tantam excrescens magnitudinem, ut doliola inde fiant mensur. i. capientia, quæ vulgaria sunt nostratibus.

Nascitur iuxta Rhenum & Danubium, tum quoque secus paludes, solo gaudet saxoso.

O F F I C I N. N A T.

Lignum, Radix, Cortex, (quibus maxime vsualis est, in primis radici detractus.)

Vires. *Cortex calfac. & sicc.* 2. (linguum ad frigiditatem inclinatum) attenuat, aperit, abstergit, subastringit, diureticus est ac splenicus. *Vsus* precip. in obstructione ac tumore Lienis (quem absumere scribit Diosc.) in morbis ab atrabile ac sero oriundis, ut scabie, pruritu, in Ictero nigro, profluvio albo mulierum, &c. Extrinsecus in primis in tinea capitis, & obstr. mensium (in seffu).

P R Æ P A R.

1. *Extract.* è corticibus fit l.a. cum V vel ▽. v.g. flor. genistæ, scolopendriæ, & sim. Querc. Ph. R.

2. *Sal.* Ex incinerato ligno, l.a.

CCCXXXIX. Tanacetum.

Tanacetum C. B.	{	Odoratū	{ 1. vulgare luteum. Hoc vsuale.	
		Inodorum	{ 2. foliis crispis.	
			{ 3. minus, album.	
flore	{	E E e e	2	{ 4. alpinum.
			{ minore.	
				{ majore.

Dicitur

Dicitur Tanacetum, Matricariæ
2. Species & parthenium, Brunf. Tanacetum vulgare, Trag. Tanacetum, Matth. Lon. Dod. Artemisia tenuifolia, Fuchf. Ambrosia quibusdam, Cord. in D. Tanacetum millefolij foliis, Lon. Athanasia seu tanacetum, Cast. Artemisia Diosc. Tab. Græcè Ἀρτεμισία λεπτοφύλλη. Athanasia, Tanasia. Germ. Reinfarn, VVurmkrant.

Nascitur locis arenosis incultis : Floret Iunio & Iulio.

OFFICIN. NAT.

Herbacum floribus, Semen.

Vires. Calfac. & sicc. incid. discut. vulnerarium, uterinum & nephriticum est. Vfus precip. in lumbricis, torminibus, ventris, calculo impuritateque Renum ac Vesicæ, mensibus obstructis, flatibus, hydrope, &c. Extrinsecus iisdem affectibus adhiberi potest, lauando, cataplassando, &c.

PRÆPAR.

1. ∇ Stillar. Ex tota planta florente
2. Oleum stillat. quod raro prostat.

CCCXL. Taraxacum.

Dens Leonis, Brunf. Matth. Dod. Lob. (& corona, caput Monachi,) Tab. Ger. Hieracium maius, Trag. paruum, Cord. in D. Hedipnos maior, Fuchf. Taraxacon minus, Lon. Dens Leonis latiori folio, C. B. I. German. Pfaffenblat, Münchakopff.

Habetur & maior, & media quæ vulgatio est folio acutiore, aliquando obtuso.

Crescit in herbosis locis : Floret Aprili, Maio,

OFFICIN. NAT.

Radix, Folia.

Vires. Refrig. & sicc. 2. saperis ama-

ri, absterge, aperit, Epaticum est, cum Endinia conueniens, quâ tamen potentius operatur. Vfus precip. in febr. putrid. inueteratis, &c. Extrinsecus maculas abigit oculorum (lac ex disrupto caule, ter quotidie oculis inditum,) vulnera ac ulcera abstergit, &c.

N. Radix amuletice curare dicitur affectus oculorum, peculiari tamen modo, ut volunt collecta. Nimirum, sunt qui infrorsum per fossam subitus factam euellunt. Sunt qui quoquo modo fossam in nouem secant frustra, nouemque diebus de collo suspendunt. Alij integram radicem adhibent. Idem Amuletum & tertianam fugare dicitur.

OFFICIN. NAT.

∇ stillar. Ex planta cum radice, foliis ac floribus collecta initio Maij.

CCCXLI. Thlaspi.

Bavvrensensf. Genera varia sunt, eaque promiscue vsualia. Præferuntur tamen aruensia.

Nomen Thlaspi Botanici fere omnibus vulgare est.

Nascitur in locis incultis, saxosis, apricis, partietibus ac tectis. Floret Maio maturelci Iunio.

OFFICIN. NAT.

Semen & Herba.

Vires. Calf. & sicc. 4. abstergit. Vfus precip. in internis abscessibus rumpendis, mensibus ciendis, Ischiaticis affectibus curandis. Extrinsecus abstergit ulcera quacunque manantia, insuperque ptarmicum est, sed minus vulgare.

N. Gravidis quia factum necat, infensum censetur.

CCCXLII. Teucrium.

Teucrium,

Teucrium, *Fuchf. Cord. in D. Lon. Lob. Cast. Teucrium 1. Tab. & C. B. 2. Matth. chamædrys 2. seu assurgens, Dod. Teucrium vulgare fruticans seu 1. Clus. hist. Teucri. latifolium, Ger. Germ. groß. Vathengel.*

Crescit locis herbosis asperis, aridis apricis: Floret Aprili, Maio.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus, vel & herba antequam flores eruperint collecta.

Vires. *Calf. & sicc. 2. Epatica est, saporis amari, viribus omnino conueniens cum chamædri.*

CCCXLIII. *Thymus.*

Thymus { 1. Vulgaris, folio tenuiore. *Hac vsualis.*
C.B. { 2. Vulgaris folio latiore.
3. Capitatus.
4. Inodorus.

Dicitur Thymus, *Brunf. Trag. Matthiol. Fuchf. Cord. hist. Lon. Thymus durior, Cam. nostras, Cord. in D. Scpillum hortense, Dod. alias Thymura. Arab. Hasce. Germ. Romischer, VVel-scher Quendel. Thymian.*

Crescit nostratibus in hortis: Floret Iulio.

OFFICIN. NAT.

Herba seu Folia & Semen.

Vires. *Calf. & sicc. 3. saporis subacris, atten. incidit, discutit. Vfus prap. in affectibus Tartareis. 1. Pulmonum, ut asthmate, tussi. 2. Artuum, ut podagra, omnia viscera reserat, appetitum excitat. Extrinsecus in tumoribus frigidis, sugillationibus, inflationibus ventris, doloribus arthriticis.*

PRÆPAR.

1. ▽. Ex herba cum floribus.
2. *Spiritus*

3. *Oleum stillat.*

CCCXLIV. *Thymiana.*

Thymiana (officinis corruptè Thymiana vel Thuris cortex, vel Thus Iudæorum, quod Iudæi in suffumigiis frequenter eo vtantur) corticosum quid est ex India allatum Videatur *Styrax rubra, Bellon. Nascaphtum, Cord. hist. Storax rubra officinarum. C. B. 3.*

Vires. *Constructionibus vulua ex suffitu prodest. Odoris incundi gratia & suffimentis immiscetur. Vide Thuris cortex. Class. 2.*

N. Sunt & qui Ammoniacum electum, Thymiana appellant.

CCCXLV. *Tilia.*

Tilia, Lin- { Mas & sterilis. *Hac nobis*
denbaum, { inusitata.
Fœmina flores ac semen proferens.

Dicitur Tilia fœmina, *Brunf. Matthiol. Fuchf. Lob. Tab. Tilia, Lon. Dob. fatiua, Trag. Phyllirea, Cast. Tilia fœmina fol. maiori, G B. 5.*

N. Est & folio minori Talia s. lucifris, Trago, quæ priori per omnia similis, nisi quod sit minor & nigrior.

OFFICIN. NAT.

Flores, Folia, Cortex Semen, Lignum Vires. Flores *calf. & sicc. partium tenuium, discut. cephalici sunt. Vfus prap. in Epilepsia, Apoplexia, Vertigine. Folia ac Cortex siccant, repellunt, urinam ac menses cient. Extrinsecus ambustis subueniunt (mucilago scil. extracta ac iuncta.)*

Semen fluxionibus quibuscunque medetur, etiam hemorrhagia narium, (na-

ribus (scilicet inditum.)

Lignum in titiones + i aspersione redactum sanguinem coagulatum fortiter resoluit.

Extrinfecus adhibentur folia in aphthis ac tumoribus pedum discutiendis: corticis mucilago in ambustis ac vulneribus magni est solaminis.

N. Humor defluens è medulla dissesta rilia, capillorum defluuiio succurrit.

PREPAR.

1. ∇stillat. Ex floribus.

2. Conseru.

CCCXLVI. Tormentilla.

Tormentilla } 1. Syluestris. Hac vsua-
C.B. } lis.
 } 2. Alpina } maior.
 } folio sericeo.

Appellatur Tormentilla, Brunf. Matth. Dod. Cord. Lon. Lob. Cast. Tab. (cui consolida rubra,) Ger. Heptaphyllum, Fusch. German. Tormentill, Heitzvurtz, Blatvurtz, roth Guntzelroth Heilvurtz, Ruhrvurtz.

N. Sunt qui $\chi\sigma\upsilon\sigma\beta\upsilon\upsilon\upsilon$ Dioscor. esse velint.

Crescit passim in herbosis ac arenosis locis: Florere incipit Majo.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Siccatur sine insigni caliditate, astringit vulneraria, diaphoretica ac alexipharmaca est. Vsus pracip. in peste, morbisque ceteris malignis imprimis si cum fluxu alui coniuncti sint, in catarrhis exiccandis, in lue venerea, in veneno hausto, in vulneribus. Summatim non est vegetabile, quod in fluxionibus quibuscunque (alui, uteri) vsu-rius sit, quam hac tormentilla radix,

Extrinfecus iisdem adhibetur variis in affectibus. in vomitu, vulneribus, & sim.

PREPARATA.

1. ∇stillat. Ex herba tota cum floribus collecta Maio.

CCCLVII. Trichomanes.

$\tau\rho\iota\chi\mu\alpha\nu\epsilon\varsigma$, seu Polytrichum officinarum, C.B. Trichom Trag. Matth. Fusch. Dod. Cord. hist. Lob. Cast. Cam. Trichom. mas, Tab Ger. Adiantum rubrū, Lon. Polytrichum vulgo Cesp. aliàs capillaris Filicula, Germ. Vidertodr.

N. C. B. Ex Tabern. diuersa genera refert, verum promiscue singula in usum accersi possunt.

Prouenit locis humidis iuxta aquas in vetuistis parietibus ac muris. Virescit perpetuo, sterileque est.

OFFICIN. NAT.

Flores seu herba integra.

Vires. Adianto (capillo Qis ut & Ruta muraria) facultatibus omnibus respondet, ideoque eo recurrendum. Peculiariter tamen monet Tabern. quod ∇stillat, inprimis proficua sit iis, quibus Iecur putrescere incipit.

CCCXLVIII. Trifolium.

Trifolij quamplurima passim occurrunt genera, nimirum plantæ quæcunque foliis ternis germinantes hoc sibi met nominis iure natiuo vendicant. Ex omnibus tamen, non nisi species paucas Officinis inferuire comperimus: hæ sunt.

Trifol. { Acetosum. Vide Acetosella.
 { Aureum. Vide Epatica nobilis.
 { Odoratum. Vide Lotus & melilotus.

CCCXLIX.

CCCXLIX. *Triticum.*

Triticum nobis vſitatus eſt duplex, hibernum & æſtium.

1. Dicitur hybernum ariſtis carens, *C.B. 1. Matth. Triticum, Brunf. Cord. b. Dod. Tab. Trit. 1. genus, Trag. Fuchſ. Lon. Siligo ſpica muticâ, Lob. Trit. ſpica mutica, Ger. Tups, Robus, Arab. Henta, Henca, Hantha, Germ. VVeit, VVinterweitze.*

2. Appellatur Triticum æſtium, tri-meſtre Setanium, *Galeno. German. Commerweitze.*

Eſt & triticum terreſtre, *Cord. aliàs Zea amilea, vel Zoopyrum amyleum, C.B. 3. Trit. 2. Trag. Trit. amyleum, Tab.*

O F F I C I N. N A T.

Semen eiſque Farina & Furfures.

Vires. Moderatè caſſac emollit, maturat, diſcutit, internus eiſus cibarius eſt, multum enim ac bonum nutrimentum ſupeditat, incrāſſat & obſtruit. Extrinſecus adhibetur (farina in tumoribus molliendis, leniendis, &c. in oculorum inflammationibus & fluxionibus) (cataplaſmatis forma impoſita) in Eryſipelate, podagricisque doloribus leniendis (ſicca farina impoſita.)

Furfures abſtergunt ſquamulas capitis, leniunt dolores, (in cataplaſ. vel ſacculis.)

Triticum tri-meſtre inferuit amylo conficiendo,

P R Æ P A R A T A.

1. ▽ *Stillat. Ex pane in MB.*

Vires. Siſtit fluxus alui in infantibus, &c.

2. *Oleum Tritic.* Parari poteſt deſtillando per deſcenſum, ex tritico contuſo, ſed inuſitatum eſt.

N. *Alij extendunt triticum contu-*

ſum ſuper laminam ignitam, vel torrent in ſartagine ac exprimunt.

CCCL. *Tuſſilago.*

Tuſſilago { Vulgaris. *Hæc vſualis.*
 { rotundifolia,
 { glabra.
 { Alpina { rotundifolia ca-
 { neſcens,
 { folio oblongo.

Dicitur *βίχιν, Dioſc. Cord. hiſt. Vn- gula Caballina, Brunf. Trag. Tuſſilago, (Bechium,) Matth. Fuchſ. Cord. in D. Lon. Dod. Lob. Caſt. Vulgaris Cam. aliis Farfara, Farfarella Germ. Hufflattiſch, Brandtlattiſch, Roſzhub.*

Nāſcitur in amœnis ac riguis locis crepidinesque fluminum amat: Floret Martio.

N. Dicitur & filius ante patrem, quia Februario & Martio foliis nondum egreſſis, repente floret, floresque fugaciſſimos ultra biduum fere cum caule non perſtantes proſert.

O F F I C I N. N A T.

Folia, Radix.

Vires. Radices & Folia virentia temperatis proxima ſunt, (al. refr.) ſiccata verò modicè acria & calida euadunt. Planta eſt thoracica. Vſus præcip. internè in tuſſi) unde & nomen habet) orthopnaea, vomiciſque peſtoris, quibus ſingulis & ſumus eiſore hiantè attractus mederi creditur. Extrinſecus proſunt vlceribus calidis & inflammationibus (folia recentia impoſita.)

P R Æ P A R A T.

1. *Syr. de farfara*, è ſucco foliorum.

2. *Conſerva*, è flor.

3. ▽ *Stillat.* è foliis.

4. *Succus* 9. di-bus bibitus quarta-

E E e e 3 nam

4. *Succus* 9. diebus bibitus quartanam tollere dicitur.

V.

CCCLI. *Valeriana.*

Valerianaæ { Hortensis.
vfuales } Sylvestris { Major.
funt } Minor.

Hortensis insignitur, Phu magnum. *Fuchf. Matth. Lon.* maius, *Matth. Corb. hist.* verum, *Cord. in D.* Ponticum, *Tab. Valeriana* vera, nardus agrestis, *Trag. Valer. major, Lob. Cam.* *Valer. hortensis, Dod. Ger. C. B. 1.* (cui & Phu folio olusatri Dioscoridis) *Carpesium, Cast. Terdina Paracelso, grosz Baldrian, grosz Barten Baldrian.*

Sylvestris major, *C. B. 4.* Dicitur Phu similitudine Elaphobosci Dioscoridi, *valeriana Brunf. vulgaris, Trag. Cord. in D. Sylvestris, Lob. Dod. Cam. Clus. hist. maior, Tab. Phu paruum, Matth. Cast. Phu Diosc. Brunf. vulgare, Fuchf. Tab. Phu Germanicum, Fuchf. grosz vuild Baldrian.*

Minor appellatur *Valeriana palustris* (sylvestris) minor, *C. B. Valeriana exigua vel 4. Trag. Valer. minor, sylvestr. Lob. minima, Dod. sylvestr. seu palustris minor, Cam. Phu minus, Lon. Tab. minimum, Matth. Cast. Cam. (Epit.) klein Baldrian.*

Phu verum colitur nobis in hortis, in Ponto & Creta sponte prouenit, nasciturque in pratis, aliisque locis humidis: minus, in campestribus vdis: Florent Majo, Iunio ac Iulio.

Optima censetur hortensis, cui succedit minor, ac demum maior.

OFFICIN. NAT.

Radix præcipue, tum & Herba Phu veri.

Vires. *Calf. & sicc. 2. atten.* aperiunt alexipharmaca, sudorifera ac diuretica sunt. *Vfus præcip. in imbecillitate visus, peste, asthma, pleritide, obstruct. Epatis, Lienis. Vreterum, Hernia, Ictero, & sim.* Extrinsecus confortant visum, maculas oculorum abstergunt, cephalagiam sedant, menses cient, sudorem promouent (in balneis) exiccant catarrhos (suffitu) bubonum ac anthracum malignitatem corrigunt, globulos sagittæ sue infixas extrahunt, ulcera inveterata mundificant.

N. Sunt qui radicem pro amuleto febris quotidianæ habent, eamque de collo suspendunt.

PRÆPAR.

1. ▽. Ex integra planta (radice, caule ac foliis) in fine Maij.

2. *Extract.* Itidem ex integra planta vel radice sola paratur.

CCCLII. *Verbasum.*

☉, Candelaria, Candela regis, Lanaria, *VVullkraut, Rertzenkraut, Brennkraut, Himmelbrand, Vnholdenkertzen, Rænisgkertzen.*

Verbasum
C. B. {
 { Album { mas { latifolium luteum, C. B. 1.
 { { { angustifolium pallidum, 2.
 { { { flore luteo magno, 3.
 { { { flore albo, 4.
 { { { lychnitis flore albo paruo.
 { Nigrum { fol papau. corniculati.
 { { flore ex luteo purpurascete.
 { Salui folium. Hoc singulate & rarum speciebus, 4.

Ex his vsualiora sunt: Verbasum mas latifolium luteum, cuius Vicarium est, Verbasum fœmina flore luteo.

Prius insignitur Verbasum, Matth. Cord. in D. Verbasum mas, Lob. Cast. Tab. Verbasum candidum mas, Lon. Verbasum latius, Dod. Tapfus barbatus, Ger.

Posterius, Verbasum seu candelaregia, Trag. Verbasum nigrum, Fuchf. Lon. Verbasum maximum album fœmina flore subpallido, Lob. Verbasum luteum, Tab. Verbasum lychnite minus, Ger.

Crescunt locis arenosis: Florent Iunio.

OFFICIN. NAT.

Folia. Flores, Radix, sed raro.

Vires. Calf. moderate ac sicc. emoll. discut. dolores lenit. Vfus precip. in morbis pectoris, tussi, expuitione sanguinolenta, torminibus ventris,

N. Radix hamorrhoidum fluxum & dolorem sistere dicitur (dieb. 9. vel 10. continuè assumpta.

Extrinsecus sunt flores ac folia precipue estimationis, in sopiendis doloribus quibuscunque & imprimis in affectibus ac tumoribus ani (hamorrhoidibus:) in capillis luteo colore tingendis.

PRÆPAR.

1. ▽ stillat. Ex floribus.

2. Oleum. Ex infusione iterata flor. in ol. oliu.

N. Matthiolum oleum parat ex flori-

bus solis, quibus vitrum repletum, bene- que obturatum exponit soli, quæ ratione flore aliquatenus liquefcunt.

CCCLIII. Verbenæ

Peristereum, Verbenaca, Verbenæ. Arab. Beneran, Albea, &c. Cisenkrant, Fisenrich, Fisenhart, Danbenkrant.

Verbenæ { 1. Communis. Hac. vsualis.
 { 2. Tenuifolia Verbenaca
 { supina, Tab.
 { 3. Fœmina V. Erysimon.

Dicitur Verbenæ, Lon. recta, Trag. mascula, Brunf. communis & sacra recta, Lob. Verbenaca, Matth. Cast. supina (& fœmina,) Fuchf. Cord. in D. recta, Dod. Tab. fœmina, Cam. vulgaris, Clus. hist. al. Columbaris. Verbenaca communis caruleo flore, C. B. 1.

Crescit passim iuxta muros & vias: Floret Iulio ac Augusto.

OFFICIN. NAT.

Herba seu Folia.

Vires. Calfac. & sicc. saporis amari, astring. Cephalica ac vulneraria est. Vfus precip. in dolore, aliisque affectibus capitis (à frigidis humoribus) in affectibus oculorum, pectoris, in tussi in veterata, in obstruct. Epatis ac Lienis, Ictera, torminibus ventris, dysenteria, imprimis atterit ac expellit calculum, libidinem coerçet, febrim tertianam fugat, arthritidem mitigat, vulnera sanat, partum

FFF facilitat

facilitat. Extrinsecus in cephalalgia, odontalgia, alopecia, melancholia, in oculorum lippitudine, imbecillitate, rubore, in Angina, in ramedine (collo circum plasmatisata) in tumore glandularum, in faucibus (gargaris.) in dolore Lienis (cum axung. porci.) ac podagrico mitigando, in vulneribus astringendis ac putridis abstergendis, in procedentia ani, in mariscis, &c.

N. 1. Sunt qui febrim tertianā ac quartanam peculiari modo eā curant. Nimirum in tertiana recipiunt geniculum tertium (à terra) idque sursum decerptum propinquant in quartana quartum.

N. 2. Amuletice strumam verbenā curari, sunt qui statuunt. Modum Marcellus Empyricus edocet: Radicē transversim in partes duas inbet dividere, inferiorem suspendere de collo, superiorem in fumo. Sic arescente parte superiore & strumā arescere ait. N. Quod si utraque pars p. stmodum in fluentem coniiciatur, malum recrudescere idem asserit.

N. 3. In dolore capitis sedandō quantum valeat si de collo suspendatur, videre licet apud Forest. lib. 9. observ. 52.

PRÆPAR.

1. ▽ stillat. Ex herba cum floribus æstate collectis.

2. Est & Unguentum de Verbena, aliàs Unguentum Iouis dictum. Vide August.

CCCLIV. Vermicularis.

Sedum minimum, Tab. 3. Fuchsf. Sedum minus 3 & Vermicularis, Trag. Lob. 3. Matth. Cast. Semper vivum minimum, Illecebra s. Semper vivum, 3. Dod. Lon. 3. Dioscor. 4. acre, Cord. hist. Portulaca 3. Brunf. Vermicularis siue Illecebra, Ger. German.

Mauwpfeffer, klein Hauszvurtz.

Crescit in muris, locisque arenosis. Floret maximè æstate integra.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus.

Vires. Calf. & sicc. validè, saporis acerr. bilemper vomitum insigniter educit. Unde usus præcip. in febribus. Extrinsecus in laxitate dentium (quorum signaturam refert) ac putredine gingivarum scorbutica (gargarism.) rubificat, Vesicatoria est, strumas discutit.

N. Sunt qui pro amuleto febrili 9. de collo suspendunt.

CCCLV. Veronica.

Fhrenpreis, Grundheil.

Veronica C.D.	{	Mas {	1. Erecta.
			2. Supina & vulgarissima. Hæc usualis.
		{	latifolia,
			angustifolia.
		minor.	
	{	Fœmina seu pratensis serpyllifolia.	

Insignitur Teucrium, Trag. Veronica, Tab. Veronica mas, Fuchsf. Lon. Veronica mas serpens, Dod. Veronica vera & maior, Lob. (cui & maior, septentrionalium.) Cam. Ger. Veronica vulgaris supina, Clus. hist.

Crescit in Dumetis. Floret Iunio, floribusque est subcartuleis, rarius candidis.

Eligenda quæ circa quercuum radices nascitur.

OFFICIN. NAT.

Folia, Flores.

Vires. Calfac. & sicc. saporis amari & astringentis, incidit, vulneraria insignis ac sudorifera est. Usus præcip. in erosione ac obstructione Pulmonum, Lie-

nis, hinc & imprimis in colica, Phthi-
scabie, pruritu, peste, vulneribus, &c.
Extrinfecus famosissima est in vulneri-
bus abstergendis, astringendis, in duritie
Lienis, in colica (clysmat.)

1. Conseru. ex summit.

2. ▽. stillat. Ex herba cum incipit
Horere.

3. Syr. Ex succo & saccharo.

4. Sal. Ex cinere.

C C C L V I. Victorialis.

Mas longa. Hæc vsualis.

{ Fœmina; est species glandioli, C. B. 3.

Appellatur. Allium montanum,
latifolium maculatum, C. B. 9. (inter
allia.) Allium alpinum, Tab. (cui &
Victorialis mas.) Allium anguinum,
Matth. Cam. Porta, Serpentinum,
Cast. Ophioscoridon, Lob. Victorialis
longa, Clus. (cui & maior.) German.
Siegvurtz.

Crescit in alpihus: Floret cum aliis
speciebus allij.

O F F I C I N. N A T.

Radix crinita.

Vires. Calf. & sicc. perinde ac allium
agreste, cui & in facultatibus aliis per
omnia similis existit.

N. Plebi nostrati, Iudæisque amule-
tum est familiarissimum, quo à spectris
aëreque infecto se tutos fore persuasi sūt.

C C C L V I I. Vinca.

Κιννάδης σαφεινός, Singrün, In-
grün.

Clematis Da- { 1. Minor. Hæc vsualis.
phnoides, { 2. Maior.
C. B. { 3. Flore pleno.

Nominatur Vinca peruinca, Brunf.
Lob. Tab. peruinca, Trag. clematis,

Matth. Cord. in D. Clem. Daphnoides,
Dod. Fuchf. Lob. Cam. Tab. Clus. h.

Solo gaudet fœcundo: Floret Apri-
li, Maio, viret semper. Flores cærulei
sunt, quandoque candidi, rarius ruben-
tes vel subpurpurascens.

O F F I C I N. N A T.

Folia.

Vires. Refrig. sicc. & astringit (Dodo-
neo calfacit 1. sic. amplius.) Vulneraria
insignis est. Vsus præcip. in fluxionibus
alni, dysenteria, hæmorrhoidibus, Expui-
tione sanguinis, vulneribus, seroso liquore
manantibus. Extrinfecus in profluvio
mensium, narium, in laxitate & dolore
dentium: lac extinctum renocat.

N. Adhibetur quoque ad profligan-
dos morbos incantatione introductos (in
lotionibus, &c.)

P R Æ P A R.

▽ stillat. Ex Radice foliis ac flori-
bus principio veris collectis.

C C C L V I I I. Vinceto-
xicum.

Ἀσκληπίας, Dioscor. Hirundinaria
Schvvalbenvurtz.

1. albo flore & Gerard.
Hæc vsualis.
Asclepias { 2. nigro flore } minus
C. B. { 3. Cretica } vsualis.
{ 4. Virginea }

Insignitur Hirundinaria, Brunf.
Trag. Lon. Vincetoxicum, Matth. Dod.
Cast. Asclepias, Fuchf. Cord. hist. Lob.
Tab. Cam.

Crescit in syluis, locisque petro-
sis atque arenosis: Floret Iulio ac
Augusto.

O F F I C I N. N A T.

Radix, raro Semen.

Vires. Calfacit atque sicc. moderatè,
FFff 2 atten.

atten. alexipharmaca ac sudorifera est insignis. *V*sus precipui in peste, aliisque venerosis affectibus, in obstructionibus mensium, in palpitatione cordis, ac lipothymia, in Hydropse. Semen commendatur ad calculum. Extrinsicus *v*sus tam florum, quam radicum ac seminis est in ulceribus sordidis ac malignis purificandis, ad ictus insector. venenator. in ulceribus mammarum, &c.

Dosis rad. ʒj.

PRÆPARATA.

1. ▽. Ex integra planta.
2. Extract. cum S.V.

CCCXLIX. Viola purpurea.

Ex variis violarum classibus, quæ apud Botanicos occurrunt, tres officinis potissimum considerandæ veniunt. Viola purpurea Martia, de qua hîc. Viola lutea, de qua in Cheiri, ac Viola tricolor, de qua in Iacea.

E violis purpureis martiis inferuntur in officinas odoratæ, neglectis in odoris.

Insignitur Viola, *Lon.* Viola fatiua, *Brunf.* Viola Martia odorata nigra seu purpurea, *Trag.* Viola purpurea, *Fuchf. Matth. Cast.* Viola nigra, *Dod. Cord. in D. Ger. Clus. hist.* Viola martia purpurea, *Tab.* Viola præcox, *Lob.* Viola martia purpurea flore simplici odoro, *C. B.* 1. aliis violaria, German. *Biolen. Kraut, Beilkraut, braune Biolen, Mertz. Biöl.*

Eligatur odora.

Solo gaudet umbroso ac aspero, iuxta vias, sepes & muros, &c. Floret circiter finem Martij ac initium Aprilis.

OFFICIN. NAT.

Flores, Folia, Semen.

Vires. *Violaria* (precipue flos (refrig.

1. hum. 2. (flores exiccati refrigerant imbecillius siccatque) emollit, laxat, cordialis est ac pectoralis, expectorationem promouet. *V*sus precipui ac creberrimi in bile, precipue atra mitiganda, in feruore febrium compefciendo, doloreque capitis inde nato, in tussi, asperitate gutturis, catarrhis acribus, pleuritide, &c.

N. 1. Flores alium leniter subducunt. Extrinsicus adhibetur herba crebrò in lotionibus, cataplasmatibus, clysteribus, & sim.

Seminis *v*sus rarus est, isque in obstructione Renum, ubi emulsioni potissimum inferuit, de qua nota, quod plerumque vomitum ac secessum moneat.

Dosis ʒss. ad ʒj.

N. Flores locum sibi vendicant inter flores illos cordiales famosos.

PRÆPARATA.

1. Syrupus violar. solutivus. Ex multip. infusione florum recentium in ▽. Vires. Ex viribus supra enumeratis, maximè lenit alium.

Dosis ʒij. ad iij.

2. Syrupus ex succo violar. (Syrupus violar. simpliciter dictus.)

3. Syrupus violarum compositus *Mesua.* Ex decoct. flor. ʒj. sem. Cidon. Maluæ, iuiub. sebest. añ. N. xx. in ▽ cucurb. ft. vj.

Syrupus violatus regius, i. e. Iulep. violar. ex ▽ flor. & sacchar.

5. Conseru. Ex floribus selectis à parte herbacea (alabastris.)

6. Acetum. Ex infusione florum.

7. Oleum. Ex floribus infusis in oleo omphacino.

8. ▽ stillat. Ex floribus.

9. E tota herba.

10. Tinctura. R. flores. macera in propria ▽, leuiter exprime & cola.

N. Addi hic potest spir. *Di ut in Tinctura*

Tinctura Rosarum Blüchradt: verum vereor, ne color inde mutetur, quod tamen viribus nihil derogat.

N. 2. *Elegantur quoque violarum Tinctura conficitur, si flores phlegmate* $\textcircled{\text{D}}$ i. (N. pluries, 8. vel 9. super $\textcircled{\text{C}}$ cohobato) irrorantur, digeruntur ac exprimuntur.

11. *Extractum*. Ex succo lentissimo igne inspissato.

Rz. Flor. violar. lbß. inde cucurbitæ etiam sine conquassatione, affusaque ∇ æ lbj pone in MB tepidum, vt coloretur: exprime ac procede vt moris: nimirum expressum succum novis floribus affunde, macera, exprime, inspissa.

Dosis ʒj. Sala.

N. 1. *Gemmas integras non reiectis alabastris* ((foliis exterioribus (adhibere licet. 2. Et si color ultra semestre spacium non durat, nihil tamen inde viribus decedit. 3. Si ex floribus exiccatis idem conficere volueris, ad eundem illum modum id præstare poteris, præterquam quod maior aqua copia requiratur.

12. *Trochisci*. Vide Disp.

CCCLX. Vitis.

Ἀμπέλος δινοκόρος, Vitis Vinifera. Arab. Harin. *VVeinstock*, *VVeinreb*.

Loca amat aprica: Flore Iunio.

OFFICIN. NAT.

Folia, quibus adiungi poterit *Succus* (lacryma) ex amputatis palmitibus extillans, sic & *Vinum*, *Omphacium*, *Tartarus*, *Vua*, *Acini* vuarum *Vua passa*, *Vinacea*, quippe hæc omnia absque operatione officinali suppetunt.

Vires. *Folia* (pampini) capreolique refrigerant, astringunt valide. *Vsus* præcip. in dysenteria, vomitu, pica, expuitione sanguinis aliisque hæmorrhagiis si-

stendis; (succus expressus assumitur.) Extrinsecus refrigerant ac leniunt capitis dolores ac astum, conciliant somnum in lotionibus pedum, vt & ipsi capiti adhibita.

Succus ex amputatis palmitibus extillans. (*Aqua vitis*, *Lachryma Vitis*.) Intrinsecus vim habere creditur atterendi & expellendi calculum: oculorum caligini medetur ac rubodini, (oculis instillata) imperigines sanat, si locus affectus nitro antea fricatus, ea lauetur.

N. *De Vino Omphacio*, aceto ac Tartaro vide suis locis infra.

Vua immatura, (Agrestæ.) Refrigerant & siccant, astringunt. Proin poterit esse vsus earum in febribus ardentibus, excitant scil. appetitum, fluxum ventris sedant, ast sanguinem indigestum procreant. Vide etiam omphacium.

Vua matura. *Calfac.* & *hum.* 1. recenter deglutita generant inflationes & cruditates ventriculi, diarrhaam, & sim. magis tamen id faciunt albescentes, minus rufescentes. Exiccata vua ventriculo commodiores sunt, appetitumque excitant, aluum laxant.

Vua passa sunt vua matura vi caloris exiccata, siua calore solis exiccatio illa peracta sit, vnde passula dulciores resultant: siue calore clibani, vnde dulcoacida. Prostant vuarum passularum potissimum genera tria. Passula scil. maxima, seu Damascenæ Zibebæ dictæ. 2. Passula maiores Germanicæ *Rosinlein*, è quibus sunt, quas vuas Massilioticas vocant Germ. *blauv Rosinen* 3. Passula minores seu Corinthiacæ, *kleine Rosinlein*, *Corinthen*.

Vires. Omnes calide sunt seu temperata, leniunt, aluum laxant, acrimoniam hebetant, ventriculo, pulmonibus ac Epatici grata sunt, rissim mitigant. Zibebæ

dicta exemptis acinis, (gigartis) in
 ▽ fontan. vel stillat. conuenienti infu-
 se, potum agrotis exhibent sat gratum
 siueque conuenientem. Acini vim habent
 astringentiam, conueniuntque in vomitu,
 aluique fluxu, siue intrinsecus, siue ex-
 trinsecus adhibeantur (torrentur scil. ac-
 teruntur.)

Vinacea, i. e. siliqua cum acinis in
 expressione musti residua, magnarum
 virium perhibentur in arthriticis dolo-
 ribus sedandis. Si membrum affectum
 Vinaceis per se calefcentibus imponatur.

PRÆPARAT.

1. Corvis sarmentor.

Vires. Adhibetur ad cauteria, & fur-
 cures capitis extergendos.

2. Loch passulatum. Vid. l. 2.

3. Mel passulatum. Vid. l. 2.

4. Condit. passula laxatiua. V. A.

CCCLXI. Virga aurea.

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| Virga au-
rea C. B.
est | { | 1. V. A. maior seu Doria. |
| | | 2. V. A. latifolia ferrata.
Huius loci. |
| | | 3. V. A. angustifolia ferra-
ta. Hæc & sarracenica
dicitur. |
| | | 4. V. A. angustifol. minus
ferrata. Hæc Serrata
surrogari apta est. |

Secunda dicitur Virga aurea, Cam.
 Epit. Ger. V. A. ferratis foliis, Tab. V.
 A. altera ferrato folio, Lob. V. A. mar-
 gine crenato, Dod. V. A. minor laci-
 niatis foliis, Cam. Germ. gulde WWund-
 kraut, ein ander Heydnisch WWundkraut.

Quarta dicitur V. A. Matth. Dod.
 Lon. Cap. Villanouani, Lob. V. A. foliis
 non ferratis Cam. Epit. V. A. maior, an-
 gustifolia, Cam. Symphytum petrarum
 3. Tab.

Crescit angustifolia vt plurimum

in syluis: latifolia in collibus, agrorum-
 que marginibus & vineis. Floret Iulio
 & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Folia & Flores.

Vires. Viraque calf. & sicc. 2. astringit,
 vulneraria est celeberrima, intrin-
 secus & extrinsecus adhibita, nec non
 & lithonriptica diureticaque non è po-
 stremis. Confert itidem diarrhææ & dy-
 senteria, sanguinis exspuitioni medetur,
 mucilaginem Renum & Vreterum effi-
 caciter abstergit, puredinem gingiua-
 rum, dentiumque vacillationem curat.

PRÆPARATA.

▽ stillat. Ex herba cum flor. Iulio &
 Augusto collecta.

CCCLXII. Virga aurea, alias
 consolida Sarracenica.

Solidago Sarracenica. Trag. Fuchs.
 Dod. Lon. Lob. Consolida aurea, Tab.
 Herba Doria, Ger. icon. Virga aurea
 angustifolia ferrata, C. B. 5. Heydnisch
 WWundkraut.

Crescit in locis montanis, sed ma-
 gis vdis & depressis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Astringit amara est siccaturque
 euidentissime, vulneraria est insignis usu
 interno & externo adhiberi apta, mede-
 tur & fistulis, vulcera maligna mundifi-
 cat ac sanat.

CCCLXIII. Vlmaria.

Barba Caprina 1. Lon. Barbi Capra,
 Lob. Barbula Caprina 1. Trag. Mede-
 fusium, Cord. hist. Regina prati, Dod.
 Ger. Vlmaria, Clus. Tab. Barba ca-
 præ floribus compactis, C. B. 2. Germ.
 Geisblat.

Geisblat.

Crescit locis vdis iuxta flumina, & sim. Floret Iunio, Iulio.

OFFICIN. NAT.

Folia cum floribus & nonnunquam radix.

Vires. Refrig. siccatur, astringit, sudorifera & alexipharmaca est, proinvenit in fluxibus omnis generis, in diarrhaa, dysenteria, fluxu menstruo nec non in exspuitione sanguinis, resistit pesti. Extrinsecus sunt, qui radicem recentem contusam vulneribus imponunt, tum ad sistendum sanguinem, tum ad consolidanda vulnera.

P R A E P A R.

1. ∇ stillat. Ex foliis cum floribus.
2. Extract. Quod admodum Quercetano probatur in peste. Ph. Res. cap. 26.

CCCLXIV. *Vrtica.*

Αράχνη
Vrtica
C. B.

{

Vrens {
Maxima }
Minor }
Romana }
Fatua est Cannabis sylvestris.
Mortua, vide infra.

Ha v-
suales.

Maxima dicitur *Vrtica* major, *Brunf. Fuchf. Lon. Tab. Vrtica vulgaris Vrens*, 1. *Trag Vrtic.* 2. *Math. Cast. Vrtica*, *Cord. in D Vrt. vrens*, *Ger. Vrt. vrens altera*, *Dod. Vrt. sylvestris asperior*, *Lob. Vrt. communis seu maior & foemina*, *Lob. Vrtica vrens maxima*, *C. B. I. Germ. grosse heisse Brennessel*.

Minor insignitur *Vrtica* minor, *Brunf. Fuchf. Cord. hist. Lon. Tab. Ger. Vrtic.* 3. *Trag. Math. Cast. Vrtica vrens minima*, *Dod. Vrtica minor*

acrior, *Lob Vrtica vrens minor*, *C. B. 3. heiter Nessel*.

Romana dicitur: *Vrtica* legitima, *Clus. hist. Vrt. Rom. Trag. Fuchf. Mat. thol. Romana vel mascula*, *Lob. Cam. Tab. Ger. Vrt. 1. Datth. Cast. Vrtica vrens*, 1. *Dod. Germ. Römische VVelsche Nessel*.

1. & 2. Crescunt passim locis arenosis iuxta sepes ac muros, &c. Prior potissimum sylvas amat. 3. colitur in hortis. Omnes vident ætate.

OFFICIN. NAT.

Vrtica maximæ Radix, Semen) Iulio & Austusto colligendum,) Folia, minor. *Herba, Romanæ, Semen*.

Vires. *Vrtica* omnis calf. moderatè & sicc. 2. partium tenuium est, aperit, incidit, absterg. emollit, diuretica est, & lithotripica, peculiariterque cicuta adversatur, ut & *Hyoscyamo*. Radix (*vrtica maxima*) commendatur maximopere ad Icturum. *Herba* usus in gangrana (decocta & propinata.) Eadem in olere sumpta soluit aluum, abstergit Renes, calculos expellit, expectorationem, morbillorumque eruptionem promouet. Semen (*Romane*.) Usus crebri est in Pulmonum affectibus, asthmate, tussi contumaci, pleuritide, peripneumonia. Extrinsecus reprimat *vrtica* unam inflammata (in gargaris.) sedat hæmorrhagiam narium (*vrtica minor* scilicet contusa vel & succus eius expressus naribus inditus,) gangranam mundis. cat.

N. 1. Nouerunt & Chirurgi vrentis *vrtica* fricatu sanguinem allicere, adeoque atrophiam subuenire.

N. 2. Prurigini ab *vrtica* introducta medetur oleum olinarum.

CCCLXV.

CCCLXV. *Vrtica mortua seu Galiopsis.*

Varia genera & vrticæ mortuæ passim obseruantur, colore, odore, figura, & sim. differentia. Datur fœtida & non fœtida: maculata & non maculata: flore purpureo, albo, luteo. Primas autem præcæteris dant fœtidæ ac præcipue maculatæ, quam genuinam suspicantur Galiopsin Dioscoridis, ex lacteo scil. ductu, qui folia media in longum interfecat. Huic surrogari tamen non nequit & fœtida non maculata.

Maculata insignitur Lamium alba linea notatum, C. B. 5. Vrtica lactea, Matth. Galiopsis Dioscoridis, Cam. Milzadella vulgo seu Lienaria (quod lieni conueniat.)

Non maculata est, quæ inscribitur Lamium purpureum fœtidum folio subrotundo, seu Galeopsis Dioscoridis, C. B. 1. Vrtica labeo mas, Brunf. Lamium, Trag. (vel vrtica 8. 9. 10.). Fuchf. Galeopsis, Cord. hist. Lon. 2. Tab. purpurea, Cast. Vrtica iners altera, Dod. non mordax, Lob.

Crescunt iuxta sepes, parietes, vias, in ruderibus, &c. magna ex parte tota æstate florent.

OFFICIN. NAT.

Herba cum floribus.

Vires, Calfac. & siccac. præcipue commendatur Galiopsis fl. purpureo ad dysenteriam (decoctum propinatum) flores albi ad fluorem album specificè celebrantur. Extrinsecus medetur vrticapano, &c.

PRÆPARATÁ.

Conserua. Ex floribus albis.

CCCLXVI. *Zedoaria.*

Zedoaria	$\left\{ \begin{array}{l} 1. \text{longa} \\ 2. \text{rotunda} \\ 3. \text{tuberosa} \\ 4. \text{Geiduar} \end{array} \right\}$	Hæc promiscua vsuales,
Zurver,		$\left\{ \begin{array}{l} \text{nigricans} \\ \text{inuitata,} \end{array} \right\}$
C. B.		

1. Insignitur Zedoaria, Lon. Matth. Lob. Zed. radice longa, Clus. in Carol. Zedoaria & veterum Arnabi, 2. species radice longa, Cord. hist. C. B. Zadura, Zaduvar, Zudar, &c. Fuchf. in comp. med.

2. Dicitur Zerumbet Serapionis, Lob. Zurumbethum, Cord. hist. Zerumbeth & Zedoaria rotunda, Fuchf. comp.

N. 1. Datas has Zedoarias non disferre inter se, nisi sola forma, adeoque eiusdem radicis partes esse, videre licet apud Lobelium in aduers. & obseru.

N. 2. Tabernamontanus & Matthiolum Zedoariam Auicenna nihil aliud esse, quam Antorum modernorum, probare nituntur, Dodonæus Zodoariam officinarum pro Zerumbeth Auicenna & Serapionis, habet.

Aduchitur è Sinarum regione & ab extremis Indiæ finibus.

OFFICIN. NAT.

Radix sola.

Eligitur odorata, albida, amara, ponderosa, non cariola.

Vires. Calfac. & sicc. 2. incid. flatu discutit, amarissimè est saporis ac alexipharmaca. Vfus præcip. in doloribus colicis atque ventriculi: animalium venenatorum morsibus opitulatur, lienteriam sistit, vomitiones reprimunt, menses ciunt, suffocationi vteri efficaciter succurrit, aluit ineas quascunque enecat, antidotis permiscetur.

PRÆPAR.

1. Condit. Zederia. Conditur vt Zinziber.

Zinziber.

2. *Confect.* Zedoaria. Fit l. comm.

3. *Extract.* Fit cum V.

N. Substitui poterit decoctum infissatum.

4. Oleum stillat. cum ∇ ascendit.

5. ∇ stillat.

6. Balsamus. Ex oleo & corpore olei nucistæ.

CCCLXVII. Zinziber.

Zingiber.

Ζιγγίβερ, Ζιγγίβερ, Τριγγίβερ, Zingiber, Lob. Monard. Zingiber & eius siliqua, Matth. Zinziber, Lon. Gingiber, Garz. ab H. Arab. Zingibel seu Lengibel, Germ. Imber, Ingber.

N. Reperiuntur apud Aromatarios radices albis & rubentes: hæ rubrica, illa sæpè creta infecta, quo a teredinibus quibus candidiores & molliores magis obnoxia præferuntur.

Aduenitur copiosum ex Calecut Indiæ Emporio, atque ex Troglodi-

tica Arabica.

Vires. Calfac. potenter, sed non primo statim occursu, adeoque partium est crassiorum, earumque non terrestrium, sed aquearum, & consequenter humectantum: aperit, incidit, attenuat. Confert ventriculo, thoraci, aliisque visceribus, appetitum prostratum excitat, putredini ac malignitati humorum resistit.

P R Æ P A R.

1. Zingiber in India seu China conditum. Conuehitur ad nos ex India; conditum sc. recenter saccharo, vel quodam mellis genere, quod quibusdam è siliquis exprimunt.

2. Conditum nostrate. Fit lege commun. Vide l. 2.

3. Confectio Zingiberis. Macera radices aliquandiu in ∇ vel lixiuio, postea fcinde in tenues & oblongas particulas, exiccaque: hinc confice l. c.

4. Zingiber laxatinum. V. August.

5. Spec. Dia Zingiber. V. Disp.

6. $\sigma\sigma$ stillat. Fit lege commun. V. l. 2.

C L A S S I S II.

De Alterantibus secundariis, quæ sunt Succis, Olea, Lachrymæ, Resinæ, Gummi Resinæ, Gummata.

CCCLXVIII. Acetum.

Acetum est liquor aciditate terrestriori ac fixiori (\oplus licam vocant) imprægnata.

Delectus. Acetorum maxima diuersitas est, variantque naturâ, viribus ac præstantiâ, pro varietate rerum ex quibus confecta ea sunt. Sunt enim aceta ex Vino, Cereuisia, ex succis fructuum

(pomaceis, pyraceis) ex melle, &c.

Vsitiora autem sunt vinacea, quæ recipienda quoties aceti simpliciter sit mentio.

Hæc itidem variantia occurrunt. (Etenim vt vinum differt præstantia, ita & aceta exinde confecta.) Eligantur igitur quæ ex meliori ac generosiore vino, vtpote omnium vegetabilium principe & maximè omnium vitriolato,

G G g g

confecta

confectasunt.

N. *Ad menstrua metallis soluendis destinanda, eligenda sunt inprimis aceta hydromelium vinosorum, utpote quae cum manna coelesti (melle) naturam animalem praefer vegetabilem ex floribus induerunt, atque ita alia menstrua soluendi potentia superant. Et haec sunt aceta illa Philosophis usitata, unde & philosophica dici solent, de quibus amplius in menstruorum descriptione, l. 2. c. 57. Vide etiam Quercet in Tetrad.*

N. *De reliquis acetis cerevisiarum succ. pomaceorum aut pyraceorum immaturorum, viliorumue vinorum, notetur, quod rerum metallicarum solutionibus minus sufficiant.*

Vires. Substantia acetum est mixta, frigida ac calida (superat tamen frigiditas caliditatem) in reliquis siccatur: partium est tenuium attenu. penetr. astring. putredini resistit, sudorem ciet.

N. *Acetum accedit proximè ad naturam D i, primasque tenet praeter ceteris correctivis, quorum opera gummi calfacientia, succine venenati corriguntur. Per se quoque singulare est remedium aduersus iectus serpentum, etiam venenatissimorum, quales sunt aspidēs. Quercet. in Pharm. rest. c. 24.*

PRÆPARATA.

I. ACETA DESTILLATA.

1. Acetum destillatum commune.

R. + fortissimum, destilletur ex cucurbita vitrea in B. M. vel cineribus leniss. calore: primo ascendit phlegma insipidum (fermè quarta pars liquoris,) quod phlegma ubi extillaverit, (acido odore & sapore idprehenderis) muta recipiens, colligèque ☒ (spir. +,) seorsim, continnando destillationem, donec spiritus omnes ascenderint.

N. 1. *Si ad extracta usque medicos ☒ destinetur, cauto opus est, ne nimium urgendo ἰπυρρῶς concilietur: sin vero ad metallicos labores; urgendum erit donec rubri spiritus adtollantur, nihilque amplius spirituum exeat: id feliciter fiet in arena.*

N. 2. *Alij rectificant aliquoties cohobando, tandemque partem aliquam phlegmatis lento M calore abstrahunt Sen. instit.*

Vires. Phlegmatis usus esse potest in Extractionibus quibusdam, E. g. viridis aris pro conficiendo ☐ o ☐ is & aliarum Tincturarum.

2. Acetum ex fecibus.

R. Feces +, (die Mutter vom Wein effig.) destilla per vesicam cum refrigeratorio ac prodibit ☒ igneum.

Vires. Soluit metalla, &c. Kessler. 4. c. 65.

3. Acetum Radicatum, seu alkalisatum.

R. Fecum, ex ☒ destillatione relictarum lb 3. vel 4. calcina ad siccitatem, dein affunde ☒, idque iterum abstrahè in arena, toties cohobando, donec omnis ☐ cum ☒ ascenderit. Sennert. instit.

Aliter. R. ☐ + i volatilis (vide infra) p. j. ☒ q. 4. confunde & destilla per arenam in Retorta, dando in fine ignem satis fortem. Destillatum destilla iterum supra ☐ fixum cohobabis toties repetitis, donec omnes cum ☒ ascenderit. Bequin. l. 2. c. 5.

R. + i mens. 1. affunde supra ☐ calcin. lb. 8. ☐ iiij. destilla, cohobaque aliquoties, tandemque supra recentem ☐ calcin. & ☐ funde, destillationemque reitera. *Vide Kessler. 4. cap. 78.*

4. Acetum mellitum.

R. Mell. lb. 4. + ad emin. 4. digitor.

tor. destilla ex arena. Exit aqua acerba, quam rectificata.

Vires. *Soluit Corallia, Margaritas, & reliquos lapides pretiosos.*

5. *Acetum Terebinthinatum.*

Fit ex aceto & Terebinthina per Simul destillatis, hinc oleo & spiritu ab ∇ separatis. *Hartman.*

6. *Spiritus Aceti S. Closs.*

Destillantur lb vi. + in **M** paulò ultra repidum incalescente, donec sexta tantum pars restet lbj. vix excedens, quæ vnà cum cucurbitâ & **X** in cineres transportetur, & destilletur ad siccitatem vsque cum coho bio ter & quater super facies repetito. Quod si adhuc fortiolem exopres, tunc ex crystallis fecum + cum boli f. q. globulos concinna, qui per **O** acti Δ nudo in Recip. quod prædictum + spiritum contineat, rectificatque igneum atque corrosiuum Σ um dabunt, metallorum solutionibus aptissimum.

N. Sal **X** euanesceat ab Extractis & Tincturis quibuslibet per putrefactionem cum **V** & abstractionem fortem in cineribus, Sic enim Sal fit volatile & $\zeta\beta$. illius qualibet vice ascendit.

II. CRYSTALLI EX ACETO:

R. \dagger ad mellis consistentiam inspissatum, repone ad crystallandum f. artem. Crystallus purifica soluendo (e. g. in phlegmate + abstracto,) & crystallando. *Libanius.*

CCCLXIX. *Gummi Ammoniacum.*

Dioscoridi Hammoniacum, Ammoniacum, Thymiana, Gutta ammoniacæ, Cord. hist. Ferulæ lacryma, Galeno. Ammoniaci lacryma, Matth. vulgò Armoniacum, Arab. Altathut, Raxach, Aafach, &c. Ger. Gummi Armoniac.

Gummi est stillans ex ferula quadam, quam ad differentiam aliarum Ammoniaciferam vocant, alij Metopion. Dicitur autem Hammoniacum ab Hammonis oraculo, iuxta cuius delubrum colligitur.

Eligendum est sincerum, instar Thuris in grumos condensatum, odore Castoreum utcumque æmulans, sapore amarum, digitis tractatum mollescens, benecoloratum (exteriorius flauum, interiorius candidum.) Et hoc $\sigma\pi\alpha\upsilon\tau\eta\mu$, (thrauston Plinio, i. e. fragmentum) appellatur: sicut id quod terræ, calcu-
lorumve particeps est, $\phi\upsilon\rho\alpha\mu\alpha$, (Phyma Plinio, i. e. mixta) dicitur.

Vires. *Calfac. 2. sicc. 1. emollit, attenuat, resoluit, digerit, maturat, attrahit valide, ut quoque spinas carni infixas eliciat, aluum mouet, splenicum est. Vfus præcipuus est in doloribus arthritidis, in resoluenda mucilagine \square ea viscosa, crassa ac contumaci Pulmonum, Mesenterij & hinc in obstructionibus contumacibus Lienis, Epatis, Vteri, in calculo. Extrinsecus in scirrhis, panis, rophisque iuncturarum, in scrophulis, aliisque tumoribus durioribus resoluendis, &c.*

Dosis à \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} j.

GGgg 2 PRAPAR.

$\text{Ἀμμωνιακόν, ἁμμωνιακόν, vel ἁμμιωνιακόν}$

P R Æ P A R.

1. *G. Ammon. depuratum.* R. Gummi, q. v. solue, cola ac exprime, hinc inspissa.

N. Soluitur in quocunque liquore aquo +, Vino, succo, &c. Usitatus tamen per + depuratur.

2. *Ol. stillat.* Fit per \times , vesicam vel Retortam. Vide supra.

Vires. Omnibus confert affectibus, quibus Gummi Ammoniacum.

3. *Oleum cœruleum S. Closs.*

Feliciter eliciuntur huiusmodi olea per \times tribus fulcris è luto sicco statuminate in capella sabulo & cineribus vacuâ, coopertâ tamen, dando Δ lentum. Rectificentur.

N. Simili modo eliciuntur olea ex Galbano & Sagapeno.

4. *Pilula de Ammoniaco.* Videl. 2.

N. Ibidem describuntur Pilula Γ res diuersæ, quarum non minima portio Ammoniacum existit.

5. *Extractum Resinosum seu Resina* Vide l. 2.

N. Conuenit viribus cum ipso G. Ammoniaco.

6. *Extractum viscosum.* Vid. l. 2.

Vires. Lenit asperitatem aspera arteria, incrassat acres ac tenues catarrhos, unde & utiliter linctibus commiscetur.

CCCLXX. Gummi seu Resina An. mæ.

G Ani- } 1. fuluescens & pellucidum.
ma } 2. nigricans & taurino glutini vel colophonix simile.
 } 3. pallidum & retorridum.

1. Animæ est Resina pellucida ex albo citrinescens, in noua Hispaniola seu America ex arboribus quibusdam proceris incisus extillans, Thuri simil-

lima, quo tamen maiora grana refert. Et hæc nobis vsualis est.

N. Veteribus incognita statuitur. Amatus tamen pro cancamo veterum habet cui consentit Garzias.

Eligenda est albida seu hauescens, granulata oleosa, si frangatur Citrina, fragrantissima ac gratissimi saporis, carboni imposita facile liquefscens

2. Myrrhæ quodammodo assimilatur.

Hanc esse Minæam Galeni vel Ammineam Dioscoridis & Serapionis idem vult Amatus, adeoque Animum Lusitanis dici. Vide Myrrhæ.

3. Ex ea species, quam ex India Orientali afferunt, granis minoribus granulata. Hæc vt colore ac pelluciditate priori cedit: ita & viribus minor est.

Vires. Calfac, 2. hum. 1. atten. resolu. astring. discutit. cephalica est. Vfus præcipuus est externus in capitis ac nervorum affectibus frigidis, dolorificis, catarrhosis, statulentis, in affectibus articulorum, paralyfi, contractura, laxationibus, contusionibus, &c.

N. Soluitur vt aliæ Resinæ in oleo, tum quoque in ∇ rectificatissimo.

P R Æ P A R A T A.

Ol. still. Fit vt ex aliis Resinis, per Retortam ex arena. Vide l. 2.

N. Colligi possunt sigillatim oleum tenuius ac crassius. Sala in Hydrolog.

CCCLXXI. Gummi Arabicum.

Gummi simpliciter, Gummi Thebaicum, Gum. Babylon. Gum. Saracen. Gum. Acanthin. ex arbuscula quadam manat, quam Dioscorides Acaciam vocat. Estque Gummi naturæ prorsus aqueæ.

Eligendum

Eligendum vitri modo pellucidum, syncerum, in vermiculorum speciem contractum, candidum vel ad flavedinem inclinans. Reprobandum fordidum, resinofum, adulteratum. Adulteratur enim admixtione gummi cerafor. prunor. & sim. vel ex resinarum quarundam, id quod cognoscitur solutione in ∇ , quia syncerum liquidissime ac limpidissime soluitur, adulteratum non item.

Vires. *Calf. & hum.* 1. inspissat, poros cutis obstruit, acrimoniam medicamentorum obtundit, asperitati aspera arteria ac tussi confert, ocularibus medicamentis & arteriacis commodissime adhibetur.

PRÆPARATA.

1. Pulvis.

N. Vi bene pulveretur, calsiant mortarium ac pila.

2. Depuratum. Soluitur in ∇ colatur ac inspissatur.

CCCLXXII. *Asa fœtida.*

Ὀπὸς μὲν ἰνὸς, Συριακὸς, (olim *superatixos*,) Lafer medicum, fœtidum, Arab. Altit, vulgo Asa fœtida. Germ. *Tensfelsdreck*. Succus est siue Lacryma Laferis siue Sylphij in Media, Lybia ac Syria crescentis, (non Laferpitij Dioscoridis, cuius succus modernis incognitus est.) Et ex illius radice ac caulibus incisus colligitur.

Eligenda est syncera alij odorem ferè æmulans, viscida; reprobanda adulterata. Adulteratur enim permixtione farinæ, fufuris, sagapeni.

Vires. *Calf.* 3. incidit, & c. *Vfus* internus precipuus, in suffocatiæ vteri, peripneumonia ac vulneribus, alijs rarè adhibetur. Extrinsecus in tumido Lienis, vteri suffocatione, paneritio (cum

allio cui *alb. suscepto.*)

Dosis à \mathfrak{B} . ad \mathfrak{zj} .

N. 1. Soluitur super prunis coquendo in ∇ , aceto aut vino.

N. 2. Si quis Epilepsia obnoxius senserit suffitum ex Asa fœtida ac cornu caprino, paraxysmo actutum corripitur.

PRÆPAR.

1. *Pilula de Asa fœtida.* \mathfrak{R} . Asa fœtid. q. v. humecta, vel solue cum \times ac redige in massam.

2. *Pilula fœtida.* Vide Disp.

B.

CCCLXXIII. *Balsamum verum.*

Balsamum Syriacum, Ægyptiacum, Balsamelæum, Opobalsamum, Bals. de Mecha; est liquor Balsameus, flauus instar Terebinthinæ, odoris fragrantissimi, saporis subamari & acris, sudans ex balsami tum fruticibus, quoad corticum vulneratis, tum ex ramusculis amputatis.

N. 1. Si guttula aquæ tepidæ immittatur, per totam superficiem sese extendit, ac rursus aquâ refrigeratâ sese contrahit, lacti instillatum id ipsum coagulat, in vestem laneam effusum non linquit maculam, secus ac alia.

N. 2. Tanta æstimationis est, ut Princeps Arabia Felicis, cui etiam Mecha parer, singulis annis inter alia munera tres quatuorve libras Turcarum Imperatori honorarij loco transmittat. Cayritidem Prefecto unam. Quin & Dacibus peregrinis idem cum maximum honorarium præsentat.

Vires. Inter olea quævis & balsama omnium est laudatissimum, præstantissimum, ac toto orbe maximè celebratum, utpote quod vires habeat abigendis mor-

bis tam internis quàm externis, nulli medicamento secundas. Conferi febricitantibus, asthmaticis, iecoris obstructiones soluit, menses mouet, stomachi dolores sedat, phthisicos inuat, appetitum excitat. Vide prolixiùs Balsamum de Tolu, & Clusium in Monard. ut & Petrum Bellonium in Observationibus suis. Alpinum de plantis Aegypti, ut & in Dialogo de Balsamo peculiariter conscripto.

CCCLXXIV. *Balsamum de Tolu, seu Tolutanum.*

Balsamum de Tolu est liquor Balsameus, coloris rubei ad aureum tendentis, mediæ inter liquidum & densum consistentiæ, valdè glutinosus, & vbicunque reponatur firmiter inherens, saporis dulcis & grati, non nauseabundi (secùs ac reliqua balsama) odoris excellentissimi, Limonio-rumque fragrantiam, vel Iasmini quodammodo referentis, præsertim si paxillum in volâ manus fuerit fricatum.

Aduehitur ex Continentis quadam Prouinciâ, inter Catthaginem & Nomen Dei sitâ, Toluab Indis appellatâ: vbi colligitur ex arboribus Pino pumilæ similibus, iisque tum domesticis, tum syluestribus, quæ vulnerato cortice præstantissimum hunc liquorem fundunt.

Vires. *Antecellere videtur facultatibus ei, quodè noua Hispania adducitur (Peruiani nomine) efficaxque est ad omnia, ad qua Balsamum illud Agy-*

ptiacum. Calfac. & sicc. atten. resoluir, vulnerarium est, pectus expurgat, &c. Usus præcip. in asthmate, phthisi, in ventriculi cruditate & dolore. Extrinsecus doloribus à causa frigida quibuscunque, & inprimis capitis, arthriticis & nephriticis; in defluxionibus ad oculos cohibendis, in paralyti, in ventriculi imbecillitate, dolore, inflatione (inunctum cum oleo nardino) in Hydrope (illitum cura Unguent. aperitino,) in Lienis imbecillitate, in tumoribus quibuscunque, ac œdematibus; in contractura: parotides insuper seu scrophulas cacas curat. Inprimis autem celebratur in vulneribus consolidandis, defendendis, præsertim si ossa quoque sint fracta, (quippe fragmenta expellis) in vulneribus articulorum, sectionibus neruorum, puncturis, contusionibus, &c.

Dosis gr. iij. iiij. &c. Nicol. Mon.

N., Balsamum hoc illud esse arbitror, quod nostratibus Balsamum de Honduras dicitur.

CCCLXXV. *Balsamum Indicum.*

Balsamum Indicum nouum, *Matthiol.* Balsami genus nouum, *Fragos. Balf. Peruuianum, Germ. Indianisch. Balsam.* Est liquor. fragrans arboris cuiusdam Indicæ, Balsami dictæ (Indis xylo) coloris ex tum albo tum nigro rubentis, odoris suauissimi, saporis acriusculi & aliquantulum amari. Affertur ex America seu noua Hispania Indiæ Occidentalis. *Monard.*

Est { Limpidum subalbidum: Ex cortice arboris fauciato stillans: opobalsamum vocant, nostratibus officinis dicitur Balsam. Indicum verum. Gerni.
Der vveisse Indianische Balsam.
Crassius. Ex segmentis truncatamisque cum ∇ coctis supernatans: dicunt Xylobalsamum: nostratibus appellatur Balsamum Indicum, seu Balsamum Indicum vulgare, nigrum.

Prius præstat limpidius; posterius eligatur purpureum, suaueolens (vt vel optimo Styraci calamitæ nihil cedat) cuius guttula, carboni instillata suaueum suffitum præbeat. Reiciatur nigrum, crassum, odoris grauis.

Vires. Calf. & sicc. 2. discut. emol. subastring. Vfus præcip. in asthmate, phthisi, nephritico dolore, mensibus obstructis, ventriculi debilitate ac dolore, Epate obstructo, utero squalido, atque inde ad concipiendum inepto, suffocatione ex utero, &c. Extrinsecus lenit dolores ex humoribus frigidis ortos, discutit humores aqueos, roborat caput ac nervos, partes, contractionesque sanat, ventriculi flatûs discutit, cruditates tollit, lienem durum emollit, nephriticum dolorem mitigat, urinam remorata promouet, arthriticis doloribus summè confert: in Chirurgia, proficuum est vulneribus recentibus (tum consolidando, tum noxia discutiendo): inueteratisque, necnon & nervorum prodest contusionibus: febricitantibus confert, spinam ante paroxysmum inungendo, atque cum Vino guttulas aliquot exhibendo, idque iteratis vicibus.

Dosis gr. 4. 5. 6.

N. Tanta censetur efficacia, vt sint qui Opobalsamo seu Balsamo Syriaco substituere non vereantur. Nicol. Mo-nard.

PRÆPAR.

Spiritus ac ol. still. Fit per arenam ex Retortal. Δ . Sic extillat post roridam ∇ oleum clarum instar sacchari can-

di coagulabile (Spiritus.) 2. post flauescere incipit igne fortiori, (oleum:) 3. in retorta manet materia instar colophonæ.

CCCLXXVI. Bdellium.

Bdellium, Bolchon, Malathram, Maldacon seu Madelcon, Lachryma est arboris cuiusdam spinosæ nascentis in Arabia, India, Media. Videatur Marth. Cord. hist. Casalp. Frag.

Probaturn gustu amarum, translucidum cum frangitur, pingue cum fricatur, odoratum, subamarum, facillè mollescens, syncerum (Parthicum nominant.) Reprobatur sordidum, nigrum, in offas conuolutum, quod Adrobalon nuncupatur.

N. Sunt qui Anime legitimum Bdellium esse putent.

Vires. Calf. & sicc. (N. aliis calfac. 3. sicc. 2. aliis calf. 2. burn. 1.) digerit, discutit, sudorem mouet. Vfus præcip. intern. in tussi ac pulmonum apostemate, calculo atterendo, urinacienda, mensibus immodicè fluentibus, vt & in fluore uterino sistendo, sætu expellendo. Extrinsecus discutit hernias, mollit durities ac nervorum nodos, adeoque creberrimi usus est in Emplastris sticticis.

N. Contusum soluitur affuso vino, aut aquâ calidâ.

PRÆPAR.

Pilule de Bdellio. Ex Bdellio & Myrobalanis.

N. Sistunt fluxum hæmorrhoidam ac mensum.

mensum.

CCCLXXVII. Benzoin.

Beniui, Garz. Beniuium, Belzoinum, Benzoinum, *Matth.* vulgò Afa dulcis, *Cord. hist.* Germ. *vuoltriehend.* *Asiand.* Resina est citrinescens vel flaua, ceu variis ex frustulis diuersorum colorum in massam redacta, bene odorata, facilis liquatu ac fractu. Stillat ex arboribus certis, magnitudinis proceræ, quoad corticem fauciatis.

Amygdaloides, quod maculas candidas refert instar amygdalar. deliberatar. colligitur in Sion & Samaria.

N. Hanc Myrrham Trogodyricam Dioscoridis, *Amatus* censet.

Nigrum odorem suauissimum spirans. Exudat ex nouellis arboribus. Dicitur Beniui de Bonias, q. de floribus.

Nigrius parum fragrans, quod uilius.

N. Commisceri solent, ut unà commodius vendantur

Optimum censetur pellucidum, globulis candidis refertum, Thuris æmulum, suauissimè spirans, nec heterogeneis inquinatum.

Vires. *Calf.* & sicc. 2. incid. atten. pulmonicum est. *Vsus* præcip. intrinsecus in affectibus pulmonum, catarrhosis, tussis, asthma. Extrinsecus in cerebra per sternutationem expurgando, in odontalgia, (masticando) in tuberculis ac rubore faciei abstergendo: ob suauem in super halitum creberrimè suffumigiis commiscetur.

N. 1. Si suffitus ex solo Benzoino paratur, tussis excitatur.

N. 2. Soluitur in oleagiosis ac spiri-

tu vini rectificatissimo, ut & in oui albumine aëri humido ad liquefendum exposito.

PRÆPAR.

1. *Magisterium.* R. Benzoin. solue in ∇ rectificatissimo. (NB. nisi ∇ fuerit omnis phlegmatis expers, nihil effeceris) solutioni affunde ∇ , & præcipitabitur lactescens Benzoin: laua ∇ rosar. ac exicca.

N. 1. *Vnius* hora spatio solutio hæc absolui potest, calore saltem adhibito.

N. 2. *Poteris* isidem ∇ abstrahere sine affusione. ∇ a.

N. 3. *Magisterium* hoc non est nisi depuratum Benzoin.

N. 4. Solutio quam Tincturam nonnulli vocant, manus abstergit candidasque reddit.

2. *Flores.* R. Benzoin trit. q. v. inde ollæ vitreæ, desuper ponendo pyramidem ex charta duplici formatam, admouéque paulatim ignem lenem carbonum vel cinerum: sic sublimabuntur flores, chartæque adhærescent, quos sæpius exime, ne tursum decendant.

Dosis à gr. ij. ad ʒß.

N. Sunt qui flores in ∇ rectificatiss. soluant, solutionemque pro Tinctura venditant.

3. *Liquor.* Fit in albumine oui cocti, ut supra. Abstergit maculas, stigmatæque elue venercæ contracta.

4. *Oleum.* R. Benzoin pulu. ℥ij. spir. Vini lbij. (vel iij) digere ʒ(4. 5. 6.) dein adde sabulum purum vel scoriatum ʒiij destilla per Retortam ex arena vel cinere, igne gradatuo: hinc separa oleum à Spiritu, *Panth.* hygist. Deodat.

N. Spir. Vini leniter abstracto, ascendet materia gummea, candida, solida, quam

quam vocant Mannam Benzoin. Hæc albibicat cuprum.

Alij.

℞. Benzoi pulu. lbij. affundunt + ros. in olla benè clausa, committuntque igni vt fluant (odore id cognoscet) Hinc affundunt nouum. I. fluereque sinunt continuò agitandò; tandem inspissari paulatim permittunt, immiscendo pro libitu flores Rorismar. Lauend. Ros. Spic. Ind. vt & sant. citr. in fine superfundunt. ¶ rectif. ac destillant ex arena vel cinere. *Med destill.*

Alius modus optimus.

℞. Benzoin pulu. q.v. misce cum sabulo, ac imple Retortam ad medietatem: destilla gradatim ex arena, & nancisceris liquorem ac oleum crassum instar butyri. ℞. huius (à liquore separati) p.j. ∇ pluui. p. xij. destilla in cinere per, XX. & extillabit oleum clarum & flauum, ad fundum subinde secedēs. Postquam pars media ∇ extillarit, extingatur ∇, effundaturque materia in cucurbita relicta, in lebetem æneum, calfiatque optimè super ∇, affuso subinde ∇æ calidæ quadruplo: filtretur per panum, reponaturque filtratura ad crySTALLISANDUM. CrySTALLOS collecta exicca lento Δ calore.

N. 1. Oleum illud rectificari poterit semel ac iterum ex XX cum V ♀ sato, & enader odore saporeque gratius.

N. 2. ℥j. Benz. præbet ol. (℥. B.) crySTALL. seu florum (℥i)

Modum hunc cum aliis non paucis acceptum refero viro solertissimo, Iohan. Casp. Sparre, Pharmacopœo huius Reip. Seniori, Affini meo, colendo.

N. Sunt qui Beniuinum solunt in ol. nucel. cerasor. expr. solutionique admi-

scunt ambram, muscum & Zibettam & exprimunt ad perfumandas, vt aiunt chirothecas.

C.

CCCLXXVIII. *Camphora.*

Κάψα, Camphora siue Caphura, *Matth. Cast. Vrab. Capur & Casur.* Lachryma est resinosa proceræ cuiusdam ac peregrinæ arboris, (non bituminis genus.) *Gerin. Kompffer.*

Differentiæ duæ. 1. Caphura de Burneo, (Insulæ Oriental.) quæ rarò adfertur, & omnium nobilissima. 2. Ex Sina in Europam adfertur, in panes orbiculares coacta, *Gari. Acost. Fragos.* (cui hæc Chinæ dicitur Chinichis, à China vnde aduehi solet.) Sic alia rudis est ignem non experta: alia elaborata, quæ solis aut ignis calore cocta atque purgata, album colorem contraxit. *Natth.*

Seligenda est alba, pellucida instar. CrySTALLI, syncera (non maculata) odora, digitis friabilis, quæ accensa vix extinguiibilis.

Distinguitur à supposititiâ, quòd hæc calido panitriticeo (vti ex clibano extrahitur) dissecto imposita torreatur; vera autem liquefcat.

N. In tritura, mortarium ac pistillium oleo aliquo e.g. amygdal. &c. est innuendum.

Vires. Resistit putredini ac venenis, unde frequens eius vsus in peste malignisque morbis, febribus, &c. Veneris quoque stimulum arcere, conceptumque impedire creditum est; verum si experientia ac observatio Scaligeriana fidem meretur veritatem, (nisi vsu continuato id experiri quis velit) suffocationi uterina, subuenit (scil. ∇ melij. ... quæ Campho-

HHhh

ra

ra extincta fuerit propinata.) *V*sus externus crebrior est, isque potissimum in Epithematis, s. Frontalibus refrigerantibus & paregoricis, quibus commisceatur, solui solet in *V*, vel conterri cum nucleis s. semine aliquo oleaginoso, e.g. pineis, sem. citrull. & sim.

De qualitatibus primis dinerfitas haud levis. Maiores ad gradum vsque 3. frigidam statunt. Recentiores è contra calidam; utrique non sine ratione. His inservit 1. inflammabilitas, utpote quæ acereis non aqueis ac terrestribus propria. 2. Odor aromaticus ac sapor acris. 3. facilis evanescencia, quâ vel sponte aerem ceu chaos suum repetit. Illis vis venerem ac libidinem compescendi, inflammatio- nésque extinguendi. Verum triumphare videntur recentiores. Etenim quantum ad prius, posito quod venerem arceat, non tamen propterea necessario frigiditatem concludi posse, argumento sunt Ruta, Vitex, & sim. Nec firmitior ratio posterior, utpote ab operatione quæ per accidens fit, desumpta. Quippe inflam- matio aut mitigatio eo in casu non à qua- litate frigida introducitur, sed à subtili penetratiua, exhalationibus calidis exitum reserante, atque per sudorem insen- silemque transpirationem discutiente.

PRÆPARATA.

1. *Oleum Camphoræ.* R. Camphor. ℥iv. Terræ argillacæ, vel boli armen. M. ij. (alij. R. Camph. part. j. Argill. p. iij.) [Misce diligenter, & ex Massa mixta forma globulos, quos in sole vel umbra exiccatos, destilla in arena ex Cucurbita vel Retorta vitrea, (in excipulum, quod contineat, si libet, aliquid aquæ pluvi. destillatæ.) Sic prodit primum quiddam album, mox aqua perspicua, tandem igne fortiori, oleum fragrantissimum. Ol.

hoc cum *V* bis rectificatum, au- reum colorem acquirit.

N. 1. Eodem modo destillari potest cum terra communi.

N. 2. Album illud sublimatum lique- scet in Alembico, & defluet in Excipu- lum.

N. 3. Non opus est formare globulos, sufficit enim materias solum miscuisse.

Vires. Vires ex superiorib. collige. Op- timum in super remedium est in gangre- nis. Hoc oleum affusum super Talcum subtiliss. pulverisat. (melius calcinatum) biduanâ in *MB* maceratione albescit, virginibusque ad uterum faciri egregiè inservit. Senn. in Instit. Hartm. in pract. Tentz. Sala.

2. *Ol. Comp.* Paulò aliter.

R. Camph. p. i. Boli p. 2. Pulve- rificata misce, & destilla ex Retorta vitrea loricata, l. Δ. arenæ, & pro- dibit Camphora instar butyri. Huius R. part. i. ♀ optimè calcinati p. ij. *V* ad eminent digit. 3. Dest per *MB*, donec Camphora incipiat ascende- re: quo dato signo, subtrahe Δm, & effunde *V* qui extillavit, in vitram angusti orificij, affundéque ∇ fon- tanæ quantitatem, sic lactescet *V*, oleumque Camphoræ supernatabit, quod separa. Materiæ in Cucurbita relictæ affunde denuò *V*, & destilla, separaque ut antea, idque toties rei- terando, donec nihil Camphoræ vl- terius ascendere conspiciatur, sic ha- bes oleum Camphoræ quantitate qui- dem paucum (½) viribus verò effica- cissimum.

N. *V* rectificari poterit ad vsus alios.

Ex communicatione Ioh. Casp. Spar. Pharmac. huius Reip. primatij.

Aliter.

Solve Camphoram in sp. *U* i An- repileptico

epileptico Hartmanni, (vel etiam in V.) & Camphora eleuabitur in formā ☉ i ad superficiem. Hoc seorsim collige, atque cum terra sigillata, & paucō ✚ forma globulos. Destilla per ☿, & prodibit ☿ seu ☉ valde fugax. *Hartm. in pract.*

Aliter.

R. Camphor. el. ℥ij. ☉, ℥ij. Sal. ♀, ℥iij. terantur subtiliss. cum lacte in formam pultis. Hanc macera in ☿ 3. dein affunde vini Maluat, ℥iij. destilla per ✕ humilem recipienti firmiter annexum, idque l. Δ, prodibit aquosa & oleosa substantia, quam vtramque rectificare poteris.

2. *Liquor.*

R. Camphoræ q. v. inde vrinale, ac impone desuper aliud vrinale inuersum, iuncturis bene clausis, sublima ex cinere, toties vrinalia illa inuertendo, donec Camphora in ☉ abeat, *Kesler. 4. c. 66.*

N. Sunt qui in ☿ camphoram dissolutam pro oleo vendunt, cuius equidem usum internum nemini suadeo. Extrinsicus autem adhiberi solet in dolore dentium. Hoc ☉ tempore rursus in camphoram coalescet. Med. distill.

Nonnulli in peste hoc deprædicant.

R. Camph. el. ℥i℥. Sal. absint. ℥i℥. Ol. amygdal. ℥iij. M. diligenter, & macera per diem vnum ac alterum, vase el. Hinc destilla per ☿, iterum Sal. absinth. ℥i℥. admisce, ☉ rursus affunde per ☿, digere, atque hinc denud per ☿ destilla.

Dosis gut. iij. v. vj.

Alij.

R. Camph. p. i. Spir. Terebinth. p. ij. ☿ antequē bis cohobando.

3. *Essentia Camphoræ alexiteria.*

R. Camphoræ q. f. solue, cum ☉ amygd. dulc. scil. digerendo; colaturam cum ☿ aliquamdiu circulatam destilla denuò, vt abstrahatur ☿; residuo adde tincturam croci, ad aureum colorem vsque inducendum.

Vires. Mirabilis est ad præcauendam & curandam pestem: item in suffocatione Matricis & Febris.

Dosis gut. i. ac altera. *Tentzel.*

N. 1. Spiritus ille abstractus haud minori cum successu in usum accersiri poterit.

N. 2. *Quercetanus* elici ex camphora essentiam cum ☿ vite tartarisata, Pharm. Rest. c. 26.

CCCLXXXIX. Cancamum.

Κάναμον, Dioscoridi est Arabicæ arboris lacryma, Myrrhæ quodammodo similis, virosi gustus: ad suffimenta vsurpant.

Quoad vires, eidem splenetica, emmenagoga, & opthalmica habetur.

N. De hoc Dioscoridis Cancamo diuersa hoc tempore Opiniones. Laccam dicunt alij, alij Resinam Animam faciunt, alij Beneninum, nonnulli profus incognitum putant. Videatur Marth. Garz. Clusius in Garz, Amatus in D. & simil.

CCCLXXX. Caranna.

Caragna, Carana est Resina duriuscula, tenax, siue multa agglutinatione, Tacamahacæ similis, nisi quod sit paulò odorator, splendidior, liquidior & densior. Affertur ex Carthagine Indiæ Occidentalis seu nouæ Hispaniæ Prouincia, vbi ex vulneratâ arbore elicitur, atque illinc foliis tatis ac neruosis, instar arundinaceorum.

rum foliorum inuoluta ad nos peruenit.

Vires. *Calfac. & sicc. 3.* viribusque pollet iisdem, quibus *Tacamahaca*, qua tamen operando citior & efficacior est, præcipue in tumoribus, omni-que generis doloribus, maximè iuncturarum, tumores inueteratos dissoluit, defluxiones frigidas aut mixtas sistit, nervorum ac cerebri dolores sedat, vulnera recentia præsertim nervorum & iuncturarum sola sanat, defluxiones in oculos & alias partes reprimat, (pone aures vel temporibus imposita.) *Monard.*

Soluitur in Oleo.

Preparatur inde Emplastr. antipodagricum insigne.

℞. Carannæ ʒj. ceræ. flau. ʒß. cum Ol. verbasc. F. Emplastr.

CCCLXXXI. Colophonia.

Colophonia Officinarum, C.B. *Pix græca*, *Matth. Cord.* est substantia naturæ oleaginosæ, flauescens, arida ac friabilis, residua ex resinis abietina, strobilinaque coctione dum purgabantur, inspissatis ac frigore induratis.

Eligenda est pellucida, odorata, quæ *Thuris* fumum accensa æmulatur.

N. 1. Dicitur *Colophonia*, quod ex *Colophone* olim aduehebatur.

N. 2. Friabilem illam flauamque substantiam in Resinarum singularum destillatione residuam, alij Resinam frictam appellant; alij eidem *colophonia* nomen imponunt.

Vires. Siquidem *Colophonia* portio est Resinarum, Resinarum quoque vires retinet, sed minus penetrabiles, calfacit itaque & siccatur, molitur, glutinat, usque eius, quia pinguis soluitur, commodissimus est in Emplastris.

CCCLXXXII. Resina Copal.

Pancopal. Copal. Resina est duriuscula, admodum candida, vel ex albo flauescens, pellucida, bene odorata, in massam redacta. Asportatur ex India Occidentali, siue noua Hispania, ubi ex vulnerata arbore guttatim stillat. *Monard. Clus. in Monard. Fragos. Casalp.*

Vires. *Calfac. 2. hum. 1.* emollit, resolu- soluit. *Usus* præcipue in affectibus cephalicis.

PRÆPAR.

Oleum tenuius & crassius. Eodem modo elici potest utrumque, quo ex Resina Anime.

N. Caput ab annis aliquot ex eadem India Occidentali, liquor quidem adferri olei de Copalyra appellatione, quod an ex Resina iam descripta sit, in dubio relinquit *Clusius* in *Monard.* commendari id ait ad vulnera recentia curanda: nostratibus ignotum est.

CCCLXXXIII. Elemi.

Gummi Elemi, Elemnij, Helenij, Resina est, siue lachryma pellucida albicans, cum flauis particulis intermixta, in massam redacta, suauem accensa halans suffitum, Asportatur ex Æthiopia, ubi stillat ex arbore, quam oleam nonnulli volunt (quod negat *Matth.*) alij Cedrum.

N. *Dioscoridi* flauum est ac scammonio utcumque simile, mordaxque: nostrate non item, quarr an verum habeamus, dubium. *Damnatur Ammoniaco* vel *Gummi Arabico* simile, colore nigricans.

Vires. *Calf.* temperatè, emollit, digerit, resoluat, maturat, dolorem sedat, capitis ac nervorum affectibus eorundem- que vulneribus, ac imprimis caluaria vulnerata

vulnerata specificè confert, contusionibus articulorum prodest, menses ac vinam ciet.

Solvitur in oleaginosi, ut reliqua resina.

P R A E P A R.

1. *Oleum stillat. Elemi.* Fit ex Retortâ per A vel vesicam ut ol. Anime. Vide supra.

Vires. Specificum præ aliis (ut & ipsa Resina) censetur in affectibus neuriticis, paraliſi, contractura.

F.

CCCLXXXIV. Fuligo.

Fuligo est pars rerum combustibilium leuior, à partibus crassioribus sub specie fumi eleuata, inque substantiam crassam nigricantem, vi frigoris compacta. Germ. Roſt.

Delectus, Fuligo eligatur splendens instar succini nigri, quæque fumarij parietibus proximè adhæreat (quo fornaci propior, eò melior) imo nec abs re foret, delectum quoque instituere, ratione materiæ combustæ, quæ quanto Medicæ intentioni conuenientior, tanto quoque fuligo præstantior censenda est.

Vires. Acris est, ex terget, rarique vsus per se, nec adhiberi eam memini, nisi quod intelligam, in suffocatione matricis à mulierculis plebens cum successu esse propinatam. Quin & cum aliis mixta carpiſ imponitur ad arcendam febrem.

P R A E P A R.

1. *Spiritus.* 2. *Oleum.* & 3. *Sal.*

℞. Fulig. el q. v. imple ad collum vsque Retortam vitream lutatam & destilla ignis aperti gradibus successiue adhibitis, in Receptacul. capaciss. ut prodeant cum phlegmate spiritus albi-

cantes, ac oleum flauum, vltimoque rubeum. Spiritum cum oleo aliquandiu digere, postea affunde medietatem V & destilla sæpius prodit cum V , Spir. fuliginis & simul ol. rectificatiss. Caput mortuum incinera & extrahe sal more solito cum +.

Vires. Spiritus ac Oleum confortatiua sunt insignia, mirabiliter agonisantes exhibita refocillant.

Dosis Spiritus gr. vj. ad ʒß.

Olei gr. 2. 3. in Vino vel alio vehiculo conuenienti.

Vires. Salis. Præstantissimum curatiuum est in cancro exulcerato, si in cella solutum cancris ulceribus semel ac iterum inungatur, venenositas instar vaporis visibiliter extrahitur. Tandem oleum (crassius) leni aspergine sæpius illitum, crustam instar cuticulæ superinducit, quæ sponte spacio 5. vel 6. dierum decidens, vlcus consolidatum esse indicat. Hartm. in Præct.

G.

CCCLXXXV. Galbanum.

Γαλβανον, χαλκων, Galbanum, (Math. Cord. hist. Cas.) Est gummi (feu fuccus) ferulæ Syriacæ, (quam Metopium vocant, quo nomine aliis gummi idem venit,) intense flauum vel albidum inflammabile; odore Opopanacem referens, colore Tacamahacæ.

Optimum censetur cartilaginofum (alij granulatum volunt, sed rarissimè, ob mollescentem naturam in granis inuenitur,) flauum, syncerum, pingue non lignosum, quod in se retineat non nihil ex suis seminibus, & ipsis ferulæ sarmentis, grauis & ingrati odoris, nec nimis humidam, nec nimis aridum, cū accenditur flammam nutriens.

HHhh ; Vires.

Vires. Calfac. sicc. 2. completè, emol-
lit. resoluit, extrahit.

Usus præcipue intrinsecus in mensi-
bus ac partupellendis, in tussi inuetera-
ta ac Asthmate: Aduersatur toxicis.

Extrinsecus prodest in partu ac men-
sibus, suffocatione uteri, vertigine, in fu-
runculis ac lentiginibus: quin & glandi
impositum Emplastri vice Urinam pro-
nuocare dicitur.

PREPARATA.

2. Galbanum depuratum: solue in li-
quore, exprime ac inspissa.

N. 1. Soluitur ut alia gummata fe-
rulacea, in quolibet liquore aqueo, +o,
succo, vino.

N. 2. Galenus suspendit in linteo su-
per ∇ atque puram extillare facit.

N. 3. Dioscorides dimittit in ∇ m fer-
nentem, impuritatesque supernatantes
reiecit.

2. Oleum stillat. Fit. a. per \odot m ex
 \triangle addito fabulo, vel silicibus con-
tulis.

N. Sunt qui Galbanum cum +o in
formam mellis miscent atque destillant.
At exit primoliquor. dein \odot , adeoque
opus protrahitur citra necessitatem.

Vires. Maximarum est virium in
passione hysterica, intrinsecus exhibi-
tum vel extrinsecus umbilico illitum.
Maturat bubones & anthraces.

Oleum aliud Sam. Closs.

Solutio Galb. in + non est de nihi-
lo, præsertim ubi spiritus Galb. repeti-
tur, omnium optimè fit oleum caru-
leum ex carino ferreo ad latus inclina-
to, cum \odot super tripodem terreum
imponitur, deinde pertuso operculo
obturatur, ita seruantur gradus Δ , exit-
que primo spiritus, mox, oleum, & bal-
samus expyreuma redolens.

3. Galbanetum, i.e. Balsamum Gal-

banetum, seu spiritus Terebinth. Galb-
netus.

R. Galban. trit. \mathfrak{h} . β . Spirit. Tere-
binth. \mathfrak{h} . i. Digere & aliquot, dein de-
stillata ex cucurbita humili, vel \odot .

Vires. Summarum virium censetur
in contractura ex colica, extrinsecus il-
litum.

N. Est & aliud Galbanum Theophra-
sti dictum.

R. Galb. \mathfrak{h} . β . Gumm. Hederae \mathfrak{z} ijj.
trita seorsim, misce ac destilla per
 \odot m in \triangle , Gato adde Terebinth.
 \mathfrak{h} . i. Ol. lauor. ac spic. añ. \mathfrak{z} j destilla
denuo.

Vires. Cephalicum est ac nutriti-
cum in signe, contracturas ac morbos si-
miles curans. Med. destill. part. i.

4. Cerotum de Galbano, s. Ceratum
Matricale. vide August.

Gummi Hederae.

Vide Hedera, Class. i.

H.

CCCLXXXVI Hypocistis

Hypocistis, germen seu plantula
est, è radice cisti fruticosi dum flore-
scit, ceu viscum ex quercu, profiliens:
Dicitur & Limodorum, aliis Robe-
thron. Ex hac itaque plantula, cum
floribus succulenta sit, exprimitur
succus, qui in sole exiccato Glycyr.
rhizæ succo non absimilis euadit, at-
que ad nos, sed raro, asportatur. Di-
citurque Hypocisthis vel succus Hy-
pocistidis. Videatur Matth. Dod. Cord.
in D. Lon. Cast. Clus. hist. Lob. Tab. Ger.

Vires. Refrig. (3.) siccatur, potentissi-
me astringit, condensat. Usus præcip.
in quibuscurque fluxionibus sistendi,
Diarrh. Lienter. Dysent. profluvio uteri,
vomitu, &c. Vri & in excretionem San-
guinis

guinis ex lapsu casive orta. Extrinsicus roborat viscera humidiora, ventriculum, epas, &c.

N. Quia rara est, eius loco succus *Acacia* recipi potest, quippe quæ analogas vires habet, quamvis imbecilliores.

P R E P A R A T A.

Hypoc. depurata.

R. Solue in ∇ , aut succo appropriato, cola & inspissa.

L.

CCCLXXXVII. *Lacca.*

D *Lacca* diuersæ Opiniones. 1. Fit *Laccæ* cuiusdam mentio apud Arabes, quam *Cancamum* Dioscoridis esse volunt, quod inodorum planè & nobis incognitum est. 2. *Lacca* est vulgaris seu officinar. quam *Garzias* ab horro fieri scribit ex succo arboris cuiusdam proceræ familiaris in *Pegu*, *Bengala* seu *Balagyvate* & *Martaba*, *Malauar* Prouinciis scil. *Indiæ Orient.* Nimirum à formicis alatis succum quandam exugi ait, eumque in *Laccam*, (non secus ac mel ab apibus) redigi, ramisque arborum induci, vnde postmodum cum ramis ad nos transportetur. Alij sponte exudare volunt, atque circa ramos concrelescere. Est autem resina sicca, *Myrrhæ rubræ* similis, masticata saluam rubro colore tingens, accensa vel tusa, suaue olens. Dicitur *Lacca* *Sumetri*, à loco natali scil. *Insula Sumetra*, sicut ea quæ in glebis sine furculis affertur, *Lacca comberri* vocatur.

N. Est & genus *lacca* fastitia terrestris, pictoribus familiare, quibus ad conficiendos inde colores inseruit. *Laccam* vocant globulatam seu rotulatam, quippe globorum plerumque venit formulis, colore minij, &c. Duplicis id generis est, alterumque vulgare *Laccam* infer-

toriam appellant: alterum *Florentinam*, quæ carior & coloris saturatus rubri.

Vires. *Calfac.* (aliis temperate, aliis 2.) atten. aperit, sanguinem purificat, sudorem ciat, diuretica est, *Vsus* prap. in obstruct. *Lienis*, *Vesica fellis*, *Epatis* ac *pulmonum*, & hinc in *hydrope*, *Ictero*, *Astmate*, *apostemate pulmonum*: in expellendis variolis, morbillis atque pestilent. contagio, in ciendis mensibus, &c.

P R E P A R A.

1. *Lacca lota seu preparata.* Tota *lacca* lauetur in *Decocto Aristoloch. & Scenanti*, quoad clarescat: hinc collige quod resederit.

2. *Trochisci de Lacca.* V. D.

CCCLXXXVIII. *Ladanium.*

Labdanum, *Laudanum* est liquor ex *Cisti* (*Ledon* appellati) foliis exudans, seu est massa non ab similibus massæ pilularum, (in pilulas vel sola manu formabilis): friabilis, colore opaca cinerea, inflammabilis, accensaque gratum saporem halens, in suffitibus vstitutissima.

Cistus illa familiaris est in *Cypro*, *Lybia*, *Arabia*. Videatur *Ant. dox*, *Ledum*, *Mart. epist. Cast. Tab.* *Lada* & *Ladon*, *Cord. in D. & hist.* *Ladanum* *Lon.* *Cistus* *Ledon latifolium*, *Lob.* *Ledum* latiore folio *Italicum*, *Cam.* *Cistus* *Ledum Matthioli*, *Ger.* *Cistus ladanifera*, *C. B. 1.* De origine *Ladani* scribit *Dioscorides*, quod hirci, frondes *Cisti* depascentes, succum illum barbis suis colligant, vnde postea pectine decerpatur.

Laudatur odoratum, subuiride, leue, facile mollescens, pingue, resinofum, arenularum, aliarumque foridum expers, quale in *Cypro* gignitur, quod plerumque ceu ex gyris coagmentatum, asportatur. *Arabicum vilium*

vilius habetur, afferturque in massa vniformi.

Vires. *Calf. sicc. emollit, digerit, maturat, attenuat. aperit, orificia venarum reseat, inspissat. Vfus* *pracip. in capite humido ac catarrhoso, in dysenteria, &c. Extrinsecus eius vsus est in Emplastris emollientibus, anodynis, tussim sedantibus, in Alopecia (in unge vel coque in vino & laua) in odontalgia, in cardialgia, doloreque ventriculi, (cum modico Bdel-li faciunt pilulas dandas Num. 1. & 2. hora 1. ante pastum. Crato.) in suffocatione uteri (interorsum adhibitum:) cicatrices curat.*

PRÆPAR.

1. *Ol. stillat. Vide Medull. destillat. lib. 1.*

2. *Pilule de Ladano. V. l. 2.*

N. 1. *Sala purificare docet in ∇ id soluendo atque colaturam inspissando, Verum me hercle minus commode. Et si enim coctione nonnihil in aqua soluat, id tamen non nisi portiuncula minima est, relinquitur pars maior intacta, quæ non minus quam illa commoda est,*

N. 2. *Et si inflammabile ladanum sit, non tamen pinguius solui potest.*

CCCLXXXIX. Liquidambra.

Liquidambar, Liquidambra, (quæ liquica ambra, ob odoris suauitatem,) Resina est oleaginosâ suauissimi ac fortissimi odoris, effluens ex arbore quadam procera ac venusta, Ococol siue Ocosolt Indis dicta. Est quæ partim siccior, partim liquidior. Liquidior pars vel seorsim collecta, vel expressione, à sicciore separata, sigillatim venditur, dicta eodem nomine; Liquidambar, seu oleum liquidambar, oleumue de Ambra. Videatur Monard. Casalp. Lug-

dunens. in hist. Mexic.

N. 1. *Effluxio hac incisione corticis promouetur.*

N. 2. *Arbor Ococol familiaris est in India Occidentali, seu noua Hispania, unde paucos ante annos in Europam transferrit cepit.*

Vires. *Calf. 2. (oleum 3.) hum. 1. resoluit, obstructions expedit, emollit, maturat. Vfus* *præcep. in utero obstructo ac indurato, tumoribus duris, &c. in suffitibus, & sim.*

N. *Adhibetur mechanicè in perfusmandis (vt aiunt) coriis ac chirothecis.*

PRÆPAR.

1. *Oleum, (vt dictum) vel seorsim collectum, vel expressione à sicciore parte Resinæ separatum.*

2. *Coctione ex ramis elicatum. Coquunt enim Indi ramulos in ∇, supernatantemque pinguedinem nomine olei colligunt. Et hoc esse oleum illud officinarum nostratum, color arguit, rubro purpureus, quippe natiua albicantiora esse solent.*

N. *Resina nostratibus in usu non est.*

CCCXC. Lycium.

Λύκιον, Lycium Dioscoridi est succus extractus (coctione scilicet, & inspissatione) ex ramis ac caudice arboris eiusdem nominis. Hanc describit titulo Lycij, *Marth. Tab. Ger* Lyc. alpini, *Lugd.* Pyxiacanthæ, *Dod. Lon.* Verum cum modernis incognitum sit, factum est, vt diuersæ inde subortæ sint opiniones, *Lob.* substituit suum ex Lucio Narbonnensi extractum, *Garz.* suum Cate dictum; habet & suum proprium *Kau- VV.* *Vfus* in Itinerario, *O.* *ficina* suum Lycium communiter ex Peryclimeni baccis.

baccis grauissimo errore conficiant: alij ex Ligustri fructu: alij ex prunis syluestribus. Præstaret tamen, monente id etiam C.B. in Matth. succedaneum ex Oxyacantha aut Rhamno, aut Rhodis succo compilare.

M.

CCCXCI. Mastiche.

Mastiche est Gummi-Resina ex albo citrina, pellucida, granulata, bene odorata, ex Lentisco arbore exudans.

N. De Lentisco. Vide class. i.

Delectus.

Optima censetur quæ in Insula Chio prouenit, odorata, candida, instar ceræ albæ, splendens, adulta, retorrda, friabilis, sincera, stridens. Reprobatur nigra bituminis similis, viridis, liuida, impura. Adulteratur Thure & Resina pini, sed odore fraus statim deprehenditur.

N. Quanto vetustior, tanto intensius citrina agit.

Vires, Calf. & succ. 2. subastr. emollit ventriculū roborat. Vfus præcip. in vomitu, nausea ac fluxu alui compescendo. Obiundit ac corrigit purgantium acrimoniam, reprimat exhalationes ventriculi, quæ caput alias ferire solent, (grana aliquæ post pastum deglutita.) roborat caput, nervosque genus, expuitionis sanguinis actus medetur, emendat oris halitum, spiritum a cerebro elicit (mastificando.) Extrinsecus Vfus eius creberrimus est in detesticiis, emplastris ac cataplasmatibus stomachicis.

N. Coquitur 3ß. in ʒiij. vel iij, daturque pro potu ordinario in Diarrhæa.

PRÆPAR.

1. Oleum stillat. s. flauum. 2. Oleum

rubrum seu Balsamum.

℞. Mastich. q. v. falis parum, (ʒi.) silic. contus. ana, destilla per ʒm, primo extillat liquor albus cum ʒo, flauo, tandem ʒe fortiori, ʒo rubrum, rectifica per retortam parua: flauum ʒo serua seorsim, rubrum deinde & Balsamum nigricantem itidem seorsim.

Aliter.

℞. Mastich. lb. ij. Boli pulu. M. ij. ʒi. q. s. impasta, digere que ʒ (14.) dein destilla per retortam ʒe nudo, & prodibit ʒo leue supernatans, tum quoque graue & ad fundum secedens, vtrumque rectifica cum bolo ac sale.

N. 1. Habes egregium modum Olei albi flauo & rubri in prima parte Glanber. p. 36.

N. 2. Et aliud sub titulo Quinta Essentia cum spiritu Thereb. in Myroth. Fabri. Per se autem factum Oleum præbet in copia, quod si super ʒm rectificaueris, ac redinis alicuius erit participes, additâ verò ʒ font. per B. habebitur Oleum flauum S. Closs.

3. Oleum per deliq.

Fit ic albumine oui cocti, aëri humido exposito.

3. Oleum Mastichinum.

Fit coctione mastich. in Ol. Rosat. omphac. Vide Diss.

4. Spiritus Mastichis.

Est liquor albus, (qui in ʒatione olei prodit,) rectificatus.

5. ʒ Mastichatum.

℞. Mastich. el. lb. i. ʒ rectif. lbß. digere ʒ (14.) postea affunde ʒ anat. & destilla in ʒB, i. prodit. ʒ. dein ʒ, quæ nullius vsus, ʒm in ʒB rectifica & serua.

N. Quod remansit ʒari potest per retortam, ut profundat ʒo.

Vires. Maxime prodest in ventricu-

li imbecillitate ac cruditate; in colico dolore, &c.

6. *Aqua Mastichina F.F.*

R^z. Mastich. lb. β. Cariophyl ꝑj. Macis ꝑj. vini albi generosi lbij. destilla per XX .

7. *Pilula Mastichina.* Vide Disp.

CCCXCII. Myrrha.

Supra, Dioscor. Bola Indis, Myrrha, Matth. Cord. in D. Garz. Frag. Cas. Lob. Est resina gummea (concretus, gummi resinofus succus, cuiusdam arboris exoticae, quæ cortice vulnerato, Myrrham profundit, partim in substratas tegetes destillantem, partim circa caudicem concrefcentem. Plurima affertur ex Arabia, tum etiam ex Regione Alexim, quæ Æthiopia est.

Delectus.

Laudatur friabilis, levis, vndique que concolor, minutis glebis, amara, acris, odorata, & quæ contracta, venas vnguium modo candidas & leues ostendit. Omnibus autem antefertur, quæ à loco vnde conuehitur, Troglodytica nuncupatur, colore pallens, seu sub viridis, splendens ac mordax. Inutilis est ponderosa & coloris picei s. nigra, (hæc myrrha animinea. Amati.).

N. Statim nihil aliud esse quam myrrham liquidam, testatur Dioscorides. Eius autem colligendi diuersosprehendimus modos. 1. Sponte ex arbore non vulnerata exudat. 2. Exprimitur ex myrrha, ut oleum Liquidambar ex Resina eiusdem nominis

Vires. Myrrha calf. & sicc. 2. (al. 3.) aperit, subastr. atten. maturat, discentit, purit. resistit. Vfus præcip. in uteri obstructione. sætu expellendo, in pulmo-

num & intestinorum mucilagine, ac inde nata raucedine, tussi & angina, pleuritide, colica, lumbricis: compescit diarrham ac dysenteriam, febrium rigorem, præcipue quartana arcet. Extrinsecus prodest in igne sacro, gangrana, tumoribus, vulneribus inueteratis ac recentibus, inprimis capitis, unde in Emplastris sticticis, ut vocant, vñs creberrimus esse solet. Masticata ac subinde deglutita halitus fœtorem emendat, coryzamque curat, &c.

Dosis à ℥β. ad ℥j. vel ꝑj.

P R A P A R.

1. *Myrrha Depurata*

Depuratur more solito: Myrrhæ subtiliss. trix affunde expressum succum, decoctum, vel insulum (intentioni tuæ appropriatum,) vel vinum ad eminen. digit. 2. digere in MB , ut mollescat, dein calide exprime & inspissa lente. *V. de Querc. Ph. Rest. c. 15.*

2. *Myrrha Extracta.*

Extrahitur cum V rectificatiss. s. a. abstrahitur V , inspissaturque extractū ulterius in vitro, vel vitreato vase ad consistentiam olei

3. *Oleum Myrrh.*

Destilla per Om ex aa

N. 1. Sunt qui myrrham cum serratura abietina macerant, ac postmodum per vesicam oleum eliciunt. Verum id aliqua ex parte abietinum est.

N. 2. Alij liquori myrrha V affundunt, digerunt, ac per X & ant. Med. destill.

N. 3. Alij digerunt myrrham puluerisat. cum +. atque hinc & ant.

N. 4. Neque per se, neque cum silicibus, arenâ, bolo aut farina laterum Ol. profundit, sed solum N um grauem & acidam aq. fœtentem. Fias igitur vitroque modo, ut dixi de Mastiche S. Closs

4. *Liquor.*

4. *Liquor Myrrha.*

Impone Myrrham pulueri albuli-
bi oni cocti adhuc calidi & tempore
in cellam ad liquefcendum. ad quā
tam cum eodem albamine repone ſu-
pra tabulam vitream & liqueſcat, de-
ſtillet in vitrum ſuppoſitum.

Vires. *Abſtergit maculas cutis, ſti-
gmataque ex lue venerea contracta.*

5. *Trochiſci de Myrrha.* Aug.

O.

CCCXCIII. *Omphacium.*

Agreſta, Agreſt, Gall. du Verius. Eſt
ſuccus ex vuis immaturis expreſſus
colatus, inque doliis repositus, & vaſe
clauſo aſſeruatus.

N. 1. *Præſtat vnas adhibere dies ali-
quot (4. 5.) ſoli expoſitas.*

N. 2. *Tempore Dioſcordis inſpiſſaba-
tur calore Solis ad conſiſtentiam Rob.*

N. 3. *Oleum acidulum ex oliuis im-
maturis expreſſum, ob ſaporis affinita-
tem, ſitidem Oleum Omphacinum ap-
pellari ſolet, de quo vide ſupra Olea,
claff. 1.*

Vires. *Inſeruit tam Eſculentis, quàm
Medicamentis. Refrig. 2. ſicc. 1. ſubſtan-
tia eſt craſſioris, ſaporis acido-acerbi.
Uſus præcipui ad hypochondria arden-
tia, ſtomachi ardorem, (oriſicio impoſi-
tum) imo calidis morbis omnibus feli-
ciori inuamento eſt, quàm aceturum, quod
præter refrigerandi vim & caliditate
acri poller, ſecus ac omphacium.*

PRÆPARATA.

Syrupus de Agreſta, vide Diſp.

CCCXCIV. *Opium.*

Sunt, qui Opij ac Meconij nomina
confundunt, & pro vno eodemque

habent, ſed male.

Opium enim lachryma eſt, quæ ſtil-
lant ex capitibus papaueris, dum ma-
tureſcebant, leuiter inciſis.

Meconium è contra ſuccus eſt ex
iisdem expreſſus, *Videatur Matthiol,
Cord. Garz. Frag. Bellon. Cord. in hiſt.*

Opium triplex eſt	{	1. Album, aſſertur ex Cairo, fortè eſt Thebaicum.
		2. Nigrum & durum, ex Aden.
		3. Flauescens magis & mol- lius, ex Cambaia & De- can.

Colligitur Plinio & Auicennæ ex
pap. nigro, at Turcæ ex albo (docente
Bellonio, *lib. 3. obſ. c. 15.*) leuiter inciſo
eliciunt, quotidianoque vſu ad ʒſ. vel
ʒj. nomine Maſſac aſſumunt, ad con-
ciliandam ſcil. animoſitatem. Verum
quia hoc opio caremus (flauescens
enim id eſſe leoninorum pilorum mo-
do, ait Bellonius) de opio agemus no-
bis vſitato, quod vel adulterum, vel
meconium, potius quam opium.

Præſtantiſſimum habetur nobis vſi-
tatū opiū Cambaſanum, quod ponde-
roſum, denſum, inflammabile & ardens
(non atra tamen flamma) odore ſopori-
ſecum (inſtar papaueris), ac graueolens,
ſapore amarum & acre; colore ad aloen
accedens, cum frangitur, ſplendore
quodam nitens, facile ſolutum.

N. 1. *Dignoscitur ab adulterato, quod
hoc ſi diluatur, liquorem croceo colore
tingat, ob Glaucium admiſtum.*

N. 2. *Opium ſeu Meconium noſtrate,
ſecundum Quercetarium, ex papau. no-
ſtrati Extractum. Vide ſupra in papau.*

Vires Opij. *Vim poſſidet ſpiritus com-
motos, inquietos, ſeditioſosque compeſcen-
di, facultatiſque animali peculiari qua-
dam proprietate torporem inducendo.*

Vnde somnus, sensibilitatis imminutio, &c. media sane maximi solaminis, in vigiliis, doloribusque intensis. Verum enim verò, nec & suis incommodis opium caret, nimirum, præterquam quod excretionibus urine & fœcum supprimat, malignitatem quoque exercere aptum est. Hac videlicet linorem artuum, frigidofque sudores, respirationem parvam, ac difficilem, mentis alienationem, &c. inducit. Scribonius.

N. De caliditate & frigiditate maxime controuertitur. Plurimi tamen cum recentioribus calidum id probant, inducti à marore, inflammabilitate, acridine, vi exulcerandi, &c. Alij cum maioribus frigidum id demonstrant, virtuti scil. insistentes narcotica, quam obtinet. Disputatio, me hercle, citra necessitatem. Etenim statuatur calidum, reputetur frigidum, quid inde? nec enim in copia adhibetur tanta, ut metienda inde inferre possit incommoda. Verum tamen calidum potius dicendum esse quam frigidum, potiores euincunt rationes: nec obstat vis narcotica, utpote quæ non à frigiditate, sed occulta qualitate procedit. Simile enim vaporum observare licet in nonnullis correptis peste, febribusue malignis & ardentibus. In quibus sane quicumque narcotin ad frigiditatem referre voluerit, igni frigiditatem attribueret.

PRÆPAR.

1. Extractum Opij Quercetani.

℞. Opij tenacis (nou emarcedi,) q. v. fcinde in bracteolas tenues & exiguas ac in patina vitreata moderato calore (arenæ) exicca (cauendofumum) donec in puluerem digitis comminui possit & fœtorem amittat. Sic ☿ fœtidum discussum, in quo omnis vis narcotica.

℞. Opium hoc ☿ suo narcotico

exutum, extrahe s. a. Tincturam cum ☿^a fortissimo, (vel succo Limoniorum) abstrahedein menstruum in MB ad melliginem seu extracti formam. Hærem. in Croll.

N. Feces quæ post Tincturam extractam remanent inferuire possunt anodynus externis inde concinnandis, e. g. in Podagra, &c.

2. Aliud Quercetani Extractum Opij & Hyosciami, quod placet appellare.

Extractum Olij succati.

℞. Succij seu Extracti Hyosciami ʒx. (vide Hyosciam.) opij præpar. i. e. ad ignem exiccati, ut dictum ʒx. vel vj. Digerantur lentò calore cinerum. Sic attrahit opium tantum succi, quantum sufficit, quod residuum erit ab attractione, seorsim separabitur per inclinationem & exhalationem. Ex eo autem quod coagulatum est extrahe Tincturam cum succo Limoniorum s. a. donec animaduuerteris succum non amplius colorari. Tinctos liquores decantatos digere denuo, ut crassiores feces subsideant, quas secerne.

N. Laudanum opiatum maius Quercetani ingreditur.

3. Extractum Opij Angeli de Sala.

℞. Opij in frustula concisi lb. ss. humectetur aceto ros. ʒij vel iij. atque exponatur igni & sarragine ferrea, continuo agitando ut liquefcat, vaporque opij ☿reus ac noxius vna cum + in auram abeat, opiumque refrigeratum friari ac puluerisari queat.

N. Ignis caute administrandus, ne ἐμπύρευμα contrahat.

Hinc ℞. opium illud puluerisatum ros. lb. iij. stent in calore arenæ (saltem aliquot horis) ut solvatur, dein cola

cola per colum linteum, cum expref-
fione ac coagula. Hinc folue denuo in
Qu.E. Sambuci rectificatiffima: clari-
fica cum album.oui ac infpiffa ad con-
fiftentiam pilulis aptam.

N.Sal + ros.operationem opij (cum quo
iungitur) non modomitiozem reddit, fed
& vim eius diaphoreticam confortat, ut
vel fudor haud fine leuamine fubfequa-
tur.

4. Extractum Opij Crollianum.

Rx. Opij (purgati prius in liquore
hilfopi, vel aqua gata,) q.v. extrahe fa.
cum V decanta & abftahe.

N. Crolliana hac extractio non fine
ratione reprehentionem incurrit, quia 1.
☞ illud, in quo vis narcotica latitat, hu-
mana natura inimica, per V tenui-
fubtilius, adeoque ferocius redditum,
Laudani compositionem deteriozem fa-
cit. 2. Spiritus vini fuâ natura nihil præ-
ter ☞ extrahit, fale intraceto, quod potif-
fimum tamen requirimus. Præftat itaque
cum aceto extrahere, quam cum V.
Hartman. in Croll. Brendel.

5. Laudanum opiatum.

Laudanum opiatum, nihil aliud eft
quam Extractum Opij admixtione ale-
xipharmacorum, cordialiumue, & fim.
correctum. Dicitur autem Laudanum,
quafi laudatum medicamentum, ob in-
fignes operationes, quas vel in grauif-
simis morbis præftat, quales funt 1. do-
lores fedare. 2. fomnum inducere. 3. om-
nes fluxiones fiftere. 4. ardorem miti-
gare. 5. Naturam confortare, Inquietos
fpiritibus in Phrenitide, Arthritide, Epi-
leptia, & fim. compefcere. Variæ porro
laudani huius descriptiones circum-
feruntur, quarum tamen præcipuæ funt
fequentes.

6. Laudanum Opiatum.

Rx. Extr. Opij (Quercet. vel Sale) li-

quidi adhuc infar mallis ʒj. Magifter.
vel fal. corallor. petlar. añ. ʒß. Extract,
croci (cum V facti) ʒij. M. omnia di-
ligenter & ferua. In fine addi poffunt
aliquot guttulæ ol. caryophyllorum.

N. Alij fpir. ☉ admifcent.

Hoc Laudanum eft pene inculpa-
bile & fecure fine omni alicuius pe-
regrynæ affectionis metu poteft admi-
niftrari.

Dofis à gr. ij. ad iij. Hart. in Croll.

7. Laudanum Opiatum Querc.

Rx. Extr. feu Effent. Opij, ʒij

Extr. Croc. (cum aq. Limon.

fact.) ʒj.

His confufis adde.

Pulu. Hyacinthor.

Corallor. añ. ʒiß.

Terræ figill. ver. ʒj.

Bezoard. ver. (f. Extracti Be-
zoardici. V. l. 2. c. 57.

Vnicornu.

Ambr. gryf. añ. ʒij.

M. exacte, continuo agitando ad ▽
lentum, donec ex materia frige facta
pilulæ formari poffint.

Vires. Insignes ac fufpiciendas perci-
pies huius anodynæ effectus, quod te fpe
nunquam fruftrabit. Nam confert citra
moleftiam & cerebri vllam perturba-
tionem, aduerfus omnis generis dolores,
à quacunque caufa fubortos, contra om-
nes hamorrhagias, in quacunque corpo-
ris parte fuerint, contra omnes defluxio-
nes & fluores ventris, dysentericos, he-
paticos: lientericos, & fim. & ad inda-
cendam gratam tranquillitatem in fe-
bribus ardentibus, in quibus ipfirationis
fenses laditur, & in phrenesi ager ple-
runque delabitur.

Dofis pilula vna ac altera magnitu-
dine grani piperis. Querc. in Pharm.
Reft. c. 25.

8. *Aliud, Laudanum Opiatum Quercetani*, quod libet appellare.

Laudanum Opiatum maius Querc.

℞. Extract. Bezoard. Quercet. (nondum inspissat.) *Dosi ut l. 2. c. 57.*

Extr. Croci ex croc. ℥iij. cum ▽
 8 at. ex succo limon. vel pomor.
 redolent. acuata cum Ω u \oplus ,
 vel \odot \odot 4.

Extr. Myrrhy ac mumia , (vt sequitur)

Extr. Opii succati (quale & quantum supra paratum,) sc. ℥vj.

Misce & lento ▽ e religantur ad consistentiam mellis.

Dein adde:

Succin. Citrin. præparat. (i.e. super quo ▽ opt. aliquoties (4.) de-
 stragarit.) ℥iij.

Sar. Perlarum.

Corallorum. añ. ℥ij.

Terræ sigill. opt. ℥i℥.

Pulu Bezoard. ver.

Oss. de C. C.

Vnicorn. ver. añ. ℥j.

Ambr. gruf. ℥℥.

Misc. opt. in fine addendo
 \odot 0 Anis.

Fœnic. añ. gr. xij. vel xv.

serua pro℥vfu.

Dosis , est magnitudo piperis, vel
 gr. ij. iij.

*Extractum Myrrhæ ac Mu-
 mia fit:*

℞. Vriusque añ. ℥℥. dissolue in hydromelite vinoso ad Δm, traicé-
 que calide per chartam, quia visco-
 sa est solutio.

9. *Aliud Laudanum Opiatum, Anodynum specificum Paracelsi.*

℞. Opii Thebaic. ℥j.

Succ. aurant. acid.

Cydon. añ. ℥vj. (alii addunt

& ▽ spermat. Ranar. tantun-
 dem.

Cinamom.

Cariophyll.

Croci or. añ. ℥℥.

F. digestio leni calore Solis vel fornacis per \boxtimes m, dein exprimantur & im-
 ponantur iterum:

Moschi \mathcal{D} ℥.

Ambræ \mathcal{D} iiij.

Magist. Corall.

Perlar. añ. ℥℥.

Misce. digereque iterum per \boxtimes m.
 postea adde

Quint. Essent. auri. ℥℥.

Misce exacte.

N. Hartmannus omissa Q. E. auri remanentiam incinerare, atque Sal inde extractum priori mixtura admiscere iubet.

Vires. *Anodynum specificum est Paracelsi ad auferendum quoscunque dolores internos & externos.* Hartman. in Croll. Sala in Opiolog.

10. *Aliud.*

Nepenthes aureum Angeli Sala.

℞. Extr. Opii (Sala) ℥℥.

Croci (vt in laudan. opiat. maior.) ℥iij.

Lap. Bezoar. seu Tinctua. auri,
 \mathcal{D} ij.

Resin. ligni aloes.

Ambr. gryf. opt. añ. \mathcal{D} j.

Misce & incorporentur simul in vase vitreo, eoque bene clauso seruentur.
Sala in Opiologia.

11. *Laudanum Opiatum Crollij.*

℞. Opii Thebaic. ℥iii. purgetur in ▽
 hyssop. dein extrahatur cum ▽.

℞. Succ. Hyoscyam. debito tempore collecti, & in \odot inspissat. ℥i℥.

F. Extractio cum ▽.

℞. Spec. Diambæ.

Diamosch.

Diamosch. añ. ʒii.ß.

F. Extract.

Hisce Extractis per ☒ ses 2. digestis
admisce.

Mumix transmar. ʒß.

Sal. Perlar.

Corall. añ. ʒiij.

Liquor. succin. per alcohol. vini
extract.

Off. de Corde Cerui.

Lap. Bezoard.

Vnicor. animal. vel minor. añ. ʒj.

Moschi.

Ambra, añ. ʒj.

Est in defectu genuini auri potabilis,
nullis corrosiuis inquinari, addantur
in fine.

☉ Anisi.

Carui.

Arantior.

Cittior.

Nucist.

Caryophyll.

Cinamom.

Succin. añ. gr. xij.

F. Massa pilularis.

N. 1. Radices & Cortices Hyoscyami
iuniores recentes, (abiecto interno trun-
co lignoso,) colligantur ☉ & ☾ existen-
tibus vel in ♀, vel in ♂, ante plenilun.
Alij colligunt, si fieri possit, in ipsa hora,
quando ☾ in dictis signis renouatur. Ex-
pressus succus depuratus inspissatur ad
consist. mellis, dein extrahitur cum ♀
inspissaturque l. Δ.

N. 2. Succus Hyoscyami & Opium
(antequam reliquis misceantur,) prius
reiciant sua ♀a, & venena noxia,
(qua spume instar superficiem petunt.)

N. 3. Pro muliebribus propter suffo-
cationem matricis omittantur Moschus
& Ambra, vel corrigantur adiectione
granorum aliquot Castorei.

N. 4. Ex remanentia incinerata Sal
extractum mixtura misceatur.

N. 5. Extractions ille digerantur per
menses 2. dein abstrahatur ♀, addan-
turque pulveres.

N. 6. Oleis, quia difficulter extracto
miscentur, prius in vicem mixtis, ali-
quot gutta ♀ affundi solent, & diligen-
ter commisceri, ita facile compositioni
miscentur.

N. 7. Compositio lenissimo calore per
ensem fermentari poterit.

Dosis è gr. ij. ad iiij.

12. Laudanum Opiatum Clar.

Sennerti.

℞. Opii purific. ʒj. F. Extr. cum ♀.

℞. Spec. Diamb. ʒj. F. Extr. itidem
cum ♀.

Hinc affundatur Extracto Opii, (ad
syr. consistent. inspissato,) Tincturæ
Diambæ pars dimidia & succ. extr.
rec. purific. ʒvj. stent in digestionem ☿
20 sæpius agitentur, vbi ♀ maxima
pars exhalauerit.

Adde

Extr. Castor.

Solut. Corall.

Perlar. añ. ʒß.

Essent. Croci ʒj.

Affund. Tincturæ Diambæ reli-
quum, lentoque ♀, ♀ exhalet.

Sub finem adde:

☉ Citri.

Cinamom.

Caryophyll. añ. gr. iij.

F. Massa instar Extracti.

Dimidia parti adde.

Moschi.

Ambra añ. gr. vi.

Reliquum referuetur pro fœminis.

13. Laudanum simplex Plateri.

Laudanum simplex habetur in
obseru. Plateri p. 455. ex ʒj. bdell. in
succo

succo plantag. emolliti & ʒj. opij in
V soluti F. massula, cuius dosis gr. vj.

14. *Alind.*

℥. opij super laminâ ferreâ exic-
cat ʒij.

Syrac. calamit.

Labdan. añ. ʒʒ.

Ol. garyoph. gutt. iiij.

Malaxentur in mortario calido & for-
mentur pilulæ magnitudinis pisi pon-
dere gr. 4. aut 5. detur vnica.

15. *Laudanum liquidum.*

Fit ex opij desiccata, super laminâ
ferreâ ʒʒ.

V opt. rectific. ʒvj.

℥, ʒ opt. ʒʒ.

Croci Anglic.

Specierum diamb.

Diaromat. ʒ. ros. añ.

ʒiiij.

Ambr. grif. ʒʒ.

Infundantur simul matraccio clau-
so, digerantur calore lento per 20. &
continuos, coletur per chartam & co-
latura seruetur. Est iis accommodatum,
qui pilulas sumere nequeunt.

Dosis à gr. 4. ad 8. & c.

16. *Laudanum solidum S.*

Closs.

Totum Laudanorum artificium
consistit in correctione opij, quæ fit per
diutina digestionem in X (sp. 8. die-
rum) quæ ter cum nouo X repetenda
venit, abstrahatur postea X à tincto li-
quore ad consistit. Extracti.

℥ extracti Opiatici ʒij.

Croci (in p. 8. aq. ros. &

spir. vin. parte vnâ fa-
cti) ʒʒ.

Castor. eodem modo pa-
rati ʒj.

Extr. spec. Diabr.

Diamarg. frig. &

Diamosc. dulc. in X
mixtim parat. ʒiiij.

Magisterij corallini ʒ lat. ʒvj. M.
vt artis est. Seruetur in vitro ad dimi-
dias solum pleno quia post paucas ho-
ras fermentari incipit, quod dum fit,
agitetur sæpe spatulâ ligneâ.

Dosi gr. iiij.

N. *Essentia & cariora omnia quæ
vulgariter Laudanis adduntur, pretium
potius, quàm virtutes augent.*

17. *Laudanum pectorale valdè excel-
lens Ang. Sala attributum.*

℥. Extracti Opii liquidi in part. iiij.
W, & parte 1. aq. ros. per digestionem

3. 6. in B. parati ʒ. Croci.

Florum ʒ Benzoinat.

Aloës lucid.

Myrrh. el. añ. ʒii. pulueris entur &
M. calidè, addendo spiritus ʒi. (ad
promouendam fermentationem.)

Hoc Laudanum tutissimè exhibetur
phthisicis à Catarrho, Asthmaticis tus-
sientibus, cum extracto succi glycyrrh.
In Epilepsiâ aërea cum sanguinis effe-
uescentiâ, hæmorrhagiâ, capitis dolore.
Indentiû dolore dissoluitur in + & ap-
plicatur denti. Dose eadem cum superiori.

N. *Plures insuper Laudanorum de-
scriptiones passim reperiuntur, vt in Al.
chymia Libanit, l. 2. cap. 1. in Opiolog.
Cl. Dn. D. Winckleri, Freytagij, & sim.
quo curiosum Lectorem remittimus.*

12. *Pilule Narcotice Plateri.* Vid.
lib. 2. c. 74.

CCCXCV. *Opopanax.*

Ὠπὸπανᾶξ, Dioscor. Opopanax.
Gummeus est succus ex panacis he-
raclei sauciata radice effluens ac con-
crescens.

Dicitur Opopanax & Opopana-
cum,

cum, *Cord. hist. Caf.* Planta autem insignitur, *παινάκης ἡρακλέους*, v, *Dioscor.* Panaces Heracleum, *Matth. Cast.* Panax Heracleum, *Lob. Dod. Ger. Fan. Her.* culeum, *Caf.* primum, *Tab.* Panax Sphondylii folio, *C.B.3.*

Vires. Calf. 3. sicc. 2. emollit, digerit, flatu discuit, purgat pituitam, crassam & lentam, a partibus remotis, cerebro, nervis, scissoris, interuris, Thorace, (de quo Class. 4.) vixula delapsa opitulatur, (suffitu in os immisso.)

N. Signa bonitatis, color extus flavus, intus albus, aut subflavus, sapor valde amarus, odor gravis, consistentia pinguis, facile in aqua solubilis, lenis, tenerat, friabilis, galbani instar lactescens, dum resolvitur ad lacteum liquorem propius accedens, Improbatur *Opopanax niger ac mollis.*

P R A E P A R.

Opopanax, styrax calā, bdell. labdan. parum admodum olei profundunt.

P.

CCCXCVI. *Pissaspaltos.*

Πισσασφάλτος } *Natium Ervvachs.*
Πισσασφάλτον } *Factitium.*

Natium describitur à Dioscoride, quod nascatur in Apollonia Epirotar. Item quod ex Cerauniis montibus deuoluatur, & impetu fluminis raptum rursus æstu in littus expuatur, ibique concreseat. Hac ratione nihil aliud esse videtur quam *δ. φάλτος*, de qua l. 3.

Factitium, est compositum quid seu mixtura ex pice ac bitumine (unde & nomen accepit,) videturque id esse, quod nostrates *ἀσφάλτον* vocitant seu bitumen Iudaicum.

N. Sunt qui *Pissaspaltos* mumiam *Arabum* dicunt, de quo lib. 5. in homine.

Vires. Calf. 3. & sicc. 2. dolori capitis, aliisque eius morbis à frigiditate obortis medetur.

CCCXCVII. *Pix.*

Πισσα. Pix, Pech. Est pars Resinosa ex accensis tædis, i.e. arboribus resinosis per senectutem nimia pinguedine q. strangularis, colliquata.

Modus fiendi rusticis committitur, qui in nonnullis locis, vbi arbores resinosa abundant, inde victum lucrantur: fitque ad modum quo destillatio per descensum feri solet. Rogus scil. tedarum resinosaum contegitur vndique termitibus, & terra, ne qua exhalatio fieri queat: hinc subdunt ignem per foramen relictum, quo fit vt resinosa pars colliquata in canales affabre subditos effluat, initio liquidior, hinc crassior, vltimo crassissima. Affertur autem copiose ex Finlandia, vbi regos eiusmodi plures non citra oblectationē vice Jynæ & eadem conspexi, abierem enim ac Pinum copiose illa alit.

Dicitur *Pix* liquida, *Pisselæon, Dioscor.*

N. *Arbores resinosa sunt imprimis Pinus, Abies, Larix, Terebinthus, Cedrus.*

Pix illa vbi denuò coctione purgatur, seu si manis dephlegmatur, crassefcit magis ac magis, diciturque *Pix sicca, Palimpissa, Pix naualis* (quod nauibus picandis adhibeatur, non quod à nauibus maritimis derasa sit, quippe hæc appellatur *Zopissa,*

Vires. Vt resnam sapit, ita & resinarum Vires obtinet, idque eo magis, quo liquidior pix fuerit, sicca enim exiccat fortius: facultatis itaque pix liquida est calfacientis, discutientis, mollientis, di-

gerentis, anodyna, &c.

PRÆPAR.

Ol. stillat. Fit l.c. per Ret. per se, vel addito fabulo.

Vires. Maxime prodest ad vulnera capitis, & ad puncturas ex causâ frigidâ egregiè facit.

N. Multum olei fundit.

R.

CCCXCVIII. Resina Terebinthi
f. Terebinthina Cypria

Terebinthina in officinis Resina est liquidiuscula, referens balsamum siue oleum crassiusculum, colore ex albo flavescent, sapore acris, lenta, cutique tenaciter adhærens. Estque duplicis generis. Resina scil. Terebinthi & Resina Laricis. Resina Terebinthi *ριντιν τερεβινθινή*. Resina Terebinthina (Aucennæ gluten Albotin) est ea quam Officinæ Terebinthinam Cypriam Venetam, Paracelsus Lorchet appellant. Terebinthina Resina. *Matth. Ter. vera, C. B. 1.*

Optima censetur clara, pellucida alba, vitrei coloris in cæruleum vergentis, acris & odorata. Præfertur item quæ ex Cinio Insula affertur, post hanc Lybica, tum Pontica; tandem Cypria, Syriaca, Iudaica. Arabica Terebinthus arbor est mediocrius magnitudinis, in plurimis regionibus sponte familiaris, v. g. in Hispania, Syria, Sicilia, &c.

N. Terebinthinam veram officinis esse ignotam autumat Clusius, officinalemque esse resinam abiegnam è novellis abietibus collectam. Videfis class. 1. in abiete.

Vires. Facultates Terebinthina ex lib. 2. sub titulo de Resinis huic referre licet. Excellit enim Terebinthina, præ

reliquis Resinis, unde & facultatibus præpollet. Conferre intrinsecus præcipue in tussi aliisque pulmonum affectibus (cum melle,) in urina ac aluo cienda: convenit Epati, Lienis, Renibus, Vesicæ, expectorationi purulenta ac phthisi incipienti succurrit, calculum pellit, arthriticos affectus innuat, uterum à saburra liberat. Extrinsecus usitator est terebinthina laricea, quæ huius vicaria in defectu esse potest, viribus iisdem pollens, sed imbecillioribus.

N. 1. Lauari solet in aqua appropriata, & hinc exhiberi.

N. 2. Exhiberi potest 1. per se, plantulis quas oblatas vocant, inuoluta. 1. In aqueo liquore, adiecto tantillo Vitelli oui, sic lacteum scil. exhibet liquorem. 3. Inspissata aliquantulum & in pilulas redacta. Verum ob evanescentiam spiritus præstant modi priores, vel si placet, fermentur modo sequenti.

Pilula de Terebinthina cum Rhab.

Pilula Podagrica.

R. Terebinth. Cypr. ʒj coq. in ∇ chamæpyt. dum albescat hinc adde Rhab. opt. pulu. ʒvj.

Iv. arthetico.

Succin. alb. añ. ʒij.

Glycyrrhiz. ʒj.

M. & F. Massa.

Vires. Faciunt ad remouendam materiam calculi & podagra.

Dosis ʒß. ad ʒj. &c. Greg. Horst. part. 1. lib. observ.

N. Crato easdem habet, sed paulo secus, conf. 143.

CCCXCIX. Resina Laricis. f. Terebinthina vulgaris.

Resina Laricis est, quam Terebinthinam vulgarem, seu Terebinthinam simpliciter

simpliciter ita dictam, vocant. Hæc quanto Terebinthinæ prioris similior, tanto quoque præstantior æstimatur, adeoque optima, quæ purissima, odoratissima, aliquantum translucida, & quæ ab intincto digito contumaciter & æqualiter diffluit.

Vires. Calfac, emollit, abstergit, Vfus præcipuus intrinsecus in pulmonibus expurgandis, in gonorrhæa sistenda (cum ∇ plantag. ac succino,) urinam ac aluum ciet. Extrinsecus Chirurgis vssatissima est, fereque in Emplastris omnibus adhibetur, mouet enim pus, maturat, scabiæ cutis medetur.

N. Sunt qui Therebinthinam, in cereuisia infundunt atque simul deferuere sinunt, pro potu ordinario in præseruatione calculi, viscerumque obstructionibus.

PRÆPARATA.

Ex Terebinthina sola vulgari fieri solent, ad quem modum tamen & reliqua tractari poterunt.

Suntque	1. Spiritus Terebinthinæ.	} Horū præparationes. Vide. l. 2. de oleis.
	2. Oleum Terebinthinæ.	
	3. Balsamus Terebinthinæ.	

N. Oleum ac balsamus rarò seorsim, crebro coniunctim extant.

4. Colophonias.

Vires. Spiritus calfacit, siccatur, attenuat, urinam ciet, tartaream mucilaginem resoluit. Hinc confert in tussi, aliisque Pulmonum affectibus tartareis, in Lienis & uteri obstructione, in calculo Renum & Vesicæ, in stranguria, gonorrhæa virulenta, ulceribus penis ex lue venerea.

Dosis à gr. iij. ad vj. & ultra.

N. Urina odorem Violaceum congeniat.

Balsamus calfacit, attenuat, mundificat, consolidat. Hinc adhibetur feliciter membris frigore rigidis, tumoribus scirrhis, vulneribus inueteratis ac putridis, gangræna, fissuris pedum à frigore oriundis (pernionibus) quas efficaciter curare creditur.

N. Conrad. Rustath commendat summè spiritum Terebinth, mellitum, cuius guttulas 4. 5. 6. in liquore conuenienti quotidie exhibet ad calculum Renum & Vesicæ atterendum, Parat ex mellis puri part. 2. & Terebinth. p. 1. mixtis exacte, & per Ret. vel \times destillatis.

5. Oleum cœruleum Terebinth.

Fit S. S. S. in Vesicâ cupreâ ex scobis radicum pinguium abietinarum cum flore chamom. affusâ aq. q. s. fermententur per dies aliquot, donec Thereb. abieti inhærens tincturam \varnothing is ad se attraxerit, quam in olei eius prolestatione secum in \times rapit, sibi que per omnia miscet. Est vulnerarium incomparabile, si Thurnheusero creditur.

6. Tinctura Therebinth.

Euaporet ol. flauuillius leniter in scutellâ, dū restet Colophonias rubentissima è quâ tincturâ cū ∇ trahitur, eo que remoto balsamus relinquitur quod renes inungitur in doloribus Nephrit.

7. Sal volatile Thereb. purgans.

Describ. in Myroth. Fabri.

8. Pilula de Therebinthina cum Rhabarb.

Terebinth. cypr. \mathfrak{z} j.

Coq. in aq. chamæpytios dum albescat.

Hinc adde Rhabarb. opt. pulu. \mathfrak{z} vj.

Iux. arthetic.

Succin. alb. añ. \mathfrak{z} ij.

Extr. Glycyrrhiz. \mathfrak{z} j.

M. F. Massa.

KKkk 2 N. Conrad

N. Crato aliquot huiusmodi descriptiones exhibet, atque Rhabbarbarum in minori quantitate immiscet.

Vires. Commendantur in praeservatione arthritidis, calculi, &c. Assumuntur singulis trimestribus, &c.

Dos. ad ʒj.

Greg. Horst. lib. 1. obseru.

S.

CCCC. Saccharum.

Σάκχαρ, σάκχαρον, μέλι κοχρίμων, ἄλς Ἰνδικός, Sacchar, Saccharum, Zucharum, Zacchar, Zaccharum, Succharum, mel Harundinaceum, mel Cannæ. Arabib. Zazar, Sudur, Sutter. German. Zucker. Vid. Matthiol.

Succus est plantæ cuiusdam arundinaceæ, non solum in India, sed in multis Asiæ & Africæ locis, quinimo & in Europæ quibusdam Regionibus vernaculæ.

Exhibet autem Saccharum, partim incisione Trunci, vnde Saccharum instar Lachrymæ extillat, quod rarum est, partim elixatione potissimum medullæ ac radicis, donec s. saccharum in fundo instar salis concreuerit.

Planta illa saccharifera inscribitur Arundo saccharifera, C. B. 2. scil. inter arundines Indicas. Arundo saccharata, Dalech. in D. Arundo saccharina Indica, Lob. Ar. & Calamus Saccharinus, Lob.

N. Sunt qui saccharum Veteribus incognitum fuisse statuunt, sed falso. Mentionem enim sacchari faciunt sub nomine mellis in cannis concreti, mellis arundinacei, Galen. 8. Meth. & 7. simpl. Dioscor. l. 2. c. 75. Hinc Paulus Aegineta, l. 7. c. 3. Salem Indicum vocare videtur, quod interdum supernamente Solis

calore induretur & concretum Salis effigiem referat. His 3. ad stipulatur Plinius l. 14. c. 18. Sic & Auicenna Fen. 1. Can. 4. tetr. 2. c. 23. salem scil. appellat, qui ex India aduectus, colore sal. dulcedine mel. representet.

Denominationes sacchari sumuntur tum à locis, vnde pierunque asportatur, tum ab elaboratione, qua depuratur, Officinisque communicatur.

A loco natali dicitur 1. Saccharum Madariense, vel Mederienne, à Medera Insula. 2. Saccharum Canariense, Canarium, à Canariis Insulis. 3. S. Thomasinum seu Thomæum, ab Insula S. Thomæ. 4. Sacchar. Maltanum, Melisium, siue Melitheum, Cibale, à Maltha, seu Melitha Insula. Sic dicitur & 5. Valentinum à loco refinationis, qua Valentia Hispaniæ celebris est.

N. Madera, Canaria, S. Thome Insulae sunt Insulae in Atlantico mari sitae, Africaeque vicinae.

Ratione elaborationis, saccharum, vel est non finum, vel refinatum, seu finum, vel Candisatum, vulgo saccharum Candiseu Candum, Non finum quod sola coctione in ∇ depuratum est. Adfertur ad nos partim in Pyramidales metas fusum, partim in formam pulueris ac grumorum crassiorum redactum. Non finum in puluere Materialitis Cassonada vel Castonada vocari solet, forsan, à Cistis, quibus inclusum ad nos aduehitur, Cista enim Germanis inferioribus Kast appellatur. Aliis saccharum miscellaneum, quod ex diuersis saccharis commisceatur. Estque hoc saccharum tum minus excoctum, tum quoque minus purgatum, vnde & minus candidum, quippe quo magis, depuratur, eo magis albet. Hinc diuersi coloris exhibetur, album, gryseum,

gryseum, pallido citrinum, citrinum purpureo-nigricans, &c.

Non finum in metris, est pulueratum illud saccharum, vltiori coctione in ∇ excoctum, despumatione (citra refinationem) clarificatum, in formulas pyramidales vsitatas effusum, qua ratione à sordibus feculentis per foramina formularum illarum destillantibus sequestratur.

Resinatum seu finum est, quod lixiuio (ex calce viua cum ∇ facto) solutum, excoctum, despumatum, & postmodum inspissatum, inque formulas effusum est, inferiori parte perforatas, vt feculentus glutinosus succus defluat.

Saccharum candisatum, vulgo saccharum candi s. candum, saccharum candium, saccharum crystallinum, saccharum lucidum, Germ. *Zucker. Candir.* Est saccharum depuratum, candisando in crystallinam formam s. a. redactum, ad modum quo folia crystallifari diximus. Estque album vel rubrum: album fit ex Canariensi; rubrum ex Tomasio.

Delectus 1. Ex loco natali optimum habetur Mederiense, hinc Canariense, tertium locum sibi Melisium vendicat, vltimum Tomasium. 2. Ex colore, purius æstimatur album, hinc gryseum & denique rubrum.

N. De Saccharo resinato, vitrum non resinato præstat, dubium mouetur. Negatinam habet Tabernamontanus, *Herbar. l. 1. c. 41.* Affirmatiua tueretur Angelus Sala in sua Saccharologia, l. 1. c. 4. Verum mallem ex Scopo rem decidere, quo resinatum, quia aliquantulum acrius est, præstat in attenuatione, incisione, absterfione, non resinatum in lenitione, lanigatione, adeoque in pulmonum

vitiis, & cat.

PRÆPARATA.

1. *Saccharum Penidium.* Hoc fit. R. saccharum q. v. dissolue & clarifica per alb. oui. Hinc cola ac inspissa lentè, donec bullæ magnæ apparuerint. Hinc retrahe ab ∇ , vt bullæ resideant, effundeque in tabulam oleo amygd. illitam atque vbi non nihil induruerit, de vnco suspende, manibus celeribus (amylo conspersis) distrahe in formam debitam ac repone.

2. *Saccharum Rosatum.* Fit ex sacchar. in succ. ros. soluto.

3. *Saccharum Violatum.* Fit eodem modo cum succo violar.

4. *Aqua seu spiritus acidulus.* R. Sacchari (lbij.) destilla ex cucurbita vitrea sat alta & ampla (quippe facile in altum attollitur,) Δ arenæ per gradus (NB. vel Retortam adhibere poteris,) sic extillat aqua acidula, cum oleo supernatante: Rectifica B si placet, oleumque à spiritu separa.

Vires. *Spiritus hunc in dissolutione lapidum, aliorumque crustaceorum adhibere licet, & est instar spiritus Guaiaci.*

5. *Oleum.* Ex prioribus patet.

6. *Sal.* Ex relicto capite mortuo, vltius incinerato elixiuatur.

7. *Liquor seu syrupus.* R. Sacchar. cand. q. v. affunde ∇ ad eminen. digir. 1. accendatur, efflagretque ad consistentiam syrupi.

Vires. *Prodest in tussi, aliisque affectibus pulmonum, incisione ac lanigatione opus habentibus.*

N. *Liquor hic apud vulgum vsitatissimus est, magneque æstimationis.*

8. *Liquor alius.* Inde Saccharum candidum albumini oui cocti ad duritiem, repone ad liquefendum.

Vires. Exhibetur ad tussim & asperitatem gutturis infantum. Extrinsecus confert oculorum rubedini.

9. *Essentia & crystalli Sacchari.*

Essentiam & crystallos Sacchari parauit, ut reperiesset publicatum centur. 3. artic. 20. Kessleri. Addidi autem pastam ex sacch. & ✕ factam cochleare vnum aut alterum ol. Tri, materiam relinquo indigestione cinerum per 24. horas, postea pro 16j. sacch. affundo V non rectif. mens. 8. digeratur, denuo, habebis Tincturam corroborantem.

Dos. cochl. ij. Sam. Cloff.

CCCCI. *Sagapenum.*

Sagapenum, Diosc. *Sagapenum*, *Sacoponium*, Offic. *Serapinum*, *Matth. Cord. hist. Cas. Sirapinsassr.* Est lachryma seu Gummi arboris cuiusdam ferulaceæ, eiusdem cum succo nominis, ex qua fauciatia educitur.

Nascitur in Media Regione, vnde Alexandriam, ac hinc Venetias atque in alia Europæa loco transportatur.

Optimum censetur syncerum translucentum, foris colore fuluo vel ruffo intus albido, gustu acre, odore graui, porriunque æmulans.

Vires. *Calf. 3. sicc. 2. attenuat, aperit*, substantia est tenuis: tanta extrahendi vi pollere dicitur, ut quoque spicula ex carne eliciat: purgat lentos & crassos, imò & serosos humores, ex ventriculo, intestinis, utero, renibus, cerebro, nervis, iuncturis, pectore. Hinc prodest in hydropse, tussi inueterata, asthma, cephalalgia, spasmo, epilepsia, paralyssi, tremore artuum, in obstructione & tumore splenis, febribus intermittit, dolore colico, menses ciet, (sed fœtum ene-

cat) urinam mouet. Extrinsecus conuenit in pleurisi, aliisque tumoribus ac doloribus. mitigatione ac resolutione opus habentibus. Fumus excitat Epilepticos, hordeola Ciliorum sanat.

Dosis à 3ß. ad ʒj.

N. 1. *Ventriculo ac Epati quia nō adeo familiare est*, corrigitur tertia parte *Mastiches, Cinamom. Zinziber. &c.*

PRÆPARAT.

1. *Sagapenum depuratum.* Fit ut depuratum ammoniacum:

2. *Pilula de Sagapeno.* Vide Dispens. August. & Cordi.

3. *de Sagapeno Camilli.* Vide sis apud Quercet. & supra l. 2.

4. *fœtida.* Vide Disp. Aug. & c.

5. *Oleum stillat.* Fieri poterit ut ol. Gum. Ammoniac. per ✕ in ☉.

CCCCII. *Sanguis Draconis.*

Αἷμα δράκοντος, Dioscor. Sanguis Draconis est Lachryma arboris cuiusdam, instar sanguinis exiccati, concreta. Soluitur quidem in ∇, quam lacteum quasi reddit, sed sine mixtione, quippe refrigerata ∇ subsideat iterum, parietibusque vasis adhærescit, videatur *Cord. hist. Matth.*

Clus. Acosta, C. B. 7. (inter gummi Drachenblut.

Aduchitur ex noui Orbis Insula, cui nomen portus sanctus, vbi partim spōte, partim vulnere caudici illato, profluit, arboris illius fructus cerasis similes sunt, detractaque pelle dracunculū exactissimè repræsentant, vnde & nomen lachrymæ succo huic impositū est.

N. Sunt qui Dioscoridis cinnabarim esse velint.

Vires. Refrigerat (aliis caliditate & frigidityate temperatus est), exiccatur stre-

*me, astringit, repellit, Vfus eius est precipuus intrinsecus in exiccandiscatar-
rhis, (impositus capiti) in hamorrhagia
sistenda, vulneribus glutinandis, donibus
laxis stabiliendis.*

N. Umbilico impositus quoque dysen-
teria prodesse dicitur.

P R A E P A R .

Nulla inde prostant, depurari ta-
men potest, si in aqua decoquatur, à
fecibus decanetur, & denuo inspif-
setur.

CCCCIII. *Sarcocolla.*

Σαρκοκόλλα est lachryma gummea
in granulis, mannæ seu pollini Thu-
ris similis, colore subrufa, (vel flava)
sapore amara, dulcedinemque (Gly-
zyrrhizæ æmulam,) post se relin-
quente. Profluit ex arbore quadam
exotica, spinosa ac nodosa, eiusdem
cum lachryma nominis, quæ tùm
sponte, tùm sauciata lachrymam il-
lam profundit. Videatur *Matth. Cord.*
in D. & hist. Caf.

Eligenda recens, coloris ad pallo-
rem vergentis (vetusta enim rubescit,)
saporis amari, substantiæ porosæ, vifeo-
sæ, glutinosæ, & quasi spumosæ, faci-
lisque in ∇ solutionis, &c.

Vires. *Calfac. & sicc 1. astringit, con-
solidat, glutinat, coquit, maturat. Vfus
precipui in vulneribus extergendis con-
solidandis, cicatrice ol. ducendis, unde &
nomen adepta est, &c. Mirifice prodest,
& inoculorum fluxionibus, albugine, ru-
beculis, (maceratur in lacte asinino vel
humano S (5) postea cum ∇ Rosar.
mixta, ciliis imponitur, addito si libet,
tantillo sacchari,) in hamorrhagia na-
rium, (anacolleomatis immiscetur.)*

N. Sunt qui propinant purgandi gra-

*ria, crassosque & viscosos humores, ex
partibus diffitis, e.g. ab articulis, pulmo-
nibus illa retrahi scriptitant.*

*Dosis ʒj. corrigenda est, vt sagape-
num.*

P R A E P A R A T A .

*Pilula de Sarcocolla compof. Vide
Dispens. Auguft.*

CCCCIV. *Succolata.*

Succolata est massa in placentas
fat crassas formata, rubra saturatò, fri-
bilis, sine odore, non abfimilis sangui-
ni Draconis, præterquam sit coloris
lucidioris.

Dicitur Chucalate, Chocolate.

*Lenscorus part. 9. l. 4. c. 22. Ind. Occid.
Caca vate, Benz on. part. 5. l. 2. c. 16. &
17. Ind. Occ. Clus. exor. l. 2. c. 28.*

Fructus ex quibus Chocolate con-
ficitur, dicitur Cacao, *Clus. Tab.* Amy-
gdalis similis fructus Guatimalensis f.
Auellana Mexiocana, *C. B. 6. Iaco. Ber-
tio, Mercatori in Hispaniola.*

Fructus hic arboreus siliquis inclu-
sus, amygdalarum speciem refert colore
fuscus. Adfertur copiosus ex Guatima-
la, adhibeturque loco monetæ, pau-
peribusque eleemosyna datur. Parant
ex hoc tum potum Indis vulgarem,
tum massam hanc chocolaten dictam
(& potus hoc nomine venit) quæ fit ex
dictis granis contusis, & cum aromati-
bus mixtis.

N. Primus honor debetur ei quæ in
America paratur, posterior, quæ in Hi-
spania ex granis ad vectis conficitur, ve-
l instate paulatim vilescit.

Vires. Conferre dicitur ventriculo
frigido, pectori, adeoque tussi, purulento-
que inprimis, sreatui, vertigim. Quin
& commendatur summè ad roboran-
dum

dum vita Balsamum, veneremque pro-
rirandam.

Uſus eſt, ut manè cum ſaccharo in
vino vel cereuiſia calida diluta abſor-
beatur.

Dofis ʒij. ad ʒʒ. & vltra.

N. Fractus huius participem me fe-
cit, Ioh. Petrus. Materialiſta huius
Reip. celeberrimus.

CCCCV. Styrax ſeu Storax calamita,

Στόραξ, Styrax, duplicis generis in
Officinis proſtat, ſiccus & liquidus.

Siccus Officinis Storax calamita,
(à Cannarum calamis ſic dicta, in qui-
bus olim ex Pamphilia apportabatur,)
eſt arboris cuiuſdam gummeus, reſino-
ſusque ſuccus concretus, aridus, odoris
ſuauiffimi, videatur Matth. Cord. hiſt.

Creſcit arbor illa ſtoraciſtua, in
ſyria, ſilicia, Pamphilia.

Præfertur Styrax pinguis, lentus, fra-
gmentis albicantibus ruſſeſcens, vel
ſtauus odore perſeueranti, qui dum
mollicur, melleum liquorem reddit.
Improbatur ſurfuſoſus, niger, cano ſitu
obductus, inodorus.

Vires. Calfacit, exiccac, emollit, con-
coquit, Cephalicus inprimis eſt & ner-
uinus: medetur ruſſi, catarrhis, rancedini,
granedini, vulnæ præcluſæ duritiæ læ-
boranti, extra & intra datus conuenit:
immifcetur cardiaco & latificantibus,
alium leniter mollit, ſi cum Terebin-
thina in forma catapotij aſſumatur.

Extrinſecus ſuffitu capiti adhibetur.

PRÆPAR.

1. Oleum ſtillar. Fit ſi Styrax cum

▽ Roſarum digeratur, poſtmodum
⊕ te ex ✕ getur primum Δe leni,
dein, quando ☉ ſtillare incipit,

fortiori.

Vires. Iſdem confert, quibus Styrax
ſed maiori efficacia: gutta auribus in-
ſtillata ſibulum diſcutit.

2. Oleum coctum. Vide Auguſt.

N. Occurrunt deſcriptiones medica-
mentorum in quibus & Storax calami-
ta & rubea diſtinctim præſcribuntur,
uti ſunt Diacaſtoreum Nicolai, Trochi-
ſci Alipta moſcata. In his igitur quid
per Styracem calamitatam arubeadi-
ſtinctam intellectum velit Nicolaus,
diuerſa ſunt opiniones: Sunt qui Thy-
miama per Styracem rubeam innui vo-
lunt, ut Euchſin compoſit. Medic. &
Bankini in Pinac. Alij Styracem op-
timam, qua in grana confluxit, ut Au-
guſtani & Cordus. Alij Styracem ve-
tuſtate rubefactam. Verum enimvero
cum in præſcriptionibus optima quæque
eligenda ſint, adeoque & Styrax in gra-
nis recipiendus, ubi calamita ſtyracis
fit mentio, per rubram aliud quid in-
telligere utique oportet.

CCCCVI. Styrax liquidus.

Eſt Liquor pinguis, inſtar Baſami
cræſſus, graueolens.

N. De Styrace liquido, magna inter
Authores diſſenſio. Aliis videlicet ni-
hil aliud eſt, quam ſtaſſe, i.e. myrrha
colamen. [a] Aliis factitium quid ex
ſtyrace calamita in oleo ac vino ſoluta
admifſtaque reſina laricea, excocta, [b]
quæ decoctio ubi refrigerit, ſtyrax liqui-
dus ad fundum ſecedere aſcitur, ad ſu-
perficiem mittens oleoſam ſubſtantiam
liquidiorem, (alijs expreſſu idem molitur.)
Serapioni ſtyrax liquidus, eſt ole-
um ex nucleis arboris ſtoraciſtue ex-
preſſum; at cortex, fructus, ex quo oleum
expreſſum eſt, ſtyrax ſicca eidem dicitur.

Anicenna

Avicenna styra humidus fit per decoctionem corticis, estque colore nigro. Fex remanens eidem styra sicca dicitur, lib. 6. c. 32. Dioscorides oleum styra cinum appellat, quod ait componi in Syria ex Styra. De hoc refert quod calfaciat vehementer & emolliat, verum caput dolore afficiat grauetque, & saporem adferat. Quæ facultates in styra liquido deprehenduntur.

a] *Matth. in Diosc. lib. 1. c. 62. Bauhin. Pinac. lib. 12. sect. 6.*

b] *Fuchs. de comp. med. l. 1. c. 11.*

T.

CCCCVII. *Tacamahaca.*

Resina est, ex iis, quæ ex noua Hispania non ita pridem adferri cœperunt. Colligitur ex vulnerata arbore instar populi procera, admodum odorata, cuius fructus ruber est, Pæoniæ semen æmulans. Resina autem colore accidit ad Galbanum, vnguibus est albis, uti ammoniacum, odorem ac saporem grauem refert, cutique tenaciter adhærescit. *Vid. Frag. Monard. & Indiæ Occid. part. 9. l. 4. c. 29.*

Vires. *Calfac. in princip. 3. sico. 2. valide astrictionis particeps, digerit, resoluit, maturat, tumores emollit, dolores ac status discutit: vterina in primis est, neruina ac cephalica. Vfus* præcipuè externus est. Prunis iniecta naribusque admota, mulieres uteri suffocatione laborantes illicò liberat. Umbilico Emplastri modo imposita merum suo loco retinet (usu familiarissimo.) Venterium roborat, defluxiones quasunque à capite defluentes reprimat, (linleo excepta, & post aurem alteram saltem vel vtramque applicata, suffitine attracta.) Temporibus adhibita (cerati modo)

defluxiones in oculos aut alias faciei partes reuellit, dolorem dentium sedat, (dentibus etiam corruptis indita:) abdomini Emplastri instar imposita vteri fluxum cohibet: magna est efficacia in doloribus articulorum (coxendicis) iuncturarum ac nervorum vulneribus imposita eadem curat, nimirum statim suppurare facit & spasnum prohibet. *Mox nardes.*

N. 1. Adeo celebris est apud Indos, ut ad qualemcunque dolorem adhibeatur, nec aliud remedium norint, modo non adsint inflammationes admodum calide.

N. 2. Inueteratos cruris dolores *Tacamahaca Emplastri loco imposita curatos vidi.*

PRÆPAR.

Empl. Stomachicum. Vide l. 2.

CCCCVIII. *De Tartare.*

Tartarus in Medicina pathologica est res naturæ lapidescentis, i. e. in lapides coagulati apta, vel iam demum coagulata: potissimum tamen viscosam ac lentam mucilaginem denotat, quæ nondum induritiem lapidis conuersa est. Hinc deducitur quoque ad officinam, denotatque salterestre ex vegetabilibus certis, vel per se, vel artificio separatum.

N. De Tartari origine non possum quin animi sensa communicem: Rerum principia primitus indigesta sunt, ac veluti, in choatica sua dispositione simplicia hinc subinde cum maturitate in partes secernuntur crassiores & subtiliores. Crassiores ad elementalem vergunt statum, scilicet aqueo terrenum: Subtiliores & potiores exaltantur subinde sent (uti dicitur,) spiritualisantur; i. e. in

LLII

statum

statum spiritus euehantur. Haec ergo ubi ad statum deducta fuerint summum, quem natura intendit, exhibent spirituales partem, sin minus eadem sint digesta, vel cum tempore retrogressa ad statum crudiores, exhibent Tartarum, constantem scilicet ex partibus posterioribus aqua, terra & salis, adeoque Tartarus pollet viribus insignibus, spiritus vires emulantibus.

PRÆPAR.

Præparationes Tartari 1. Depuratus, 2. Destillatio, 3. Salificatio.

I. DEPURATIO.

Depuratio vel fit à fordibus externis, vel parte magis arenosa ac minus solubili illa lotionem peragitur, hæc solutio- ne ac coagulatione.

Lotio seu ablutio: unde ♀ lotus.

℞. ☐ triti ac cribrati. q. v. affunde ∇ fontanam, calidam (vel lixiuium forte, e.g. ex cineribus clauellat.) agitaque optime, hinc sine residere ac refrigerescere, postea decanta aquam una cum impuritatibus, idque repete aliquoties, donec ♀m sit instar arenæ.

N. Si lixiuium adhibueris, edulcorare ♀m oportet.

Solutio & coagulatio, unde

1. ♀us depuratus Acidum ♀i, Cre-
mor & Crystalli ☐.

℞. ♀i optime loti, q. v. affunde ∇ æ feruentis bonam quantitatem, agita spatula lignea, & soluentur particula ♀i, cola per manicam Hippocrat. dum adhuc calet (alias coagulatur rursus, quod solutum erat): restanti ☐ affunde aliam ∇m feruentem, agita & cola, idque reitera tantisper, donec nil nisi arena irresolubilis restet. ∇s has ☐o imprægnatas repone ut refrigerant, & videbis ♀m purum, partim supernatare instar cuticulæ, partim instar

crystallorum vel ad fundum residere, vel parietibus ac bacillis immixtis adherere (utrumque cuticulam scilicet & crystallos collige, exicca atque serua.

N. 1. Si nimia ∇æ quantitas coagulationem impederis, evaporare aliquantulum sine.

N. 2. Sunt qui cuticulam supernatantem seorsim colligunt (nomine cremoris ♀) & crystallos itidem seorsim (titulo crystallorum ☐i) verum cum utrumque eiusdem sit natura & efficacia, distinctionem hanc parui momenti autumo.

N. 3. Felicius adhærescent crystalli vasi ligneo.

N. 4. Si depuratum hoc ♀m hand satis candidum sit, solue iterum in ∇ feruente, filtra & repone ut ante, ad coagulandum.

Vires. Usus huius ♀ depurati est, crassos tartareosque humores, præcipue autem in prima ventris regione stabulantes incidere ac attenuare: commodè itaque adhibetur in obstructione Epatis, Lienis, Mesenterij, Renum, in affectu Hypochondriaco, &c. Hinc quoque sibi primas vendicat inter Digestina vniuersalia, cuius rei gratia & catarticis premitti plerumque solet. Quinimo ad laxandam aluum commodissimum medicamentum est, si saltem grano vno ac altero Diagridis vel Gummi de Gaman- dra acuiatur.

Dosis à ʒss. ad ʒj. vel ʒij.

2. Crystalli ♀ chalybeati, Acidum ♀, chalybeatum ☐ Sale.

℞. Acidi ♀ ʒiiij. Magister. chalyb. i.e. crastall. ☐ per spir. ☐. (Vige in ☐) ʒij.

Crystallum ☐ solue in ∇ fumar. solutionem incorpora cum acido Tartari in mortario lapideo. Exicca iterum ac puluerisa: aromatizetur aliquot

quot guttis ol. Cinamomi.

Vires. *Utilissimum medicamentum est morbis chronicis, ut sunt obstructio Lienis, quartana, icterus uterque, cachexia virginum, hypochondriaca passio,*

Dosis à ʒj ad ʒij.

3. Cremor ☿ chalybeatus compendiosior S. Cloff.

Vbi! ▽ imprægnata ♀ pulverisat. ʒj. soluitur in ʒxv. aq. fluuiat.) per ebullitionem fuerit resoluta, & ad decidientiam vnius quartæ euaporata, iniice in vas ʒiij. limat. ☿ tis moxque ab Δ remoue & cola' calidè. Habebis cremorem præsoidem & summè deoppilatum.

N. Iniciatur limitatura dum ▽ feruet nec diu relinquatur, ne cremor reddatur vomitorius.

II. DESTILLATIO unde

1. Spiritus ac oleum.

ʒ. ♀ albi crudi loti (vel quod melius depurati,) q.v. destilla ex Retort. vitrea in arena (vel igne nudo) Δ e gradatim adhibito: primò extillat phlegma, dein spiritus in forma nebula & tertio oleum pingue. Separa oleum à spiritu, vel beneficio chartæ ac filtrationis, vel tritorij gossypiiue auxilio.

N. Sunt qui spiritum ☿ terna vice supra colchotar rectificant.

Rectificatio spiritus ☿ i. Destilla ex MB tertiâ vel quartâ vice semper visa distillationi inferuentia optimè lixiuio forti eluendo.

Rectificatio ol. ☿ i. Affunde quantitatem magnam ▽ (vel ☿ ac destilla per MB separa oleum ab ▽ vt moris, idque rectifica ▽ m scil. fragrantem aliquam addendo ac denuo destillando.

N. Ex residuo capite mortuo extrahi potest sal. Vide suo loco.

Vires. Spiritus vim habet, incidenti, attenuandi, resoluendi, discutiendi. Hinc referat obstructiones viscerum, purgâtque per sudorem ac urinam, ideoque utiliter adhibetur in Hydrope, Tympanitide, Arthritide, Paralyfi, Scorbuto, lue venerea, impetiginibus, scabie, contractura artuum (ex materia flatulenta & humoral. fluida, non ☿ ea coagulata & fixa.

Dosis à ʒj ad ʒij.

Oleum intrinsecus adhibitum prodesse creditur aduersus dolorem colicum, suffocationem vterinam, &c.

Dosis gr. iij. iij.

Extrinssecus, admisceri potest vnguentis contra scabiem communem vel luis venereæ, &c. Vide Crollium, Sennert. in Institut. Salam. in Tartarologia.

N. Spiritum ☿ ex musto parat Forsterus p. 1000. de morb. Treis, collectis scil. crystallis euaporatione lentâ in quibus spiritum ☿ i primateriale remanere credit.

2. Spiritus Tartari compositus.

ʒ. ☐ purum, destilla vt moris, prodeatque phlegma spiritus ac oleum. Ex capite mortuo extrahe S quod solutionibus ac coagulationibus purificatum coniunge cum phlegmate spiritu ac oleo: Hinc digere in MB vase clauso, donec ☉ totus solutus sit, cum hoc liquore impasta argillam siccam formaque globulos & destilla ex Retorta, igne nudo (vt destillatur spiritus ☉ i.) prodibit cum spiritu & oleo, Sal totus spiritualiter in posterum à spiritu ☿ i inseparabilis: Oleum fœrens separa à spiritu, vt moris.

Vires. Penetrantior & efficacior est priori.

3. Spiritus ☿ i D-latus seu spiritus.

¶ *aperitiuus compositus.*

℞. Spir. ♀i (simplicis) ℥j. V 3iij.
Misce & affunde colchotari: digere in
MB (♂ 8.) ac destilla per Retort.
adhibitis ignis gradibus omnibus.
Totum deinceps quod prodiit funde
super caput mortuum nigrum ♀i,
ex quo nimirum spiritus ille simplex
est prolectus. Digere 24. Tincturam
decanta, residuum calcica ad albedi-
nem, atque ex eodem extrahe Sal cum
Tinctura illa decantata, in calido S.
(hor. 24.) relinquendo: Δ in hanc per
filtrum purifica.

*Vires. Exhibetur magno cum succes-
su ad contumaces obstructiones visce-
rum, ad fædos colores, febres diurnas,
Hydropem.*

Dosis à ℥j. ad ℥ij. in aquis appro-
priatis.

*Spiritus ☐ Philosophicus ad aurum
portabile, S. Cloff.*

Reuerberetur Sal ♀ super testâ
probatioriâ (in einer flachen Scherben,)
absque fusione tamen, per horas 24.
ita cæruleum euader sal, affunde X
quousque non tumultuet amplius, &

✕ 3. digitos super materiam emine-
at, digere, tingetur ✕ saturato rubore
filtra & coagula. Hoc quater cum no-
uo ✕ repete. Permixtis his 4. salibus
V rectif. suffunde & tincturam extra-
he tories, dum colorari desinat, salere-
stantem solue iterum in ✕ iterum-
que cum V attrahe tincturam. Iam
omnes V tinctos, & in vnum colle-
ctos ♡a per MB in cucurb. cui
✕ infundibulo instruct^o imponatur,
extillatum V 1e affunde per infund.
sali tincto & cohoba totiens (14. vici-
bus ad minus) donec videas guttas
rubentes decidere, tùm cessa, & liquo-
rem ex ☉ per ☐ leniter ♡a, ita tran-

sibit spiritus salis ♀, nebulosis cum
guttis rubris, superflite infundo
☐ pulu. rubro. Illo vtete ad extractio-
nem ☉ is.

*Vires. In obstructione mesenterij, &
arthritis, dantur gutt. 4. 6. in vino, in
retentione mensium, si dosis ter aut
quater iteretur, certo fluent menses.*

III. SALIFICATIO vnde

1. Sal Tartari.

Sal Tartari elixiuatur ex ♀o ad al-
bedinem calcinato, (i.e. combusto,) non
secus ac ex aliis cineribus Sal extrahi
solet.

N. 1. Ex capite mortuo in destillatio-
ne spiritus residuo, itidem Sal elixiuari
potest, si vterius comburatur. Prompte
enim ignem concipit, atque etiam extra
ignem comburi potest.

N. 2. Communiter calcinatur ♀ in
fornace figulina.

2. Ol. Tart. p. d.

Pone ☐ calcinatum in cella ad li-
quescendum, vel dissolue tartarum cal-
cinatum in V communi, filtra & coa-
gula.

*Vires. Optimum est remedium in
serpiginibus, ulceribus, tineis, scabie, &c.*

N. Est porro huius olei eligans vsus
in Extractis vegetabilium purgantium
conficiendis. Eius enim gutta aliquot
cum menstruo mixta, tùm extractio-
nem faciilitant, tùm catharsin ipsam
promouent.

3. Magisterium ♀i seu ☉ ♀i alcoholis auri.

Impræгна ☉ ♀ cum Sale vola-
tili Vini, v.g. ℞. Salis ♀ purissimi, q.
v. affunde V ad eminent. digit. 1. dige-
re ac destilla lenissimo calore, iterum-
que V affunde, idque repete tories,
donec Sal ♀ totam spirituofam Vini
substantiam, seu omne sal volatile Vi-
ni

ni imbibere, quod ubi factum, sublima, habebisque sal vini sublimatione ab omni phlegmate & aquositate separatum. Sennert. in Institutis.

4. Magisterium ☉ i purgans.

℞. ☉ i, q. v. impræгна aceto optimo, donec ☉ nihil amplius aciditatis retinere velit (vide correctionem flor. ☉ ij. Crollianam l. 3.) dein affunde ☉, eumque abstrahere aliquoties cohobando: tandem reponere ☉ ad liquefcendum & habebis oleum rubrum.

Vires. Purgat per inferiora, utile in omnibus morbis deploratis.

Dosis à gr. v. ad ℔.

N. Sal illud ☉ ✕ sufficienter imprægnatum si in ☐ destill. (e. g. Borræginis) solutum atque s. a. crystallisatum sit, conueniens medicamentum euadit in morbis ☉ reis.

5. Tinctura seu ☉ i. ☉ i.

℞. Sal ☉ optime purificatum, calcina igne violentiss. ad cæritatem: dein affunde ☉, extrahe rubedinem s. a. decanta, abstrahere ad consistentiam olei. Sic hebes Tincturam ☉, quam si placet exaltare, digere aliquamdiu cum ☉ recenti ad emin. dig. i. affuso.

N. 1. Sunt qui ex ☉ cum ☉ calcinato, Tincturam hanc extrahunt, sed preualet modus prior.

N. 2. Maxima pars ☉. decedit.

Vires. Urinam largiter ciens, confertque in Melancholia hypochondriaca, Scorbuto, Hydrope, aliisque Mesenterij ac Lienis morbis & obstructionibus.

Dosis gutt. aliquot 4. 5. 6. 7. 8.

6. Tartarus ☉ latus.

℞. Ol. ☉ purissimi per deliq. ☉ iij. affunde guttatim Spir. ☉ ☉ ij. vel q. s. donec strepitus cesset, idque in vitro capaci sic fiet coagulum: sedata ebullitione euaporare sine humidita-

tem lento calore ad siccitatem.

Vires. Digestiuum est præstantissimū, Tartarum in corpore humano efficacissimè resoluens. Hinc utilissimè exhibetur in obstructionibus viscerum, venarum mesaraicarum, in omnibus febribus, præcipue in quartana, in obstructionibus mensium.

Dosis à ℔. ad ☉ j. in conuenienti liquore, conuenientissimè autem propter saporis emendationem offertur in Hydromelite.

N. Eodem modo fieri quoque poterunt salia vegetabilium ☉ lata. Sic sal (e. g. absinthij) depuratum solue in ☐ absinthij, instilla spiritum ☉ li, proce- deque, ut cum ☉ ☉ lato.

Tartarus ☉ lat. alius.

℞. Magisterium Tart. purgans ad siccitatem euaporatum, affunde guttatim ☐ um ☉ li, donec strepitus omnino cesset, abstrahere phlegma in ☐ coagulum superstes reuerbera per triduum, ita tamen ut sal non fundatur, sed in continuo isto calore velut fixetur. Vocatur à Parac. lib. 7. Archidox. specifi- cum purgatiuum.

Vires. Purgat benignè per inferiora, & sudores mouet in peste, scorbuto, hydrope.

Dos. ℔. in syr. de ros. de rhâmno, &c. Excommunicatione S. Closs.

7. Tart. ☉ latus crystallisatus.

℞. Crem. Tart. ☉ iij spir. ☉ ☉ ij. digerendo soluantur. Hinc affunde ☐ calid. ut penitus solutio fiat, abstrahere aliquantulum, & reponere ad crystallandum.

8. Sal ☉ volatilissimum.

℞. ☉ Tartari purificat. q. v. affunde ☐ rectificatiss. ☉ a ex ☉ per ☐ cohobando aliquoties (3) & adhærescet ☉ ☉ lateribus ✕ bici.

N. Si per **MB** & aueris, non sublimabitur, sed exhibebit. Menstruum coralliiis soluendis idoneum.

Vires. *Insigne est lithontripticum.*

Dosis gr. v. vj. &c.

9. *Liquor Tartari spleneticus.*

R. Tartari lbj. Et lb. (al. lbj.) Misc. exacte, imponeq; mortario, sarragini vel laminæ ferreæ ignitæ vt calcinentur: Hinc puluerisa ac affunde aquæ feruentis lbiiij. digere in loco calido & P(6) quotidie agitando, postea colentur, vt omnis falsedo insit aquæ. Huic aquæ imprægnatæ tandem adde Tartari el. lbj. digerantur, & P(8) filtrenturque pro vsu.

Vires. *Insigne est de oppilatiuum Lienis, aliarumque tartarearum obstructionum, mesenterium maxime infestantiū, adeoq. vile in hypochondriaca, scorbuticaque affectione ac mensum obstructione.*

Dosis cochl. f. ad 1. cum aliis appropriatis vehiculis.

Terebinthina.

Vide Resina.

CCCCIX. *Thuris.*

Aléar &, *Dioscoridis*, *AspéwTov*, Olibanum, Arab. Louan. Conder. German, *VVeyranch*. Resina est duriuscula, pellucida, profluens ex arbore Arabica Louan. Arab. dicta. Vide *Thuris*, *Matth. Cord. hist. Caf.* Louan. & Conder, *Garz. C. B. 7.* (inter gummata.)

Genera *Thuris* traduntur duo, masculinum scil. quod propriè Olibanum dicitur, seu Melax. (Arab. Melafon.) & fœmininum.

Masculinum ex albo flauescit, suapte natura rotundum est, guttarum formam referens, candidum intus & pingue.

Fœmininum, resinofum magis est, ac molle, cito ardens, flauum.

Præfertur masculinum, vt quod ex arboribus montanis colligitur.

Vires. *Calfac. 2. succ. 1. subastringit. Vssus præcipui intrinsecus ad varios capitis & pectoris affectus, vt & ad alui, vterique profluvia, ad tussim, (deglutitur vesperi frustatim,) vomitum, sanguinis excreationem, diarrheam, dysenteriam mitigandam. Extrinsicus inservit sufficibus pro capite roborando, catarrhos discutit, cava ulcera carne replet, & ad cicatricem perducit, cruenta vulnera cephalica inprimis glutinat, perniones (cum suillo adipe aut anserino) sanat, ulcera cacoëthea, tum sedis, tum reliquarum partium demulcet, (tritum cum lacte in lenimentum:) oculorum rubendini ac lippitudini medetur, (scil. ∇ Rosarum multiplici extinctione *Thuris* imprægnata, lactique muliebri postmodum commixta, pro collyrio liquido verrucas incipientes & impetigines abigit, (cum pice & aceto imposi-*

tum. Cortex *Thuris* in Officinis corticosum illud vocatur, quod Thymia-ma supra appellauimus. Cortex hic præfertur crassus, pinguis, odoratus recens, lævis minimè scaber. Vide supra.

Manna *Thuris* sunt micæ, fragmenta, (pollen ac farina) *Thuris*, quæ ex collisione, dum in saccis vehitur, colliguntur.

P R Æ P A R.

1. *Liquor.* Fit in albumine oui cocti, summeque prodest ad maculas abstergendas, cavitatesque cicatricum explanandas.

2. *El. Diaolibanum.* Vide Disp.

CCCCX. *Tragacanth.*

Tragacanthum, *Tragacantha*, corrupte *Tragaganthum*, vel *Dragagantum*, *Tragant*. Est gummi fruticis eiusdem nominis pellucidum, album subdulce, leue & syncerum, in granis plerunque fragmentisue contortis.

N. ∇ calida soluitur, mucilaginemque exhibet aliis Medicamentorum formulis, e.g. trochiscis formandis conuenientem.

Dicitur *Spina hirci*, *Arab.* *Chitinæ*. Germ. *Bocksborn*.

Exudat hoc gummi radice incisa, vel ut alii volunt sponte sua.

Præstat pellucens, gracilis, levis, sincera & subdulcis.

Vires. Refrig. 2. (aliis temperata est) hum. 1. (aliis siccat.) lenit, cutis spiracula obstruit, acrimoniam mitigat, incressat, usus præcip. ad tussim inueteratam, ad fauces exasperatas, retusas voces, cæterasque destillationes, (cum melle inde fit linctus, subditurue lingua, ut liquefeat,) contra renum dolorem & vesicæ rosiones, (in passo vel brodio,) in dysenteria. Extrinsicus ad dysenteriam (in clysteribus,) ad rubedinem & acres destillationes oculorum (soluta in ∇ rosar. vel lacte,) ad palpebrarum scabritiem.

Dosis \mathfrak{zj} .

N. *Tragacantha* quo vetustior, eo calidior.

P R A E P A R A T.

Spec. Diatragacanth. calida } Vide
Diatragacanth. frigida } Disp.

CCCCXI. *Tubera Ceruina.*

Fungus Cervinus, *Corniboletus*, *Math. Cam. Lon. Tab. Cord. in D. C. B. 2.* German. *Hirschkrunst*, *Hirsch-*

schvamm.

Crescit in syluis, ut vulgo creditur ex libidine ceruorum, quippe nonnunquam formâ genitalis ceruini reperitur. Verum testibus Lonicero & Cordo, nec iis denegatur locis, ad quæ nec cerui, nec Damæ vnquam preuenerint. Inhiant autem iis Cerui ob odorem fortem, quo delectantur.

Vires. Rari usus est, nec adhibetur, nisi quod nonnulli ad libidinis stimulum, lactisque incrementum id commendent, cui *Lonicerus* contradicit, qui e contra naturæ frigida & humida statuit, adeoque ad stimulum ineptæ. Extrinsicus commendatur ad vterinas ascensiones compescendas.

N. His subiungi poterit & *Fungus Chirurgorum*, videlicet *Fungus orbicularis*, *onatus*, *puluerulentus*. Crepitus *Lupi*, Germ. *Bubenst.* *Wciberst.* *Wolffst.* *Posst.* Videatur *Lon. Tab. Cast. Dod. Matth. Cam.*

Huius vires sunt adstringere, siccare, adeoque pulvis eius ad intertiginas, & abrafa non inutiliter adhibetur. Chirurgi fructum imponunt sectæ venæ ad sistendum, sanguinem vulnusque solidandum.

CCCCXII. *De Vino.**Anatomia Vini.*

Vinum est succus vitis, fermentatione exaltatus.

Dicitur *Paracelso*, Sanguis Terræ, *Querc.* Omnium vegetabilium Princeps, & maxime vitriolatum.

Eligatur generosum, beneque maturum.

PRAEPARATA VINI SVNT varia, pro diuersis scilicet partibus, variantia.

Nimirum.

Vini

Vini partes sunt:

1. Essentia subtilissima, incorruptibilis, vulgo ∇ vitæ, ∇ ardens, ∇ , ∇ Cœleste, ∇ Bezoardicum vegetabile, menstruum cœleste, ∇ cœlica, Lullij cœlum, clavis philosophorum, corpus æthereum ex Δ & ∇ constans, Balsamus volatilis liquoris catholici. 2. Magna copia ∇ insipidæ corruptibilis. 3. Hanc sequitur ∇ quidam fumidus, qui nihil aliud est, quam ∇ vini volatile crassius, in forma fumi ascendens. 4. Huic mox subiungitur ∇ quoddam vere pingue & vinctuosum combustibile, sed paucum. 5. Ex ∇ extrahitur ∇ quoddam corrosivum. 6. Post extractionem ∇ is relinquitur ∇ limosa inutilis. *Sala in Anatomia* ∇ ij.

Hinc 1. ∇ f. ∇ vita. Q. E.
Vini.

R. Vinum generosum, ∇ etur per vesicam, donec pars optima ∇ arit, (quod gustu facile cognoscitur,) destillatum rectificetur aliquoties per B. M. abstrahaturque saltem pars dimidia, tertia aut quarta, ut nihil humiditatis relinquat combustibilis.

N. 1. Rectificatio feliciter peragitur. 1. Si in rectificatione orificium cucurbitæ charta subtili triplici vel quadruplici, vel panno spissiori tegatur, quippe hac ratione penetrat solum pars spirituosior, aquosior in cucurbitam relabente. 2. Si rectificatio ex cucurbita colli longi, vel per phiolam serpentindæ perficiatur.

N. 2. Nonnulli obstruunt cucurbitam vel phiole orificium, spōgia oleo imbuta, qua ratione solus ∇ transit, ∇ in spongia remanente. Senn. Instit. Libau. in Alchym. Verum nemini suaserō hunc modum, inspicitur enim ab oleo ascendente ipse ∇ .

N. 3. Eodem modo paratur & ∇ ex fecibus vini, ut & ex siliquis unarum, ex quibus vinum fuit expressum. Kessl. 1. cap. 70.

2. Aliter ∇ , subtiliss.

R. Vini generos. q. v. digere (14.) ∇ in fimo, vel alio lenissimocalore, postea per phiolam destilla, destillatumque aliquoties per eandem phiolam rectifica, donec ad summam subtilitatem peruenierit.

R. Huius ∇ lbij. misce cum recentis vini lb. vj. destilla iterum per ∇ , ac prolice saltem lb. ij. affunde iterum recentis vini lb. vj. ac destilla denuo, ut dictum, idque repete septies vel plures ad lb. ij. colligendas

N. Hic ∇ adeo subtilis ac fugax est, ut guttatem ∇ ando ne ∇ m quidem attingere possit, quin in auram evanescat. Tentzel. Glückrath. in Bequin. l. 3. c. 2.

Vires. ∇ calidus est & siccus, penetrantissimus, incorruptibilis, resistit putredini, resocillat apoplecticos, comate oppressos, & c. Extrinsecus resolvit tumores, frigidos ac scirrhusos, arcet coagulationem sanguinis in contusionibus, crurumque resolvit ac discutit.

N. Sunt qui ∇ circulatum ac toties destillatum, ut in oleaginosam abeat consistentiam, Circulatum Paracelsi autumant, sed malè Alij ∇ cum proprio sale, interuenientibus tamen digestionibus aliquoties destillant, ut sal tandem cum ∇ per Alembicum transferatur, vocantque Circulatum Mains. Libau. tract. de Igne Naturæ. Verum fallunt & falluntur.

3. Spiritus Vini alcalisatus.

R. Vini generosi Hispanici vel Hungarici, q. v. elice spiritum ac phlegma: separa eadem ab invicem: ex fecibus

cibus calcinatis cum phlegmate extrahe Θ , idque per crystallisationem purifica, in spiritu solue \ominus & habes ∇ alcalisatum.

4. *Spiritus Vini acuatius Tart. seu spir. Vini Tartarificatus.*

$\mathbf{R.}$ ∇ lb. ij. Tart. alb. crudi puriss. grossè contusi \tilde{z} j. destilla in balneo pleno scobe ligni serrati, madefacta lenissimo ∇ ut ad quartum ferè pulsum guttula cadat: quando phlegma stillare inceperit, cessa, vel si phlegma quoque prodierit rectifica.

N. 1. *Si subtilior adhuc expetatur, de nouo ad huius lbij addatur Tartari \tilde{z} j. destilleturque ut ante.* Sennert. in Institut. Tentzel. in Exeg.

N. 2. *Ad cognoscendum, utrum spiritus prodeant nec ne, obseruentur striae, quippe quo spissioribus striis \mathbf{XX} bicus refertus fuerit, eo uberior semper spirituum fit, enaporatio & e contra.*

N. 3. *Oleum, quo lentahac destillatione peracta, guttis quibusdam enatare videbitur (quamuis vina in hoc valde inter se discrepent) vera vini essentia aestimatur.* Tentzel.

5. *Aliis. ∇ Tartarificatus sine ∇ Tartara calisatus.*

Hic spiritus si super eundem Tartarum per Retortam cum cohobis rectificatur & in fine (phlegmate intermedio abiecto) fortiori igne vrgetur, spiritus vini Tartarificatus acquiritur. Sennert. Instit.

6. *Spiritus Vini Tartarificatus seu ∇ philosophica.*

$\mathbf{R.}$ Tartarum in præcedenti spiritus Tartarificati præparatione post cohobiam relictum (vel & Tartarum recentem) calcina ad viriditatem (cærulitatem), dein affunde spiritum illum Vini Tartarificatum, destilla & tandem propelle

igne fortiori. Tentzel.

Vel: Ex \ominus Tartari ad cærulitatem calcinato extrahe essentiam digerendo cum ∇ , (∇ habeat aliquid phlegmatis, cuius beneficio sal arripit) destilla gradatim, ad ignem fortissimum subinde progrediendo.

Vires. Spiritus hic longe præstantissimus est ad Tincturas & Extracta omnium purgantium in genere elicienda, ad conservandas metallorum & vegetabilium, animaliumque facultates

In \mathbf{S} \mathbf{P} \mathbf{I} \mathbf{R} \mathbf{I} \mathbf{T} \mathbf{A} \mathbf{R} \mathbf{I} \mathbf{F} \mathbf{I} \mathbf{C} \mathbf{A} \mathbf{T} \mathbf{U} \mathbf{S} arcanum est ad plurimos affectus, in primis tartareos, & ubi sal fixum ex deficiente coctionis \mathbf{P} \mathbf{R} \mathbf{O} \mathbf{P} \mathbf{R} \mathbf{A} \mathbf{T} \mathbf{I} \mathbf{O} \mathbf{S} abundat, ut in Scorbuto, Tartareo Hypochondrio, Asthmate, Cachexia Epatis aut reliquorum viscerum obstructionibus, conciliat insuper somnum cum essentia croci propinatus.

N. 1. *Spiritus vini hoc modo rite præparatus, est Ros Iouis amphibij vegetabilis ad parandum illud Biol. chnium Burggrauj. Einsdem beneficio. fit & perpetuum mobile & \mathbf{N} \mathbf{O} \mathbf{D} \mathbf{U} \mathbf{S} criterium.* Hartman. in præct. Tentzel. in Exeg. *Qui plura de ∇ facultatibus voluerit, consulat Lemnium, Euonymum, Gesnerum, Libanum, Medull. destill.*

N. 2. *Hic ∇ tartarificatus in spagyrica cochlea Hermet. Cl. circularis, è meo spiritu enadit Balsamus, è fragrante fragrantior, è crystallino carbuncularis, haud secus ac cor sanguinem Epatis, continente pulsum circulo, in auream vitæ Balsamicam, vinidamque spirituum vitalium naturam exaltat.*

Vires & Dosis. Huius essentia gutta 3. vel. 4. calidum nativum in Eclampsin euocant. Cum Croci essentia somnum conciliant, restaurationemque membrorum conantur.

7. *Spiritus Vini microcosmicus, i. e.*

\mathbf{M} \mathbf{M} \mathbf{m} \mathbf{m} cum

cum sale vrina volatili acuat.

℞. Spiritus Vini subtiliss. ac **S**is
vrinæ ad summam puritatem deducti
(vide in vrina) añ. mixti ponantur in
locum frigidissimum. Hinc digerantur
per lentum calorem **B** in Phiola
H. Cl. spatio 20. vel 30. **℞** & con-
vertentur in liquorem, qui si luber
per **MB** semel ac iterum rectificetur.
*Bequin. l. 3. c. 2. Hartm. in pract. & in
Croll. Senn. in Instis.*

*Vires. Menstruum est ☉ potabilis
preparationi inferuiens: poterit quoque
intrinsecus adhiberi, ad referendas ob-
structiones viscerum, ut & extrinsecus
ad dolorem compefcendum.*

8. Spiritus Vini **D** latius.

℞. Spiritus vini opt. & spir. **☉** i
rectificati añ 3liij. M. & destilla per
XX in cinere, primo lento igne, dein
fortiori, ut simul alembicum transeant:
reitera destillationem vice tertia: po-
stmodum circula per mensem simul,
habebisque spiritum odore & sapore
sat gratum.

9. Quinta Essentia Vini.

℞. Vini generos. alb. vel rub. q. v.
Sla ex **MB** rectificando donec **V**
euadat quasi igneus (sit rectificatio-
nibus sæpius iteratis scil. 12. &c.) Spi-
ritus hic indatur vitro, quod bono lu-
to vel mastiche **℞**e & album, oui
optime claudatur. Hinc circuletur **B**
per mensem. Postmodum aperi sen-
sim & si mirum oleat saporem, assecu-
tus ex vini. V. Essentiam; sin minus,
claude denuo vitrum & reponē in **B**
donec dictum signum fenderit, sapo-
rem sc. siue odorem *euadat*.

*N. Acquiritur scopus beneficio salis
proprij. Popp. in Hodoger.*

*Vires. Balsamus est efficacissimus,
nostroque balsamo naturali roborando*

*conuenientissimus. Insuper antidotus est
certissima aduersus pestem intra 6. ho-
ris sanandam, si in primo illius insultu
gutta xij. exhibeantur ad mouendos su-
dores, Epilepticum paroxysmum anni-
hilat eadem dosi ferum mortuum expel-
lit, in partu difficili illico, & ad miracu-
lum vsque operatur si cochleare inte-
grum illius exhibeatur.*

10. Alud opus vegetabile ex commu-
nicatione **S. Cloff.**

Cohaba **XX** super sal **♀** proprium
tantisper, donec tam acidum egredia-
tur, ac fuerat affusum, cumque suffici-
enter **♂**libus suis acidis fuerit impræ-
gnatum. **℞** Illius 3vj. **V** 7es. super sal
♀ proprium rectificati **j**. Digere per
mensem **Δ** lampadis, vsque dum cor-
pus suam receperit animam, imbibatur
rursus eadem quantitate olei æthærei
& desiccet per quindenam, his im-
bibitionibus ad sufficientiam fa-
ctis, detur **Δ** **♂**is, eleuabitur Salcan-
didissimum, relictis terreis aliquot
impuritatibus. Sublimatum reconde
in aliâ phialâ H. C. & **Δ** eodem
lampadis decoque ad albeninem vs-
que perfectam. Quo viso imbibatur
fixissima hæc materia **♂**u æthereo
suo siue animâ, idque tories interce-
dente digestionē fixatiuâ iteretur, do-
necqñ igneum ruborem eleuata fuerit,
summam corporis nostri medicinam.

11. Magisterium Vini s. Lapis vini
vegetabilis.

℞. Vini generosi Hispanic. vel Vn-
garic. q. v. putrescat 40. **℞** in fimo
equino. Hinc destilla in **MB**, & pro-
dibit spiritus, ac tandem oleum: hæc
separa ab inuicem, spiritumque de-
phlegma. Oleum denuo in fimo equi-
no **℞** 40. putrescat ac destilletur.
Ex remanentibus fecibus beneficio
phlegmatis

phlegmatis extrahatur sal volatilius sine calcinatione. Vtrumque coniunctim s.a. purifica. Postea impræгна sal spiritu suo ac digere : hinc adde & oleum, digereque donec coloris tandem rubei puluerem nanciscaris.

Vires. Grana (vel gutta aliquot, si maior liquidius) integra mensuram aqua vinosis qualitatibus per fundunt.

12. Menstruum Basilij Valentini, Aqua temperata, Temperatum Extractinum.

Rx. Spiritus vini subtiliss. q. v. eumque cum spir. ☉ digere ac terna destillatione per alembicum, vini. Sic dulcescit, acrimoniamque amittit. Vide spir. ☾ dulcem.

Vires. Soluit ☉ non radicaliter, sed tinturam eius extrahendo. Vide de ☉ Basil. in repetit. magni lapidis veterum. Senn. Instit.

N. 1. Alij Rx. V optimum, eumque cohobant multies (12.) supra ☉, ut essentiam ☉is secum euehat. Huic V essentia ☉is imprægnato affundunt tantundem spir. ☉i rectific. digeruntque.

N. 2. Tenzelius Rx. V rectific. q. s. superfundit Sali Tartari philosophico ad emin. 3. digit. digeritque in Phiola longiss. colli aliquamdiu l. calore: postmodum destillat.

13. Sal. Tart. philosophorum.

Rx. Sal ex Cineribus Sarmentorum. Extractum. reuerberetur Δ aperto (hor. circiter 3.) donec albescat. Dein solue in Δ & separa feces filtrando & coagulando. Sic habes Sal Tartari philosophorum. Tenzel. in Exeg. de ☉ potabili.

14. Cinis clauellatus.

Rx. ☿ ex destillatione fecum residuum, combure & elixiua.

C L A S S I S III.

De Purgantibus primariis.

CCCCXIII. Agaricum.

Agaricus f. Agaricum fungus est albicans trunco laticis adnatus. Vid. Brunf. Matth. Dod. Cord. in D. Lob. Cast. Tab. Ger. Cam. Lon. Porta. Bellon. Germ. Lerchenschvamm. Estq; Diosc. Mas, hic reprobatur.

& Plin. ☿ Fœmina, hac præfertur.

Mas rotundus est, & vndique sibi similis (Plinio) crispior amariorque. Fœmina rectas intus habet pectinum modo venas, & q. diuifuras (Plinio.) Fœmina solutior est, initio dulcis mox in amaritudinem transit.

Eligatur itaque Agaricus albus, leuis, valde rarus, velociter friabilis, sapore primum dulcis, mox amarus & stypticus. Reprobatur lignosus, longus, durus ac grauis.

N. 1. Pars exterior præstat interiori

N. 2. Multos in anxos durabilis est, sine virium iactura.

N. 3. Adnascitur iidem Fungus Abieti, Pica sylu. Teda & Larici, sed solum Larignus intra corpus sumitur.

Vires. Pituitam educit reuicem aquosam, serosam & viscosam totius corporis, & in primis excrementa mesenterij, tum capitis ac pulmonum. Urinam

MMmm 2 ciet

638 PHARMACOP. MED. CHYM. L B. IV.

ciet ac menses, calf. 1. sicc. 2.

N. 1. Quia ventriculo nauseabundus est, corrigitur stomachis, e. g. Zinzib. garyophyll. Spica Celtica, &c.

N. 2. Quia tardè operari solet, additur stimulus ex sale gemma, crystallis & similib.

Dosis à ʒj. ad ʒij. In infusione à ʒij. ad ʒv.

PRÆPAR.

1. Extractum Agarici.

℞. Agarici, q. v. Extrahe cum V, &c. Augst.

N. Sala adhibet Agaric. Trochiscarum, extrahitque cum V.

Alij aquam adhibuisse malunt, ac præ alijs aquam Anisi vel Cinamomi in qua Agaricum macerant (hor. 24.) exprimunt ac inspissant. Verum enimvero quia Agaricus nonnihil resinosi quoque in se continet, præstat V adhibere.

Dosis à ʒj. ad ʒʒ. vel ʒij.

2. Agaricus Trochiscatus.

℞. Agaric. limat. cum vino in quo maceratum Zinzib. additoque tantillo Tragacanth. vel Gummi Arab F. Trochisci.

3. Trochisci de Agarico.

℞. Agar. lim. ʒij. ʒ, ʒʒ. Zinzib. ʒij. cum Oxymell. q. s. F. Trochis. V. D.

4. Pilula de Agarico. V. D.

Dosis à ʒʒ. ad ʒij.

5. Pilula Hiera cum Agarico.

V. Disp.

Dosis à ʒj. ad ʒij.

CCCCXIII. Asarum.

Ἀσάρων, Diosc. Asarum, Brunf. Trag. Matth. Fuchf. Dod. Cord. in D. & hist. Lon. Cast. Tabi Ger. Cam. C. B. 1. Asarum baccaris seu baccatus, Lob. alijs. vul-

go, Haselwurtz.

Solo gaudet montano opaco, Vici- niâque corylorum. Viter perpetuo, no- ua foliatamen vna cum flosculis vere promit.

OFFICIN. NAT.

Radix colligitur vere, & folia.

Vires. Crassam pituitiam, bilemque utramque per vomitum ac nonnunquam per secessum violenter expurgat. Calf. & sicc. 3. diureticum est, ac emmenagogum in signe, Epar, Lienem, vesicamque fellis aperit. Hinc utile in arthritide, hydrope, febribus præcipue tertiana & quar- tana, in ictero, &c.

Dosis Rad. à ʒʒ. ad ʒj. in substan- tia, à ʒj. ad ʒij. in infuso.

Folia exhibentur. N. 6. 7. 8. 9. infusa, cocta & expressa.

PRÆPARATA.

1. Extractum alcalisatum quod ve- nit nomine coaguli Asari. ℞. Rad. ac folia Asari, extrahe cum V ac filtra. Hinc adde sal ex incineratis fecibus elixiuatum, & ad ignem fusionis cal- cinatum, solitione ac inspissatione purificatum, abstraheque Vini spiritum ad consistentiam mellis. Vide Sennert. in Instit. Hartm. in Pratt.

Dosis ʒj. ad ʒij.

2. Diasarum Fernelij. Vid. lib. 2. cap. 51.

Dosis à ʒj. ad ʒʒ.

B.

CCCCXIV. Bryonia.

Ἀμπελος λευκή, Dioscor. Bryonia, Trag. Lon. Tab. Cam. alba, Dod. Ger. Vitis alba, Matth. Fuchf. Cord. in D. Lob. Cast. C. B. 1. German. Zaunrübe, Schmeervurtz, Strickvurtz, Scheiß- vurtz.

Est baccis rubris & nigris, viraque
usualis, praefertur tamen prior.

Crescit in dumeris: Floret Maio.

OFFICIN. NAT.

Radix collecta verno tempore.

Vires. Purgat validdè serofos & pituitosos humores. Splenetica & Iecoraria est, utpote quorum obstructions aperit. Calfac. & sic. 2. Hydropicorum aquas per vomitum ac secessum educit, menses ciet, fatum eiicit, suffocationes vteri arcet, asthmata sanat, podagricis conuenit (intus & extus.)

Dosis in substantia ab ʒj. in Infuso ad ʒʒ. vel vltra.

Extrinfecus confert Hydropi, abdomini emplastrata cum sterc. caprillo, quin & quartanam curare dicitur arteriis temporum & brachiorum affixa.

PRÆPAR.

1. *Fecula Bryoniae*. Videl. 2.

Vires. Vierina est, menses ciens, sed non citra nauseam.

Dosis ad ʒj.

2. *Nectar succosum S. Closs.*

Fitex ʒj. succi bryon. per expressiorem facti, & ʒj. ol. ☉ vel ☿ M. Dos. ʒj. in vino albo.

N. Purgat aliquando per vomitum, alium & vrinam.

3. *Unguentum Agrippa*. V.D.

CCCCXV. *Carthamus*.

Κηκο, Dioscor. Κηκ, Plinij, Arab. Karten. Cnicus, Matth. Dod. Lob. Cast. vulgaris, Clus. hist. sarius, Cord. in D. & hist. Lob. Cnicus urbana & sativa, Theophr. & Plinij. Carthamus, Brunf. Trag. Fuchs. Lon. flore Croceo. Cam. Cnicus sativus seu Carthamus officinar. C.B. 1. aliis, Crocus sylvestris, Cnecus, Germ. vild Saffran.

N. Floribus est croceis, variis albidis illorum admistione adulterans Crocum

Colitur in hortis Italiae, Galliae. Floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Semen.

Vires. Semen pituitam viscosam ac aquas vomitu ac deiectione purgat: confert maxime pectori: Calf. & sic. 1. Stomacho aduersatur, ideoque corrigitur stomachichis, anis. galang. Zinzib. &c.

Dosis in substantia à ʒj ad ʒij. ʒ. (sed raro ita exhibetur ob viscositatem) in infuso à ʒij. ad vj. vel. vltra.

PRÆPAR.

1. *Extract. Diacartham. f. Cnicopharmacum*. Vide D.A.

Dosis à ʒʒ. ad ʒiiij.

2. *Syrupus de Carthamo*. V.D. Dosis ab ʒj. ad ʒij.

3. *Electuar. Diacartham.* Dos. ʒj.

4. *Species Diacartham.* Dos. ʒj.

CCCCXVI. *Cassia*.

Cassia, (Casia) fistula, Arab. & Alpin. Cassia nigra, Actuarius, Dod. Cord. in D. Cast. Fragos. Tab. Ger. Cass. laxativa, Lon. Cass. solutiva, Bell. Monard. Garz. Siliqua aut Cassia purgatrix Arabum, Lob. Cass. Aegyptia s. purgans, Cam. aliis. Canna fistula, Siliqua Indica Cass. solutiva seu Aegyptia, siliqua, Matth. Cass. F. Alexandrina, C.B. 1.

N. Aduchi cepit & ex Brasilia, Cassia purgatrix, cuius ʒj. plus purgat quam ʒij. Cassie illius Aegyptiaca.

Cassia Arbor procera est, instar iuglandis ferens siliquas seu cannas longas, rotundas, exterius lignosas, intus feminibus ac medulla praegnantibus.

OFFICIN. NAT.

Siliqua s. Cannae medullam includens
M M m ; dentes

dentes. Hæ eligendæ pouderosæ, recentes, plenæ, quæque minime commotis intus seminibus resonent, splendentes, foris etiam ac in pulpa pingues.

Vires medullæ. Aluum lenit, clementerque sine torminibus feces educit, caliditate ac frigiditate temperata (Fernel. cal. j.) cetera humidior, unde nec humido ventriculo nec hypochondriacis ac flatulentis nisi stomachichis & carminativis, (E.g. Cinam. Mastich. sem. anis.) correctæ convenit. Potio eius grata correctæ convenit. Potio eius grata est pleuriticis.

P R A P A R.

1. *Cassia flos s. pulpa Cassia. Cassia extracta.* Fit traiectione medullæ exemptæ per cribrum.

N. Vapor aquæ cribro subditur, ut medulla in cribro agitata eò facilius transeat: debet autem fieri extractio actuum quando usus postulauerit, accersit quippe pulpa cum tempore.

Dosis. Infantibus ad ʒiſs. adultis ad ʒiſs. in clysteribus ad ʒij.

2. *Cassia extracta seu Cassia extracta communis sine pro clysterio.* Fit pulpam cum decocto herbar. mollientium & melle ad consistentiam Electuarii coquendo. Vide Disp.

3. *Elect. Diacassia cum Manna.* Electuarium est & paratum ex pulp. Cassiæ. p. vj. Tamarind. j. Mannæ ij. Sacchar. Cand. j. Penid. j. Sacchar. Violar. iiij. quæ suscipiantur decocto prunor. & syrupo violar. V. D.

Dosis ab ʒj. ad ʒij.

4. *Cassia Extracta sine foliis senæ.* Electuarium est ex pulpa Cass. lbij. Tamar. ʒj. sacchar. lbij. susceptis decocto express. polypod. sem. cartha. herbar. pectoral. Vid. Disp.

5. *Cassia Extracta cum foliis senæ.* Fit ex prioris Electuarii p. xij. pulu. sen. p. j. Vide Disp.

3. *Extractum Cassi.* Vide Quercet. in Diæt. & Ph. Rest.

Dosis ad ʒiſs.

7. *Aqua Cassia.* Fit ex pulpâ additis limon. paruis & ser. lect. q. s. Extrahitur aq. per B. M. dantur ʒvj. in nephrit. & inflammatione Renum.

8. *Syrupus de Cass.* Describitur à Renod.

CCCCXVII. Cataputia minor.

Adonis, Dioscor. Lathyris, Brunfels. Matth. Fuchs. Dod. Cord. in D. Lob. Lon. Cam. Cast. Ger. Tab. Lathyris seu Cataputia minor, 2. Trag. Cataputia minor, Lob. Tab. Lathyris minor, C. B.

1. Granum regium minus, Mes. German. Springkærner.

Ratione ætatis, latiora vel angustiora folia habet, hinc apud Tab. Lathyris duplex, latifolia scil. & angustifolia, quæ promiscue vsuales.

N. Recensetur inter genera Tithymallorum, ut pote tota candido & lacteo succo turgens

Colitur in hortis: Floret Iulio, fert femina Augusto.

OFFICIN. NAT.

Semen (s. grana) rarissime Folia.

Vires. Purgat cum violentia per vomitum ac secessum, humores inprimis serosos & biliosos, hinc phlegmaticos, calf. & sicc. 3. Dosis à baccis vi. ad xij. Folia Num. 4. vel. 5. sed est rari usus. Extrinsecus vesicatorium exhibet & psilothrum, præcipue succus eius lacteus.

CCCCXVIII.

CCCCXVIII. *Colocynthis.*

Colocyn- { rotunda { maior.
 this, C.B. { min. hac usualis
 est { oblonga.
{ pyriformis.
{ pomiformis.

Dicitur *Κολοκυνθίς* Dioscor. Colocynthis fructu rotundo minor, C. B. 2.

Fœmina, Tab. Coloc. fungosa & levis, Cord. h. aliis cucurbita sylvestris, fructu rotundo minor, vulgo Colocynthis Sicyonia. Arab. Chandel, Handel & Handhal. Videatur & Colocynthis, Matth. Cord. in D. Lon. Lcb. Dod. Cast. Cam. Ger. Vera, Trag. prima f. mas, Tab. Germ. Coloquinth.

OFFICIN. NAT.

Fructus seu poma ac præcipue medulla eius arida affertur autem ex Ægypto.

Vires. Pituitam crassam ac glutinosam ex profundioribus & remotioribus partibus expurgat, ut ex crebro, nervis, iuncturis, pulmonibus, unde cum commodo exhibetur Vertiginosis, Hamicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, Scabie, Lueque Venerea afflictiis. Calida est & sicc. 3. verum ob vehementiam ac amarorem, & quia ventriculo ac intestinis noxia est, rarissime in substantia, & non nisi robustis, imo decenter correctæ exhibetur. Corrigenia illa sunt cuminum, tragacantha, mastiche, bdellium, & sim. cardiaca, hepatica, stomachica.

Dosis in substantia à gr. vij. ad ʒj. in clysteribus (in petia) ad ʒʒ.

PRÆPARAT.

1. Trochisci alhandal. V. Disp.

2. Infusum Trochisc. alhand. Ω vite aureus Rulandi (nonnullis.)

R. Trochisc. Alhand. ʒʒ. Ψ Maluar. ʒv. vel ʒxij. Digere aliquandiu filtra & serua ad usum.

Vires. Purgat per aluum absque periculo omnes humores viscosos, bilem utramque ac serum si tertio quoque die mane propinetur.

Dosis à ʒij. ad ʒj. vel ʒʒ. vel si placuerit inspissare ad consistentiam extracti, detur à ʒʒ. ad ʒj.

3. Extract. Colocynth.

R. Colocynth. pulpæ (reiectis seminibus) puluerisatæ, extrahe digerendo. vase clauso cum Ψ , aliquot septimanis (3) quo temporis spacio totam acrimoniam amittet; filtra & si dulcius desideras, iterum digere, & dulcescet. Medicamentum eadē optimum, ad puitam & alios humores crassos à remotioribus partibus attrahendos, idque sine noxa. Corrigitur oleo Mastich. Nucist. Cinam. VVecherus ex Querc.

N. Sala. R. pulpæ coloc. sine semine q. pl. eamque subinde irrorando ∇ plantag. incidit, dein extrahit cum ∇ plantag. part. ij. Ψ p. j. filtrat, defecat & inspissat ad consistentiam mellis.

Menstruum ex ∇ plantag. & Ψ commiscet; ne quid ex parte resinosa ac viscosa, quibus Colocynthidem constare ait, intactum maneat.

Dosis à gr. iij. ad. x. cum corrigentibus.

N. Præstat Extractum hoc cum aliis purgantibus miscere, ut illis stimulo sit quam solam exhibere.

CCCCXIX. *Ebulus.*

De Ebulo actum est supra class. 1. Hoc loco ergo solum Ebuli partes purgationi inferuientes, perstringimus. Hæ sunt Cortex & Acin. s. seminula baccarum.

Vires. Ebuli cortices & seminula vim habent educendi ∇ m, conferunt igitur


igitur in Hydroke, Arthritide, caterisque morbis a sero natis.

N. Eliguntur cortices medij ac potissimum radices.

Semen Ebuli solutorium acquiritur hoc modo.


R. Baccar. Ebuli quantitatē magnam, exprime succum, (quem in Extractum redigere poteris ad normam datam l. 2. (acinulosque restantes à siliquis separa, aliquoties lauando, semperque quod supernatate reiciendo, donec solos acinulos eosque puros nactus fueris. Hos sicca ac serua pro vsu.

N. 1. Dosis à ʒj. ad ʒij. vel fiat emulso in dosi maiori. *Sala.*

N. 2. Ex hoc semine exprimitur  quod ventri inunctum aluum laxare dicitur.

Aqua still. Sambuci aut Ebuli radicū, cuiusque ad ʒiij. sumpta per 30. dies, confert Hydropi.

Arcanum Chamaeactes S. Closs.

Semina contusa pone in cucurbit. affunde aquā limpida, agita materiam in calore remisso, donec in puluem tenuem euadat, digere per 3.  deinde cola torculari fortiter. Oleum mixtum erit cum aqua. Digere & quod supernabit serua, in fundo habebis eiusdem sem. vnguentum.

Vires. Oleum hoc intus sumptum purgat egregie pituitam si eius ʒʒ. cum far. amyli incorporetur, vel in iusculo exhibeatur. Extus podagra materiam influentem abigit, ingressam discutit durascentem emollit, in omnibus doloribus salutare est.

CCCCXX. *Elleborus niger.*

Vtimur non omnibus Ellebori ni-

gri speciebus, sed (monente Matthiolo. Helleboro nigro, flore roseo, C. B. 4. cui tamen alij substituunt Helleborum nigrum hertensem flore viridi. Alii eius loco cum successu vtuntur Elleboro nigro tenuifolio, Bupththalmi flore, teste Bauhino in *Matth. Germ. schvvariz Mieszvortz.*

Prior insignitur Elleborum nigrum, *Matth.* (cui & Helleb. purpureo flore,) *Cast. Cam.* Helleborus niger, *Lob. 2. Dod. verus. Ger.* Veratrum nigrum, *Dod. Legitimum, Clus. hist.* Styriacum, *Tab. C. B. 4.*





Posterior nominatur Helleborus niger, *Brunf. alter, Matth. 3. Dob. nostras, Cord. hist.* Helleb. niger adulterinus domesticus, *Trag. hortensis, Fuchf.* Helleborastrum, *Lob. Ger.* Veratrum nigrum, *Cord. in D. Clus. pan. & hist. Tab. C. B. 2.*

Tertius dicitur Elleborus niger verus, *Trag. Lon.* Pseudo Elleborum, *Matthioli.* Bupththalmum, *Dod. Clus. Cam.* Helleborine tenuifolia, *Cord. h.* Elleborastrum nigrum, *Cam.* Helleb. niger ferulaceus Theoph. *Lob.* Elleb. alerum, *Cast.* Hellebor. Hippocratis, *Tab. C. B. 9.*

Prior crescit copiose in Austria. Floret Ianuar.

OFFICIN. NAT.

Radix ac præcipuè Cortex.

N. Colligendi tempus referunt  in aspectu felici cum  aut  existente sub ortu  crescente ac peragrante signum Capricorni, Leonis aut Sagittarii. Heurnius.

Vires. Purgat potenter humores melancholicos, vile per consequens medicamentum est, omnibus affectibus inde Originem trahentibus, quales, Mania, insania, Hypochondriaca, passio, Elephantiasis, Herpes, Cancer, Quartana, Vertigo,

tigo, Epilepsia, Apoplexia, Scabies. Sed cautè & non nisi robustis ob violentiam quam exercere aptus natus est, exhibere conducit. In decocto tamen minus periculi. Corrigitur mastiche, cinam. anis. fœnicul. & sim.

Dosis à ʒj. ad ʒij. in infusione dant à ʒj. ad ʒʒ.

P R Æ P A R.

1. *Preparatio Ellebori officinarum. Maceretur (reiecta medulla lignea) per ʒ 5. in Vino citonior. (alij in Maluatico) postea exiccetur. Aug.*

Quercetano sufficit 24. hor. in + ros. macerasse. Ph. Rest. c. 26.

N. *Alij radicem ita preparatam ulterius pino cidonio insigunt, idque pacta panis obuolutum in clibano coquunt, postmodum radicem exemptam exiccant.*

2. *Preparatio Recentiorum.*

ʒ2. Rad. Elleb. nigr. puluerif. q. v. irroraphlegmate ⊕, & ad tenem calorem continuo lignea spatula agita, iterumque irrorat & agita, donec fœtor omnis exhalarit, radicesque gratum odorem & colorem nigricantem acquisiverint.

Dosis ʒʒ. ad ʒj. cum corrigentibus. Hartmann in Croll. Sennert. Inst. Tent. Zel.

N. 1. *Alij irrigant aliquoties (3.) succo rosar. & in umbra exiccari sinunt, dantque ad gr. 10. vel. 1. 2. imo ad ʒj.*

N. 2. *Non minoris virtutis sunt alie correctiones, quæ per macerationem radicum seu fibrarum helleb. teretium & minutarum ex Oriente allatarum sunt in lacte caprino, sero lactis, melicrato, & Oxymel. per tridium, vel etiam modo sequenti.*

3. *Extractum Ellebori nigri.*

ʒ2. Cortic. rad. & fibrar. q. v. coque in

Vino albo generoso leni calore hor. 3. in fine Δ augendo ut bulliant. Dein exprime, & coagula ad consistentiam Extracti.

Dosis à gr. x. ad xv. vel xx. cum ol. mastich. & sim.

N. *Alij loco vini solâ aquâ pluuiali utuntur, ut August. Alij aqua anisi, de qua oleum separatum, ut Heurnius in Meth. pract. vide & VVecker. vel aq. maior. aut Meliss. cum ol. ʒ per d. Hartm. in pract. alij V, ut Beg. lib. 2. cap. 9.*

4. *Extractum Ellebori nigri Quercetani.*

ʒ2. Rad. & fibrar. (cum + rosar. præparat.) q. v. extrahe digerendo, cum succ. Limonior. part. 1. & succ. pomor. redolen. part. ij. (succ. prius sint bene depurati & clarificati, exprime. Fecibus affunde nouum succ. Rosar. pallidar. clarificatum, ac denuo digerendo extrahe colando & exprimendo. Vtramque Tincturam coniunctam digere in MB & defeca. Defecatam Tincturam Δ coagula ad formam extracti.

Dosis ad ʒj. cum stimulo aliquo vim ellebori vomitoriam obtundente, e. g. Extract. diagrid. & sim. Querc. in Pharm. rest. c. 26.

5. *Aliud Quercet.*

ʒ2. Extr. elleb. nigr. (cum ▽ Anisi factum) affunde ▽ digerendo, extrahe, filtra, coagula. VVecker. ex Quercet.

N. *Si viridem habueris Elleborum, extractum quoque parare poteris cum ▽ eius ʒ ata, ad modum in Esula extracto delineatum.*

6. *Extractum Elebori nigri Sala.*

ʒ2. Cort. ellebori nigri, ʒʒ. ▽ borrag. ʒʒij. V ʒijij. digerendo extrahe, vese cl. decanta, ex fecib. combustis extrahe Sal, idque Tincturæ admisce, di-

gere per ♂ . ac coagula. Dosis ad ℥ss . & ℥j . fumar. ℔ . xij. Postea coque ad consumpt. tertiæ partis.

7. *Extractum helleb. nigri* 8. *Closs.*

Desicca fibras helleb. nigri flore purpureo in patellâ ferreâ, admoto subtus Δ lento, quasi animus esset aliquid frigere, agita frequenter, ut vapor malignus, qui conuulsionis causa est, inde exhalet, hoc facto tere radículas, & cum phlegmate \times tincturam extrahe, filtra & coagula.

Balsamus Elleboratus.

Herbas & rad. elleb. nigri munden-
tur, conquassentur & ponantur in Vinum moschatellinum rubr. mensur. 4. vase vitreo benè clauso per menses duos, postea exime & succum exprime, expressum filtra, filtratum pone super herbas & radices recentes añ. m. j. ros. rubr. m. v. garyoph. ℥vj . Ponantur ad digestionem per aliquot ♂ , adde V octauam partem, deinde exprimatur, expressum seruetur. Tandem remanentiâ combure in cinerem, & s.a. salem præpara, liquorem abstrahe in B.

24. Salis præparati ℥ß .

Croci ℥j .

Ambar. grif. ℥ij .

Mosch. ℥j .

Aloës epat ℥ß .

Spec. diamb. r.

Diagrid. añ. ℥j .

Ol. garyoph. ℥ß .

Soluatur extractum, deinde admisceantur hæ species, iterumque ad formam inspissentur, datur à ℥j . ad ℥ss . & ultra. Ex communicatione Greg. Horstij habuit S. Closs.

Syrupus Helleboratus Plmensis.

82. Myrobalan. omn. ℥iiß . contundantur crassiori modo & fricentur manibus cum ol. amygd. Deinde infundantur per diem & noctem in aq.

Adde cort. rad. helleb. nigr. præpar.

Glycyrrhiz, mund.

Polypod. q. à. ℥j .

Sem. citr. ℥ß .

Caryophyll. ℥iß .

Sum. fumar.

Fl. Cichor. mß .

Borrag.

Bugloss. añ. p. j.

Bulliant omnia ad remanentiam ℔v .

Postea adde. Fol. sen. el. ℥iiß .

Epithym. cort. ℥ij .

Iterum bulliant, donec maneat ℔iij .

Addito sacch. ℥xxxij . coque ad consist.

Greg. Horst. in obseru. lib. 1.

N. Syrup. Helleb. Quercetan. Vid. l. 2.

7. <i>Syrupus Elleboratus</i> : In hoc continentur	{	Cort. Elleb. 3.	} partes.
		Rhabarb. 8.	
		Fol. Senæ. 16.	
		Polypod. 16.	
9. <i>Oxymel. Elleboratum</i> : In quo	{	Helleb. alb. 3.	} partes.
		Helleb. nig. 3.	
		Efulæ. 2.	
		Agaric. 2.	
		Turbit. 8.	

Fit ex foliis helleborastri mense Septembris vel Octobris collectis, (à decrescente, quæ in umbrâ persè exiccanda, vel in pane filiginoso.

Dos. à ℥ß . ad ℥j . in vino albo.

CCCCXX. *Elleborus albus.*

Elleborus albus flore subuiri-
di. C. B. 1. Ellebor. alb. Brunf. Trag.
Fusch. Cord. hist. Lon. Cam. Clus. hist.
Helleborum album, Matth. Lob.
Cast. Veratrum album, Cord. in D. mas
&

& foemina, Tab. Germ. vveisz Ni-
eszwurtz.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. Ob violentiam purgationis,
quam per superiora & inferiora exer-
cet usum purgandi internum soli ferè
Elleboronigro linquit. Ingreditur tamen
ceu basis vomitorium Conradiuum.
Extrinssecus sternutationes mouet, sca-
bies, impetigines & serpiginis mundifi-
cat & sanat, Lethargicos excitat, (na-
ribus indita) menses proritat (subdita.)

PRÆPARAT.

1. Vomitorium Conradini.

R. Rad. Bryon.

Cyclamin. à ʒij.

Helleb. alb. ʒj.

Radices has probè mundatas, lo-
tas & exiccatas puluerifa, affundeque
V ad eminent. dig. 2. stent in MB.
dein ʒ la per M, feces lexime & com-
minue, spiritum abstractum reassun-
de, stentque aliquandiu vase clauso.
Postea filtra & habebis verum vom-
itorium.

Vfus. Penna extremas plumas intin-
ge & immitte in haustum Vini malua-
rici, eumque bibe & euomes. Vid. Hart-
mann. in Croll.

2. Vinum vomitorium.

Fit vinum ex elleb. albo. si radi-
cum illius crasse contus. ʒß. macere-
tur in ʒb. Vini Hispan. exponaturque
Soli.

Vires. Est singulare Heurnij Expe-
rimentum pro mouendo vomitu co-
chleari vnum, ad alium vero ciendam
detur cochl.ß cum aliis laxantibus.

CCCCXXII. Epithymum.

Επιθυμιον, Dioscor. Epithymum,

Marth. Lob. Cast. Tab. Cassutha minor,
Dod. C. B. I. Germ. Tymseid.

OFFICIN. NAT.

Integra Planta.

Vires. Purgat blande melancholicos
& serosos humores, calf. & sicc. 3. Vfus
pracip. in scabie, vlceribus, affectibus
melancholicis, in hypochondriorum &
lienis passionibus & obstructionibus.

PRÆPAR.

Syrupus de Epithymo. V. Disp.

CCCCXXIII. Esula.

Esula herba est Linariæ conformis,
nisi quod hæc lacteo succo careat, quo
illa grauida est, iuxta versum:

Esula lactescit, sine lacte Linaria
crescit.

Diuerfa sunt eius genera iisdem
qualitatibus prædita. Ex his eligere
monent pineam, i.e. quæ foliis pinum
æmulatur.

Dicitur Esula vulgaris maior, 5.
Trag. Esula minor Officinar. Lob. Esu-
la minor, Dod. Tithymalus cupressi-
mus, 2. Tab. Tithymalus foliis pini, for-
tè Dioscoridis Pityusa, C. B. I. Germ.
VVolffsinilch.

N. Eligenda non nimis recens.

OFFICIN. NAT.

Cortex præcipue radice, hinc & fo-
lia, quibus addi potest & succus, sed
rarissimi vsus est.

Vires, Pituitam validissime, præcipue
per inferiora purgat, unde & Rustico-
rum Rhabarbarum Esula audit. Est an-
tem acris, ignea & erodens adeo ut im-
pudentium mendicorum frandi inser-
uiat, qui eius succo cutem sibi met exul-
cerant scabritiei specie.

Corrigitur eius feritas Bdelio.
Tragacantho, mucilagine Psyllij.

NNnn 2 Quinimo

652 PHARMACOP. MED. CHYM. L B. IV.

Quinimo mitescit præparatione, i. e. tridua in + acerrimo ros. infusione acexiccatione. *Vide August.*

N. *Quercetanus contentus est infusione 24. hor. in Pharm. Restit. Alij singulis diebus nouum acetum affundunt. Nonnulli perficiunt eandem macerationem in decocto myrobalanor. cum modico cinamomi vel spica.*

P R A E P A R.

1. *Extractum Esulæ minoris. Sala.*
2. Cortic. radicis (in principio veris quando prodire incipit collect.) q. v. coque cum Vino albo generoso in diplomate: Exprime ac inspissa: Inspissatum liquorem solue iterum, in ∇ plantaginis, maceraque in MB 3. vel. 4. decanta, filtra, vel si opus, clarifica cum albumine oui, & coagula.

Dosis à gr. xij. ad xx. vel plura.

2. *Aliud Extractum Esulæ, quod Rulandinum existimatur.*

2. Rad. Esul. min. vt in officinis veneunt, q. v. coque lento Δ cum ∇ simpl. semper despumando, dum spumat, ∇ inde cola & serua, aliamque superfunde & coque collectam ∇ , leniter coagula ad spissitudinem mellis, postea affunde ∇ ad eminent. digit. j. & vase clauso in loco calido, aliquandiu asserua. Tandem abstrahe leniter ∇ . Et relinquetur Extractum.

Vires. Feliciter ∇ intercutem pel-
lit, &c.

Dosis à ʒj. ad ʒj. *Hartman. in Croll. Senn. in Inst. Tentzel.*

VVeckerus describit & Extract. Esulæ ex foliis siccis cum ∇ factum, idque per vomitum ac aluum expurgans,

3. *Extractum Esulæ Quercetani*

Exprime succum ex radice & foliis, fecibus remanentibus affunde serum

lactis (vel ∇ m lactis ʒatam) digere ʒ aliquot, dein exprime. Expressiones utraque confusas digere in MB vt defecentur, nec quicquam amplius crassamenti deponant. Liquorem defecatum lento MB calore coagula ad consistentiam Extracti.

Dosis ad ʒʒ. in forma pilular. vel in liqore dissoluta.

4. *Aliter eiusdem Quercetani.*

2. Esulæ viridis contus. q. v. destilla in VB (non tamen comburatur) fecibus affunde destillatam illam ∇ m, digere, vt extrahatur Tinctura. Tincturam decantatam separa ab aqua sua in MF : abstractam aquam reaffunde fecibus prioribus, ex quibus parasti extractum, idque toties repetendo, donec non amplius tingatur: Vltimò exprime, expressionem prioribus Extractis adde.

N. 1. Si ex fecibus utriusque præparationis (precedentis atque huius) combustis Sal cum sua propria aqua extraxeris, idque extracto, proprio addideris eius purgandi vim & efficaciam validiorem reddes.

N. 2. Ad hunc modum Extracta præparabis ex Thymelæa, Mezereio & reliquis omnibus Tithymali speciebus, & ex ipso quoque Elleboro nigro, si in loco eo habitaueris, ubi recens colligi potest.

5. *Pilula de Esulæ Fernelij. V. l. 2.*

CCCCXXIV. Frangula.

Alnus nigra, baccifera, C. B. 1. Frangula, Martb. Dod. Alnus nigra, Lob. Cam. Alnus baccifera, Arbor fœtida, Lon. Trag. Auernus Crescentio, Herm. Faulbaum, Zapfholz.

O F F I C I N. N A T.

Cortex interior, potissimum radicis.

Vires. Purgat humores noxios & es,
maximè

maximè serum, tam per vomitum, quam per secessum, idque sat violenter. Ea propter corrigi solet Cinam. Zinzibere sem. anis. fœnic. & sim. Extrinsicus coquitur cum butyro, ad scabiem & similes morbos.

Dosis ad ʒij.

N. Rusticis familiare exhibet purgans in hydropo & sim. morbis.

CCCCXXV. Gratiola.

Gratiola, Matthiol. Dod. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Limmesium l. centaurioides, C. B. aliis, Gratia Dei. Germ. wild. Autin.

N. Veteribus ignota videtur, quamvis, aliqui papaver spumeum Dioscor. alij Eupatorium Mesue, alij Beon album esse velint. Centaurida alij faciunt, nec male, cum centaurij minoris species esse videatur, & inter spurias Centaurij minoris appellationes quoque Helleborine extet, qua ob vires cum Gratiola eadem esse videtur.

Crescit in Campestribus & pratis.

OFFICIN. NAT.

Folia.

Vires. Efficax remedium est in humoribus aquosis, lentis, biliosisque specificè euacuandis, quos vel ex remotissimis partibus trahit, atque tum per secessum, tum per vomitum expurgat. Hinc magnus eius usus esse poterit in Hydropo, Ictero flavo, &c. Et quia amaritudine insuper dotata est insigni, fugat lumbricos, eorumque saburram expurgat.

Corrigitur Cinamom. sem. anis. Glyzyrrh. &c.

Dosis foliorum puluerisatorum, ʒj. vel. in infuso ad ʒij.

N. Matth. exhibet foliorum Num. x.

PRÆPARATA.

Extractum seu succus inspissatus Gratiola.

R. Fol. Gratiolæ, (Maio vel Autum. collect.) exprime succ. clarifica & inspissa.

Dosis à ʒj. ad ʒʒ.

CCCCXXVI. Hermodactylus.

Hermodactylus est vel	{	Iris tuberosa. Hermodactylus verus, Matth. & Tab.
		Colchicum { perniciosum. ʒausitatum.
		{ non venenatum. Hoc usuale & huius loci.
		Satyrum { Hæc Officinis ignota sunt.
	{	Cyclamen

- Dicitur Colchicū radice siccata alba, C. B. 2. Colchicum album, Cord. hist. Hermodactylus legitimus, Dod. Hermodactyli non venenati Offic. Lob. Hermodact. Offic. Cam. Lon. Hermodact. albus, Serapioni. Hermodact. Orientalis, Casalpino.

N. Matthiolus & Tabernamontan. Hermodactylum in Officinis usitatum esse volunt, radicem Iridis illius tubero-

sa, à quibus dissentiunt Dod. Lob. & alij.

OFFICIN. NAT.

Radix, quæ ad nos ex Syria affertur.

Reperitur Hermodactyli Radix alba, ruffa & nigra, sed eligenda quæ foris & intus verè albo, grauis, compacta, quæ leni contusione in puluerem farinæ triticæ similem facile redigitur, sapore suauis ac dulci.

Vires. Pituitam crassam, lentam, N N n n 3 aliosque

654 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. IV.

aliosque humores viscidos peculiariter à iuncturis efficaciter trahit, ob id articulorum affectibus, chiragra, podagra, &c. conducit.

Dosis à ℥ss. ad ʒiſs. in infusione à ʒij. ad ʒiſs.

P R A E P A R.

Pilula de Hermodactylo. Vide apud Augustanos.

Dosis à ʒj. ad ʒiiij.

I.

CCCCXXVII. *Ialapa.*

Ialapa radix est, exterius nigricans, interior rufescens, radici *Mechoacæ* similis.

N. Incognita fuit maioribus, & non nisi paucos ante annos ex India ad nos transportari cepit.

Dicitur *Gialappa*, *Chelopa*, *Celopa*, *Ialapium*, vel *Gelapo*, (à *Massiliensibus*,) aliis *Mechoacanna nigra*, quod *Mecchoacannæ* assimiletur, *C.B. Bryonia*, *Mechoacanna nigricans*. Num. 7.

Vires, Expurgat valide humores noxios omnes, inprimis autem serosos, idque citra molestiam.

Dosis à ℥ss. ad ʒiſs. in infusione à ʒiſs. ad ʒij.

P R A E P A R.

1. *Extractum Ialapa.*

Extrahe cum V, s. a. decanta & abstrahere ad consistentiam.

Dosis à ℥ss. ad ʒj.

N. 1. Extractum hoc quia resinosum est, in aqueo liquore dissolui nequit.

2. *Magisterium.*

Extrahe cum V optimo, hinc affunde aquam & præcipitatur.

Dosis ad gran. xvij.

N. 2. Vis purgatrix potissimum in re-

sina Ialappa consistit. Ideoque si Ialappam adhibere volueris, vel in substantiâ, vel in Extracto aut magisterio viere, vino enim si infundatur, vires suas pro voto non communicat.

CCCCXXVIII. *Mechoacanna.*

Mechoacan, *Mon. Dod. Lon. Frag. 1. & 2. Tab. Ger. Mechoaca peruviana, Lob. Ger. Rhabarbarum Indicum, Cast. Bryonia, Mechoacana alba, C. B. 6. aliis Rhabarb. album, vveiß Rhabarb.*

O F F I C I N. N A T.

Radix ex Prouincia nouæ Hispaniæ *Mechoacan* nomine ad nos allata.

Duplex habetur ratione loci: Prima ex *Mechoaca* Insula affertur, altera vero ex continente circa *Nicaragua* nata, quæ priore longe præstantior est. Eligatur recens intus albicans, extus cortice cinereo vestita, minus cariola.

Vires. *Pituitosos, aquosos, serososque humores, ex toto corpore, ac inprimis ex capite, ac nervoso genere, pectoreque blande ac sine molestia educit. Utilissimum itaque Remedium est in Catarhis, ac indeortis affectibus, in Hydrops, in omnibus arthritidis speciebus, Lue Venerea, & sim. Quia tamen calida & sicca est, in calidis constitutionibus eius usus ne sit continuus.*

Dosis Infantibus ʒj. præter propter, Adultis à ʒj. ad ʒij. in infusione ad ʒiſs.

N. Conducit maxime infantibus in cruditate ventriculi ac pectoris viscosa mucilagine expurganda.

P R A E P A R A T A.

1. *Extractum Mechoacanna.*

Extractum vt alia extracta parari potest

potest cum **V**, vel secundum Quercetan. (in Pharm. Rest. c. 26.) cum **∇** aliqua Epatica, e.g. Endiuia, succo Limoniorum vel Citriorum acidularēdita. Alii parant cum +. Hartm. in pract. verum minus recte, quippe vis purgatrix hac ratione obrunditur.

Dosis ad \mathfrak{z} j.

N. Nihil, lucrin hoc Extracto præ pulvere habes, præterquam quod dissolui in liquoribus possit.

2. Extractum Mechoacanna compositum.

R. Rad. Mechoac. el. non cariofa \mathfrak{z} ijj

Turpeth. gummof. & alb. \mathfrak{z} j.

Zinziberis albi \mathfrak{z} ij.

Polypod. querni \mathfrak{z} ss.

Incisis grosso modo, extrahe digerendo cum **V** opt. & **∇** Beton. (quæ ab Aloe est abstracta, si adsit) añ \mathfrak{lb} ss. exprime fortissime, fecibus relictis aliam affunde **∇** in Betonica, macera iterum ac exprime, expressis liquori- bus adde.

Mannæ puriss. \mathfrak{z} ij.

Scammon. mund. \mathfrak{z} j.

Agitando misceantur, adde

Ω Θ i.g. v.

\odot Cinam. gr. iij.

Redige ad consistentiam extracti.

Vires. Panchymagogen est omnes humores noxios simul educens, præcipue autem serofos.

Dosis \mathfrak{z} j. plus minus. Hart. in Croll.

CCCCX XIX. Mezereum, Laureola f. Daphnoides,

Frutex est Mezereum Officinarum, cuius baccæ Officin. Cocci gnidii, f. grana cnidia vocantur.

Dicitur Chamelæa f. Mezereon

Trag. Germanicum, Lob. Chamelæ. Germanica, Dod. Daphnoides, Fuch. Cam. (Epir.) flore purpureo, Tab. Laureola maior, Cast. Thimelæa, Cord. in D. Daphnis alterum, Lon. Laureola folio deciduo, flore purpureo Officin. Laureola fæmina, C. B. 2. Germ. Kellersbals.

N. Sunt qui Chamadaphnen Dioscoridis faciunt. At alij Dioscoridi ignorant fuisse volunt.

OFFICIN. NAT.

Cortex, Folia & Grana.

Vires. Mezerei vis est ignea, acerrima, exulcerans, mordens, febres accendens, cordis principumque partium vires exoluens, validissime bilem, biliosasque serofitates purgans. Corrigitur macerando hor. 24. in aceto (ut elleborus ac Esula) succo mali punici aut Cydonij, portulacæ, mucilagine sem. psylli.

N. Alij corrigunt infundendo in Vino, & iterum exiccando. Alij triduanam macerationem in + requirunt, singulis diebus novum + affundendo & tandem **∇** bene eluendo.

Dosis, Fol. ac Cortic. Mezerei optime præparatorum & correctorum (sine correctione exulare debent,) est gr. viij. ad xv. Grana à gr. vj. ad xv.

N. 1. Reiciantur fibra, dum teritur.

N. 2. Ob malignitatem rarissime in usum venit.

PRÆPAR.

Pilula de Mezereo. Videfis apud Augustan.

N. Est & Mezereum Chamelæa Tricoccus, C. B. 1. Chamelæa foliis magnis & tenuibus, Mesuao. Cham. latif. vel alba, Serapioni. Chamelæa, Matth. Dod. Cord. in D. Bellon. Lon. Clus. Tricoccus, Lob. Cast. Mezereon Arabum, Lob. Tricoccus, Tab. Chamelæa

656 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. IV.

melæa vera, *Cam. Germ. Seidelbast. Verum officinis nostratibus non adeo vulgare. quamvis sint qui pro Mezereo officinarum habeant.*

CCCCXXX. *Myrobalani.*

Myrobalani fructus sunt ex numero prunorum exoticorum, veteribus Græcis incogniti, ab Arabibus primum inuenti.

Suntque Myrobalani { *Chebuli*
Citrini
Bellyrici
Indi
Emblici } *omnes sunt vsuales.*

Myr. *Chebuli* dicuntur *Quebolia* & *Quebuli*, *Arab. Mirobal. Cepula, Mes. Clus. Chepula, Actuario. Matth. Garg. Lob. Chebuli, Cord. h. Lon. Cast. Chebulæ, Tab. Ger. Myrobal. maximi oblongi, angulosi, C.B. 1.*

Citrini dicuntur *Azafar, Arab. Myrob. lutei, Actuar. flauæ, Garz. Lob. flaua, Matth. & lutea, Clus. in Cord. Myrob. citrea mas. citrini. Cord. hist. Lon. Lob. Cast. Ger. flauæ citrinæ luteæ, Tab. Myrobal. citrin. Bellon. Myrob. teretes citrini, C.B. 2.*

Bellyrici: *Belleregi, Bellilegi, Bellegu, Arab. Myrob. belliricæ, Maith. Cord. hist. Clus. in Cord. Garz. Lob. Tab. Ger. Bellirici, Lon. Cast. Myrob. rotundæ belliricæ, C.B. 3.*

Indi: *Asuar. Arab. Myrob. nigra, Actuar. Mes. nigri, Lob. M. Inda & Damafonia & nigra, Clus. in Coroll. Indicæ, Lob. Tab. Ger. f. nigra, Garz. Indi, Cord. hist. Cast. Myrob. nigra octangulares, C.B. 4.*

Emblici: *Embelgi, Emblegi, Ambeigi, ATab. Myrob. de Seni, Serapioni. Senitica, Anicenna. Myr. Empelica, Mart.*

Empelitica f. Emblica, Clus. in Cor. Emblici, Cord. hist. Lon. Cast. Emblicæ, Lob. Tab. Ger. C.B. 5.

Eligendi sunt carnosiores, crassiores, ponderosiores.

Vires. *Myrobalani citrini seu flauibili flauæ educendæ apti nati sunt. Indi f. nigra, bili atra, chebuli, pituita ac postea bili, Emblici ac Bellyrici, itidem pituitæ,*

Dosis à ʒvj. ad ʒiʒ.

OFFICIN. NAT.

1. *Pilula de 5. generibus Myrobal.*
2. *Extractum Myrobalan.*

ʒ. Genus Myrob. quodcunque volueris exemptis nucleis, tere partem carnosam subtiliss. Macera dies aliquot cum ∇ dein exprime & inspissa. *Sala.*

N. Alij adhibent succum pomorum redolentium, indeque conficiunt *Extractum Myrobalanorum pomatum.*

CCCCXXXI. *Polypodium.*

Polypodium { *vulgare. H. vsuale.*
minus. Dod. 2. Matth.
1. Tab. & c.

Dicitur *πυλῶδιον Diosc. Polypodium, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Cord. hist. Lon. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. maius, Dod. C.B. 1. Germ. Engelsüß.*

Reperitur in Fago, Corylo, in antiquis & cæduis saltibus, in ruderibus saxosis, præfertur tamen omnibus quod in Quercu nascitur.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. *Educit bilem adustam & pituitam lentam, Hinc utilissimum in obstructionibus Mesenterij. Epatis ac Lienis, & inde natis passionibus hypochondrior. scorbuticis. Raro autem solum datur, sed aliis purgantibus fere admisce-*

tur, & quia segniter lurgat, plerunque in decoctis vel infusionibus, raro in aliis formulis adhibetur.

CCCCXXXII. *Psyllium.*

Psyllium
C.B. { Dioscorid. f. Indicum crenatis foliis.
{ Maius { *supinum, 2. Matt. Cast. Tab. &c.*
{ *erectum, hoc vsuale solum.*
{ Minus.

Dicitur *Psyllium*, *Trag. Matth. Fuchsf. Cord. in D. & hist. Dod. Lob. Cast. Ger. 1. Tab. Germ. Psyllien' rant.*

Crescit sponte in Italia, locisque nonnullis Germaniæ, solo gaudens aspero, nobis non nisi in hortis colitur. Floret Iulio & Augusto.

OFFICIN. NAT.

Semen collectum Octobri.

Vires. *Euacuat bilem flauam, mucilagineque sua acrimoniam humorum obrundere aptum est. Hinc conuenit maxime in Dysenteria & Corrosione intestinorum*

Dosis à ℥iij. ad ʒvj. scil. ex his ∇ conuenienti extrahitur mucilago propinanda, sed raro.

N. *Semen psylli hoc peculiare præ cæteris purgantibus habet, quod qualitate refrigerandi sit præditum, secus ac Mesue statuit. Verum enim vero nec tamen extrareprehensionem positum est, quam incurrit ratione virulentia sue.*

PRÆPAR.

Electuarium de Psyllio.

Dosis ad ʒj.

R.

CCCCXXXIII. *Rhabarbarum.*

Pw ñ pñor, Dioscor. Arab. Ravid. &

Rhabarbarum, Romanis Raponti cum Rhabarbarum, Officin. C.B. 1. Rhabarbarum. Garz. Acost. Fragosf. Lob. 3. Tab. 2. Ger. Rhabar. Americanum. Monard. Rhabarbarum f. Indicum, Cord. Rheum f. Rha. Dod.

In China prouenit, unde in Turciam, hinc Venetias defertur, & quidem vel nauibus, quod citius corrumpitur, vel itinere terrestri, quod durabilius.

Duplex venale prostat: alterum dicitur *Rhabarbarum de Leuantes*, quod flauius & melius: alterum *Muscoiticum*, quod obscure flauum & uilius est.

OFFICIN. NAT.

Radix.

Vires. *Purgat benigne bilem flauam, pituitamque viscosam ac tartaream in ventriculo, primaque regione stabulantem. Epatis specificè confert, adeo ut cor Epatis dicatur, curat Icterus, & quia vim quoque astrictoriam obtinet in omnibus morbis dissolutis, Dysenteria, Diarrhæa præ aliis commendatur.*

Corrigitur ꝑ Cinam. Shænanthos, Santal. Citrin.

N. 1. *Partem tum purgantem, tum astringentem obrinere creditur, quarum prior facilius eximitur, posterior difficilius. Hinc pro diuersa intentione, diuersimode quoque tractatur. Nonnulli leni rostione vim purgantem minui & astringentem augeri sibi imaginantur, quod alij improbant, nec immerito, etenim cum vis purgans fixior sit, quam ut leni rostione in auram euanescat, rostio illa vix satisfaciet. Præstat itaque si astrictoriam vim auctam velimus, reiecta prima decoctione, denuo id coquere, ac forrissima expressione exprimere.*

N. *Radix Rhabarbari Monachorum,*

658 PHARMACOP. MED. CHYM. LIB. IV.

rum (alias *Lapathi domestici, hortensis satini*,) eandem purgandi facultatem, cum vero *Rhabarbaro* habere creditur, modo in duplo usurpetur. Hinc sunt qui pro *Rhapontico* illud habent, sed male, *Rhaponticum* quippe verum & à *Rhabarbaro Monachorum* & à vero *Rhabarbaro* diuersum nonnunquam ad nos transportatur. VVeckerus.

Dosis *Rhabarbari* veri à ʒj. ad ʒiʒ. in infuso ad ʒʒ.

N. 3. *Rhabarbarum* ex omnibus *caracteticis* est *usitatissimum*, sine ullo periculi metu omni aetate, atque ideo etiam pueris & *pregnantibus* conueniens.

P R Æ P A R.

1. *Rhabarbarum* conditum.

Cuius dosis paulo maior est crudo.

2. *Syrupus* de *Cichorio* cum *Rhabarb.* (in qua solum *Rhabarbarum*,) V D.

3. *Syrupus* de *Rhabarb. solutius*, in quo part. æqu. *Rhab.* & fol. *Sonæ*.

4 *Syrupus* *Diafereos*, { *Rhabarb.* 5.
in quo partes { *Carthã.* 4.
 { *Agaric. tro-*
 { *chisc.* 2.
 { *Fol. Sen.* 1.

5. *Trochisci* de *Rhabarb.* V D.

6. *Pilule* de *Rhabarbari*.

7. *Extractum* *Rhabarbari*.

℞. *Rhabarb.* el. q. v. extrahe s. a. dige-
rendo cum ∇ dest. *Epatica.* (*Endiu. Ci-*
chor. Agrimon.) affusis aliquot guttulis
ol. ʒ per d. decanta ac exprime, coagu-
laque ad formam *Extracti*.

Alij addunt quoque corrigentia, ea-
que simul extrahunt. Sic. *Quercet.* ℞.
Rhabarb ℥iʒ. addit *Cinamo.* ʒʒ. *San-*
tal. ʒj. Extrahitque cum ∇ *Endiu.* succo
Limonior. vel *Citriorum* acidula red-
dita. *Pharm. Rest.* c. 26. Fit quoque *Ex-*
tractum per ∇. Vide *VVeckerum*.

Dosis ʒj. ad ʒʒ. ʒj. Acui tamen

potest *Diagrid.* præparat. *Gummi* gutt.
Elater. &c.

N. *Melius* est *extractum simpliciter*
sine *corrigentibus* conficere, cui si opus sit
pro intentione *Medici* *oleum* aliquod
conueniens. E.g. *Macis*, *anisi*, & sim.
admiscei potest.

CCCCXX XIV. *Ricinus.*

Ricinus Vulgaris. *Huius loci.*
Americanus. De hoc infra.

Dicitur *Kixi*, *Diosc. Plin.* *Ricinus.*
Trag. Matth. Fuchf. Dod. Cord. Lon.
Lob Cast. Tab. vulgaris, Cam. C. B. I.
Cataputia maior, Fragos. *Granum* re-
gium maius, *Mesueo*, alijs, *Palma*
Christi. Arab. Alkatoo & Kerua. Ger-
man. *VVunderbaum.*

Colitur in hortis, tum ob raritatem,
tum ob talpas, quæ eius præsentiam
fugere dicuntur.

OFFICIN. NAT.

Semen seu *Nuclei* cortice suo tri-
quatro echinato exuti.

Vires. Potenter *bilem* & *pituitam*
ἀπορροήν pellit, calf. & sicc. 3.

Dosis. *Nuclei* N. xij. plus minus.

N. *Rarissimi* in idem usus est.

P R Æ P A R.

Oleum ex *semine* expressum, quod
dicitur *oleum* de *Kerua.* V D.

N. *Oleum* hoc dicunt *oleum* *ficus in-*
fernalis.

CCCCXX V. *Ricinus*
Americus.

Est & genus *Ricini*, quod ante an-
nos aliquot ex *America* adferri ce-
pit. vulgari paulo maius, cuius operi-
mentum seu *siliqua*, quæ *semina* con-
tinet, *tuberculis* asperis non est obli-
ta,

ta, ut in vulgari, sed levis & cinerei coloris: ipsum granum siue semen vulgari simile est, nigrum tamen & non maculosum, nucleumque continet solidum.

Nominatur Ricinus Americus, *Lob. Tab. Clus. in Monard.* Ricinus Americanus, *C.B. 2.* aliis curcas. Vulgo Grana tiglia. Vbi tamen notandum Granadillam Monardo grana esse ab his diuersa & granati feminibus similia.

Vires, Valenter superne ac inferne purgat.

Dosis. Nucleus vnus excorticatus, vel solum dimidium nuclei.

S.

CCCCXXVI. Senna.

Senna { Alexandrina s. foliis acutis.
C. B. { Hac prestantissima
 { Italica s. foliis obtusis. Hac
 { priori substituitur.

Priori inscribitur Senna Alexandrina, *Trag. Cam.* Orientalis, *Bellon, Lob. Tab. Ger.* aliis Ægyptia, Syriaca.

Altera dicitur Senna, *Hermolao.* Sena, *Marth. Fuchf. Dod. Cord. b. Lon. Lob. Cast.* Italica, *Trag. Ger. Cam.* altera media dicta, *Bellon.* aliis nostras.

N. Veteribus Græcis indicta videtur, primumque à Serapione descripta.

OFFICIN. NAT.

Folia, tùm quoque folliculi, sed raro.

N. Folia præscribuntur vix plurimum seft. i. e. sine stipitibus, à quibus eligendo seligendoque separantur.

Vires. Senna inter purgantia vixatissima est, adustus ac serofos humores & hinc flauam bilem pituitanque ex Capi-

te, Epate, Liene, continuatoque usu iuncturis sine noxa sat benigne educens. Excitat tamen nonnunquam tormina, id quod ex abundantia pituitæ virescens seu mucilaginis acris euenire nonnulli volunt. Verum rectius sentire videntur, qui id crudiori ac magis terrestri senæ particula, forti expressione prolecta, adscribunt. Quia autem calida ac sicca (1.) corrigitur flor. viol. Borrag. Prun. & quo minus ventriculo obesse possit, additur Cinam. Galang. Zinzib. &c.

Exhiberi potest omni ætati & vel ipsis prægnantibus.

Dosis in subst. à ʒss. ad ʒi. in infus. à ʒij. ad ʒss. vel ad plures vices ʒj. ij.

N. Adhibetur & extrinsecus ad melancholiam capitis arcendam (in lotionibus capitis).

P R Æ P A R.

1. Pulvis senæ Moni. g. V. D.

2. Syrupus folior. senæ V. D.

3. Syrupus depom. Reg. Sabi. V. D.

N. Potest Syrupus senæ parari cum fructu, ut est in Pharmac. Poteris p. 122. Acui potest aque extrahens aliquot guttis Ω us, \oplus li aut Φ ri.

4. Electuar. Diabel Zemer. s. Sennatum Renod.

5. Passula laxativa. V. D.

6. Extractum.

R. Fol. Senæ Alexand. ʒj. affunde ∇ simpl. feruentem (acuatam si libet aliquot guttis ol. Φ per d.) ʒviij. Extrahes, exprimeque leniter, clarifica, inspissa ad consistentiam iustam.

N. 1. Aly extrahunt macerandum ∇ stillat. pomor. redol. Beguin. Quercet. Δ y cum ∇ Lupuli. Scolopend. Borrag. Fumar. addita portione alia. Caryophill. Zinzib. sem. fænic. August.

Dosis à ʒi. ad ʒj. & ultra.

O O O O 2

N.

660 PHARMACOP. MED. CHYM. L B. IV.

N. *Extractionem ex iisdem foliis secundum ne repetas: grania nimirum tormina excitare solet.*

7. *Tinctura Sen. aut Rhabarb. ex communicatione S. Cloff.*

℞. Fol. Orient. vel Rhabarb. ʒiβ. Θ tantundem, reduc. in pulu. qui accens⁹ cum carbone ignito detonet in + lo, cinerem solue in ✕ aut ∇, solutum filtra & euapora, solvatur denuò in aqua ros. filtreturque addendo ʒij. rhei aut fol. Sen. in pulu. redact. digere per 4. aut 5. horas.

Dos. huius tincturae sint cochl. ij. in iusculo. Ita reliqua purgantia in Tinctura adducuntur.

CCCCXXXVII. *Soldanella.*

Κράμνη θαλασσία, Diosc. Soldanella, Dod. Lon. Lob. Tab. Marina, Ger. Brastica marina, Matth. Cord. Lon. Cast. Cam. Soldan. maritima minor, C.B. 2. Germ. Meerwinden.

Crescit in locis maritimis Italiae, Galliae, inferioris Germaniae. Floret ætate.

OFFICIN. NAT.

Herba seu Folia ad nos ex Gallia allata.

Vires. Calf. & sicc. 3. Aquam valide educit, adeoque confert in hydropse, scorbuto, &c. Corrigitur cum stomachicis Zinzib. Mac. Cinam. sem. anis. &c.

Dosis in substant. à ʒβ. ad ʒj.

PRÆPARATA.

Succus inspissatus.

CCCCXXXVIII. *Spina insectoria.*

Rhamnus Cataracticus, C.B. 6. Rhamnus solutius, Dod. Ger. Rhamni alia

species, Trag. spina insectoria, Matth. Bellon. Lob. Cast. Clus. hist. Tab. Cerui spina, Cord. hist. spina alba, Lon. Germ. VVegdorn. Creutzbeer.

Crescit iuxta sepēs in sylvis, aliisque locis incultis, amans siccobes & riuiolos, familiarisque est tractui circa Rhenum. Floret Maio, fructus fert Autumno.

OFFICIN. NAT.

Bacc. collectæ in fine Septembris, aut initio Octobris.

Vires. Purgant bilem, pituitam ac maxime serofos humores, unde usus precip. in Cachexia. Hydropse, Arthritide.

Dosis baccar. à N. xv. ad xx. vel aridæ baccæ teruntur, daturque puluis à ʒj. ad ʒiβ. in decoctione coquantur baccæ Num. 40. vel 60.

PRÆPAR.

1. *Succus ex baccis expressus.*

2. *Syrupus de spina insectoria s. Syrupus domesticus. Syr. de Spina Ceruina.* Fit ex succo ac melle additis corrigentibus.

Dosis ʒj. ʒiβ. V.D.

N. Ex baccis immaturis fit luteus color, ex maturis; Viridis (Saffgrün)

3. *Extractum Rhamni & Tithymalorum omnium S. Cloff.*

Contundantur Rhamni baccæ, vel Tithymali cum toto, & inter pistandum irrorentur aceto rosat. succum exprime, clarifica, tortiua huius materiæ retinimentum calcina, addito pari pondere Θ. & extrahe salem cum ✕, quem succo remisce & ad Extracti consistentiam redige, quod longè purius erit, si denuò solvatur in aqua. ros. addaturque ʒβ. ol. Campanarii, filtratur & euaporetur vt prius.

Dos. gr. viij. in iusculo.

N. Sic quoque Cautamer agrestis & Rad. Helleb. in Extracta redigi possunt, affuso

affuso vino alb. loco aceti, in quo rad. per horam unam aut alteram decoquantur.

CCCXXXIX. *Staphisagria.*

Staphis agria descripta est supra. Huius loci semen est, quod purgat per vomitum, sed rarissimi v'se est.

Dosis gr. 12. vel 15.

I.

CCCXL. *Turpethum.*

Turpethum { 1. Arabum f. Turbit. officinarum.
C. B. { 2. Indicū Turbit. Garz. Acoft. Trag. Dod.
3. Garganicum f. pseudo Turpetum, Matth.

1. Dicitur Turbith. Mesuæi, Matth. Turbitum f. turbit Arabum, Cord. b. 1. Alexandrinum. Lob. Ger. Cast. Thapsiæ radix, Fuchf. Turpetum. Tab.

N. Hoc esse quod in officinis v'sitatum est, authores sunt, Clus. in Garz. Matt. & alij quam plurimi.

2. Dicitur Turpetum repens foliis Althææ. C. B.

N. Hoc esse verum officinarum Turbith defendit Garzias. & ex hoc Dodonæus, &c.

3. Nihil aliud est, (teste Matthiolo,) quam radix vel Thapsiæ, vel pityusæ, ex Gargano Apuliæ monte allatæ, vel (teste Clusio in Garziam,) Scamoneæ Radix, loco veri Turbithi venundata.

OFFICIN. NAT.

Cortex seu Radix à medulla lignosa sequestrata.

Vires. Calf 3. crassos viscososque humores, sine pituitam, fortiter & à remioribus partibus, iuncturisque elicit. unde & diuturnis morbis maxime condu-

cit. Inprimis proficuum eius v'sus est in Arthritide, ventriculo pituita abundante, Asthmate, Lue venerea, Hydrope, Elephantasi, scabie, &c.

Quia ventriculo nauseam & vomitum procreare per se solet, corrigitur Zinzibere, Mastiche, Pipere, Cinam. Fœnicul.

Dosis à ʒij. ad ʒiiij. in infusione à ʒi. ad ʒij.

N. Infantibus ac gravidis dare caueo.

P R E P A R.

1. Species Diaturbith. C. Rhab. V. D.
2. Pulvis Stokstaldi, dictus. V. D.
3. Pilulæ de Turbith stomachica Mesuæi. V. D.

4. Acetum de Turbith. Vatiij generis. Vires. Commendatur in Peste, sitque ex Turbith, ruta, myrrha, aloë, aliisque putredinem arcentibus in T infusis.
5. Extractum.

N. Quia Turbethum resinosum est, sue ut aiunt gummosum, conuenit cum V. Extractum eius conficere.

Dosis huius Extract. à gr. vj. ad x. & plura.

CCCCXLI. *Tamarindi.*

Tamarindus Serapioni. Tamarindi, Matth. Bellon. Garz. Acoft. Fragos. Lob. Alpin. Tamarindi, daetyli Indi, Mesuæi. Thamarindus, i. e. Acacia Indica, Cord. hist. Thamarindi, Cam. Epit. Palmæ syluest. fructus oxyphænica. Lon. Cast. Siliqua Arabica, quæ Tamarindus, C. B. 3.

OFFICIN. NAT.

Daetyli acidæ (sic dicti ab Arabico Tamar quod daetylus est : dicuntur & Euphorbia palmulæ acidæ, non quod fructus palmæ arboris sint. Ar-

OOOO 3 hoc

bor enim Tamarindifera instar Fraxini procera est.)

Eligendi recentes, nigro-rufescentes, teneri, multis villis intertexti, pingues, acidi s. vinosi.

Vires. *Refriger. & sicc.* 2. *humorum acrimoniam & feruorem reprimunt, bilem ac adustos humores blande ducunt. siti succurrunt.*

Dosis à ʒij. ad ʒiiij. in Decocto. Alij à ʒʒ. ad ʒj.

N. Parum nutrimenti subministrant.

PREPAR.

Pulpa Tamarindor. V. D.

Dosis ab ʒj. ad ʒij.

Sunt qui paulo aliter hanc pulpam depuratum conficiunt. Extractū Essentiamue Tamarindorū vocant. ʒ. Tamarind. q. v. coque in f. q. aquæ. Exprime, clarifica cum albumine oui ac inspissa.

Dosis à ʒʒ. ad ʒj. & ultra.

N. Fit & ex Tamarindis l. a. sed minime purgat. Sala.

Electuarium Diaphanicum. V. D.

CLASSIS IV.

De Purgantibus secundariis.

A.

CCCCXLII. Aloë.

Aloë est succus sapore amarissimus, qui ex Arabia & Ægypto ad nos pellibus inuolutus, deportatur. Genera eius moderno tempore officinis in vsu sunt 4. quæ tamen non nisi puritate & impuritate discrepant. Nam *Aloës crassamentum* s. pars impurior arenosa, sordibus conspurcata & idcirco nigricans, dicitur *Aloë caballina*: pars paulo purior, colorem hepatis referens, *Hepatica*: adhuc purior, *succotrina* vocatur, quasi succo citrina; quod pulvis eius citrini coloris sit, vel succotrina ab Insula Socotra, vbi copiosè crescit: pars purissima, si adeò depurata ut transparens sit, *lucida* dicitur, quod scil. radiis solaribus obiecta pellucida instar vitri appareat.

Optima lucida est atque sine vlteriori præparatione in vsum medicum accersi apta. Lucidæ succedit Succotrina & Hepatica.

N. *Caballina*, *Caballis* seu *Equis* exhiberi debet, non hominibus.

Censetur Aloë bona, quæ pura, eximie amara, subflaua, difficilis solutu ac

fractu. Hinc, quantò Aloe purior, amarior, flauior, tantò quoque melior est: nigra enim & fractu contumax, reprobanda, ceu adulterata.

Aloe, C. B.

{	1. vulgaris. <i>Huius loci.</i>
	2. folio in oblongum aculeum abeunte.

1. Dicitur Aloe, *Trag. Matth. Fuchs. Dod. Cord. Lon. Lob. Cast. Garz. Clus. b.* communis, *Cam.* Ex hac exprimitur succus, qui inspissatus Aloen huius loci exhibet.

2. Est semperuiuum illud folio mucronato, quod de tabulatis canaliculorum suspensum diutinè virescit, præsertim si luto radix circum-ligetur & subinde irrigetur Dicitur Aloe Americana.

Vires. *Vim præter purgantem obtinet & exiccantem* (gr. 3.) calefacientemque (gr. 2.) prouocat hæmorrhoides & menses, roborat ventriculum, enecat & expellit lumbricos, arceat pitredinem, astringit, consolidat, ex terget, adeoque vulneraria est insignis.

PREPAR.

1. *Aloe depurata, sine lora.*

ʒ. Aloes q. v. pulueris. solue in ʒ. quod arenosū subidet, abiice: pinguiissi-

mum è contra & quod leue est, recipe.

N. 1. *Sunt qui ∇ Endiu. vel Cichor Acetosanè adhibent. Alij vt augeatur vis purgatrix, decoctum purgans loco ∇ substituunt.*

N. 2. *Aloe constat parte resinosa & aqua: illa purgationi inutilis est, hac idonea. Eapropter, si aloen purgantem expectis, neglectare resinosa, aquam collige, in ∇ solubilem, eamque à fecibus sequestratâ.*

2. *Balsamus siue Extractum Aloe.*

R. Aloes succotrin. q. v. extrahe rubedinem, s. a. cum √ rectif. decanta, filtra, coagulaque ad consistentiam aloë debitam, *Pharmacop. August.*

Vires. *Ex superioribus collige.*

Dosis à ℥j. ad ʒss.

N. *Aliam quoque extractionem scit. cum ✕ & ∇ rosar. Vide si libet in Pharmaco. Augustan. sub Extracto Holagogo Andernaci.*

3. *Aloe violata.*

R. Aloes puriss. grossè contusæ ℔b. 1. infusionis violarum, (ex triplici infusione, vide *Syrup. violar.*) ℔b. iij. clarifica, digere, vt soluatur aloë, cola ac coagula leni calore ad consistentiam pilularem.

Dosis à ℔ss. ad ʒss. Sala de Essentiis.

4. *Aloe violata ☐ea.*

R. Aloes violatæ ℔b. j. Crystall. ʒ. ℔b. ss. misce.

N. *Salu vocat Aloedariū Pro violatū.*

Dosis à ʒss. ad ʒj.

5. *Aloe Rosata.*

Fit eodem modo (quo Violata) cum succo Rosar. & ex eadem cum vino F. pilulæ. *Vide Pharm. August.*

6. *Aloe rosata Hieronymi ab Aqua pendente.*

R. Aloes putræ puluerif. q. v. impasta cum succ. Rosar. Damasc. seu prouincialium: exicca leni calore æstui solis; iterumque impasta; idque toties, donec

Aloë sedecim succi partes imbibere, referuetur dein in massâ pilulari pro vsu.

Dosis ad ℥ss.

7. *Eadem aliter.*

R. Aloes puriss. ℔b. j. succ. Rosar. Damasc. ℔ss. coagulentur ad ignem, idque repetatur bis vel ter, sic habetur Aloë rosata optima.

N. *Corrigitur quoque cum spir. ☉i. Vide Scammonium.*

8. *Oleum Aloës purgans.*

R. Aloepar. ℔b. j.

Myrrh. ʒij.

Thuris ʒss.

Destilla lento Δ in cineribus ex cucurbita humili.

Vires. *Umbilico illitum purgat & expellit lumbricos.*

℔.

CCCCXLIII. *Elaterium,*

Ελατήριον. Elaterium succus est amarus, ex fructu cucumeris asininus expressus ac inspissatus.

N. *Omniū succor. hic maximè durabilis est, adeo vt ultra centum annos efficax manere credatur.*

Cucumis asininus describitur Cucumis agrestis, *Brunf. Cord. in D. Cucumis sylvestris, Trag. Matth. Fuchs. Dod. Lon. Cast. Cucumer Elaterii sylvestr. Lob. Cucum. asininus, Tab. Ger. Elateriū quod leue & candidum & igne instar pinguedinis accenditur, Bellon.*

Eligatur Elaterium vetustum, summe amarum.

N. *Elaterium à bimatu ad decennium colore candido, utile Dioscoridi, Ægineta, quod anno antiquius non est, & quod virescit: Theophrasto optimum, quod vetustissimum.*

Vires. *Purgans est violentum humoris serosi: mouet menses, fatumque interimit, vnderarus eius vsus, præcipue*

cum

cum nec malignitate careat.

PRÆPARATA.

1. *Elaterium depuratum.*

2. *Elat. correctum.*

N. *Depurari potes, si in ∇ solvatur ac filtretur, quod facili fieri potest negotio, siquidem ut plurimum liquidum extet.*

Corrigitur cum spir. ☉ i & oleis, vt de Scammoneo dictum.

3 Fit etiam *Extractum* ex depurato succo per V, vt & Fæcula ex succo cucumerum maturorum per subsidentiam, cuius vires vide in obseruat. *Henr. ab Heer.*

Dosis gr. j. ac ij.

CCCCXLIV. *Euphorbium.*

Euphorbium, Euphorbium succus est cœcretus accerrimus, ex fauciatâ Lybica Ferula eiusdem nominis extractus.

N 1. *Modum extrahendi docet Dioscorid.* Videatur Matth. Dodon. Lob. Lon. Tab. Ger.

N. 2. *Dodonæus Euphorbium.* (vnde succus ille extrahitur.) plantam esse perhibet. Dioscorides arborem : contradictione haud difficili conciliatur. Sunt enim planta, quæ temporis progressu, vel diligenti cultura arborescunt, cuius rei exemplum, & in hac ciuitate præbuit arborescens *Ruta frutex.*

Genera Euphorbii sunt duo:

1. *Sarcocollæ* modo pellucidum flauum, pisi magnitudine in guttas æquales densatum, modice cauernosum. 2. In vtriculis, quibus excipitur, in massam densatur candicantem, aut vitri colore.

Dosis à gr. v. ad x.

N. *Adulteratur admixtis Sarcocolla aut Gummi atque liquore Tishymalli.*

Eligendum est purum, translucens, candidum aut flauum & acre, quod leuilinguæ contractu os accensum diu detinet. Annotinum, nimirum per ætatem perfectionem suscipere creditur, acrimonia cum tempore mitiore reddita. Recens improbandum, ceu vitium violentia suspectum.

Vires. *Insignem quidem vim obtinet serum ac aquas ex toto corpore purgandi. Verum enim vero non sine violentia ac molestia, quam præter substantia proprietatem malignam, & vi inflama mandi (calidum e. est gr. 4.) exerit.*

PRÆPAR.

Correctum Euphorbium.

Correctio Euphorbii consistit partim in partium acrium volatilium abolitione, partim in residuarum malignarum ac calidarum mitigatione, quod fit.

1. R. Euphorb purificati ab omnibus fecibus q v. redige in exigua frustula ac inde pomo Citrio vel Limonio excauato, massaque panis obuoluto, coque in clibano : Euphorbium dein sic præparatum, (quod albissimum) vase vitreo serua. *Querc. Pharm. Rest.*

N. *Augustana Pharmacopœa* initio Euphorbium cum Ol. Amygdal. dul. q. s. instar collyrii terere ac massam dein pomo imponere iubet.

2. *Correctio Euphorbii.*

Solve Euphorbium in +o rosato, cola & inspissa, abluque ∇ Rosarum.

3. *Correctio præstantior.*

R. Euphorbii (præstat quod prima correctione correctum,) q. v. affunde succum Limon. vel Granat. acid. depuratum, ad eminent. digit. 3. vel 4. solve digerendo in M^p, filtra calide ac coagula. *Querc. Ph. R.*

4. *Correctio præstantissima.*

Solve

Solve Euphorbium cum phlegmate
 ☉ i, totali & integro suo spiritu im-
 pregnato, vel cum aquis citonior. po-
 morum uè curti-pendulorum, oleo
 ☿ is per C. vel spiritu ☽ i acuatis,
 decanta vel filtra & coagula. *Querc.
 dist. loc.*

5. *Extractum Euphorbij.*

℞. Euphorb. opt. depurat. (vt supra
 cum + rosar.) extrahe cum ☿, decan-
 ta, coagula & denuo circula cum nouo
 alcoole (☿ 10.) dein separato mēstruo
 coagula Δ lento, addendo aliquod cor-
 rectorium pro libitu: fiat mixtura.

Vires. *Paralyfi, Arthritidi, Spasmo,
 Hydropique conducit, pituitam nervis
 impactam expurgando ducit,*

6. *Ol. Euphorb. stillat.*

7. *Ol. Euphorb. commune.*

℞. Euphorb. 3℔. Ol. Cheirin. 3v. vini
 generos. 3v. coque ad consumptionem
 vini.

Præparata alia communiora, quæ
 Euphorbium ceu basisingreditur sunt
Hiera Logadit.

Pilula de Euphorbio. & c. Vid. l. 2.

G.

CCCCXLV. *Ghitta, Iemou.*

Gutta Gamandra, Gummi gotta,
 Gutta gemau, Cattagauma vel gemu,
 Gummi Peruanum f. de Peru, de Iemu,
 de Gemandra; aliis succus Gambici
 vel Crambici.

Est succus concretus aut inspissatus
 (potius quam Gummi.) Cuius autem
 plantæ succus sit, nondum certò con-
 stat. Sunt enim qui ad Efulam, ad cata-
 putiam maiorem, ad flores Ricini Indi
 originem eius referant, coloremque
 aliunde. (E.g. ex Curcuma) conciliatum
 volunt, alij Euphorbij, succum censent

aliis ex Scammonio & Tithymalo com-
 positus est: nonnulli compositum ex
 Chelidonia maioris succo, Scammonea
 & Croco suspicantur: alij ex succo cor-
 ticis mediani Frangula. Nos præcipuè
 de Vfu folliciti, eligere suademus, pu-
 rum, flauique coloris.

Adfertur ex Sinarum regione, pri-
 mumque adferri cepit ante annos 40.
Videatur Clus. lib. 4. exor. cap. 8. succ. 1. 1.

N. *Videtur esse Gummi contra poda-
 gram Monardi.*

Vires. *Expurgat per superiora & in-
 feriora, præcipue humores serdſos &
 aquosos, cum quoque omnem saburram
 vitiosorum humorum ex toto corpore edu-
 cit. Hinc vsus eius creber est in hydro-
 pe, Febri, scabie, pruritu, & sim.*

Dosis à gr. v. ad xiiij.

P R A E P A R.

Etſi crudum quidem, non citra com-
 modum adhiberi queat, attamen cum
 nauseabundam possideat qualitatem,
 operæ præcium duxerunt, hanc obtun-
 dere. Vnde.

1. *Ghitta Iemu correctum per spir.*

☉ i aut ☿ Mindereri.

℞. Ghitta Iemu q. v. dissolue cum
 spir. ☉ : abstrahatur dein spir. ☽
 residuumque exicceur, lentè, ne scil.
 nigrescat, sed colorem suum retineat:

N. 1. *Edulcorare si volueris ▽ ali-
 quoties ablue.*

N. 2. *Procedit felicius correctio ad
 modum quem habes de Scammonio: vel
 Gummi Gutta terna vice cum spir. ☉
 aut + imbebe, tere & exicca.*

Dosis à gr. xv. ad xx.

2. *Extractum f. Magisterium.*

℞. Gitta Gemu pulu. 3ij. ☿ opt.
 3viiij. fiat solutio, digerendo in MB.
 3 aliquot (2. 3. 4.) decanta & filtra ca-
 lide, præcipita affundendo ▽ ros.) vel

P P p p aliam

aliam aliquam,) abstrahere & coagula lente.

N. 1. *Melius succedet processus.*

R. Ghitta Gem. ℥ij. Vopt. ℥v. o^o
 ♀ i ℥j. digere, & soluetur in ℥b breui tempore.

N. 2. *Sunt qui R. V. Santali tinctura impregnatum.*

3. *Magistorium G. G. S. Clossai, siue Gamandra correcta.*

Imbibatur pulvis Ghittæ Iemou ol. deliquioso, ita ut liquefcat instar pastæ, malaxetur diutissime in mortario, terendo pistillo vitreo, donec colorem mutet, affunde V ♀ satum, macera per 15 horas in tali calore, qui colliquando soluendoque gummati non sit satis, decanta, malaxa ut prius, addito nouo ol. Ari, idque tertiâ vice reitera, tandem albescentem hanc materiam laua pluribus aquarol. & ex illâ desiccâ Tabellas aut trochiscos finge.

Vires. *Leniter, & absque vomitus promocatione operationes suas in plerisque absolunt.*

Integrum doctumque Tractatum de Gitta Iemou conscripsit Clariss. Dn. D. Ioan. Petrus Lottichius, Marpurgi Med. Professor publ. amicus meus singularis, ad quem Lectorem remitto.

M.

CCCCXLVI. *Manna.*

ἡ δὲ μέλι & ἀρόμελι, Galen. [Mel ex aëre, cui cœlestis natura, Plinio. Men Siracost & Terniabin, Arab. Thereniabin & Trungibin, Terengibil, Serapioni & Auicenna. Manna purgatoria, Matth. Drosomeli, Cord. hist.

Est ros siue liquor suavis, qui ex aëre sublucanis temporibus decidens arborum ramis & frondibus, hinc

herbis lapidibus & solo interdum inuenitur inhærere, breui tempore coalescens, grumofus instar gummi apparet.

Manna { Liquida Tereniabin, strictè itaque { Bellon. l. b. 2. obs. c. 65.
 tum { Du- { Granata } Ha Of-
 est { rior { Mastichina } scin.

Pro diuersitate regionum est Manna Orientalis, s. Syriaca, Persica, Calabrica, Goriciana, Tridentina, Briançonensis.

N. *Meminit & Garzias Manna granata instar seminis Coriandri, que nobis penitus incognita, nisi intellectum velit graminis semen, Manna nomine veniens, de quo supra Class. 1.*

Ex his etsi Syriaca laudem omnibus præripiat: atamen nostratibus Officinis primas damus Calabrienſi & præcipue granatæ, i. e. quæ granulis minoribus constat, vulgus Mannam foliorum vocat, quod scil. de arboribus colligatur. Hac inferior est mastichina, i. e. quæ granis maioribus & mastichis, guttis propè æqualibus est. Dicunt mannâ corporis, quod de ramis colligatur vel impetu ventorum in terram delabatur.

Eligenda candida, recens, anno non vetustior: ruffa enim & fusca inueterata est. Adulteratur saccharo penidio, herbarum foliis circumuoluto. Sic quoque quæ Sênæ folia granis suis amplectitur factitia est, C. B. Fit quoque Manna factitia ex amylo Manna, Scammonea semine aliquo & radice lacticiania, Christ. Acoſt. cap. 8.

Vires. *Temperata est ad caliditatem reclinans, guttur, asperam arteriam, thoracemque leniens, aluum blandè mouens, bilem serosumque humores educens.*

Dosis infantibus à ℥ij. ad ℥℥. adul. tis

tis ab ʒiʒ. ad ʒiij. & ʒiij.

N. Quia facile bilefcit, in febris. nifi frigida admifta fuerint, non adeo conueniens cenfetur.

P R A E P A R.

1. Elefuar. Diacaffia cum Manna. Vide Difp.

2. Elef. Lenitiuum de Manna. Vi- de Difp.

3. Manna Tartarifata f. Tabule de Manna.

Fiunt ex manna foluta & purgata, quæ more communi in tabula effun- ditur, additur ad Mannæ ʒj. Cremor. ʒj.

4. Manna liquida.

ʒ. Mann. Calab. ʒij.

Crem ʒ i ʒij.

aq. stillat. pro libitu ʒv.

Tartarum primo aquis optimè fol- uatur, hoc facto, lento igne manna, quæ omnia calidè per linteum traici- enda, & cum albumine oui clarific. in modum fyrup. Cui ad conciliandum gratum odorem aqua cinam. vel fimile quid affundi poteft.

Ex Communicatione Dn. D. Iohan. Kieferi.

5. Spiritus Manna.

ʒ. Mannæ el. q. v. defilla Δ lento ex Cucurbita, & habebis fpiritum in- fipidum.

Vires. Sudorificum infigne eft in fe- bribus tum peftilentialibus, tum com- munitibus, sudorem propellens admodum fetidum.

Dofis ad cochlear. j.

Soluit itidem ʒ r, vnde Tinctura ʒ is flaua. Cl. Dn. D. Heluic. Dieteri- cus, Medicus Elefctoris Brandeb. Prin- cipp. Dan & Hofat. amicus meus inte- gerrimus.

6. Spiritus Manna alius.

Diffoluatur Manna rore Maiali, & tam diu cohobetur, donec fublime- tur in caput XX ci inftar niuis. Hic ʒs in fpiritus fluidam naturam redactus fit folutiuum Soli mineralis, fepofitâ omni vi corrofiuâ. Eickerus in Her- mete rediuiuo.

7. Syr. de Manna laxatiuus.

Dn. D. Echoldi.

ʒ. Polypod. q. ʒvj.

Rad. Ireos Flor. ʒiʒ.

Pafful. min. ping. & incif. ʒij.

Fl. Violar.

Borrag.

Bugloff. añ p. j.

Sen. f. ft. ʒiʒ.

Cinam. ʒiʒ.

aq. mulf. lbij.

Coque omnia f. a. ad confumpt.

lib. i. Coletur & exprimat. In cola- tura diffolue.

Mann. calabr. ʒij.

Sacchar. penid.

Cand. alb. añ. ʒj.

Coq. ad confist. fyrupi, addendo in fine aq. Cinamo. parum.

Dofis ʒj. ad ʒij. & vltra.

CCCCXLVII. Opopanax.

Opopanax quid fit & quodnam optimum, vide fupra, hoc loco illius purgandi facultatem describemus, quâ educit phlegma craffum & visco- fum, non folum è mefenterio f. regio- ne prima, fed & idem allicitâ partibus remotis & iuncturis, adeoque mun- dificat cerebrum, neruos, pectus: tuffi antiquæ confert: potum cum aceto hora vna ante acceffionem febrilem, arceat rigorem, maxime fi idem opopa- nax cum fucco apij ac oleo anethino fpinæ illinatur.

P P pp 2

Dofis

Dosis à ʒʒ. ad ʒj.

Corrigitur spica & mastiche.

P R Æ P A R.

1. *Opopanax depuratus*; Fit soluendo (in +) colando & inspissando.2. *Extractum*. Fit vt Euphorbij. Dosis à ʒʒ. ad ʒj.3. *Pilula de Opopanaco comp.* V.D. Dosis ʒj.4. *Oleum stillat.* (ex X per cinerem.) *Sagapenum*. Vide class. 2.CCCCXLVIII. *Scammonium*.

Scammonium, Scammoneum, Scammonia, Scammonea. Est succus ex radice Scammoneæ, plantæ lacteo succo plenæ, extractus & inspissatus. Extrahitur autem vel radicem adhuc crecentem incidendo (vid. Dioscor.) vel eandem (dubio procul cum foliis & eaule,) prælo submitiendo.

Scammonia 5 Syriaca, hac huius loci.

planta est 2 Mospeliaca, Valentina.

Dicitur *σκαμμόνια*, Diosc. Theophr. Scammonia, Matth. Lon. Cast. Scammonea, Cord. in D. Antiochena, Cam. Scammonium, Cord. hist. Dod. Syriacum, Lob. Syriaca, C. B 1.

Optimum est quod ex Antiochia affertur, dein Armenium, Europæum omnino prauum est. Probatum quod nitidum, splendidum, (instar gummi) rarum, cito liquefscens, friabile, colore cum frangitur, fuluo, non valde ponderosum, tactu linguæ lactescens, nec vehementer eam calefaciens, (nimirum hoc Tithymalli admisti argumentum est.) Quod ab his notis recedit, tantò peius existit, quantò longius recesseris. Improbantur glebæ ingentes, nigre, graues, nimirum aut adulteratæ hæ sunt, aut succus ex tota planta expressus.

Dosis à gr. v. ad x. vel xij.

Vires. Expurgat valde humores biliosos, acres, serosos, adeoque creberrimi usus est, non modo per se, sed & cum aliis permistum.

N. Cum magna sit acrimonia, intensaque caliditatis & siccitatis, infensa malignitatis, mordacis flatulentia, excessiue attractionis, adeoque aptum naturum, quod intestina erodat, viscera, cor, epas, &c. conturbet, ventriculum flatibus mordacibus laceffat, vi sua calfactoria ac exiccatoria (quas 3 gr. obtinet) inflammet, & consequenter febres producat, vi attractoria hypercatharses introducat, correctione opus habet, hanc alij aliter instituunt. Hinc

P R Æ P A R.

1. *Scammonium correctum per Cydonium*, i.e. *Diagridium*.

2. *Scammonium tritum*, coque in malo Cydonio excauato pasta circumdato, exemptum dein diagrydium serua pro vsu.

N. 1. Hac elaboratio est Gal. l. 1. c. 1. dealiment, facult. ubi interna mali cotoniæ acetabula semini destinata excauat, eaque Scammonio replet ac coquit.

N. 2. *Antiquum imbecillum* est, ideoque flatulentum, bimum est optimum.

N. 3. Dicitur *Diagridium*, *Diagrydium*, *Diacrydium*.

2. *Scammonium defecatum per succum Citonior*.

Solue Scammonium (vel diagridiū) in succo calido Citonior. Rosarumue pallidarum aut Damascenarum s. à decanta à fecibus ac coagula

N. 1. *Quercetanus* veram Scammonij preparationem feri cum succo Limoniorū ait, cum quo proceditur dictū. Vide Pharmacop. c. 15. Alij cum succo Citri.

N. 2. *Crollius* imbibit *Diagridium* puriss.

puriss. succo clarificato Ros. pallidar vel sylvestrium,) forte Damascenar. seu Provincialium) addit spir. ☉ i guttam unam vel alteram, atque exiccat calore solis vel retro fornacem, idque repetit multoties (20. vel 30.)

Dosis à gr. vj. ad xij.

N. 3. Bredelius Scammonium in ▽ destillata actu frigida. Sic subsidet picea quadam substantia, à qua decantat liquorem supernatantem: idque repetit, novam scil. ▽ affundendo, quoties ▽ albicantem colorem contraxerit. Coagulat dein decantatas ▽ s leni calore ad siccitatem.

Dosis ad gr. xij. &c. Brendel. in Chym.

3. Extractum per spiritum Vini, Magisterium s. Resina Scammonij, Pulvis Syrius.

R. Scammonij purissimi grossè triti ʒij. ▽ opt. ʒxij (vel ad eminent. dig. 4) Digerantur in ME hora vna ac altera, sæpius agitando, vt solvatur: dein filtra calidè per chartam, filtraturæ afunde ▽ frigidam Rosar. (vel aliam aliquam ▽ m) & lactescet liquor. Abstracto ▽ reponere reliquum & residet bit Resina quam (à supernatante lacteo liquore decantationis beneficio separatam,) ter quaterue ▽ roseacea lava.

N. 1. Si Scammonium purum fuerit, vix pars tertia decedit. Sala de vegetab, Kessl. i. c. 90. Tentzel, in Exeg.

Dosis à ʒß. ad gr. xv.

Fit quoque Extractum Scammonij per ☿

Dosis gr. 8. vel. 12. Hartm. in Croll.

4. Extractum Diagridij aromatizatum FF.

R. Cinam.

Zinzib.

Caryophyll.

Macis.

Nucist.

Cardamom.

Cal. Arom.

Anisf.

Cortic. Arant. añ. ʒiß.

F. Extractum cum ▽ ʒß.

2. R. Diagrid. ʒij. Extrahe itidem cum ▽ s. a.

Vtrumque Extractum coniunctim digere. ▽ abstrahe ad consistentiam Extracti.

Dosis gr. xv. ad ʒj.

5. Extractum Scammonij Glycyrrhizatum.

Verum Scammonij correctivum est succus liquiritiæ. Infundatur radic. glycyrrh. bona quantitas in aqua per 24. horas, eaque infusio novâ semper glycyrrh. additione ter repetatur, coctione leui præmissâ. In hoc decocto Scammon. puluerisatum resoluatur filtretur, exhalet aqua sub finem lenissimo ▽ (neaduratur) vsque dum extractum in fundo resideat. Est S. Clossai.

6. Elixir Scammonij Crollianum s. Pilula Scammonij.

Ex Scammonio crebris imbibitionibus succi Rosar. (vt supra) imprægnato, extrahe Tincturam s. a. digerendo cum ▽ opt. (in quo sem. anisf. scenic. cinam. & spica nardi macerata,) decanta & abstrahe ▽ ad consistentiam duriusculam, vel quod melius præcipita cum ▽ Rosar. & lava.

R. Huius Extract. ʒj.

Succi Citonior. depurati ʒiiij.

Ros. rubr. depurat. ʒj.

M. & coagula ad consistentiam pilul.

Dosis à gr. 10. ad 20.

7. Alia correctio Hartmanni: Scammonium ☉ latum.

R. Scammon. minutiss. triti q. v. imbibe P P P P 3 cum

cum paxillo spir. Θ i vel ol. is p.c. adfundendo guttas aliquot Ol. anis. vel fœnic. contêre diligenter vt fiat massa instar picis viscida, quam serua.

Vires. Purgat leniter sine omni molestia.

Dosis à gr. xv. ad xxv. Hartman. in Croll.

N 1. Eodẽ modo mitigatur & vehementia omnium succor. purgatiuum. Aloes, Elaterij, Gummi de Peru. Hartmann. in Croll.

N. 2. Quercetanus in Pharmac. Restit. c. 15. Chymici, inquit, qui elegantes illas & singulares Θ i proprietates occulte in eo delitescerent eruere norunt, haud verebuntur Scammoneam, Myrrham & ipsa etiam Gummi preparare & dissoluere cum phlegmate Θ i, toto suo spiritu impragnato. In hoc solo enim spiritu latet vera illorum simplicium preparatio, quæ cum exuperante calefaciendi qualitate insignita sunt, & hac via exquisitè & perfectè corriguntur.

N. 3. Mus, Oli & Δ is comburunt Scammon. & in picem vertunt, ac proinde multum virtutis catartica deperdant. Satiùs igitur erit Scammon. resolueri in Tincturâ ros. cum Ψ u Θ li paratâ ut moris est, resolutumque ad Extracti consistentiam reducere.

8. Scammonium Δ ratum.

R. Scammon. minutiss. triti, q. v. (E. gr. ζ j. vel ζ ij.) Extendatur supra chartam bibulam, detineaturque supra carbonibus viuis. Δ re super iniecto fuman- tibus, donec Scammonium, (quod continuo mouendum) liquefcere incipiat vel albefcat. Scammonium hac ratione optimè correctum exhiberi potest à gr. vj. ad vij;

9. Scammonium Rosatum.

R. Scammon. vel Diagrid. q. v. Ex-

trahe cum spiritu Citonior, s. a. decanta, filtra & inspissa ad consistentiam mellis. Dein addead Scammon. ζ j. succi Ros. Rub. recenter expressi. ζ ij. coagulentur simul ad siccitatem.

N. Si spiritum Citoniorum, in infusione Santali tinctum, loco Menstrui extractioni huic adhibueris, non modo Scammonium colore elegantius, sed & Epatici minus noxium acquies Et hoc modo paratum Scammonium rosatum extat in officina. Saltzvedeliana, incunda suâ rubedine visum oblectans.

Dosis gr. vj. ad xv.

10. Infusum Scammonij seu spiritus purgans.

R. Scammon. el. p. iij. Succu Cydon. p. ij. mixta pone in locum calidum quotidie mouendo, donec induretur. Tunc affunde Ψ Maluatici, q. f. stentque aliquandiu in digestionem. Et sic spiritus purgans seu solutiuus.

Vires. Purgat sine ullo fastidio ac molestia.

Dosis, variat pro Scammonij ingredientis quantitate.

N. Hac infusio ad annum circiter seruata, reuicet ad superficiem guttulas olei rubei, instar picis liquidæ, in quo ferocia seu malignitas scammonij residere indicatur. Tentzel. in Exeg.

11. Diacydonium Lucidum Scammoniatum seu laxatiuum.

R. Gelat. Diacydon. lucidi, lb . j. Extract. Diagrid. ζ vj. coque lento igne, (NB.) optime miscendo, ad iustam consistentiam.

Vel

R. Scammon. ζ iv. extrahe Tincturam cum Ψ postea fiat s. a. Cydoniatum ex succu Cydonior. lb . iij. sacchar. lb . j. Tincturam paulatim succo affunde, misce exacte ac effunde in scatulas.

Dosis

Desis à ℥j, ad ℥ij. & ℥iij.

N. Nisi mixtio exacte fiat fieri potest.

ut diagrydium in uno loco parcius, in alio copiosius concreseat, inde purgatio iusto lenior, hinc copiosior, adeoque hypercatharsis nonnunquam subsequitur.

12. Gelatina Cydoniorum Laxativa cum Turbith.

℞. Scammon. ℥ij.

Turbith. ℥iv.

Extrahe cum V, postea

℞. Decoct. Cydon. lbvss.

Sacchar. ℥xviij.

Coq. s. a. & F. Gelatina, cui sub finem affunde Tincturam Diagridij & Turbit. spatulaque agitentur, donec evanescat. Tandem repone pro usu.

N. Communiora præparata, quæ

diagridium ceu basis ingreditur, ipsemet Tyro observare poterit.

Præcipua ex his sunt.

Confectio Anisi Laxativi.

Elect. Benedict. Laxativ.

De Citro solutivum.

Diacydonites Laxativ.

El. Episcopi s. Eleseph.

Confect. Hamech.

Indum maius.

Diaprunis solutivum.

Rosatum.

De succo Rosarum.

Zinziber Laxativum.

Pilule Aggregativæ maiores.

Aurea.

De Fumaria.

De Hermodactylis.

Extractum Catholicum, &c.

Et hæc sunt quæ de Vegetabilibus scribenda fuerunt.

PHARM-



PHARMACOPOEIAE MEDICO-CHYMICÆ LIBER V. DE ZOOLOGIA.



ZOOLOGIA est pars Pharmacopœiæ, quæ Medicamenta ex Animalibus desumpta recenset.

N. Animalia puta, tam viua, quam interempta, (liceat hac animalia appellare.) De virisque commonere hic expedit, eligenda esse, quæ extra dispositionem morbosam & hinc detrimentosam constituta sunt. Itaque si ex viuis experis, provideas, sana ea sint; sin ex interemptis, interempta illa adhibeas morte violenta extrinsecus accedente. Etenim expetitur medicinalis cuiusque rei substantia, eaque ad medicationem apta, adeoque facultatibus morbosis destituta, salubribus è contra tincturis delibuta. Hac inprimis pars rei spiritiuosa est, in naturali scilicet dispositione constituta, facultatibusque peregrinis orba. Nimirum hac, ut morte naturali paulatim senescens consumitur, curriculoque suo destinato perfuncta, in principia sua resoluitur: ita eadem ipsa, si flamma vitalis violenter extinguatur, superstes aliquandiu manet, nec à corpore separatur,

donec huius dissolutione & ipsa dissoluatur. Et quidem talis ferè illa superstes suppetit, qualis erat, dum flamma illa exstinguebatur, i. e. salubribus, insalubribusue tincturis imbuta. Hinc itaque non raro mira cadaverum facultates elucunt, veluti præ reliquis est vis illa formatrix, non modo è cineribus vegetabilium suscitabilis, (teste Sennerto, ex Quercetano & Polono, ut & ex Libauio, teste Cl. Horstio epistola ea de re ad me missa, teste itidem Vigenario Gallo, in tractatu Gallico, de Igne & Sale, pag. 262.) sed & in animalium quorundam cineribus demonstrabilis. Huius rei historiam, cum Parisiis degerem, ceu verissimam mihi retulit Doctor Medicinæ Parisiensis, nomine Certain, vir vel ætatis ratione fide dignus, videlicet sibi in maceratione cineris cancerorum, tam perfectorum, quam imperfectorum, in liquore natantium. Simili ratione in ▽ stillat. spermatis ranarum, sibi ranarum imagines quondam fuisse representatas, testis est Vir Excellentissimus Ioan-Daniel Horstius, in Academia Marpurgensi, Medicinæ Professor publicus, Amicus meus integerrimus.

integerrimus. Non minus & in perfecturum animalium ossibus idem accidere, præter alios refert Robertus Flud, de Fluctibus, Medicus Anglus, Scrutator naturæ sagacissimus. Et queso quid causa subesset, quod solum animalia matata culinis expetantur, posthabitis quæ secus obierunt, nisi sit, quod illa bal-samica seu spiritali prædita sunt substantia, ad nutritionem requisita, hæc vel eadem destituta sint, vel inquinata & insalubrem possideant. In Medicis difficultatibus non postrema est, quæ etiam doctissimos macerat, unde scilicet facultates occultiores Medicamentorum fluant. Nimirum, alij Formæ mixti eas acceptas referunt, alij Formæ separata relicto vestigio: ne dicam de peculiari qualitatibus primarum mixtione, quam alij ponunt. Verum anne satius sit, difficultates has & similes hoc ipso, quod posui, fundamento dirimere, quam Entia citra necessitatem multiplicare, cuilibet pro arbitrio do indicandum, nec enim quenquam cogo, sed saltem Philosophica libertate nixus modum suggero è difficultatibus emergendi, & quidem eiusmodi, quem (ne nouitatis accuses) tota stoicorum schola olim docuit. Vide-
lis Quercetan. libro. de Veritate Her-

metic. medicin. cap. 10. Nec est quod hinc metuas simplicitati formarum hæc ratione derogari. Simples quidem sunt formæ, id fateor, sed & materiales, non ut communiter fingitur simpliciter spirituales. Caueas autem huc spiritum diuinum hominis retrahas: hic enim, ut sublimioris est originis, ita & altioris indaginis.

Quia Epistola Horstiana mentionem fecit, eius verba subiungere placet, quæ sunt: Quod attinet fuscitabilem vim formatricem, certè sæpeque D. Georgius Moltherus Med. VVezlar. retulit, non semel se vrticam vidisse in ∇ congelata. Mihi est sal Absynthij, cuius ope, vera loquor, totum Absynthium tibi ponam ob oculos. Hæc Horstius; quibus & hoc subiicere volui, quod certa quadam operatione Absynthij volatile eleuatum Alembici lateribus adhærendo plantam suam dilucide repræsentet.

Classes Zoologiæ sunt quatuor.

1. Animalia terrestria exhibet, eaque perfectiora.
2. Aues recenset.
3. Pisces describit.
4. Insecta subiungit.

CLASSIS I.

De Animalibus Terrestribus perfectioribus.

I. Agnus.

3. Coagulum.

Vires.

Agnus, agnès, ein lamb, Schaaf.

OFFICIN.

1. Pulmones, (cùm recentes, tùm siccati.) 2. Fel. 3. Lana. 4. Ossa inuenerata.

1. Pulmo attritus à calceamentis contractos, ab inflammationibus ructur (impositum) vide Ovis.

2. Fel. ad morbum comitiale exhibetur.

QQq q

hibetur.

3. *Lana* (cum corio) anginae, aliisque colli tumoribus leniendis ac molliendis confert, (imposita).

4. *Ossa incinerata*, consolidationem vulnerum, etiam eorum, quae difficilioris sunt consolidationis, consolidant.

5. *Coagulum* valet ad venena, ad Lac coagularum, ad morsus venenatos (cum + potum).

II. *Alces.*

Alces, *Alces*, magna bestia, *Casari*, *Alberti*, *Magni*, (cui & *Equicervus*) *Oleo magno*. *Mizald*. *Leu*. *Lemnio*. *Clendz*.

Animal est gregarium bisulcum, ad cerui figuram accedens, quo tamen maius est, natura timidum, comitiali morbo obnoxium.

OFFICIUM NAT.

1. *Vngula* ac 2. *Nervi*.

Vires.

1. *Vngula* specifica virtute celebratur aduersus Epilepsiam, tum praecauendo, tum curando, idque usu tam interno, quam externo.

Internè propinantur scobs, & praeparata subiuncta.

Externè includitur particula annulo, gestaturque digito, qui minimo proximus est, ut palmam respiciat: Inditur itidem pugno, applicatur pulsui, immittitur in aurem, (sinistram,) suspenditur de collo, ut cutim attingat.

Dosis ℥ss. & ultra ʒj.

N. 1. *Dignoscitur* odore, quem gratum suffitu exhibet.

N. 2. *Referunt*, non quodlibet huius species animal malo Epileptico corripit, nec omnia eadem proprietate praedita esse sed pro aetate, sexu, tempore, & ipsius et-

iam vngula ratione, plurimum variare. *Faemina* vngulam hac facultate nequam pollere, sed maris solum; nec pulli, sed adulti, idque eo tempore, quo in *Venerem ferri* incipit, (inter Festum assumptionis *Marie* & *natiuitatis eiusdem*.) *Plus etiam* vnguibus posterioribus quam anterioribus tribuunt, & horum quidam pedi (quod vulgatius) dextro, alij sinistro. Sunt qui velint has vngulas ab animali adhuc vivente, dicto tempore praescindendas esse. *Andr. Bacc. l. de Alce.*

2. *Nervi*, circumligantur membris spasmo obnoxiiis.

PREPAR. ex Vngulis.

1. *Vngula* preparata, lege communi.

2. *Magisterium* fit l.c. aceto, (alij malunt spir. Θ.) ac oleo ʒi.

N. *Magisterium* hoc cineri colorem fere refert.

3. Sunt qui aquam ex medulla cerebri destillatam, pro arcano Epileptico habent. vide in homine.

4. Exhibere itidem poterit Oleum Liquorem, ac Sal volatile. l.com.

N. Cum in Finlandia degerem Praefectus institutioni Generosissimi Gustavi Horn, Euerhardi Filij, qui iam Generalem Maiorem in Suedico Exercitu agit celeberrimum, transfossam *Alcen*, Generosissima illius *Matri Vidua* à servis presentatam vidi 17. palmos altam.

III. *Aper.*

Aper { *Mas*, *dasos*, *Verres* syluaticus, *Vildschwein*, Cber.
Faemina, sus fera, *scropha* sylu.
vilde Savv,
Porcellus syluestr. *Irishling*.
Vescitur glandib. nucib. faginis, castaneis, radicib. filicis, angel. & simil.

Coit

Coit initio Hyemis, parit Vere.

IV. *Asinus.*

OFFICIN. NAT.

1. Adeps. 2. Dens. 3. Genitalia. 4. Fel. 5. Stercus. 6. Urina.

Vires.

1. *Aper*, ut verridomestico cognatus est, ita & vires communes obtinet, sed fortiores. Hinc recipitur adeps ad vnguentum armarium, commendatur peculiariter ad laterum dolores leniendos, materiamque molliendam: reiectiones sanguinis sistit, (in † vel vino potum,) ad rupta & conuulsa, (ex † bibitur,) luxatis (cum + orosar.) medetur. *Diosc.*

2. *Dens* specificè in pleuritide exhibetur: cynanchen, (cum Ol. Lini inunctus vel & exhibitus) curat.

Dosis ʒj.

3. *Genitalia ac Testiculi* ad Veneris impotentiam ac proliferationem faciunt.

4. *Fel.* strumas discutit.

5. *Stercus* aridum (potum) reiectiones sanguinis sistere creditur, id quod etiam præstat extrinsecus ad motum.

6. *Urina* comminuit specificè vesicæ calculos, eosque expellit.

PRÆPAR.

1. *Dens* preparat. leg. com.

2. Fieri etiam potest *Magisterium* ex dente, soluendo cum ✕ & præcipitando cum Sp. ⊙ i vel ol. ♀ i.

N. *Dens apri mucilaginosus* valde est, ideoque congelascit nonnunquam in fundo preparatum, Hanc congelascentiā ut præcaueant, solent igni aliquantulum exponere & vrere.

3. Sunt & qui v ex sanguine cum plantis refrigerantibus & humectantibus, destillatam in Atrophia magnificiunt. *Hartm. in pract.*

$\left. \begin{array}{l} \text{Mas Esel.} \\ \text{Fœmina Eselin.} \\ \text{Pullus Füllin.} \end{array} \right\}$

Animal est pigrum, melancholicum, viuax, (ad annos 30.) mense 12. pariens.

OFFICIN. NAT.

1. Vngula. 2. Sanguis. 3. Lac. 4. Urina. 5. Stercus. 6. Adeps. 7. Pili.

Vires.

1. *Vngula* in morbo comitiali vngulæ alcis vicaria censetur: (datur per mensem diebus continuis ad ʒss.

Extrinsecus commendatur cinis ad discutiendas strumas & sanandos periones (cum Oleo inunctus) ad rimas cutis consolidandas; apostemata discutienda, pterygium oculorum tollendum, (cum lacte mulieris instillatus, ad fœtum mortuum eliminandum, (in suffitu,) ad Epilepticas & Hystericas excitandas (nidore.

2. *Sanguis* sudorem ciet; pone aures flex aure extractus, linteo susceptus & interueniente lintei illius infusione assumptus, melancholici humoris ferociam dicitur mitigare, morbosque; incartatione introductos, arcere: sunt & qui eundem ad febrim quotidianam exhibent. Pulli asini sanguis icterum curat.

3. *Lac* nutrit, abstergit fortiter; hinc vtile in Phthisi, in morbis ventriculi, renum abscessu, vesicæ lithiasi, arthriticis doloribus, laxat nimir, alui, abstergit vias vtinarias, ciet menses.

Extrinsecus adhibitur, stabilit gingiuas, compescit dolores podagricos, (cum stercore cataplasmatum) faciei gratum conciliat pallorem illi.

Exhibetur ab ʒiv. ad x.

QQ q q 2

4. Urina

4. *Vrina* medetur peculiariter morbis renum, (*Dioscorides*) tum & scabiei, (*cennum* *vrina* *ea* *imbutum* *imponitur.*) Verrucis & callis, membro- rum atrophix & paralyfi, podagricis- que dolorib. &c.

V. gr.

5. *Vrinam pulli asinorum*, *ungulam asina incineratam*, subige addendo *axungiam asin.* cum tantillo *spica indica* ad odorem.

F. Vnguentum.

5. *Adeps.* Cicatrices concolores reddit.

6. *Stercus*, sanguinem sistit, (*potum* *vel vstum*, vel *Emplastri* instar impositum, *naribus* sue admotum.

7. *Pellis*, loco culcitrx imposita, infantum terrorem arcere dicitur.

V. Bos.

{ *Mas* ταύρος, *Taurus Ochse.*
Bos { *Fœmina* κῆρς *Vacca Kuhé.*
 { *Vitulus*, vide infra.

Animal est vulgo notissimum vitam ad annos viginti producere aptum natum. Coit fere medio Vere vel Autumno.

OFFICIN. NAT.

1. *Cornu*. 2. *Fel*. 3. *Iecur*. 4. *Splen*. 5. *Sanguis*. 6. *Medulla*. 7. *Senum*. 8. *Axungia*. 9. *Vngula*. 10. *Vrina*. 11. *Stercus*. 12. *Lapilli*. 13. *Lac* & inde 14. *Butyrum* ac 15. *Casus*. 16. *Priapius*. 17. *Ossa*.

Vires.

1. *Cornu* rari vsus est: vidi tamen scobem exhiberi contra Epilepsiam; adhibetur quoque in suffitu, ad aërem contagiosum corrigendum.

2. *Fel*, bubulum seu taurinum præstat fere omnium quadrupedum fellibus: specificè aurium medetur susurro,

ac dolori, (*mixtum cum lacte muliebri aut caprino*, & cum cottone impositum,) aluum mouet, (in *Clysteribus*.

3. *Iecur*, rari vsus est, eiusque loco vituli epas, pro hepate scil. corroborando, in decoctis adhiberi ferè solet.

4. *Splen*, inseruit potissimum decoctioni ac extractioni pro arcenda splenis duritie, mensiumque suppressione. Sunt & qui extrinsecus spleni illinunt.

5. *Sanguis*, intrinsecus singularem opem fert dysentericis mensium & internis hæmorrhagiis. Extrinsecus discutit & emollit tumores, maculas faciei extergit, (*illitus*.

6. *Medulla*, post ceruinam & vitulinam proximum bonitatis locum habet: præter vires generales, (*cum vino illusa*,) trementia membra reficit, nervis induratis confert.

7. *Senum* seu *Adeps*, præter vires generales, usurpatur specialiter ad mortificationem intestinorum, & tenesimū, vt & ad vlcera & rimas labiorum, podagricis & Scirrhis affectib. medetur.

N. Præfertur qui à Renib. colligitur.

8. *Axungia ex ungulis*, *Klarven. Schmalz*, vlitata vulgo est in molliendis tumorib. leniendis dolorib. luxationeque articular.

9. *Vngula*, in cinerem combustæ copiam lactis præbent, (*assumptæ.*) adhiberi item solent ad arcendum aërem malignum, (in *suffumigio*.

N. *Vngularum* suffitu fugantur mures.

10. *Vrina*, aurium dolore lenit, si cum *Myrrha* instilletur.

11. *Stercus Vaccinum*, refrigerat, siccaturque moderatè, discutit, dolores insigniter mitigat. Hinc feliciter adhibetur adustionib. inflammationibus arthritidi, apum ac vesparum morsib.

suffitu

suffitu reprimat vterum prolapsum.

N. Plebeij febris ardente, vel colico dolore correptis in potu suspendunt, aut succum expressum felici cum successu propinant.

12. *Lapillus*, ex ventriculo (Martio Mense, (vel & Lapillus è fellis vesica (Maio) exectus medetur Ictericæ, specificè comminuit ac consumit calculum, si cum vino propinetur: idem præstat, si vino, quod potui datur, quotidianè imponatur, donec penitus consumptus sit. *Querc.*

Lapillus fellis in puluerem redactus errhinum exhibet egregium.

13. *Lac Vaccinum*, crassum est, nutrit benè, inflat, Renum & Vesicæ dolori conuenit, diarrhææ, dysentericæ, teneismo, erosionique intestinorum succurrit (potum).

N. 1. Nocet *Lac Spleneticis*, *Epaticis*, *Comitialibus*, *Vertiginosis*. Febricitantibus, & Capite dolentibus, quod de lacte in genere notandum.

N. 2. *Lac coagulatum cum camomilla nascitur*, aq. & hac. *Iunip.* in lacte coctis, ad dolores scorbuticos mitigandos maximè prodest. (catapl.

14. *Butyrum*, calfac. moderate emollit, digerit, lenit, resoluit, laxat, oculorum hebetudini prodest, (inditum,) &c.

15. *Casus recens* mollis podagricorum dolores lenit, Epatis æstus mitigat, Exomphalo infantum succurrit (impositus).

16. *Priapus-Tauri* (rubri) dysentericis prodest (tritum & exhibitum).

N. 1. *Mulieribus fastidium Coitus parere creditur.*

N. 2. *Vasa spermatica cum didymo combusta*, sanguinis hemorrhagiam sistunt.

N. *Hoc Iudeorum medicamen in*

circumcis. *Forest. in Chirurg.*

17. *Ossa* ad corroboranda viscera, & ad arcendam Epilepsiam à nonnullis adhibentur.

PRÆPAR.

1. *Aqua omnium florum dicta*, destillatur M^e, vel ex Cinere, Verno seu Maiali tempore, ex stercore recenti vaccæ herbas depascentis, Prodit & hinc oleum.

Vires.

Refrigerat, discutit, adhibetur interne in dolore colico, nephritico, vrina suppressâ, febribus, &c.

Externè imponitur locis dolentibus, vt supra. Commendatur & ad Vlcera cancrofa.

2. *Aqua sanguis* fit (Maiali tempore) M^b. Vires.

Summe mitigat podagram.

3. *Decoctum Splenis* Bouis, v. lib. 2.

4. *Extractum Splenis*, vt & Epatis, vide lib. 2.

N. Crollius.

R. *Splenem bouis iunioris castrati*, scindit in laminas tenues, macerat per aliquot \odot P in ∇ cum myrrha essentificato, dein exiccât in aëre. Postea cum ∇ s. a. Essentiam extrahit, abstrahit, maioris efficacie ergo addit aliquot guttulas Olei Angelici stillat.

Vires.

Lienis obstructione expedit, menses prouocat.

Dosis \mathcal{D} j. in ∇ appropriata.

N. In Clibano commodè exiccari poterit.

5. *Oleum ex butyro*, videl. lib. 2.

6. *Tinctura fellis Tauri*.

R. Fella Taurorum sensum in \odot exiccata, extrahe cum ∇ .

Vires.

Cosmeticum est insigne ad miraculum

culum vsque albedinem gratissimum concilians. Illinitur scil. inquiturque illita per triduum, quadriduumuè, ita tamen, ne aëri libere sese exponant, post eluatur aliquoties ∇ flor. fabarum, nenuphar. polygonati & simil. *Hartm. in Croll.*

VI. Bubulus.

Bœvalis, Animal est boui figurâ & naturâ simile, maius tamen & crudelius, colore nigrum. *Büffel.*

OFFICIN. NAT.

1. *Cornua & Ungula.* 2. *Senum.* 3. *Stercus, &c.*

Vires.

1. *Cornua & Ungula* medentur spasmo (annulus exinde factus gestatur digitis manus vel pedis.

2. *Seni, Stercoris, &c.*

Vires.

Ex descriptione bouis addiscere licet.

PRÆPAR.

Extractum Epatis bubuli fit eodem modo, quo *Extractum Splenis* bouis.

N. *Præstantius habetur, si Sal proprium ex capite mortuo extractum admixtum fuerit.*

Vires.

Vfus eiusdem est, cuius *extractum Splenis* bouis, sed promptioris efficacæ.

Dosis quoque eadem est. *Hartm. in Croll. Gluckr. in Beg.*

VII. Bufo.

Μόχρος, Bufo,

Krotte, Taasche est

palustris, qui minus vulgatus.
terrestris, qui vulgator.

N. *Maxima fonetur antipatheia inter bufones & araneas, adeo ut si bufo subter araneam ponatur, cum impetu illum interemptum hac descendat.*

OFFICIN. NAT.

1. *Ipsi bufones,* & 2. *Lapis Bufonites.*

Bufones siccantur in aëre, transfossi per caput, collum uè; siccati asseruantur pro vfu.

Vires.

Et si animal sit deterrimum, venenosum ac abominabile; attamen non effugit vsum Medicum, eumque tum internum, tum externum.

Internè pulvere eius hydropicorum aquas per vrinam educi, desperatus quidam expertus est hydropicus, qui præter spem attentatæ necis sanitatem illo acquisiuit, *Petræus in Nosolog. p. 1. diss. de Hydrope, VVierus in observ. de Hydrope, ut & de præstig. demon. l. 3.*

Dosis ʒß.

[N. *Mallem ego minorem.*]

Extrinfecus imponitur bubo, parte qua venter est anthracib. (in acetoparum maceratus,) ad eliciendum sc. venenum, (quod adeo feliciter præstat, ut attracto veneno intumescat,) ingreditur itidem amuleta aëri contagioso arcendo dicata, hæmorrhagiam narium certo experimento sistit (si vel pone aures per se applicetur, vel pugno includatur, ut caleascit, vel axillis subligetur vel & collo appendatur, Idem & cinis s. pulvis præstare perhibetur loco affecto inspersus. Renibus impositus aquam inter cutem per vrinam pellere dicitur: Umbilico alligatus, fluxus hystericos retrahit & inhibet. Plantis pedum appositus capitis cordisque morbis phrenitidi febribusque succurrere statuitur.

Lapis Bufonites, Chelonites. Batrachites,

trachites, Borax, *Krottenstein*, Gemma est bullæ instar, altera parte caua, altera conuexa, coloris ex fusco pal- lentis aliquantum fusci, interdum ni- gti, albi, (*qui melior*) Viridis, Versico- loris.

N. *Reperiuntur in agris, affirmant tamen alij, eos in annoſiorum, ac qui diu in arundinetis, interrubos sentesque de- lituerint, bufonum capitibus generari, cui ut fidem adhibeam, dissuadet quo- rundam magnitudo.*

Vires.

Commendatur ad pestem & venena ceu remedium præstantissimum (*exhi- bitus*: Imò sunt qui asserant, illum ge- stantes à venenis tutos esse, blandoque attritu inflationes à venenatis bestiis discutere ac virus omne elicere. *Cas- p. Bauhin. de Lapide Bezo. cap. 3.*

N. *Præsente poculo venenato fertur hic lapis colorem mutare ac sudare.*

P R Æ P A R.

ex bufone.

1. *Amuleta* variatum descriptio- num.

Cinis Bufonis (bufo combustus) in- continentiam *Vrina* ex lacerato vesica collo ortam sanat. *De collo suspensus. Ob- seru. Henr. ab Heer. 18.*

2. *Pulvis* fit sola tritura, qua bufo- nes optimè exiccati in puluerem redi- guntur.

N. *Mallet* equidem bufones inci- neratos.

3. *Sal* elici potest ex calcinatis bu- fonib. puluerique illi in hydropè sub- stitui.

Dosis ad gr. iij. &c.

4. *Oleum.*

℞. Bufon. viv. N. iij. vel iv. per horam in Ol. Oliuar. ℔. ij. Coque, colarumque serua.

Vires.

Maximè commendant in maculis faciei, morphæa, aliisque affectibus seu vlceribus inueteratis abstergen- dis, (signatura sua maculata bufo ad maculas prodesse iudicatur,) singulis diebus illinitur semel. *Hartim. Parac. t. 1. p. 1091. b.*

N. *Præferrem* equidem ranas ma- culatas.

5. *Ol. bufonum compositum.*

℞. Ol. pedis veruec. q. v. bulliat cum ☿ puluerisato, vsque dum rubi- cundum oleum euadat. Hoc facto se- paretur ☿ ab oleo, in quod adhuc ea- lens immergantur & suffocentur bu- fones post expressionem destillentur.

Vires. Præstantissimum est in dige- rendis tumoribus ex hydropè.

Ex communicat. Dn. D. Ioh. Kie- fori.

VIII Canis.

Kd̄y est { Mas, *Hundt.*
Fœmina, *Hündin.*
Catulus, *iunger Hundk.*

OFFICIN. NAT

1. *Canis integer.* 2. *Caput.* 3. *Axun- gia.* 4. *Fel.* 5. *Sanguis.* 6. *Stercus.* 7. *Vrina.* 8. *Dens* 9. *Pellis.* 10. *Pilus.*

Vires. 1. *Integer*, scil. viuus catulus. *ventri imposuit*, dolores colicos miti- gat. Paretica membra confortat (bal- neatio in decocto catulorum & axun- gia è decocto hoc collecta.

2. *Caput* f. *caluaria* incinerata desic- cat vlcera, curat vitia sedis, rhagades, & testiculorum tumores.

Intrins. Icterus sanat.

3. *Axungia* canina reliquis calidior est, adhibeturque internè in vulnerib. & exulcerationib. abstergendis, con- solidandis,

solidandis, adeoque & in Phthisi, & cruore ex casu dissoluendo.

Externè in Podagricis, auriumque dolorib. leniendis, lendibus capitis aræendis, auditu difficili reparando, scabie & pruritu corrigendo.

4. *Fel. catuli nigri* Epilepsiam mire curat, (recens cum + potum, vel in pulvere exhibitum.

Extrins. abstergit maculas faciei, (cum stercore Vitulino inunctum,) oculorum albugini medetur, (cum melle illitum.

5. *Sanguis* contra Veneficarum venenum commendatur, bibique cum successu dicitur contra morsum rabiosa Bestiæ ac Toxicum.

6. *Stercus* (album Græcum Officinis) siccat, abstergit, discutit, aperit, apostematâ rumpit, exulcerationes abstergit; hinc vrile est in Dysenteria dolore colico & simil.

Extrinfecus medetur angina, (gutturî insufflatum,) vlcerib. malignis (inspersum,) tumores duros emollit (emplastr.) aquas trahit hydropicas, (ventri illitum,) verrucas abigit, (cinis per se, vel cum Ol. rosar. impositus.

N. Commendatur præ reliquis, quod Julio fuit collectum ex cane ossibus nutrit, an lidum, purum, minimè færens.

7. *Vrina*, verrucas abigit, vlcera capitis manantia, fursuresque abstergit.

8. *Dentium cinis*, (cum melle vel butyro illitus mandibulis,) infantium dentitionem faciliat: (gargarismis inditus,) odontalgiam sedat.

9. *Pellis parata*, manuum lenit pruritum, neruosque emollit contractos (chirotheca sc. induta.

10. *Pilus* morib. canis medetur (impositus.

PRÆPAR.

Balsamus è Catulis compositus,

Fit ex integris catulis in vino albo suffocatis, coctisque cum herbis nervinis, oleis & resin. in bals. quod membra contracta sanat, ischiadicos & arthriticos dolores compefcit.

IX. Caper, Capra.

Est { Caper masculus Τρῳς, & hircus
ein Ziegenbock,
Capra fœmina, αἴζ, Capella
Geiß, ein

Animal est alacre, velox, superbum, auditu acuto præditum, vorax, &c. obnoxium febrib. pesti, & simil.

OFFICIN. NAT.

1. Cornu. 2. Sanguis. 3. Lien. 4. Medulla. 5. Semen. 6. Lac. 7. Lapilli. 8. Stercus. 9. Vrina. 10. Vesica. 11. Omentum. 12. Pellis. 13. Fel.

Vires. 1. Cornu vt & pilis utimur in suffumigiis, pestis tempore, vt & ad Veterosos & Epilepticos excitandos.

2. Sanguis hircinus habetur alexipharmacus, obstruit, dysentericis conuenit, sanguinem concretum resoluit, (siccatus & exhibitus,) calculum atterit.

Extrinfecus tumores maturat.

N. Hircum mediocris ætatis (quadrimum) domi per mensem alunt, nihil aliud dando, præter plantas lithontripticas, hinc Æstatis principio cum Sol in ☍ ingressus est, mactant, sanguinemque arteriosum, abiectis partibus ichorosis, concretum in furno siccant. vide Disp. Aug. & Norimb.

PRÆPAR.

Ex sanguine hircino non minus, ac ex aliis sanguinis generibus fieri possunt: Spiritus, Oleum, (quod summe in calculo

calculo commodatur, & Sal: Attramen præ aliis famulos est, *Balsamus antipodagricus* ex sanguine, qui ut modo fiendi, ita & virib. conuenit cum balsamo è sanguine ceruino. *Vide suo loco.*

N. *Sunt qui exinde Tincturam conficiunt, ad calculum sanguinemque coagulatum celeberrimam.*

3. *Lien*: Lienem Capræ deligant per diem, super Lienem infirmi, die sequenti ad furnum, vel solem suspendunt, quantum ibi exiccabitur, tantum quoque lienem patientis diminui aiunt. *Thesaur. pauperum Petr. Hispan.*

4. *Medull.* hircina acrior est ac sicior reliquis, ideoque & efficacior.

5. *Senum* hircinum validissimè dissecutit, podagricis auxiliatur, stranguariam tollit, (*umbilico immisissim*) hæmorrhoidam dolores lenit (*suppositorium*).

6. *Lac* Caprinum nutrit, abstergit, febris hæctica laborantibus & Phthisicis, consumptisque ac emaciatis optimè conuenit.

Serum eius præstat reliquis seris, aperit, abstergit, incidit, laxat, hinc frequenti vsu ad infusiones purgandæ Melancholiæ recipitur.

7. *Lapelli* in ventriculis & felle repti commendantur, vi diaphoretica & resolutiua.

8. *Stercus* calfacit, siccat, abstergit, digerit, aperit, acrisque est facultatis.

Hinc *Vsus* præcipui in duris tumoribus, Lienis & aliarum partium, in parotidib. ac bubonib. in vlceribus desperatis consolidandis (cum vino veteri expressum & appositum) hydrope, (*imponitur ventri*) in coxendicum dolore, vltum tenuioris est substantiæ, congruitque ad omnia vitia, quæ extergi volunt, ut ad alopecias,

lichenes, &c.

Intrinsicus conuenit Spleneticis, exhibetur itidem In Ictero, menstribus retentis & morbis similibus.

9. *Vrina* (*hirci*) commendatur præ reliquis omnib. vrinis ad calculi attritionem, vrinæque expulsionem, (*calidè ut ex hirco egeritur epota.*

Hinc conuenit & in Hydrope, &c. (*destillata.*

10. *Vesica Vrinaria* exiccata ac puluerisata vrinæ incontinentiam peculiariter curare dicitur.

Dosis ʒj. exhibita.

11. *Omentum* mitigat feroces & ebullientes spiritus, (*calidè impositum*) hinc prodest in dolorib. colicis, in Mania, &c. Præterea vrinam obstructam pellit, (*ventri impositum.*

12. *Pellis* sedat diarrhæam, (*decoctum eius bibitum*) sistit hæmorrhagias, & præcipuè narium, (*Cinis pilorum inspersus.*

N. *Hædus est pullus caprinus seu tenellus caper, infra menses sex constitutus; eapropter ut natura cum capris conuenit, ita & viribus, quas tamen ratione iuuentutis teneriores & imbecilliores ob-*

13. *Fel* febrim quotidianam curat. (cum pane an. & oui albumine addito oleo laurino in cataplasma redactum ac Ventri impositum. *Petr. Hispan.*

X. *Capra alpina* f. *Rubi. Capra.*

Dama { Mas.
Gembz, { Fœmina.

Caprarum genus sylvestre est, magnitudine ac figura domesticis conforme; amans alpes, gaudens herbis alpinis è fabulo nascentibus, & præcipuè doronici radice nigra.

OFFICIN. NAT.

1. Sanguis 2. Seuum. 3. Iecur. 4. Fel.
5. Stercus. 7. Lapis.

1. Sanguis recens vertiginis est mel-
dela (*bibitus*)

2. Seuum Phthisi exulcerationique
pulmonum succurrit, (*cum lacte as-
sumptum.*)

3. Iecur alui fluxum sistit, (*pulsus
assumptus.*)

4. Fel. oculorum nubeculae, nyctalo-
piæque auxilio est.

5. Stercus calculum atterit & ex-
pellit.

6. Lapis in capsula supra ventri-
culum nonnullarum rupicaprarum
reperiri solet, (*ut Bezoar reperitur.*)
magnitudine variante, & maxima ad
iuglandis magnitudinem ascendente,
colore nigro, odore dum frangitur gra-
tissimo.

Huius Vires experientia docuit in-
signes ad febres malignas, venena, pe-
stem, & simil. Vnde alij Bezoar Ger-
manicum vocant.

Dosis gr. xv. ad xx. ad præcauen-
dum gr. iv. vel v. *Casph. Bauh. de Lap.
Bez. c. 13.*

X V. Capri Cerua Orientalis, e qua
Lapis Bezoar. Orientalis.

Est animal Persiæ ac Indiæ Orien-
talis, partim Ceruo simile, partim Ca-
præ: hinc fit, ut aliis Capra audiat, ali-
is hircus, aliis Capricerua: V. g. dicitur
Capra Indica, *Amato*; Capra Monta-
na, *Monardo*, Capra sylvestris, *Lac-
nae*; Pazon, *Persis*.

OFFICIN. NAT.

Lapis Bezoar Orientalis, qui est La-
pis in dicto animali repertus (ac potis-
simum in prouentriculo, hinc & in

ventriculo aliisque cavitatibus internis,) figurâ scil. variante, ouali, rotunda ses-
sili & intus caua, (*medistullio paleam,
pilos vel simile continente*) superficie
leui & splendente: substantiâ laminis
instar caparum sese inuicem incum-
bentib. compacta: Variante item co-
lore (plerumque attrouirente, hinc di-
lucius virente, pallecente, cineritio,
fuluescente, melleo, &c.) odore nul-
lo: variante, magnitudine & ponde-
re (plerisque scil. infra iuglandis ma-
gnitudinem constitutis, nonnunquam
& paulo maioribus.

N. Dantur & adulterati seu falsi;
confecti sc. ex lapidum fragmentis &
pice artificiose coagmentatis: Item ex
creta, cineribus testarum, sanguine sicco
& lapidibus Bezoar minoribus pulue-
risatis & cum liquore incorporatis: Item
ex ☿ ☿ ☿ ignis artificio compactis,
tinctis, &c. Qui sane non modocitra uti-
litatem, sed & cum detrimento in usum
accerantur.

Nota ergo bonitatis ab Authoribus
passim notate sunt.

1. Forma à forma renum aut ovi co-
lumbini exterius leuigati diuersa, utpote
qua signum lapidis adulterati.

2. Structura laminis multis instar
caparum sese inuicem incumbentibus,
iisque singulis glabris, lenibus, splendore
coruscantibus: quod tamen alij repro-
bant.

3. Canitas (*medistullium* (*expers rei
heterogenea præter puluerem*, (*quidam
malunt inclusam paleam, festucam, gra-
num, & sim.*)

4. Pondus aliis lenius, nonnullis gra-
uius.

5. Commissio cum calce, i.e. si lapis
humectatur, & calci vel muro affricetur
calcem colore viridi tingat: si lapis calce
vina

vina (cui admista aqua) inunctus, paulo post flavescat: si lapis charta creta oblita affrictus viridem inducat lineam: si pulvis cum calce vina mixtus colorem expallido virentem referat, (quod tamen non de omnibus verum esse potest.

6. Friabilitas & dissolutio in ∇ . quae tamen itidem & falsi lap. propria esse non nequit.

7. Liguatio, i.e. si acus candens intrudi possit.

8. Disparitas fragmentorum cum gypso aut terra cocta (in duritie scil.

9. Experimentum.

Verum enimvero summa in diiudicatione lapidis cautio adhibenda est, neque absque notarum syndrome de bonitate, quid certi statuere expedit. Praestantissimus tamen inter ceteros habetur Persicus.

Vires Corroborat, sudores ciet, alexipharmacus est, ideoque utilis in vertigine, Epilepsia, Lipothymia, Palpitatione cordis, Ictero, Colica, Dysenteria, Vermicatione, Calculo, Mensib. obstructis, parindifficili, Melancholia. Praecipue autem in peste, febribusque malignis, venenis assumptis, Quin & extrinsecus adhiberi poterit in scrophulis apertis, cancro ulcerato & simil

Dosis à gr. iij. ad xii.

XII. Capri Cerva Occidentalis.

Est animal Peruanum, Capriceruo Orientali simile, cornib. tamen orbum, depascens herbas salutiferas.

Dicitur Vicuniras, s. Taraguas Iof. A Costa.

OFFICIN. NAT.

Lapis Bezoar Occidentalis, qui est lapis locis iisdem animalis, vt de priori dictum, circa rem heterogeneam

in cauitate media contentam, tunica-
tim concretus, Orientalibus vt plurimum maior, superficie scabra, colore cineraceo, albo, nigro, obcuré virente, (qui optimus.

N. Praestantiores habentur (vti & Orientales) ex animalibus montanis exempli.

Vires. Iisdem viribus celebris est cum Orientali, cuius tamen bonitati non parum cedit. Hinc utilis compertus est in affectibus cordis, venenis, febrib. pestil. quartana, (cuius symptomata mitigat) Melancholia, morbis diuturnis. Lumbicis, Epilepsia & simil. Nec minus & extrinsecus conuenit in vulnerib. venenatis (inperfus,) Monard.

Dosis maior quam Orientalis, sc. à gr. vi. ad xx.

N. 1. Peculiare habet, quod alium quoque nonnihil moneat

N. 2. Affertur & Lapis Bezoar ex noua Hispania, sed Peruano aliquantulum vilior & debilior.

XIII. Capreolus, Capra.

Δαρδάνος { Mas, Capreus, Rehebock.
Λαίξ, { Fœmina, Caprea, Rehegeisz.

Animal est corpore ceruum referens, cornua exigua alens, ceruinis ferè similia, morib. timidum, lepidum, alacre, cursu velocissimum, visu æque noctu ac interdiu pollens.

OFFICIN. NAT.

1. Caro. 2. Coagulum. 3. Iecur. 4. Fel. 5. Lien. 6. Stercus.

Vires.

1. Caro in cibo conuenit Diarrhææ & Dysenteria.

2. Coagulum iisdem affectib. conuenit (in vino potum.

3. Iecur oculorum aciem reficere

R R r r 2 creditur

creditur, (comestum, potum, extusque suffumigatum, instillatum, &c.) sanguinis hæmorrhagiam & præcipuè narium sistit (cinis insufflatus).

4. *Fel* maculas faciei abstergit, (illitum, oculorum albugines & nubes, aliasque affectus curat, (cum melle inditum) aurium tinnitus reprimat, cum *Ol. rosar. instillatum* (odontalgiam mitigat (simili modo.

1. *Stercus* Ictericam soluit (potum. N. In reliquarum partium viribus cum capris conuenit, fortiores tamen easdem obtinet.

XIV. *Castor.*

Kαστόριον Fiber, animal est amphibium, aqua ac terra ambiens, viuens piscib. & fructib. corticibusque arborum. Biber.

OFFICIN. NAT.

1. *Axungia*. 2. *Testiculi*, qui *Castorium* vocantur. 3. *Pellis*.

Vires.

1. *Axungia* peculiariter neruoso generi ac vtero conuenit, adeoque morbo comitali, membris resolutis, contusis, apoplexiæ &c.

1. *Kαστόριον*, Castorium, testiculi Castoris. Hi excisi beneque purgati in sese exiccantur, siccanturque in loco umbrato suspensi asseruantur. Durant citra corruptionem ad septennium.

N. Adulteratur per Gummi Ammoniacum, quod cum Castoris sanguine Castorioque subactum in vesiculam coniecitur, exiccaturque.

2. *Renes Castoris Vesica* induntur ac siccantur. Fraudis autem huius cognoscendæ gratia notentur distinctionis notæ.

1. Testiculi genuini ambo ex vno oriuntur principio.

2. Adulterini Testiculi maiores ut plurimum existunt.

3. Genuini sunt grauis & ingrati odoris, validi, acris mordacis & amari saporis, substantiæ fragilis. Fugendum porro nigrum & rancidum castorium.

Vires. *Cal.* 3. sic 2. attenuat, aperit, flatus discutit, nervos nervosasque partes, adeoque caput roborat, spiritus, animales torpidos excitat, venenis resistit, sternutationem ciat, anodynum est, menses promouet. Hinc proficuum est in Lethargo, Apoplexia, Epilepsia, Paralyfi, Vertigine, artuum tremore, defluxionib. ad articulos, strangulatu vteri, dolore colicorumque usu tum externo, tum interno. Insuper tinnitus aurium ac difficultatem audiendi corrigit (auri inditum) dentiumque dolori, succurrit.

N. 1. In strangulatu vteri variis modis adhibetur, admonetur naribus, subligatur axillis, inditur umbilico.


N. 2. *Opij* virulentiam corrigit.

3. *Pellis* opem fert Podagricis & Paralyticis (parata & induta.

PRÆPAR.

1. *Oleum* Castorei infusum, vide *Dispens. Aug. & Norimb.*


2. *Ol.* stillat.


3. Castorei q. v. dissolue in + aut macera in Vino, eiusue spiritu, hinc destilla l. Δ. per  vitream.

N. 1. Rectifica cum aceto

N. 2. Procedi itidem potest ut in destillatione Olei Philosophici, lateres sed ignitos axungia imbibendo & destillando.

3. *Electuarium* Diacastorium, vide *Dispens.*

4. *Extractum* fit l.c. cum  rectificato.

N. Alij extrahunt cum , quo rursum

CLASSIS I. DE ANIMALIB. 68;

sum abstracto, reiterant cum *V. Quercetanus* adhibet aquam destillatam conuenientem, v. gr. *Melissa*, *Calendula*, *Pæonia*, aut similes *Antepilepticas* & *Cephalicas*, maceratque in *B. M.* (& 4. aut 5.) *Pharmac. Rest. c. 25.*

Dosis à gr. v. ad xii.

XV. *Catus domesticus.*

Αἰλῦρις, Γαλέκτις } Domesticus
Felis, Catus, } *Katze, Hautz-*
katze. Sylue-
stris vvilde Katze

Animal est libidinosum, visu acutum.

OFFICIN. NAT.

1. *Axungia.* 2. *Sanguis.* 3. *Caput.* 4. *Stercus.* 5. *Pellis.* 6. *Secundina.*

1. *Axungia* cati castrati, calfac. emoll. discut. mirificè articulorum affectib. prodest.

N. Præstat *axungia* cati sylvestris.

2. *Sanguinis* gut. 3. (ex *venula* sub cauda aperta cati maris,) caducum penitus curant (*epota*) *Schvvenckf.* Quin & cati sanguinem, (ex incisa aure detractum) herpeti cum successu vidi inunctum.

3. *Caput* cati nigri incineratum ad oculorum vitia, vnguem, nubeculam, albuginem, &c. remedium præstantissimum esse, si quotidie ter infussetur, scribit *Mizald.*

N. *Venenum* quod felibus adscribitur, in solo capite ac cerebro stabulatur, non reliquo corpore, vtpote quod in cibum nonnullis venit.

4. *Stercus* (cum *sinapi ana* ex \dagger *illitum*) alopecias curat & podagricos iuuat.

5. *Pellis* gestatur ad calfaciendum ventriculorum, articulosque contractos.

6. *Secundinam* de collo suspendunt ad oculorum affectus arcendo. Præferunt autem cati primipari, cuiusque nigri.

XVI. *Cathus Zibethinus.*
Gibeth Katze.

Animal est peregrinum, ad nostras oras tamen transportatum, à nonnullis oblectationis ergò ali cæpit.

OFFICIN. NAT.

Zibethum. (*Cineta, Zibetta*, quod est eius excrementum (con sudor) inter testiculos concretum vesica inuolutum ex qua incisa Zibetum depromitur.

Vires. *Calidum*, humidum est atque anodynum. *Vsus* crebri in dolore colico, (inungitur umbilico,) in dolore ventris infantum, in strangulatu vteri, (applicatur vulua, vel canernula umbilici.

XVII. *Cervus.*

Εράρς } *Mas, Cervus Hirsch.*
 } *Fæm. Cerua Hin. Hindin.*
 } *Hinnulus.*

Animal est viuacissimum (ad annos 100.) cursu velocissimum, cornua quòtannis mense Aprili deponens, coit mense Augusto & Septembri, circa diem *Ægidij*, parit mense octavo.

OFFICIN. NAT.

1. *Cornu.* 2. *Corium.* 3. *Os de corde.* 4. *Genitale* 5. *Testiculi.* 6. *Sanguis.* 7. *Lachryma.* 8. *Medulla.* 9. *Scium.* 10. *Talus* 11. *Astragalus.* 11. *Lapis.*

Vires.

1. *Cornu* crudum resistit putredini, malignitatem corrigit, sudorem ciet, balsamum humanum corroborat. Hinc vsus eius proficiuus in hyariolis, morbilis, febrib. putridis & malignis, aliisque

R Rrr 3 morbis

morbis ubi sudore opus est. Incoqui potest decoctis, macerari in infusionibus, (quippe in substantia exhibitum, crudum ferè egeritur.

N. Commendatur collectum intra festinitates Mariae, i. e. inter 15. Augusti, & 8. Septembris.

PREPAR.
ex Cornu.

1. C. C. vstum, v. l. 2. c. 43.

2. C. C. preparatum, fit ex vsto, quod cum ∇ cordiali l. a. læuigatur.

Vires. *Vi* sua siccante putredini resistit, fluxus alui sedat, vermes necat, sudores ciet, Medicinaque infantib. familiarissima.

Dosis à \mathcal{D} j. ad \mathcal{Z} j. & ultra.

3. C. C. philosophicè calcinatum, vide l. 2. c. 43. Sudores ciet, morbis malignis confert.

Dosis ad $\mathcal{Z}\beta$.

4. Magisterium: Cornua rasata solvantur in \times precipitantur per Ol. \mathcal{F} vel \mathcal{D} i edulcoranturque ablutione cum ∇ . Hinc siccata servantur.

N. 1. Alij solvant cum spir. , quo dein rursus abstracto, Magisterium in fundo relictum edulcorant. In abstractione a. sp. \mathcal{O} i cautione opus est, ne se. accensio, que facile accidere aliàs potest, damnum pariat. Cautius ergo procedunt, qui solutionis \mathcal{Z} iv. affundunt ∇ fontan. mensur. 1. ac filtrant, filtratumque si opus sit instillando Ol. \mathcal{F} precipitant.

N. 2. Alij solvant cum ∇ , precipitantque cum sp. \mathcal{O} i ac edulcorant.

N. 3. Magisterium precipitatum cum Ol. \mathcal{F} flavescit, è contra cum Ol. aliquo minerali. E. gr. \mathcal{D} i, euadit candidum.

5. Galreda seu Gelatina. Vid. l. 2. c. 62.

6. Liquer seu spiritus. Vide l. 2. c. 70. & 81.

7. Oleum v. l. 2. c. 70.

N. Veri olei C. C. descriptionem vide in Kessler.

8. Sal volatile l. 2. c. 70.

Sunt qui Sal C. C. fixi \mathcal{Z} ij cum ∇ rectificati \mathcal{Z} j. \mathcal{O} aliquot (12.) digerunt, atque dein ∇ ad medietatem abstrahunt, residuumque seruant. *tinctulo Tinctura Salis C. C.*

Dosis à gr. v. ad $\mathcal{D}\beta$.

Extractum. C. fit superfundendo segmentis cornuum cerui aque propriam & tincturam digestionem menstruâ extrahendo.

9. ∇ . e. Typhis cerninis. Hirsch. Kolben ∇ .

\mathcal{R} . Cornua Cerui nonella, sanguine adhuc succulenta, in frustula concide, destillaque in MB aut VB vel per se, vel cum pauco vino generoso, donec omnis liquor extillarit.

Vires. *Vitilissima est in febrib. ardentib. malignis.*

Dosis cochlear s. vel per se, vel cum appropriata aliqua ∇ Hartm. in pract. Senn. Inst.

10. Unguentum C. C. anodynum vid. lib. 2.

II. Corium Ex corio fit cingulum, quo mulierculæ vtuntur ad inguina stringenda; vterinasque affectiones compescendas.

Os cordis, Hirsch Krentzlein, (est arteriarum in basi cordis concursus, qui cum atate & in primis turgescentie tempore durior fit & in Os degenerat.) peculiariter cordi conuenit, idque à malignitate tuetur, custodit partum & prægnantib. mirè conducit.

IV. Genitali (Priapus) diureticum est, Venerem stimulat, dysentericis colique

colique dolore correptis auxiliatur, Dat-
tur tùm tritum, tùm de cocto inco-
ctum, vel & aquam qua genitale ablu-
tum est, exhibere conuenit.

V. Testiculi sicci è vino poti, concu-
bitum cum voluptate excitant. Schvv-
enckfeld.

VI. Sanguis inassatus sartagine, dy-
senterias & cæliacor. profluuiâ sistit:
est & efficax contra toxica; commen-
datur ad dolores coxendicis & lateris
(cum oleo decoctus).

P R Æ P A R.

Et si ex sanguine ceruino & hirci-
no non minus ac ex sanguine huma-
no elici queant *Spiritus, Oleum, & si-
mil.* Inprimis tamen in vsum Medi-
cum accersitur:

Balsamus Antipodagricus paratus ad
modum qui habetur de sanguine hu-
mano.

N. E dictis animalibus si interiora
viscera, videlicet pulmones, cor, atque
hepar particulatim dissecta vix cum
sanguine macerentur, nobilior eorum es-
sentia simul proleclatur.

Vires. In podagra maximi est sola-
minis, (illitus,) insignis; item eius usus
est in contracturis à quacunque causa
subortis, quippe vi salis magnam resol-
uendi vim obtinet. Gluchr. in Beg.

VII. Lachryma fordes quæ in
oculorum angulis reperiuntur, velut
cera indurata, odoris aliquantulum
grauis, tandem fragrantis (*lapis vul-*
go dicitur) siccant, adstringunt, corro-
borant, sudorem cient, ideóque ad-
uersus venena, morbosque contagio-
sos quàm summè celebrantur, vt vel
cum Lapide Bezoar viribus certare
dicantur.

Quinimo (vt scribit ad me Cl. D.

D. Horstius) profunt lachrymæ quo-
que in difficultate partus, adeo vt ea-
rum vis nuper adhuc sit comperta in
mortuo etiam fœtu expellendo.

Dosis gr. 3.4. vide Casp. Barb. l. de
lap. Bezoar. c. 8. & 9.

N. Lachrymarum harum aliquot
frustula colore obscure fusca, consisten-
tia cerea, pilis immixtis referta, dono libe-
rali mihi impertita est *Illustrissima*
Saxonia Princeps, Sophia Eleonora,
Coniunx Illustrissimi ac Celsissimi Prin-
cipis ac Domini, Dn. Georgij Hassie
Landgrauij, &c.

VIII. Medulla ferè omnium lau-
datissima est, præstatque præ reliquis
in vlcerib. malignis, vt & in Tibiarum
vlcerib. *Plin.*

IX. Senum commendatur præ aliis
in tumorib. molliendis, vulneribus
astringendis; perniones persanat, dolo-
res sedat.

P R Æ P A R A T A.

Ol. stillat. seu vel axungia fit, *l. c.*
lib. 2. c. 70.

Vires. Emollit, lenit, summum miti-
gatiuum est in podagra, semel iterum
de die illitum.

X. Talus s. Astragalus utilis est Dy-
sentericis.

XI. Lapis in corde, ventriculo, vel
intestinis nonnunquam repertus, cum
Lapide Bezoar virib. suis conuenire
dicitur. *Crato Epist. 160. Encel. de lap.*
l. 3. c. 49. C. Barb. de l. p. Bez. c. 11. In-
primis vero lapis è vulua erutus phy-
lacterium esse fertur prægnanti & per-
ficere vt partum perferat.

N. 1. Optima omnia è cerno censen-
tur, collecta ex cerno turgescen- te, quod
fit circiter Ægidij Festum initio
Septembris.

N. 2. Canda cerni venenata est.

XVIII.

XVIII. Cochlea.

Κοχλῆς, κοχλία Limax Schnecken.

Cochlea { Testacea
Nudæ (sine testis.
Fluviatiles.

Præferuntur quæ in locis apricis & vinetis degunt, herbisque viuunt odoratis, collectæ ante ortum solis vid. Forest. l. 16. § 8.

N. Flumiatiles easdem quidem vires obtinent, sed rarioris usus sunt. Generantur ex terra limo, viuunt rore plantisque variis. Inimicantur coturnici ac ardea quibus in pradam & cibum veniunt. Antipathica sunt maximè Lacer-tis ac Simis: Nimirum, hæ cochlearum vel & testarum solarum præsentiam adeo formidant, ut sese contrahant, formidineque excrementa egerant.

OFFICIN. NAT.

1. Cochlea integræ. 2. Testa, 3. Pinguedo. 4. Mucus.

Vires.

1. Cochlea refrigerant, incrassant, consolidant, leniunt, neruis conueniunt ac pulmonib. Hinc usus præcipui internè ad tussim, phthisin, secretionem sanguinolentam, aliosque pulmonum affectus; hinc ad Epatis calorem, & colicum dolorem.

Extrinfecus maturant ac rumpunt anthraces, (imposita tùm solæ tùm cum felle tauri,) consolidant vulnera præcipuè neruorum, vlcera sanant, (inprimistibiari.) inflammationes (podagricas) mitigant, ventrem hydropicor. hydroceleumque herniosorum detumesce-re faciunt (cum testis crææ & imposita,) hæmorrhagiam cohibent (fronti applicata.) Spuma ex cochleis sine ∇ igne apposita fistulas domare dicitur.

2. Testa tritæ exhibentur calculosis,

rimas manuum siccant & consolidant.

3. Pinguedo (in elixato brodio, ubi id refrixerit, supernatans,) oculorum rubedini doloribusque medetur, defluxiones ad oculos intercipit (fronti cum album. oui imposita.

4. Mucus saliosus (quem compansæ cochleæ reddunt,) emplasticus est, ideoque glutinans, defluxionesque ad oculos intercipiens (in anacollematis.

PRÆPAR.

1. ∇ stillat è carne mense Maio vel Octobr. per MB prolecta conueni-redicitur atrophia laborantibus. Epar nimirum corroborare statuitur.

Extrinfecus faciem fucat.

2. Cinis cochlear. Exiccat, incrassat, cutis rimas ac scabritiem exiccat, Synouiam, (das Gliedvasser,) sistit.

3. Liquor limacum.

Rubri limaces concisi misceantur cum pari pondere Θ communis, conicianturque in manicam Hipp. ut in cellâ defluant in liquorem, quo dolentes partes podagricæ illinuntur, & verrucæ scalpello prius abraasæ faciliè auer-runcantur.

S. Cloff.

XIX. Cuculus.

Κύμα, Kingle, Kiinglen.

Animalculum est leporini generis, timidum, fœcundum admodum & prolificum.

OFFICIN. NAT.

1. Integer vstus. 2. Axungia. 3. Cerebrum.

Vires. Cuculus totus exustus medetur Anginæ s. faueium inflammationib. cum costo & folio illius.

2. Axungia articulis & neruis induratis utilis est.

3. Cerebrum

3. *Cerebrum* venenis resistere creditur, alioquin leporino correspondens.

XX. *Elephas.*

Elephas, Elephantus, *Elefand.*
Helffand.

Animal est rarissimum, viuacissimum, placidum ac docile.

OFFICIN. NAT.

Solidentes, *Ebur vulgo dicti.*

Vires.

Ebur refrigerat & siccat, moderatè, adstringit, incidit, viscera roborat, albas mulierum fluxiones sistit. Ictero conuenit, lumbricos fugit, diurnis obstructionibus confert, stomachi dolores & imbecillitatem abigit. Epilepsià medetur, melancholiam arcet, putredini ac venenis resistit. Adhibetur eius Limatura in infusionibus, quin & puluis in substantia exhibetur.

Dosis ʒʒ.

PRÆPAR.

1. *Ebur vstum* (*spodium vocant*, & ad differentiam *spodij mineralis*, *spodium ex Ebore*.

2. *Trochisci de spodio*, vide *Dispens.*

N. Sunt qui *Ebur* ad fecunditatem commendant, verum cum sit animal pauca proles, tardè pariens, (biennium sc. gravidum,) potius ad sterilitatem fœtusque retentionem facere coniecturatur, quam ad conceptionem promouendam.

XXI. *Equus.*

ἵππος, Equus Mas, Equa Fœmina, *Pferdt.*

OFFICIN. NAT

1. *Sanguis*. 2. *Coagulum*. 3. *Lac*. 4.

Stercus. 5. *Lichenes*. 6. *Testes*. 7. *Pinguedo iubar*. 8. *Vngula*. 9. *Pili*. 10. *Salina*. 11. *Dens*. 12. *Lapis*.

Vires. 1. *Sanguis* (malunt nonnulli equarum admissuram expertarum) admiscetur septicis ac causticis.

2. *Coagulum*, (*Hippacen vocant*,) priuatim cæliacis, Dysentericisque conuenit.

3. *Lac* vile censetur Epilepticis, Phthisicis, Tussientibus, Asthmaticis.

4. *Stercus* extrinsecus sanguinis eruptiones cohibet, (tàm crudum, quàm vstum,) fœtum mortuum, ac secundinas expellit (in *suffitu*.

Internè propinatur in dolore colico, ac strangulatu vteri, & similiter in fœtu mortuo & secundinis expellendis.

N. *Præstat ex equo auena nutrito*, & non castrato.

5. *Lichenes* (callosa excrementa in equorum cruribus nascentia,) laudantur peculiariter ad vterinas suffocationes, (suffitu subtus facto,) vt & ad morbum comitalem, & calculum. (pulvis propinatus.

PRÆPAR.

Extractum Lichenum fit ex lichenibus, siccatis cum V, vel alio appropriato spiritu.

Dosis à gr. v. ad ʒʒ.

N. *Hartman.* Menstruum parat ex *Meliss.* & *Viniana* ʒʒ. ij. qua per *Om.* ex cineribus destillat. super *Succini* & *Gagatis* ʒʒ. Δ è in fine forti, hinc *Om.* ab *So* separatam adhibet.

6. *Testes castrati* ad secundinas pellendas remedium præsentissimum (puluerisari.) Commendantur quoque in doloribus colicis.

7. *Pinguedo iubati colli Kamschmaltz* illinitur commodè articulis luxatis.

SSss

8. *Vngula*

8. *Ungula* partus mortuos exturbat (fuffitu) pediculos fugat, (fuffitu).

9. *Pili* sanguinis fluxum reprimunt.

10. *Salina* spuma oris triduo pota, tuffim sanat, feruorem faucium con-
tundit.

N. *Aqua frigida ex ore equi non castrati in praeterfluente potantis elapsa, & subito vasculo collecta, prodest ad sterilitatem emundandam, (semel ac iterum pota) Hartm. in pr.*

11. *Dentes* primum nascentes, dentitionem facilitare dicuntur, (appensi.) *Dentes* dealbant, cinis, affricatus.

12. *Lapis (Hippolithus)* in ventriculo aut intestinis equorum nonnullorum repertus, uti *Lapidi Bezoar*, (Occidentali,) figura & laminea structura non abfimilis est, ita & virib. eundem æmulari statuitur.

N. *Historias lapidis huiusmodi, cui magnitudine reperti, habet Iordanus tr. de peste, Phœnom. tr. 3. c. 9. Schvvenckfeldius in Theriotroph. vide, & c. Bauh. tr. de Lap. Bez. c. 25* His subiungi meretur lapis eiusdem ferè magnitudinis, quem nostro hoc tempore præbuit mortuus equus, (ut audio Hispanicus,) non procul ab Vrbe hac nostra Francofurtensi disiectus; quem aquid Henr. VVlorath. Comitum de Stolberg. videre contigit, Cuius vires easdem cum *Lap. Bez. occidentali* experientia docuit.

XXII. *Erinaceus*.

Erxos' ein Igell, } caninus.
Hochel. } suillus.

Animal est terrestre, echinatum, Hyeme in cauernis arborum occultatur, vascens murib. iuglandib. malis,

pyris, & simil.

OFFICIN. NAT.

1. *Echinus ipse*. 2. *Iecur*. 3. *Axungia*.
4. *Ventriculus*.

Vires.

1. *Subuenit (coctus vel incineratus & potus)* in voluntariè mingentibus, stomacho gratus est, aluumque & urinam mouet. *Forest. l. 21. 15.*

Extrinsecus illitus alopecie subuenit.

2. *Iecur* vel & corpus exiccatum atque cum *Oxymelite* sumptum, renum vitiis auxilio est, medetur Cachexiæ, Hydropi, conuulsionib. & Elephantia; viscerum fluxiones exiccat. *Disfcor.*

3. *Axungia* felicissimè herniis medetur. *Hartm.*

4. *Ventriculi* tunicam interiorem commendant ad dolores colicos (assumpt).

XXIII. *Homo*.

Ἄνθρωπος } Mas.

Mensch. } Fœmina.

OFFICIN. NAT.

Sumuntur vel ex partibus corporis
viventis.

Quales sunt.

1. *Capilli*. 2. *Ungues*. 3. *Salina*. 4. *Aurium* sordes. 5. *Sudor*. 6. *Lac*. 7. *Menses*.
8. *Secundina*. 9. *Urina*. 10. *Stercus*. 11. *Semen*. 12. *Sanguis*. 13. *Calculi*. 14. *Membrana caput fœtus* cingens.

N. De pediculis vide infra.

Vel ex partibus corporis demortui seu
Cadaveris.

Tales sunt.

1. *Integrum cadaver* s. caro. 2. *Cutis*.
3. *Pinguendo*. 4. *Ossa*. 5. *Cranium*. 6. *Vf-
nea cranij*. 7. *Cerebrum*. 8. *Fel*. 9. *Cor*.

I. *Capill.*

I. Capill. commendantur ad capillorum productionem, (liquor inde destillatus & cum melle illitus) ad Ictericitiam, (pulsus propinatus) ad membra luxata (cum adipe ouillo illitus cinis) ad hæmorrhagiam vulnerum.

N. Sunt qui ad quartanam capillos patentis, cum aliis in corpore dispersis pilis permixtos ouo imponunt, duriter eoquunt, & anibus deglutienda obiciunt, qua ratione quartanam curatum iri volunt.

PRÆPAR.

Destillatum fit per se ex Signe arena non admodum valido.

II. Vngues cient vomitum, (intus assumpti, tum in pulu. tum in infus.) aquas Hydropicor. ducere dicuntur (resecti à pedibus & manibus atque umbilico alligati.

N. 1. Sunt qui ad curandam febrim segmenta è manibus & pedibus ouo includunt anibusque deportanda obiciunt, alij eadem cera inuoluunt matutinòque tempore ante Solis ortum ianua affigunt, alij dorso cancri vini alligant, cancrumque fluenti committunt.

N. 2. Ad recuperandas vires, abscessus vngues & capillos cerasi radici incise imponunt, vulnusque fino cooperiunt.

PRÆPAR.

R. Rasur vel resegment. puluerit. ʒj. Vini generosi lb. i. macera, donec in mucilaginem abierunt. Hinc filtra & addita ʒj. reserua.

Dosis à ʒj. ad ʒvi. vel ʒj.

III. Salina ieiuni hominis commendatur ad venenatos morsus serpentis, canis rabidi, & similib.

IV. Aurium sordes (cerimen) colica laborantib. præsentissimum perhibentur Remed (in potu si assumantur.

Extrinfecus medentur ictib. Scor-

pionum, conglutinant vulnera, fissuras & scissuras cutis.

V. Sudor vsus proficui dicitur, contra scrophulas, si cum herba radiceque verbasci mixtus folio inuoluatur, inque cinerib. calefactus imponatur.

VI. Lact refrigerat, lenit, maturat oculorum rubedini subuenit.

PRÆPARATA.

1. ∇ lactis ʒia.

R. Lactis & ʒi alban. destilletur vt phlegma saltem prodeat, relictis acriorib. spiritib.

Vires. Oculorum rubedini, aliisque inflammationib. mirè confert.

2. Butyrum: Insigne est ophthalmicum.

VII. Sanguis menstruus, (Zenithinuacula) exiccatus commendatur intrinsecus ad calculum & Epilepsiam. Extrinsecus sopit dolores podagricos, (cum adipe bovina inunctus.) Conducere item dicitur in Peste, apostematib. carbunculisque (impositum linteam quod fuerit humectatum in +. vel ∇ rosar. menstruo illo sanguine imprægnata,) Erysipelata extinguit, pustulas faciei abstergit.

N. 1. Commendatur qui prima vice erumpit.

N. 2. Ad immodicum menstruum fluxum cohibendum, sunt qui pannum menstruo sanguine imbutum certo tempore Cerasi radici in cortice aperte indunt, incisuramque iterum operiunt.

VIII. Secundina (vel eius loco Umbilicus infantis,) magni fit ad strumas gutturis tollendas, (calcinata & in ∇ abrotan quotidie exhibita pondere ʒss. idque & decrescen-), ad Epilepsiam & philtrea compescenda; ad molam & fœtum exterminandum, nec non ad animalia enecanda, etiam ea quæ ma-

lesicio in homine extiterint. *Hartm.* ad nœuos maternos commendat, alij ad do-
lorem colicum (gestatam loco amuleti.

IX. Vrina, calf. exiccat, resoluit, ab-
stergit, discutit, mundificat, putredini
resistit, ideoque vsus est præcipui in-
trinsecus, in obstructione Epatis, Lie-
nis, Vesicæ biliaræ, Pestis præseruatio-
ne, Hydropè, Ictero, Quin & Mariti
vrina hausta partum difficilem facilita-
re dicitur.

Extrinsecus siccat scabiem, resoluit
tumores, mundificat vulnera etiam vé-
nenata, arcet gangrænam, soluit aluum,
(in clysmate) abstergit furfures capitis,
(cum \odot mixta,) compescit febriles in-
sultus, (pulsui applicata,) exulceratas
aures sanat, (instillata pueri vrina) ocu-
lorum rubedini subuenit, (instillata)
artuum tremorem tollit, (lotione) vuulæ
tumorem discutit, (gargaris.) Lienis
dolores sedat (cum cinere cataplasma-
tisata.) vide Hieronym. Reusnerum Sy-
nopf. de Remediis ab vrina desumptis.
Tabernamont. VVasserfchatz.

PRÆPAR.

1. Spiritus volatilis, Sal volatile.

\mathcal{R} . \square æ pueri, (ann. 12.) Vinum bi-
bentis recentis, destilla per \mathbb{X} in fer-
uenti $\mathcal{M}\mathcal{B}$. Hinc cohoba super feces,
prodibit. \mathcal{L} \square æ cum suo phlegmate
mixtus, quem si libet dephlegma, &
habebis spiritum. Hunc si ex phiola
eleues, nancisceris sal volatile candi-
dissimum.

Vires. *Auxilij nobilissimi censetur in
pellendis lapillis, (potus cum conueniente
liquore, sed valde foetet.*

N. 1. Celeberrimus est, ob tincturam
caruleam Smaragdi, cuius preparationi
menstruum præbet. (cum phlegmate.

N. 2. Libani rectificat, imponique

podagricis, asthmaticis, calculosis, per
stringam in vesicam immittit, (impra-
gnatum tamen antea essentia saxifra-
gor. v. gr. Crystall. lab. Lync. & simil.

2. Alius \mathcal{L} \square igneus f.

Sal volatile.

\mathcal{R} . \square pueri V. bibent. q. f. (mens.
30.) euaporet leni admodum Δ ad con-
sistentiam vsque Syrupi. Residuum
hoc reconde in phiola longissimi col-
li, & destilla aëre frigidiorè, (ut sc. in
 \mathbb{X} condensetur,) in \mathcal{E} ib. vel \mathcal{A} & pro-
dibit \mathcal{L} in \mathbb{X} instar niuis sese ele-
uans, frigore coagulabilis, sed leni ca-
lore subilis. *Osunald.*

N. 1. Hunc Spiritum si purificato suo
 \mathcal{A} ex fecib. scil. elixiniato coniunxeris,
cohobisque aliquot volatilifaueris, men-
struum habes in signo ad elicienda viri-
ola è metallis & præcipue è \mathcal{C} a.

N. 2. Eundem spiritum (\mathcal{S}) optime
solutionibus & coagulationibus purifi-
catum, si aliquandiu (\mathcal{P} 8.) in \mathcal{V} di-
geris, soluetur: Solutionem ergo si denuo
cum \mathcal{V} rectificatiss. maceraueris.
(\mathcal{P} 8. mensuri pariceps es soluendo
 \odot idoneum.

3 Spiritus per putrefactionem.

\mathcal{R} . \square hominis iuuenis (annor. 12.)
vinum bibentis quantitatem magnam
(mens. 30.) pone in finum equinum
vel $\mathcal{M}\mathcal{B}$. \mathcal{P} 40 ad putrescendum.
Hinc decanta à fecib. ac destilla per
 \mathbb{X} , (vel per vesicam,) ex \mathcal{A} , idque do-
nec omnis humiditas destillando ab-
stracta sit. Humiditatem hanc cohob-
a aliquoties (3.) à capite suo mor-
tuo. Tandem destillatum in cucurbita
oblongi colli, committe calori, ut
alembicus semper frigidus maneat. Sic
ascendit Spiritus instar Crystalli, nulla
comitata humiditate. Crystallus recti-
fica soluendo in ∇ pluuiali \mathcal{G} at. &
ex

ex phiola, vt prius S ando, idque se-
xies, semper nouam ∇ . pluui. stillatit.
adhibendo. Hinc digere Crystallos in
phiola Herm. cl. S P 15. lento Δ c, do-
nec in liquorem limpidiſſimum abeant.

N. 1. Sennertus ab S dicto modo
defecata, destillando elicit, saltem quar-
tam aut sextam partem, eamque leni ca-
lore ex phiola oblongioris colli dicto mo-
do sublimat. vide Inst.

N. 2. Alij urinam putrefactam destil-
lant ex cucurbita, cuius orificium obtu-
rant charta triplici oleo imbuta, vel
spongia similiter imbuta, qua U rina
ignis tantum transeat.

N. 3. urina quia facile destillando exa-
stuat, caute ignem adhibere oportet.

N. 4. Sunt qui foetoris corrigendi
gratia (qui tamen S dicto modo aliqua-
tenus correctus) U affundunt, eumque
rursus lento calore abstrahunt, idque
aliquoties, nouum semper U affunden-
do. Verum U rina hac ratione corre-
ctā nō U rina simplex, sed Magiste-
rium potius, i.e. U rina sale vini im-
pragnatum dici meretur. Vide de his de-
stillationibus Hartmann. in pract. & in
Croll. Sennert. in Instit. Gluckr. in Be-
guin. l. 3. c. 2. Kest. l. 1. c. 2. 4. c. 42. Bec-
cker. in Spagyria Microcosmica, &c.
Tentzel. in Exegeti.

Vires. Inſigne anodynum est in dolo-
rib. (ſi cum liquore conueniente affrice-
tur.) referat quoque tartareas obſtructi-
ones Viſcerum ac Meſenterij, vnde ma-
gnus eius uſus eſſe poterit in Scorbuto,
Hypochondriaco, Cachexia, Ictericia fla-
ua ac nigra: atterit calculum renum &
veſicae, doloreſque inde ortos ſopit, &c.
Idem Sal ſi in Sp. S i ſolutus, ac ite-
rem in arena deſtillatus fuerit, liquor
prodit in Epilepſia efficaciffimus. Idem
ſpiritus optimē purificans, (ſcil. aliquo-

ties in ∇ pluuiā ſoluendo & deſtillan-
do,) cumque V anaticē unitus ſoluit
 O , vnde O potabilis, vidē V micro-
coſmicum.

4. S L Antepilepticus, ex vrina
& S i duplo digeſtis & deſtillatis. Vi-
de lib. 2. S o.

N. Quercetanus de ſignat. Rer. plu-
ribus eundem deſcribit, eademque opera
elicit M B.

1. Phlegma Ophthalmicum (primum
egrediens.

2. Antipodagricum (acrius 2. deſtil-
lans.

3. Per Retortam ſpiritum glaciale
i.e. coagulabile, quē maximopere depre-
dicat ad reſerendas obſtructiones Epa-
ris, Lienis, ad promouendas urinas, &
diſſoluendum calculum, tum quoque
ad extinguentes inflammationes &
gangranas.

5. Magiſterium urinam.

S S putrefactam, (vt dictum,) &
defecatam, deſtilla l. Δ ex M B, donec
phlegma omne prodierit, tunc ſubſi-
ſte & rectifica ſpiritum ex phiola,
oblongi colli, ſic acquires ſal volatile,
quod collige phlegmate reiecto. Reſi-
duū deſtilla ex arena & aſcendet vltē-
rius ſal volatile: Ex S elixiua ſal fi-
xum, idque coagula ad ſiccitatem, at-
que cum triplo argillae mixtum, inque
globulos redactum, (poſtquam globu-
li exiccati fuerint,) deſtilla per O m,
(vt deſtillatur S S .) ſpiritui huic
affunde ſtillatim priorem illum S
 S m, vel ſal volatile, donec ceſſet
ſtrepitus. Hinc da Δ m ſublimationis
in S , & ſublimabitur Sal vrinae elegan-
tiſſimum, viſuque iucundum.

Vires. Efficatus agit hoc ſublimatum
quam praecedens, S m q; totius corporis
incidendo, per ſudorem, urinam, imō vel

per alium expellendo. Plurimos inde ortos affectus curat, vel saltem leuat, quales sunt, Atrophia, &c. Praeservat itidem à dolorib. calculi, (si singulis Mensibus ante neuilunium assumatur.

Dosis gr. VII. VIII. IX. X. in liquore conuenienti.

Vfus eius quotidianus aliquandiu continuari poterit.

6. Oleum Ludi, i. e. ☿ ex materiæ quæ matula inhaerescit, fit calcinando, per deliquium soluendo.

Vires. Insigne est ad resoluendum calculum.

Dosis ℥j.

X. Stercus (carbon humanum Paracelso, aliis ☿ Occidentale,) emolliat, maturat, anodynum est. Ea propter magni vsus ad mitigandos dolores incantatione introductos, (impositum) ad anthraces pestilenciales maturandos, ad phlegmonem, v. gr. gutturis sanguinem curandam, (siccatum, tritum & cum melle illitum,) ad inflammationes vulnerum arcendas. Quin & intrinsecus à nonnullis adhibetur, in Angina, (crematum & potui datum,) in febr. ad patoxifinos profligandos, (eodem modo propinatum, Dos. ℥j.) in Epilepsia, (quam stercus primum Infantuli siccatum & puluerisatum, & ad complures dies exhibitum, radicatus euellere aiunt.

PRÆPAR.

I. ▽ stillaritia fit vna & eadem opera cum oleo.

Vires. Mederi dicitur oculorum vnguib. reliquisque passionib. tunica annaria, (guttula vna vel altera instillata,) faciei conciliare colorem, pilo producere, ulcera corrosiua & fistulas curare, cicatricesque manuum remouere.

Interne prodesse aiunt comitialibus

& hydropicis, lapidemque renum & vesica pellere, morsibusque canis rabidi, venenatorumque animalium subuenire.

2. Olenm,

℞. Stercor. Iuuenis, (non pueri) q. p. exiccetur in Δ vel furno lento Δ e, postea per XX destilla, Δ e primum lento, sic prodibit phlegma, tandem cum albis Spiritib. oleum Vtrumque per MB rectificetur.

Poterius Andegan. parat hoc modo.

℞. Sterc. human. quant. magn. corrumpatur per se. ac conuertatur in exigua quædam animalia, & hinc ferè in ☿ erem abeat. Stercus hoc ita præparatum destilla ex ☿, i. Δ blando, mox validiori, sic prodibit ☿ & ▽.

N. Graueolentia vtriusque tollitur rectificationibus & cohobationibus repetitis

Vires. Valet ad tineas capitis, erysipelas exulceratum, lichenes, impetigines (illitum) podagricis doloribus subuenit, cancerum curat & mortificat.

Interne Icterus soluit, Liban. l. 2. Alohyum. Poter. in Pharmacop.

3. Zibetta occidentalis nihil est aliud, quam stercus mediante digestionem ad suaueolentiam redactum, qua Zibettam mentitur vid. Agricol.

XI. Semen s. Sperma, non modo comperimus per se à nonnullis ad Veneris scil. ligaturam maleficam dissoluendam adhiberi, sed & Mumiæ magneticam inde fieri, qui amoris concilietur feruor. Quin & homunculum suum inde meditat. Paracelsus.

XII. Sanguis, (recens adhuc & calidè potus,) conferre dicitur ad Epilepsiam, si sc. potum motus excipiat vehementior, cursusque celerior ad sudoris

doris vsque prorupcionem, hæmorrhagiam quamcunque sedat, (eporus recens vel incineratus.) Quin & extrinsecus sanguinis eruptioni medetur, & præcipuè narium hæmorrhagiæ, (cinis inditus vel & recens fronti illitus, ut inibi exsiccetur.

N. 1. Potio sanguinis summa cautione opus habet, quippe assumentibus non modo iraculentiam inducit, sed & Epilepsiam quandoque generasse compertū est.

N. 2. Sanguis puerperij sanat scabiem volaticam, (recens cum secundina semel ac iterum illitus) Hartm.

PRÆPAR.

1. ∇ destillat. fit eodem labore cum $\circ\circ$.

Vires. Valet in Phthisicis & aridis (epota ad $\frac{3}{4}$, vel membrīs affricta,) fistulis purificandis & sanandis, ambustis refrigerandis.

N. Destillatur & ∇ è sang. & lactis humani. commendaturque ad maculas cutis extirpandas. Hartm.

2. $\circ\circ$ destillatum

R. Sang. Iuuenum (verno extracti,) quant. magn. Alcohol. Vini $\frac{1}{2}$. cucurbitis probè munitis, digere in F. E. $\frac{1}{2}$ per 40. dein destilla per XX , è cinere, & prodit vna cum ∇ . $\circ\circ$. Verumque rectifica ∇ per MB . $\circ\circ$ per O . è cinerib. aliquoties (9. 10. $\frac{3}{4}$ ando.

Vires. Maximè commendatur ad Epilepsiam radicis tollendam, si singulis diebus per mensem integrum sumatur ℞ . à Nouilunio incipiendo & postmodum singulis nouiluniis semel per annum ℞ . ad paralytin, apoplexiam, pulmonem exulceratum, plenresin. Bequin.

N. Destillatio S. H. non vniusmodi instituta reperitur.

Nimirum:

Destillant aly S. Hm. recentem & adhuc calentem, idque modo duplici, per se scil. & sine additione, tum quoque admixta aliquota parte ∇ rectificati.

Aly S. Hm. non recentem, sed velexiccatum, vel digestum aliquandiu destillationi subiiciunt. Digestionem autem peragunt aly solius sanguinis (addito tantillo Ois .) aly sangu. cum ∇ rectific. confusi.

Exhibet autem Anatomia Sanguis
1. ∇ m & 2. O m, i. e. ∇ m rectificatam. 3. $\circ\circ$, i. e. Liguorum crassiorum. 4. Sal volatile. S. Sal fixum. Verum nos vsitatiora damus.

3. Oleum rectificatum.

R. Sanguinem Iuuenis sani, mense Maio vena secta extractum, suscipe cucurbita, vt solum $\frac{1}{4}$. repleatur. Hinc clauso vase detineatur, in calore mediocri, vt sanguine intumesciente tota cucurbita impleatur. Hinc F. $\frac{3}{4}$ ratio, primumque exit ∇ (non magnæ æstimationis, nisi quod amplius elaborata, nonnullis ad extrahendum Sal inferuiat.) Reliquum pellatur in cinerib. per O m, iuncturis optimè clausis: Destillatum refundatur super feces, fiatque cohobatio vice nona, vt color subsequatur rubinus.

N. Attendere oportet in destillatione, ne nimio Δ feces comburas, inque carbonem redigas, ideoque tantum ad siccitatem destilles.

Vires. Maximarum habetur virium ad refocillandos agrotos. Liban. Syntagm.

4. Balsamus Antipodagricus s. Oleum s. H. alcalisatum. Fit eodem modo.

R. S. H. adhuc calentis, Mens 1. putrefac. aliqu. $\frac{1}{2}$ (9.) dein destilla ex O m per

per gradus 1. lento Δ e, hinc 2. fortiori per \bigcirc , & exhibit Ol. rubicundum & fœrens, sale volatili ad spondilia colli adhærescente, \odot rectifica per colchotar ex cucurbita Δ , aliquoties à recenti colchotare \S ando: demum solue in correcto hoc oleo sal & serua.

Vires. *Mirandarum est virtutum in podagra, quotidie bis ternè, sex dieb. continuus inunctum; sistit dolores tumore simul & rubedine euanescente, &c.*

N. Similis energia est balsamus è sanguine hircino & ceruino prolektus, in quibus tamen & viscera, pulmones scil. cor & epar addidisse expedit. Vide supra.

5. Spiritus Antepilepticus.

R. S. H. dephlegmati & ter rectificati, lb. ij. iufusi fl. lauendul. (in vino) lb. ij. M. & destilla per B. M. ad medietatem, idque repetere tertia vice: dein adde ∇ rectific. ζ ij. & serua.

Vires. *Valet ad curandam Apoplexiam, paraly sin, ut & ad Asthma, &c.*

N. Habet & Beguinus insuper S. H. Qu. Ess. Biolychnium, Phyltrum, Balsamum, ∇ m sanitatis, Arcana duorum cum prolixa horum descriptio, Authorque alias in omnium manibus versetur, illorum descriptione superse-
deo.

6. Mumia vite alexiteria.

Est sanguis florentis & beneualen-
ris hominis, lento calore exiccatus, spiritu limonum & \bigcirc i spiritu impregnatus, & in trochiscos cum pauca myrrha paratus.

Vires. *Insignis est efficacia in curandis carbunculis.*

Dosis ζ ss. in ∇ cinam. mane Ieiuno propinata. P. I. Fab. in Chirurg. c. 9.

7. Arcanum sanguinis humani.

P. I. Fabri vide Myrothec. c. 8. Byl-

lick. de natura Spagy. n. 66.

XIII. Calculus Tartarum s. calculum in omnibus partibus soluit, & expelli facit, ideoque omnib. obstructionib. subuenit.

[Pulu. exhibitus. Dosi ζ j.]

PRÆPARATA.

1. Sal Crystallinum.

R. Calcul. optimè calcinatum (ve-
durities lapidis emolliatur,) coque in ∇ , & soluetur in ∇ m Citrinam. Hinc filtratura euaporata, manet Sal in fundo, quod si liber denuo calcina, & in ∇ feruente solue, & coagula re-
poneque ad crystallisandum.

N. Calcinatio institui potest diuersi-
mode: Alij calcinant cum \bigcirc 6. horis: Alij cum Δ & \bigcirc : Alij cum duplo carbonum faginarum.

Sennertus calcinat calculum tritum Δ e circulari, hinc reuerberij, & tan-
dem cum carbonibus faginis (in fornace
figulina. Inst. l. 5. p. 3. f. 3. c. 5.

2. Oleum s. Liquor, fit si Sal in aëre
humido soluatur.

Dosis gr. vi. ad x.

N. Sennertus, calcinat cum \bigcirc , hinc
 \bigcirc cum ∇ extrahit, & ∇ separato,
Sal reponit ad liquefendum.

3. Essentia s. Elixir.

R. Sal calculi Crystall. volatilis a cum
 ∇ , hinc abstrahe leni calore ∇ , &
remanet \odot . Sennert. d. l.

Dosis agr. v. ad x.

N. Si ita placuerit, calculum iisdem
preparationibus cum alijs lapidibus
subiicere poteris. vide l. 2.

XIV. Membrana, quæ caput non-
nullorum fœtuum cingit, maximam
vim habere dicitur, aduersus colicum
dolorem.

I. Cadaver integrum Caroué, Officinis Mumie titulo venit.

Hæc resoluit sanguinem coagulum (assumpta ʒij. conferreque dicitur, purgationi Capitis, punctiōni Lienis, tussi, inflationi corporis, mensib. obstructis, aliisque affectibus vterinis & sim.

Extrinfecus adhibetur vulnerib. consolidandis.

N. Mumia communiter 4. denotat.

1. Mumiam Arabum, quæ est liquamen s. liquor concretus exudans in sepulchro e cadaveribus Aloë, Myrrha, Balsamoque conditis.

2. Egptiorum, quæ, est liquamen ex cadaveribus passiasphaltum conditis. Nimirum, hoc condiebantur Cadavera vilioris sortis, adeoque & ipsamet cadauera nonnunquam eo modo condita prostant.

3. Pissasphaltum factitium, id est, mixtum pici bitumen, quod pro Mumia venditant.

4. Cadaver sub arena Solis aestu torrefactum. Fitque cum in Hammoniorum Regione, quæ est inter Cyrenarum Regionem & Alexandriam, ubi arenae Syrtis Ventor. turbine sublatar. incantos viatores obrunt, unde horum cadauera flagrante Solis aestu torrentur & exrescunt.

His 5. & Mumia recentiorum addi poterit, quæ fit: Eligatur Cadaver hominis ruffi (quia in hoc sanguis habetur tenuior, adeoque & caro præstantior,) integrum, recens, sine macula, 24. aut circiter annorum, morte violenta (non morbo) interemptum, per diem & noctem luminarium radiis, sereno tamen tempore irradiatum. Huius carnes musculo-

sa frustulatim conscinde, & consperge pulvere Myrrha & tantillo saltem Aloës, postea imbebe macerando aliquot & in V suspendatur per ʒ 6. vel 10. ac iterum cum V imbibatur: tandem in A sicciori, locoque umbroso frustra suspensa siccescant, tunc assimilatur carni fumo durata, sine fœtore, Crollius.

N. Ex his iam recensitis Mumiarum generibus, etsi prioribus, si saltem è sanis corporibus haberi possent, suas laudes non derogem, præcipue primo, quod tamen vix ad nos perferri credo: Attamen iis posteriora duo præferenda autumo, utpote in quibus metu sumus soluti, quem incutit Renodæus, Mumiam Officinarum nihil aliud esse perhibens, quam expressum putridi cadaveris succum inspissatum, ideoque magno mortalium damno dinendi.

PRÆPARATA.

Vulgaria quæ Mumia Officinarum ingreditur passim occurrunt.

Suntque

Pulvis ad casum, Athanasia, magna, Balsam. Petri de Ebano, Unguentum Sympathetic. Emplastr. Apostol. nigrum, Cerat. pro herniosis Laudan. Opiat. &c.

Insuper sunt minus vulgaria:

1. Tinctura s. Extractum Mumie Quercetan.

Fit ex Mumia vulgari, extrahendo cum & Therebinth. an. iterumque menstr. separando ad mellis consistentiam. Querc. Spagiric.

Vires. Alexipharmaca est, putredini que summopere resistit. Commendatur iidem ad morbos pectoris, Asthma, phthisin &c.

N. Feces remanentes admodum sunt anodina,

TTT

2. Tinctura

2. Tinctura f. Extr. M.

Crollij.

Fit ex mumia recentiorum dicta cum Ψ aut Spi. Sambuci.

N. Ex hac facit Crollius Theriacam de Mumiaque \mathcal{R} . Tinctur. Mum. \mathfrak{ss} . Theriac. Androm. \mathfrak{z} iv. Ol. Oliuar. Mumiat. \mathfrak{z} ij. Θ Perlar. & Corallana \mathfrak{z} ij. Terra jessui. \mathfrak{z} ij. Moschi \mathfrak{z} ij. Dig. per mensem.

Vires. Commendatur ad quavis venena & contagia, subuenit pesti praecauendo. \mathfrak{z} ij. & curando. \mathfrak{z} ij. vel \mathfrak{z} ss.

N. In assumptis venenis exhiberi potest cum Ol. Amygdal. dul. ad Vomitum.

3. Tinctura Alcosata, s. Elixir.

Mumia.

\mathcal{R} . Mumia, scil. carnis humanae induratae, tenuiter incisa, affunde Sp. Terebinth. vaseque H. clauso per mensem, ad putrescendum seponere. Expressioni vesica bubula exceptae affundantur aliquotae partes rectific. Inde in \mathfrak{xx} caeco super cucurbitam iuncturis optimè munitis adaptentur, ita vt cucurbita in frigidam Ψ m posita, \mathfrak{ss} prunaque circa \mathfrak{x} lento calore officium faciant, cuius beneficio Liquor, s. Q. E. in forma perquam subtili cum Ψ per vesicam delabatur. Materia residua reuerberanda & in Θ sublimatione redigenda, demum cum Q. E. posteaquam illa à Ψ per \mathfrak{M} fuerit separata, circulationis medio vnienda. Quib. peractis Qu. Es. Mumiae cum Theriaca & Moscho amplius digeri & ita in forma Elixirij reservari poterit. Tenz. in Med. Diastat.

Vires. Remedium est praesentaneum cum ipse susinet pestis, tum aliorum deteriorum.

N. Circumfertur & Tinctura Mu-

mia ex 4. suis Elementis à se invicem separatis denuo coniunctis, quam qui voluerit videre poterit apud Tenz. in Med. Diastat.

4. Alia Tinctura seu Arcanum carnis humanae.

1. Carni humanae superfunditur Ψ rectif. per \mathcal{S} & \mathcal{P} (4) decantato Ψ , invertatur e. dem.

2. Spir. Θ is, per vices vt magnam eius quantitatem imbiberit, hinc exicca, habes carnem conditam summe proficiam.

3. Ex hac extrahe Tincturam cum Spiritu Vini, vi digestionis in summan fragrantiam redacto. Circulando defeca, ex fecibus calcinatis sal extrahe, idque depuratum Tincturae admisce, & abstrahere. P. I. Fab. Myroh. c. 11.

5. Ol. Oliu. Mumiat.

\mathcal{R} . Mum. ante paratam, (induratam) scinde per minima, digereque cum Ol. Oliuar. vase H. C. per mensem. Hinc transfunde in cucurbitam vitr. atque in \mathfrak{MB} . exhalet Mercurius, donec nullus exeat faex, & Mumia tota dissoluta sit. Solutiorem digere aliquandiu \mathcal{S} & \mathcal{P} 20. cum Ψ , postea eundem abstrahere, & remanet \mathcal{O} rubicundum & odoriferum.

N. Quercetanus recipit recentem.

Vires. Omnes Balsami naturalis habet proprietates, venenatis & pestilentib. affectibus conducit. Quercet. Spagir.

6. Ol. exaltatum.

\mathcal{O} hoc dicto modo paratum exaltari amplius potest, si cum Ψ aliquandiu digeratur, Ψ iterum abstrahatur, idque aliquoties (3. 4.) repetatur.

Vires. Tinctura seu oleum hoc Mumiae

miæ exaltatum, tanta dicitur pollere facultate viuifica, vt nulla sit particula, quam ipsa non penetret, nullum vlcus, nullaue corruptio quàm non curet, si ipsius exhibeas bis quotidie per aliquod tempus gr. 4. 5. cum decocto conuenienti Querc.

N. *Libanius Carnibus recentibus incisus addit parum* Θ *is & sp. Terebinth. macerat vas. claus. colat & fetorem aperto vase exhalare sinit, post destillat per* Ω *vel* \times *rectum, additroque moscho, & V digerit.*

7. *Aqua Diuina.*

R. *Totum Cadauer cum Ossib. Carnib. Viscerib. (perempti scil. morte violenta:) secetur in frustula minutissima, probeque subigantur omnes corporis partes, ne quid maneat incommixtum. Hinc destillabis vice secunda.*

Vires. Sunt qui Aquam hanc Diuinam magneticâ suâ virtute maximopere depredicant.

Nimirum:

Guttulas aliquot Sanguinis, (sc. 3. vel 9.) ex *Ægro* aliquo extracti, miscent cum aliquota parte, (5j.) dictæ ∇ æ, Δ ique apponunt, quod si sanguis & ∇ inuicem misceantur, intra breuetemporis spatium (hor. 24.) sanitatem promittunt, sin incommixta manserint, breui mortem subsequuturam autumant. In defectu sanguinis similiter procedunt cum excrementis, sc. \square , stercore, sudore, sanie, & similibus. Quæ tamen maiori Dosi adhibent.

II. *Cutis* commendatur in difficili partu & affectib. hysteriis, (si uenter ea ligetur,) in aridura & contractura articulorum. (si chirotheca inde facta induantur.)

III. *Pinguedo*, roborat, discutit, mul-

cet dolores, remouet contracturas, cicuticum duritiem lenit, foueas post morbillos relictas explet.

P R Æ P A R.

Linimentum, misce axungiam cum spir. \oplus i exactione & redactione relinquitur aliquod viscidum.

Vires. Penetrans est, usumque habet in ariduris.

IV. *Ossa humana*, exiccant, discutunt, astringunt, fluxus quoscunque sistunt, adeoque utilia sunt in Catarrho, fluxu mensium, Dysenteria, Lienteria: Insuper articulorum dolores com-pescunt.

N. 1. *Usitatum est recentiorib. purgantibus ea admiscere.*

N. 2. *Adhibemur & dentes è maxillamortui euulsi, commendanturque ad morbos maleficio introductos (in suffitu.) & ad corrosos dentes enellendo, (si sepius illis tangatur,) Hartmann. in practic.*

P R Æ P A R.

1. *Puluis s. Cinis* fit l. c. calcinando in fornace figulina.

2. *Ossa preparata* fiunt l. c. cum ∇ conueniente læuigando.

3. *Magisterium* fieri item potest l. c.

4. *Olenum* fit destillatione per Ω v. l. 2.

Vires. Discutit, anodynum est, ideoque insigne antipodagricum.

V. *Medulla ossium*; commendatur summe ad contracturas membrorum. zur lähme der Glieder.

VI. *Cranium* ad capitis morbos conferre compertum est, & nominatim ad Epilepsiam, vnde & varias passim compositiones Antepilepticas ingreditur.

Laudatur autem præcipuè Os triquetrum

quetrum temporum ceu peculiare Epilepsiae specifi-
 quum. *preciosissimum aduersus Epilepsiam dili-*
genter asseruare fas est.

PRÆPAR.

1. *Cranium calcinatum* fit l.c. in fornace figulina.

2. *Cran. praparatum* fit è calcinato cum ∇ antepileptica, v.gr. Flor. Tiliæ læuigato.

3. *Magisterium Cranij* fit l.c. soluendo in spirit. aliquo acido, v.gr. sp. \oplus & præcipitando.

Dosis ad \mathcal{D} j. vel $\mathcal{Z}\mathcal{S}$.

4. *Magisterium compositum seu spiritus Cranij Essentificatus* fit, si liquori acido, oleo ac sali volatili, Sal quoque fixum ex \odot extractum coniungatur, & postea simul per mensem philosoph. in cinere illa digerantur ac y-
 antur.

Vires. *Antepilepticum est, cuius vires vulgarij antepilepticorum facultates longè superant.* Brendel.

5. *Oleum* fit destillando crania contusa per Retortam. Exit liquor \odot & \odot volatile.

N. *Officinis hoc vulgare est incorrektum, præstaret tamen cum ∇ rectificasse.*

Dosis gr. iv . ad vi .

6. \odot volatile vna opera cum oleo acquiritur.

7. *Extractum s. Tinctura Cranij.*

℞. Crania 2. vel 3. grossè contusa, digere \odot aliquot (14.) & cohoba cum spr. Iuniper. vel Saluiæ ad eminent. digit. 4. & affuso, macera in phiola longi colli optimè clausa ∇ \odot (12. 13. 14.) Hinc exprime per torcular perquam fortissimè, & exhibit liquor rubicundus oleosus. Cola & abstrahæ in ∇ , ad consistentiam sapæ.

Vires. *Extractum hoc digestum & perfectè depuratum, tanquam thesaurum*

Dosis \mathcal{D} ss. ad \mathcal{D} j. cum sua ∇ propria \mathcal{H} at. *Quercetan. Pharmac. restit. cap. 26.*

8. *Extractum seu Galreda Theophrasto*

℞. Limatur. Cranij, digere cum ∇ (saluiato \odot 15.) dein destilla per \odot (præmissaque maceratione \odot 15.) cohoba vice tertia: tandem destillatum circula, (\odot 5. 6.) & ∇ MB separato, Essentiam instar coaguli serua.

Dosis g. 5. 6. quotidie. *Quercet. de Med. Spagyr. præp.*

VII. *Vsnea Cranij* (i.e. Muscus nascens in cranio interempti, aëri exposito,) altringit validè.

Vsulque magni est in Hæmorrhagia quacunque, v.gr. narium (inditus N. 1. *Sunt qui Vsneam in manibus retentam Hæmorrhagiam quamcunque incantamenti instar, suppressere tradunt.*


N. 2. *Adnasceitur & aliis Ossibus aëri expositis Vsnea quadam, quam vi-
 liorem quidem reputant, verum & huic magnam vim adstringendi in esse, experientia docuit.*

Ingreditur Vsnea Cranij compositionem Vnguenti Sympathetici s. Magnetici v.l. 2. c. 87.

VIII. *Ex Cerebro sunt.*

1. *Spiritus Cerebri humani. Aqua aurea dicta.*

℞. Cerebrum hominis iuuenis (infra an. 24.) sani, violenta morte perempti, cum omnib. membranis, arterijs, venulis & nervis, cum medulla spinali tota, conuassâ & affunde aquarum Cephalicarum, (fl. Tilia. Pæon. Beton. Ceras. nigr. Lauendul. Lil. Conuall. inprimis Diaphoreticis in acutis) q.s. ad eminent. dig. 4. vel 5. relinquatur aliquandiu.


diu, postea per cohobia ꝑ entur. Ex fecib. calcinatis elice Sal, quem deinceps cum  u facto coniunge & totum curiosè serua.

Vires. *Antepilepticum* insigne reputatur.


Dosis à ʒj ad ʒv. Hartm. in pract.

N. Ex Cerebro Alcis insigne itidem *Antepilepticum* simili ratione parari poterit.


2. Oleum Cerebri.


Substantiæ Cerebri admisce nonnihil salis commun. ac destilla per ʒm viream ex .

Vires. Insigne quoque *Antepilepticum* est, caputque summe confortat.

N. Tota ferè Cerebri substantia in  redigi poterit, hinc parum Salis expectandum.

3. Aqua Antepileptica.

ʒ. Cerebri humani lb. iij. Aqu. Lil. Conual Lauendul. primul. Ver. Vin. Maluat. an. lb. iij. stent infusa  ʒ. deinceps entur per ʒB.

IX. Ex felle humano fit Extractum cum , quod auri instillatum mirè surditari subuenit.

X. Cor. Epilepsiæ medetur, (siccatum & exhibitum.

Ethæc sunt quæ de Medicamentis ex Homine de promptis cõpendij ratio scribere permittit, vltiorem farraginem qui cupit, passim apud Authores inueniet. Peculiarem quoque inde conscripsit Tractatum Clarissimus Dn. D. Daniel Becker, Professor & Physicus Regionontanus, qui primum in 12. postmodum superiorib. annis in 4. sufficienter augmentatus prodiit.

Lacertus.

Vid. Insectorum Classem.

XXIV. Lepus.

Lepus Hase.

Animalculum est timidissimum ac fecundissimum, quoquo tempore coiens.

OFFICIN. NAT.

1. Cinis Leporinus. 2. Caput. 3. Oculus. 4. Sanguis. 5. Pulmo. 6. Cerebrum. 7. Cor. 8. Iecur. 9. Fol. 10. Renes. 11. Testiculi. 12. Vterus. 13. Coagulum. 14. Talus. 15. Axungia. 16. Stercus. 17. Pili.

1. Cinis fit ex Lepore integro combusto (præstat qui Verno tempore captus,) vel ex pelle tota, ad nigredinem cinereumue volorem incinerata. Præstantissimum Medicamentum est in calculo.

Dosis ad ʒj. & ʒß. vel ʒj.

Alopeciis item & Pernionib. extrinsecus medetur.

N. Laurenberg. leporem non calcinat, sed animal decollat, ollaque inditum exiccat in clibano, pulu. exhibet.

2. Caput Alopeciæ subuenit, (cinis cum melle inunctus,) dentes dealbat, (cinis in dentificiis.

3. Oculi Leporini Martio capri, valent ad partum difficilem, secundinas & molam propellendam, (siccati scilicet cum pipere sine ulla compressione, impositique vertici ut pupilla verticem tangat.

4. Sanguis illitus cutis vitia in facie, vti lentigines vitiliginemque sanat; assatus, Dysenterias & Caliacorum profluuia sistit, calculum comminuit.

5. Pulmo suspiriosos iuuat, Epilepsiam curare dicitur, (muria conditus & quotidie cum Myrrha comestus per mensem;) perniones sanat (impositus.

6. Cerebrum gingiuis infantum affricatum dentitionem faciliat, tremores

artuum emendat (*inassatum & mansum.*)

7. Cord dicitur itidem Epilepsiam curare (*simili modo quo pulmo adhibitus,*) dolores vterinos arcere, (*pulis assumptus.*) Quartanæ peculiariter mederi, (*in partes tres dissectum & præmissis vniuersalibus initio* 3. *Paroxysmorum, tertia parte singulis vicib. propinatum.*

8. *Fecur* fluxum sedat alui, Iecinerosisque opem fert.

9. *Fel.* Ophthalmicum & Oralgicum insigni exhibet.

10. *Renes & Testiculi* calculosis propinantur, (*siccatis.*) conceptionem inuuant (*à mensib. assumpti.*) mictionem inuoluntariam corrigunt..

11 *Testiculi.* Vrinæ incontinentiam tollunt, Vesicæ morbis subueniunt, ad conceptionem faciunt, (*puluerisati & assumpti.*

12. *Vterus* itidem conceptionem promouet (*siccatus & à mensibus propinatus*

13. *Coagulum* sanguinem concretum discutit, conceptionem promouet (*post menstruas purgationes vuluæ cum butyro impositum,*) potum v. partum enecat. Epilepsiam arcet, &c.

N. *Præstantissimum est quod eximitur antequam aliud quid, præter Lac maternum degustauerint.*

14. *Officulum Tali* (*der Hasensprung*) commendatur ad arenulas, Colicam, Epilepsiam, partusque enixionem (*puluerisatum & exhibitum.*

N. *Idem de Vertebriis cauda affirmant.*

15. *Axungia* extrinsecus applicata, maxime si vetusta sit, tanta pollet attrahendi vi, vt vel spicula cuti infixæ eliciat; insuper abscessus rumpit, dolores

dentium medetur, (*pone aures posita.*

16. *Stercus* calculosis prodesse dicitur, (*cinis exhibitus,*) Dysentericæ conuenit, (*potum*) ambustis medetur (*impositum.*

17. *Pili Limentis* sanguinem sistuntib. miscentur.

XXV. *Lupus.*

Lupos, Lupus, VVolf.

Animal est audax, rapax, vorax, cani non ab simile, vnde & Canis syluestris nonnullis Venatorib. audit.

OFFICIN. NAT.

1. *Dentes.* 2. *Cor.* 3. *Hepar.* 4. *Intestina.* 5. *Axungia.* 6. *Ossa.* 7. *Stercus.* 8. *Pellis.*

Vires.

1. *Dentes* argento inclusi infantulis familiares sunt, quib. gingiuas sc. fricant, dentibusque erupturis patefcere faciunt: alligati pauores eorum prohibent.

2. *Cor* comitialib. prodesse fertur (*tostum & tritum.*

3. *Epar.* Epatis vitiis, confert, idèoque & Hydropicis ac Emaciatiss, nec non & tussientib. (*siccatum & exhibitum.*

4. *Intestina*, inprimis ad colicos dantur dolores, quos itidem arcere dicunt circumligata: hoc item fertur de corio.

Dosis Intestin. arefactor. & puluerifator. ʒj.

5. *Axungia* non vilioris virtutis est, quam canina: calf. digerit, articularib. morbis medetur, oculorum lipitudini confert, *sicæ fricentur.*

6. *Ossa* ad morbum intercostalem, vt & ad ictus puncturasque valent.

7. *Stercus* Colicis confert (*exhibitum,* (3. 1.) *vel brachiis, cruribusue alligatum*

gatum vinculo, ut nonnulli volunt, confectum ex lana à lupo laniata, vel ex coriocervi. *Vid. Forest.*

8. *Pellis lupi* commendatur itidem ad dolores colicos mitigandos (facta inde stragula, vel cingulum cuius pili ventrem tangant.

PRÆPAR.

1. *Oleum* fit si *Lupus* in *Oleo* decoquatur.

Vires: *Podagricos dolores* mitigat.

2. *Essentia Sanguinis Lupi*, efficax ad dissoluendum sanguinem coagulatum. *Hartm. in pract.*

XXVI. *Lynx.*

Αβγζ, *Lupus ceruarius*, *Lux*, *Thieger VVolf.*

OFFICIN. NAT.

1. *Axungia* 2. *Vnguis*,
vires.

1. *Axungia* conuenit articulis resolutis, conuulsis, luxatis.

2. *Vnguis* argento & auro includitur, gestaturque aduersus morbum Comitalem & Spasmodum, (loco amuletii.

N. Præfertur qui in dextro pede pro pollice est.

XXVII. *Moschus* s. *Moschi Capreolus.*

Dorcas Moschi, *Gazella Indica*, *Bisam Thier.*

Est Animal exoticum Capræ non multum ab simile, vulgare in Regno Cathai, Pegu, (Ditionis magno Cham subiectæ) & ut alii volunt in Ægypto aliisque locis: colitalpes, nardis victitat, aliisque herbis odoriferis.

N. Transuehi quidem cepit in Ita-

liam, verum citra emolumentum, nec enim *Moschum* exhibet, nec vitale diu superstes est.

Moschus Bisam.

Est excrementum seu sanies inclusa Vomica circa umbilicum, dum ♀ is æstro animal id percellitur, enata, videlicet Vomica hanc dum dolet, ac lapides vel arborum truncos fricat, adeoque dirumpit, saniem inibi contentam effluere facit, lapidibusque adhærescere, hinc calore Solis ulterius elaborata in moschum odoris suauissimi facessit.

N. Sunt qui ex Vomica abscissa, solique aliquantulum exposita Moschum colligunt, sed hic ut priore immaturior est, ita & bonitate vilior. Adulteratur variis modis, verum cui syncerus & verus non incognitus est, eidem ex odore & sapore, quin & ex pondere fraudem deprehendere non erit difficile. Nonnulli probant, an Moschus legitimus sit, hoc modo: Pondus libra examinatum in labellum humore perfusum immittunt, tum paulo post iterum aqua lance ponderant, quod si superferatur, syncerum & legitimum existimant: sin cedat, spurium & adulteratum.

Vires. Calfac. 2. sic. 3. attenuat, discutit, cordialis est, & alexipharmacum, hinc & cephalicum.

Usus præcipui in omnibus affectionibus cordis, palpitatione (pœnis ac illius) Spiritus nimirum vitales fouet, inferat, recreat: Hinc in affectionibus capitis & nervorum, à frigore & crassis humoribus oriundis, tum & in dolore colico, &c.

Externè detergit tenues oculorum albugines, & humidas defluxiones exiccat, ad Venerem concitat, auditum imminutum restituit, (auribus inditus cum cottone.)

Dosis

Dosis gr. iv. v.

N. Vterum quia suavi suo odore alliecit, mulieribus uteri ascensui obnoxiiis maiori cum utilitate pudendis ad retrahendum uterum illinitur.

P R E P A R A T A .

1. Spe. Diamosch. dulc. } Vide
2. amar. } Dispens.
3. Confectio Moschardina, s. Trochisci Moschardini. v. l. 2.
4. Oleum Moschellinum, (compositum) v. D.

XXVIII. Mulus, Mula.

Ἡμίονος Maulesell.

Animal est viuacissimum, genitum ex Equa & Asino, ideoque sterile.

O F F I C I N . N A T .

1. Vngula. 2. Vrina. 3. Stercus. 4. Cor.
5. Epar, &c.

Vires.

1. Vngula suffitu menses nimium fluentes sistit. Cinis potus steriles reddit; illitus alopecie subuenit.

3. Vrina cum luto suo pedum clauos curat.

3. Stercus Menstruum fluorem sistit & Dysenterie opitulatur (combustum rufum, cribratum & potum,) dolori Lienis subuenit.

4. Cor, Epar, Renes, Vterus, Testes Spuma oris: singula hæc sterilitatem inferre dicuntur.

XXIX. Mus,

- Domesticus μῦχος Mansz.
- Mūs { Araneus.
- { Alpinus.
- { Maior, s. Glis.

Mus domesticus est animalculum notissimum, vitæ brevissimæ, salaci-

tatis maximæ.

O F F I C I N . N A T .

1. Mus ipse 2. Stercus.

Vires.

1. Mus viuus dissectus & impositus extrahit aculeos, spicula, sagittas, &c. curat ictus scorpionum, extrahit venenum. Cinis mictioni inuoluntariæ f. nocturnæ medetur, (potus) alopecie succurrit (illitus,) tussi refractariæ medetur, (cinis, vide Forest.

2. Stercus mouet aluum infantum (exhibitum gr. 3. 4. 5. 6. vel subditum) inseruit clysterib. & glandib. alopecie succurrit, furfuresque capitis abstergit (illitus.) Calculos renum & vesicæ atterit: Condylomata, omnisque generis verrucas, ficus, mariscas & mora ani tollit. (cinis cum Vino coctus & applicatus.

Mus araneus, μυράνα Sorex nonnullis, Spitzmausz.

Vires. Affectibus sedis, peculiari Experimento est, (vstus & illitus cum axungia asferina.

Mus alpinus, Murmelthier, Murmentle.

Est animal alpium altissimarum incolæ, magnitudine cuniculos ferè superans, Hyeme integra dormitans.

O F F I C I N . N A T .

Solus Adeps commendatur ad genus neruofum & articulos contractos, rigidos, &c.

Mus maior, δῆμος, ῥάξ, Rattus, Ratte, Ratze.

N. Venenum in cauda gestare dicitur.

Vires. Stercora murium maiorum nouem numero deglutita, mulierculis nonnullis singulare habentur experimentum, quo mensib. obstructis succurrere moliantur. Plater.

Ovis, *ovis* 705,
Ovis, *S. haaf*,
Mas, Aries *hammell*
Veruex, i.e. Ar.
castratus
Fœmina, Ovis
Agnus, vide supra.

Ovis animal est inansuetum, timidum, lupo inimicum.

N. Coitus tempus est à Maio ad Augustum.

OFFICIN. NAT.

1. Cerebrum. 2. Fel. 3. Oesypus. 4. Lana succida. 5. Senum. 6. Pulmones. 7. Omentum. 8. Stercus. 9. Urina. 10. Vesica. 11. Caput, & Pedes. 12. Pediculi.

Vires.

1. Cerebrum arietis prodesse aiunt in fomno immoderato arcendo in morbis Epidemiis, (fixant cerebrum, cunque pinguedine in placentam redigunt, addendo Cinam. Nucist. & hinc exhibent.) Conradin. de Morb. Vngar. Facilitat dentitionem, (illitum cum melle.

2. Fel (lana susceptum, infantumque umbilico appositum) soluit aluum, carcinoma exterius sanat (illitum) aurib. purulentis auxilio est, (instillatum cum lacte muliebri.

3. Oesypus (succidarum lanarum pinguedo, vulgo Isopus humida dicta) conficitur hac ratione.

Lana succida è collo feminibus acofemorib. ouium, macerantur aliquot horas (6 7. 8.) in aqua feruenti, hinc feruefiunt iterum, agitanturque bacillo, donec totam pinguedinem in aquam depofuerint. Aqua hæc temotislans, magno impetu lignea rude agitur, aut ex alto in aliud vas effunditur, vt spumescat, sic sordes spumæ inhærescentes separari poterunt.

Reiteretur hæc depuratio, donec nihil spumæ amplius extet, collecta pinguetudo lauetur aqua pura, (aly malunt marinam.) manibusque agitur, donec candida euadat, nec aquam amplius inficiat, admodoque linguæ leuiter tantum astringat. Et hæc omnia sub feruido Sole fieri conuenit, Marth. & Diosc.

Vire. Emollit, resoluit, calefacit, dolores sedat, luxatis, contusis, & simil. conuenit.

Lana succida, *lân*, *lân*, schmutzige Schaafsuvolle, colligitur Æstate è collo feminibusque, eaquemollis & sudore referata.

Vires. Calfacit, emollit, lenit, conuenit optimè contusis, luxatis, casis, & sim. (cum aceto, oleo, vino imposita.) Cremata vim habet calfac. siccantem, acrem, mordacem, discutientem: Eapropter confert humidis mollib. tumorib. vlcereb. inueteratis; excrescentias cohibet, vlcera ad cicatrices perducit, fistulas auresque suppuratas sanat (indita.

5. Senum datum ex vino rubro, sanguinem sistit, diarrhæam, dysenteriam, & tormina ventris curat (in clysmate.

6. Pulmones, (vt & aliorum animalium carnosâ viscera) capiti impositi dolores & æstus mitigant, ferocesque spiritus sopiunt.

Hinc Vfus præcipui in phrenitide, vigiliis, &c.

7. Omentum calidum colico medetur dolori (impositum.

8. Stercus vim habet refrigerandi, exiccandi, aperiendi, discutiendi.

Hinc maximi Vfus in aurigine, (sumptum cum petroselino, &c.

Extrinfecus conuenit in tumore splenis, in thymis, clauis, verruca, tumorib.

morb. cutaneis, &c. Maximi itidem folaminis est in ambustis, (*puluerisatum & inspersum*).

9. *Vrina* (nigræ vel rubræ ouis) sumpta, aquam intercutem abigit; (idem facit & destillata).

Dosis $\mathfrak{z}\text{v.}\text{vi.}$

10. *Vesica*, (vt & capræ vesica, (cremata & exhibita, iis qui urinam inuiti reddunt, succurrit.

11. *Caput & pedes* veruecis in ∇ fluente optimè decocta, atrophix & contracturæ subueniunt, (*in balneo*

12. *Pediculi*, mira præstare dicuntur in arthritide vaga curanda. Exhibet N.9.

bubali cornu forma sua representans, solidum sine cavitare.

N.1. Tale nimir. videre licet apud viros rerum rariorum curiosos, Cornellium ac Ioannem Petraos, Materialistas huius loci celeberrimos.

N.2. Et cornu alterum pusillum in dorso gerere dicitur, quod eiusdem cum priore coloris, itidem apud Petraos profat.

Vires. Commendatur ad venena, contagia, aliosque affectus sudore opus habentib. ideoque loco unicornu in huius defectu esse poterit.

Datur in scobe puluerisata ad \mathfrak{ss} . vel \mathfrak{ssj} .

XXXI. *Ranunculus viridis.*

Ranunculus calamites (à calamis in quib. degit,) *Dryopetis Laub*, *Frosch*.

Est genus Ranarum terrestrium, reliquis minus, colore viridissimum, amans dumeta & loca aspera.

OFFICIN. NAT.

1. *Ipse Ranunculus*, 2. *Sanguis*.

Vires.

1. *Ranunculus sylvestris* couenit virib. cum rana aquatica, eiusque cinis vulnerib. inspersus mirificè sanguinem cohibere dicitur, *Clariss. Dn. D. Arn. VVeickhard. in Thesauro*.

2. *Sanguis* peculiariter pro Philtro commendatur.

XXXII. *Rhinoceros.*

Ρινοκερως, Rhinocer.

Animal est magnitudine Taurum, forma aprum æmulans, cornu vnicum in proboscide gerens, idque nigrum, fistile, cubitum longum, pyramidale,

XXXIII. *Serpens.*

ὄφις, Schlang.

Animal est astutissimum, exuias suas singulis annis bis exuens, Vere sc. & Autūno, Hyeme sub terra & præcipuè sub radicib. arborum, (Betulæ, Coryli,) sopitū quiescens, homini infensissimū.

N.1. *Serpentis nomen generale est multas serpentum species sub se comprehendens. Huius a. loci vulgare serpentis genus intelligimus à Caciliis, Viperis, &c. distinctum, quas damus infra.*

N. 2. *Præstant collecti initio Veris cum senectam deponunt, attamen non statim ab egressu è latebris hybernix.*

OFFICIN. NAT.,

1. *Integri combusti*, Caro, Cor, Ossa, 2. *Pinguedo*, 3. *Exuvie*, 4. *Fel*.

Vires.

1. *Integri combusti*, (pulvis serpentum,) scil. caro, cor, ossa ac epar, vim habent alexiteriam, sudoriferam, (non venenatam,

Vfusque præcipui sunt intrinsecus in omnib. morbis yenenatis ac malignis,

gnis, quales sunt pestis, febris petechialis, lepra & similes: Quinimo & phthysicos Gallicoue morbo laborantes, viperarum præcipuè vsu iuuari, seu secretum venditat Cardanus. Si scil. caro cocta comedatur, ius bibatur, pinguedoque spinæ & iuncturis illinatur. Nec est, quod vsus serpentum internum adeo formides, exintertate ac decoriatam carnem, abiectis tamen felle, cauda & interaneis, loco cibi assumere licet.

N. Caput abiicitur, quia maximè venenosum est, adeo ut dentibus solis vim suam malignam exerant. Cauda negligitur non quod venenata sit, sed quia ex ossibus tantum modo constet. Vesica fellea reiecitur, quia proxima est lacuna materia venenata, quæ inde duobus meatibus ad dentium vesicas, seu gingivas defertur, in quibus scil. spirituosior ac efficiacior illa fit, adeo ut si quis dentibus vipera etiam iam dudum interempta pungatur, veneno inficiatur, secus ac de felle constat, quo recenti canes moriuntur, siccato sine noxa vescuntur. Interanea non adhibemus ob stercorea vel oua adhaerentia, alias tamen his reiectis, sine noxa vsui esse possunt.

N. 2. Si placuerit Corda ac Epata seorsim seruire, secundum nonnullos. Thesaurum Medicum obtines preciosissimum. Verum me hercle, si quicquam peculiare à carne & ossibus, quantum vires attinet, tibi inde persuasum habeas, falleris. Falleris etiam, si (quod communis fert opinio, de glutinatione pulueris serpentini, (vel & cordium recenter extractorum, atque adhuc sese mouentium) ab ictibus serpentibus serpentum tutum te imagineris. Experto crede.

2. Pinguedo emollit strumas, oculorum rubenini & maculis medetur,

visum acuit, podagricos dolores mitigat.

3. Exunia partum facilitare creduntur, (ventri vel lumbis alligata, odontalgiamque (in gargarismis) mitigare; impetigines curant, (puluerisata vel incinerata & imposita;) alopeciis medentur, ac pilos nasci faciunt (illita).

4. Fel. Ictib. serpentum impositum, venenositatem in se allicit, Idem & de capite imposito affirmant,

PREPAR.

1. Puluis.

Pulueres serpentum tot compositionū circumferuntur, ut Agyrta ferè quisque peculiare sibi quippiam immaginetur. At quid opus est compositione, nec e. cor-rigi serpentes exenterati opus habent, nec stimulari, sat e. fortis eorum vis, sat turacarnosa ac ossea substantia, (Cor, Epar, Lingua, Caro, Ossa, vitote quæ minime venenata,) integer itidem si comburatur, venenatam exhalat naturam, (mallem tamen caput reiecis,) nihilominus tamen adscribam unum atque alterum.

Bezoarticum Animale simplex.

1. Serpentem excoriatum, (reiectis interaneis cauda ac capite) lava & exicca, hinc puluerisa, una cum spinæ vertebri, puluerem serua pro vsu.

Dosis à ʒss. ad ʒj.

N. Exiccatio vel perse in aëre peragi potest, vel in M.

2. Serpentes viuos, (non exenteratos aut excoriatos,) conice in ollam ac tege operculo, torrequæ ad ignem lentum, ut omnis pinguedo & humiditas consumatur, (absque combustionem tamen) postea redigantur in puluerem.

N. Prafero priorem, quippe metus

ne venenose partes sufficienter exhalarint.

Ex hoc fit

Bezoarticum Animale
compositum.

3. Pulu. serpentum, ʒij. Rad. Valerian. Angel. pimpin. Herb. Rutæ ana ʒj. M.F. puluis.

Dosis à ʒj. ad ʒij. vel ultra.

N. 1. Solus pulvis colubrinus valet aduersus araneas viuas & ∞, non vero ad pestem curandam experimento Vntzeri lib. de peste p. 195.

N. 2. Ex carne siccata extrahitur Tinctura ad V aut quidem melius cum *Quinquefolii*, vide Quercet. & Fab. Myrothic.

XXXIV. SUS.

us { Mas, Verres, Porcus, Eber, Borch
Borch, (maialis, i. e. porcus castratus
Fœminæ, Porca, Scrofa, Sævv.
Porcellus, Ierckel.

Animal est maximè pituitosum & humidum, multis morbis obnoxium, quales sunt, raucedo, angina, struma, febris, grando

N. Non datur animal, quod homini quantum interiora attinet, similis sit ipsa suo.

OFFICIN. NAT.

1. Fel. 2. Pulmo. 3. Pinguedo. 4. Ossa.
5. Talus. 6. Stercus. 7. Vesica.

Vires.

1. Fel suillum contra aurium vlcera, reliquaue omnia magno successu adhiberi scribit Diosc. pilor. prouentum impedit, cum lardo suillo ana ac ʒi. parte + acerrimi & Ol. Amygd. ana digestam, & illitum.

2. Pulmo mirificè prodest imposi-

tus attritui à calceamentis contracto.

3. Pinguedo (Adeps absolute dictus) calfacit minus, ideoque in vnguenta refrigerantia intertuit, inueteratos dolores lumborum & articulorum sedat, inuncta cum cinere straminis fabacei aut calce.

Lardum coctum & circumligatum ossium fracturas feliciter conglutinat.

N. 1. Pinguedo quæ è sue vereri fuerit, vel quæ sale condita, calidior ac efficacior est illâ, quæ tum è porcellis desumpta, tum insulsa fuerit. Sic & vetus axungia acrior est recenti.

N. 2. Sunt qui sola axungia verris, vice Sympathetici vnguenti vtuntur.

4. Ossa; aiunt ossa de collo suspensa quartana laborantibus esse auxilio, fides sit, penes expertum.

5. Talios (Astragalus) commendatur ad fracturas ossium, vt & ad colicæ capitisque dolores (vstum & exhibitum).

6. Stercus (succerda) emollit, discutit, hinc prodest in prurigne, exanthematibus, clauis pedum, aliisque tuberculis duris, (calide impositum,) Ictibus, medetur animalium venenator. (cum +. coctum) Hæmorrhagiam narium sistit, (in Tritum & illitum).

7. Vesica iuuat eos qui inuitilotium reddunt, cocta vel vsta & exhibita.) Eadem præstat pubi imposita. Vrinam ciere fertur. Plin.

PRÆPARATA.

1. Vnguenta ex pinguedine sunt varia.

E. gr.

Rosarum, Pomatum, quæ suis locis attigimus.

2. ∇ ad Atrophiam.

Fit è sanguine è fibris repurgato atque cum herbis bechicis refrigerantibus.

XXXV. Talpa.

Ἀπάλαξ, Σπάλαξ, Mus terrenus, Maulwurff, Scharmausz, Molt. wurff.

Animal est acutissimi auditus, hoc peculiare præ cæteris animalibus habens, quod non nisi sub terra viuere ac superstes esse possit.

OFFICIN. NAT.

1. Talpa ipsa. 2. Cor. 3. Sanguis.
Vires.

1. Cinis confert lepris, strumis ac fistulis, (illius cum albumine oui aut melle.

Intrinfecus cum Cereuisia aut Vinopotus curat Arthritidem vagam dictam, (die lauffendt Vahren, die lauffende Gicht,) & Scrophulas.

Dosis ℥℥. quotidie assumenda.

2. Cor, Herniam sanat, (siccatum puluerisatum & exhibitum, per dies 3. aut 4. scil. quotidie unum.

N. Præstat mense Maio collectum.

3. Sanguis recens illitus, capillis caluitiem decorat.

N. Vulgi opinio est, si quis talpam manu compresserit, ut moriatur, eum à febris eo ipso anno fore securum, quin & in Paroxysmo febrili manus retenta, insultus reprimere censetur.

XXXVI. Taxus.

Μέλις, Meles, Taxus, & Taxo Dachs.

Duorum est generum: Caninū quod pedes habet caninis similes, & porcinum, quod pedib. suis imitatur.

OFFICIN. NAT.

1. Integer incineratus. 2. Sanguis. 3. Adeps.

Vires.

1. Taxus integer incineratus cum succellu exhibetur pulmoniacis, sanguinem excreantib.

2. Sanguis puluerisatus lepræ conuenire dicitur, destillatusque pesti subuenire.

3. Adeps præcipuè Officinalis est, qui vti paulò crassior, ita & paulò calidior ac efficacior est suillo. Renum dolorib. auxiliatur, à calculo subortis, (inunctus vel in Clysmate adhibitus,) febrilem æstum mitigat, contracturis ac imbecillitatib. artuum succurrit (cum adipe vulpis catinè sylvestris.

XXXVII. Vipera.

Ἐχὺς vel Ἰχθυα, (Fœmina) Arabicè Alphe, Thirus, Viper Natter, Nater, Otter, Atter, Hecknatter, Brandt, Schlang.

Est species serpentis viuiparæ, serpentib. communib. venenosior, Hyeme in scopulis sopita delitescens, vel & terra oblecta.

N. 1. Vipera nomen nonnullis generale audit, omnique serpentum generi imponitur. In specie tamen hic sumitur pro eo, quod Italici Marassi nomine venit, licet adhuc controuertatur, utrum Vipera Italica cum Viperis à Maieribus ad Theriacam expetitis eadem sint.

N. 2. Viperis solis peculiare esse voluit, vinum foetum parere, vnde & Vipera, quasi Viuipara dicta sint, at tamen & in serpente sat magno, quem in Finlandia secui, foetus vinctos deprehendi.

N. 3. Non tota Vipera venenata ac lethifera est, sed solum caput & fel, reliqua ut caro, epar, ossa veneno carent, vide supra de Serpente.

Præstant 1. Fœmellæ, collectæ tempore

V V u u 3 pore

pore Verno, postquam aliquandiu à cauernis suis hybernis fuerint egressæ, victuque quadantenus refectæ.

2. Iuenculæ, (non effætæ, nec grauidæ,) quæ ablatiis partib. auferendis, diu adhuc mouentur, quæque degunt locis aridis & montanis.

Vires. Vide in *Serpentum descriptione*.

Nimirum:

Vires ibidem recensitas præ aliis serpentum generib. Viperæ excellenti gradu obtinent. Præter eas sunt qui Viperæ caput ad anginam notham commendant (*collo appensum*).

P R A E P A R.

1. *Oleum ex Viperis.*

℞. Viperar. nigrar. ℔. iij. Ol. Sesamin. sextarium. j. β. in vase vitreato angustioris probè obturati, (ne vapor inde exhalet,) incoquantur, donec caro ab ossib. decidat, dein cum refrixerint, respondentur. Andernacus.

N. Alij per descensum eliciunt ex Viperis sc. capite, cauda, & c. orbatis.

Vires. Cutim extergit & impetigines, aliaque id genus vitia sanat.

2. *Sal Theriacum* s. Theriacale, vide *Dispens. Aug.* & si placet *Querc. in Phar. Rest. Aetium & Galenum.*

2. *Trochisci de Viperis*, v. *Dispens.*

N. 1. Sunt qui Theriacam de Cacula, (*Cacilia BlindkSchleich*), confecerunt, summoque cum successu tempore pestis ad sudorem eliciendum semel ac iterum propinarunt. Gesn. de *Serpent. Schvuenck feld. ex Platero.*

N. 2. Fieri potest & *Vinum Viperinum* (i.e. in quo Viperæ interfectæ sunt,) ad Elephantiasin celebre (bibitū) Galen.

3. *Alcohol Viperarum* describit *Burggr. in Biolychn.*

4. *Puluerem alium egregium repe-*

ries in Pharmac. Poterij.

5. *Essentiam Viperarum in Myroth. Fabr.*

⊖ *Viperarum volatile*, ♂. *Spiritus*
& ⊖ *fixum & fixatum.*

Viperæ exiccatae, concisæ ac leuiter contusæ vna cum Epate & Corde, indantur in ♂ loricatam vsque dum impleatur, ♀ la in vas Recip. amplum gradatim. Exhibet, phlegma & Spiritus, hinc ⊖ volatile vndique laterib. Recipientis, colloque ♂ adhaerens, tandem ♂ foetidum & crassum, quod charta separandum. Exemplum v, ⊖ volatile purificetur in phiola satis longa cum amplo, si placet ♀ sublimando per ♀ moderato Δ, ne aquositas aliqua ⊖ m sequatur, quod aucto Δ contingere solet. Salis huius partes sublimes reliquis sunt odoris penetrantioris, idcirco in ♀ optime clauso custodiantur.

Medicamentum summè penetrans, putredinem arcens, in toto corpore obstructions reserat, febres resoluit omnes & quartanas, si hora 1. vel altera ante paroxysmum propinetur in liquore appropriato, qui acrimoniam eius nonnihil obrundere, non tamen destruere valet. vipote in Emulsion. sem. melon. vel amigd. d. addita portinacula ∇ a rosar. vel cinam. & sacch. alb.

Dos. g. 6. ad ℥℔.

Figitur eodem modo, quo ⊖ volatile microcosmi, nisi quod loco Sp. proprii ex ⊖ fixo (qui paucus est in viperis & ex ♀ elicitur) sumitur spir. ⊖ com.

Vires. Sic fixatus medicamentum est immutabile, totum corpus permeans, resoluit enim Excrementa quacunque, eaque abstergit instar saponis, ubicunque locorum haerint non assimilata, et facile

facile & commode à materiâ repellatur, vel per sudorem, insensilem transpirationem, aut quod plerunque fieri solet per ☐, propterea in melancholia quacunq; podagra, renum calculo & vesica, obstructionib. viscerum omnibus ac putredine presentissimum est remedium. In deperditis virib. pertingit ad loca affecta, naturam confortat, adiuvat purgando se & resoluendo excrementa natura contraria. Dos. ℞. ad ℥j.

Essentia Viperarum.

℞. Iecinora & corda Viperum N. 100. exiccata & confusa cum V rectif. ☉ (3. vel 4.) digere extrahe s.a. Iunctis destillationib. adde (ad lb. j. Essentiæ) ☿ is volat. ℥j. fixi ℥ss. Digeret ut optime vniantur, adhuc ☒ vno atque altero, & habebis summum quod à Viperis sperari potest medicamentum.

N. Vsitatissima hæc medicamenta sunt in Italia, magnoque cum successu & agrorum applansu adhiberi dicuntur.

XXXVIII. Vitulus.

Μόχθ, Ἰταλός, Vaccæ proles Kalb.

OFFICIN. NAT.

1. Medulla. 2. Stercus.

Vires.

1. Medulla vitulina post ceruinam locum primum bonitatis obrinet, vim habet indurata & scirrhusa corpora emolliendi, siue musculis, siue tendinib. siue ligamentis, siue etiam viscerib. ipsis durities acciderit. Quin pessi quoque inde confiunt, vterum emollientes.

2. Stercus Erysipelati conuenit, (recedens illitum.

PRÆPAR.

☒ destill. pectoralis, v. l. 2.

XXXIX. Unicornis.

Μονοκερὸς, Remena, Reem, & Reim. Hebr. Alcherchedom. Arab. Vnicornis, Einhorn.

Animal esse dicitur equo quoad corpus non dissimile, ungulis fissis, cornu in fronte gerens procerum.

N. Cuius regionis incola sit nondum certum constat. Alianus, montes esse ait in intimis Regionibus Indie Or. asperrimos & feris refertos, ubi quæ apud nos bestia domestica sunt, feras aiunt esse, ut oues, capras, &c. In iis Monocerotem, quem vocant, Cartazenon, numerant, eamque magnitudine ad confirmata ætatis equum accedere, inbaque præditum, & pilis fulvis esse, &c. Nicolaus Venetus referente Andrea Baccio, inueniri eum scribit, in extremis Asia partibus, in Prouincia, appellata Macina. Narrat Marcus Paulus Venetus, in quadam Prouincia India occid. ea reperiri, Regnumque Basina Prouinciam eam appellat. Verum Andreas Baccius illorum Monocerotem nihil aliud esse autumat, quam Rhinocerotem. Ludonius Vartomannus in Itinere suo Æthiopico veram Monocerotis speciem descripsisse videtur. Cuius duo individua in Ciuitate Arabia Mecha sibi visa asserit, cratibus inclusa, quorū unū fuerit magnitudine equi 30. mensū: alterū magnitudine pulli equini vnius anni, vnum cornu media fronte gestantia, primū longitudine 3. cubitorū, alterum v. duorum: colore præditum balio, capite ceruino, cernice non admodum procera, nec valde crinita, eruribus macilentis, & tenuibus unguibus, caprinorum in modum fissis, &c. Et hæc animalia ab Æthiopia Rege ad Sultanum Mecha Regem missa fuisse subiungit.

OFFICIN. NAT.

Cornu, (Vnicornu,) quod ab Ebone distingui potest, fibris quas subtiliores exhibet, simul & solidius ac grauius ferè est. in cæteris ebur æmulatur.

Vires. *Sudoriferum est, Alexipharmacum ac cordiale. Hinc laudatur aduersus venena, morbos contagiosos, &c. Proficuum quoque censetur in Epilepsia infantum.*

Dosis à gr. iv. ad ℥℥, etiam integrum & ultra.

N. Andreas Buccijs qui integrum de Vnicornu Tractatum conscripsit, eius fragmenta annulis includere iubet, digitisque circumferre, vel de collo, loco amulæti, suspendere, ut cutim tangat.

X L. Vrsus.

Ἀρκίος, Bar.

Animal est crudele, catarrhosum, phlegmaticum, capite imbecillo, lumbis robustissimis, lasciuum. Inimicatur equis, asinis, leonib. dormit septimanas aliquot continuas.

OFFICIN. NAT.

1. Pinguedo. 2. Fel. 3. Oculus.

Vires.

1. Pinguedo calfacit, resoluat, emollit, discutit &c.

Vñs præcipui in alopecia (illita cum mure combusto:) medetur dolorib. arthriticis, parotidib. (Ohrnkele) tumoribusque alijs (cum seño taurino & cera ana in Empl. redacta,) vlcera crurum tibiærumque sanat.

N. 1. In Hernia s. Enterocèle utriusque prolapsu, muliercularum vulgare remedium (dorso s. ossi sacro illita).

N. 2. In usu externo pinguedinis huius observare expedit, quod pilis albedinem conciliat.

2. Fel commendatur intrinsecus ad morbum comitalem, ad asthma, & icterum.

Extrinsecus ad vlcera cancrofa ac serpentia (illitum) ad odontalgiam, oculorum hebetudinem, &c.

N. In Finlandia ubi Vrsorum datur copia, vulgatum rusticis est, fel exiccatum instar Panaceæ exhibere, sudoreque superueniente morbos quamplurimos fuisse solutos audiui.

3. Oculi dextere effusus exiccatus & infantib. appensus, terrorem quib. in somnis vexantur arcere dicitur.

Sunt & qui aiunt, Oculum Vrsi sinistro brachio alligatum, quartanam fugare.

X L I Vulpes.

Ἀλώπηξ, Fuchs.

Est animal astutissimum, naturæ caninæ quodammodo particeps.

N. Vulpium genera tria in Suecia ac Finlandia vulgaria comperi, nimirum præter vulgares dantur ibidem nigra & crucigera, linea scil. nigra, secundum longitudinem à capite ad caudam per dorsum decurrente.

OFFICIN. NAT.

1. Pinguedo. 2. Pulmo. 3. Iecur. 4. Fel. 5. Lien. 6. Pellis. 7. Sanguis. 8. Integra Vulpes. 9. Stercus.

Vires.

1. Pinguedo auxilio est conuulsionibus contracturis, tremorib. &c. (illita,) aurium dolorib. vulnerib. capitis & alopeciis.

2. Pulmo consolidat, abstergit, hinc valet ad vitia pulmonum & angustiam pectoris, (exiccatus saltem & combustus).

3. Iecur, Epaticis & Spleneticis confert.

fert, (simili modo ut pulmo adbibitum.

4. *Fel.* Oculorum Pterygio succurrit (illitum.

5. *Lien.* Lienis duritiei ac tumori medetur, (impositum.

6. *Pellis pilosa* membris refrigeratis ac articulari morbo infestatis feliciter imponitur.

7. *Sanguis* arefactus & tritus calculo Renum & Vesicæ medetur : Idem felicius præstare perhibetur sanguis recens, potius ad cyath. sc. vel & abdomini, pubi, inguinibus ac renibus illitus.

8. *Vulpes integra*, vel *Caro eius com-busta*, ad vitia pectoris commendatur.

Vulpes in aqua vel oleo optimè cocta, neminis affectibus, ideoque contrahitur ac dolorib. articulor. medetur (si locus affectus eo lauetur.

9. *Stercus* Scabritiem cutis sanat (cum ✚ illitum.

P R Æ P A R A T A.

Ol. Vulpinum, v. *Dispens.*

Loch. de pulmone Vulpis, v. *Disp.*

Pulmo preparatus s. lotus & exicatus.

C L A S S I S II.

D E A V I B V S.

XLII. *Accipiter.*

O F F I C I N. N A T.

1. *Cor. s. integra ales* & 2. *Sanguis.*
Vires.

Ἰεραξ, *Habich.*

Volucris est rapax, vorax & audax, visu forti prædita.

O F F I C I N.

1. *Accipiter integer.* 2. *Adeps* & 3. *Excrementa.*

Vires.

1. Inter oculorum vitiis succurrit, (in oleo coctus, oculoque inunctus.

Idem sentiendum & 2. *de Adipe:* Insuper omnib. vitiis cutis medetur, (oleum illud illitum.

3. *Excrementa* calefactoria vi adeò pollent, ut à Galeno ex foro Medico eliminentur, nihilominus tamen sunt, qui oculorum vitiis arcendis adhibeant, alii ad partum promouendum (exhibita vel in suffitu adhibita. (Hippocrates & Plinius ad sterilitatem commendandam propinant.

XLIII. *Alauda.*

Κόπος, *Alauda*, *Cassita*, *Galerita*, *Ierch.*

Alauda { cristata, hæc præualet,
non cristata,

1. *Cor* (*Alauda cristata*) femori alligatum, arcere colicum dolorem aiunt, idem quoque de *Corde* recenti deuorato perhibent, ut & de integra *Alauda*, (tosta vel una cum pennis incinerata, quæ Dosi ʒ. sen cochl. i. ac 2. per dies aliquot exhiberi poterit.

2. *Sanguinis recens* ex aceto acri aut vino calido haustus, calculosis efficacissimè subuenit.

X L I V. *Alcedo.*

Ἀλκυών, *Halcyon*, *Eiszwogel*, *Eisengart.*

Auis est speciosa, passere paulò amplior, rostro longo, colore tum caruleo, tum viridi, tum purpureo, iuxta glaciem riuulorum degens.

O F F I C I N.

Cor, quod siccatum & collo infantium appensum comitialè arcere volūt.

X L V. *Anas.*

Ἡΰνα, *Anas*, *Endtzwogel*, *Endt.*

XXX

Est

Est { Domestica.
Sylvestris.

Culinaris potissimum est, gignit crassos, melancholicos & superfluos humores.

OFFICIN. NAT.

1. Anas viva. 2. Adeps. 3. Sanguis. 4. Fimus.

Vires.

1. Vna sedat dolores colicos, si ventri imponatur, parte deplumata.

2. Adeps calf. humect. moll. diger. resoluit. Ea propter eo vimur in dolore interno & externo, scil. laterum, artuum, in neruorum frigida intemperie, &c.

N. Adeps hic primas præ reliquis habet, & præcipue Anatis sylu.

2. Sanguis alexipharmacus est, & hinc in antidota nonnunquam ascitur.

4. Fimus morsui venenatorum animalium imponitur.

X L V I. Anser.

X^{lv}, veterib. Ganza, Gans.

Anser { Domesticus.
Sylvestris. hic in Officinis præfertur.

Anser itidem culinaris maximè est, alimentum præbens excrementitium & melancholicum.

OFFICIN. NAT..

1. Pinguedo. 2. Sanguis. 3. Stercus. 2. Cuticula pedum.

Vires.

1. Pinguedo calore suillam superat, suæque subtilitatis ratione promptius penetrat ac resoluit, ideoque rectè per anum iniicitur, ad obtundendam erosionem in alto corporis sitam, alopecias capellis explet, rimis labiorum medetur, tinnitui aurium succurrit,

(aurib. indita,) spasmus neruosque rigidos sanat, (pinguedo ex anser, fascio carne cari, aliisque neruinis herbis, & assato collecta) aluum laxat, præcipue infantum, (umbilico inditum, ventriue impositum.

2. Sanguis Alexipharmacus habetur.

Dosis ad zij

3. Stercus calfacit & siccatur vehementer, incidit, aperit, menses secundum & urinas potenter mouet.

Hinc maximi Vfus in morbo regio, Scorbuto, Hydrope, (cum cochleari urina Capra vel Vituli destillata, continuarique potest eius vsus in dies aliquot (8.) Idem & tussi mederi perhibetur.

N. 1. Adeo calfacit ut & gramina, in que deciderit, urat, unde & à Galeno inutile indicatur.

N. 2. Præfertur viridiusculum in pratis tempore Verno collectum, quod siccatur calore moderato & puluerisatum à ʒb. ad ʒj. exhiberi poterit.

Alij in poture cens exhibent, cum liquore conueniente transfusum.

Dosis ʒi. vel ʒj.

4. Cuticula pedum exiccata & puluerisata ob astringendi vim commendatur in profluvio mensium sistendo.

Dosis ʒb.

Extrinscus cum successu pernioni imponitur.

N. Sunt & qui Medicamentis Ant-ictericis admiscunt.

X L V I I. Ardea.

Reyer, Reigl.

OFFICIN. NAT.

Pinguedo f. Axungia.

Vires.

Pinguedinis

Pinguedinis huius rarus vſuseſt in Medicina, lenire tamen dicitur podagricos dolores, oculorumque nebulas diſcutere, & viſum clarificare (*illita.*) Hinc & ſurdaſtris conferre (*indita auribus.*)

N. Proſtat nihilominus in gratiam piſcatorum, qui inde faciunt quo piſces alliciant.

Nimitum:

Piſces quia ardeam odio proſequuntur, huius odore concurrunt, ardeam cen hoſtem inuaſuri.

XLVIII. *Ciconia.*

Πέλαγος, *Storch.*

OFFICIN. NAT.

1. *Ciconia* ipſa. 2. *Stercus.* 3. *Ventriculus.* 4. *Axungia.* 5. *Fel.*

Vires.

1. *Ciconia* vim habet alexipharmacam inſignem, adeo vt contra omnis generis venena & inprimis contra peſtem præſtantiſſima cenſeatur, (*comeſta vel cinis eius aſſumptus*) inſuper neruoſis & articularib. affectib. ſuccurrit.

2. *Stercus* ſi ex ∇ hauriatur comitialib. aliisque morbis capitis prodeſſe credunt. *Craio.*

3. *Ventriculus* exiccatus ac pulueriſatus pro maximo ſecreto habetur in venenis.

N. Alij ſolam tunicam interiorem malunt.

4. *Axungia* podagricis & tremulis articulis vtiliter illinitur.

5. *Fel* ad oculor. vitia commendatur.

PRÆPARATA.

1. ∇ *Antepileptica:*

Fit ex pullo *Ciconiæ* integro, i e & deplumato, & exenterato, atque in fruſta diſſecto, admixtis antepilepticis aliis

ex MB *Sando.*

2. *Ol. ſtillatitium* quod ſat copioſum fundit.

3. *Sal volatile* quod iſdem copioſe inſtillatione exhibet.

4. *Arcanum Alexipharmacum de Ciconia,* vide l. 2. c. 51.

XLIX. *Columba.*

Περιστέρα, οὐς, *Daube.*

Avis eſt ſœcunda admodum, calidiſſima, cerealib. viuens.

Columba { *Domæſtica, Hauſdaub*
eſt { *Sylveſtris, Turtur, Tur-*
{ *reldaub, v. ſuo loco.*

OFFICIN. NAT.

1. *Columba* tota. 2. *Sanguis.* 3. *Tunica ventriculi.* 4. *Fimus.*

Vires.

1. *Columba* viua per medium diſſecta, capitiſque dùm ſanguine adhuc caler, impoſita, feroces humores mitigat, melancholicam triſtitiā diſcutit.

Hinc conuenientiſſimum Medicamen eſt in Phrenitide, Cephalalgia, Melancholia; Podagra.

2. *Sanguis* tepens oculis inſtillatus, dolorem, lippitudinemque ſedat, ſuffuſiones ſanguinemque diſcutit, vulnera recentia curat: Peculiariter cruorem è membranis cerebri erumpentem cohibet, podagricum dolorem mitigat.

N. 1. Præfertur ſanguis *Columbi* maris, iſque ſub ala dextra elicitus (ob naturam eius calidiorem.

N. 2. Succus ſanguinolentus expennarum calamis expreſſus, ſanguini ſubſtitui aptuſeſt, præferturque è pullis columbarum.

3. *Tunica vëtriculi* exiccata & pulueriſata commendatur in Dyſenteria.

XXXX 2

4. *Fimus*

4. *Fimus* vehementer excalefacit, (ob nitrosam facultatem, qua maxime pollet,) ideoqueurit, discutit, ruborem cutis sanguinem alliciendo excitat.

Hinc Vfus frequens in Cataplasmatibus & Emplastris rubificantibus. Sic tritus & cribratus, cumque semine nasturcij impositus, facit ad effectus inueteratos.

Cuiusmodi sunt :

Arthritides, Hemicrania, Vertigo, Cephalæa, dolores inueterati in lateribus, scapulis, ceruice ac lumbis, dolores colici, affectus apoplectici, lethargici, & simil.

Sic strumas aliosque tumores discutit, (cum hordeacea farina & +o mixtus & impositus) alopeciae succurrit (illitus,) Colicis confert, (in Clysteribus) defluxiones ad genua delabentes discutit, (cum \ominus & \odot).

Internè calculum atterit & vrinam pellit.

[Dosis \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} ij.

L. *Cornix.*

Корна , Kraye.

Vires. *Fimum in Vino potum, dysenteriam sanare tradit Kyranides.*

L I. *Coruus.*

Крѣзъ, Raab, Rappe.

OFFICIN. NAT.

1. *Pulli.* 2. *Cerebrum.* 3. *Pinguedo & Sanguis.* 4. *Stercus.*

Vires.

1. *Pulli* Cornor. incinerati commendantur ad comitalem morbum.

Dosis \mathfrak{z} j. singulis dieb. 2. vel 3. exhibita.

Sic & Cinis Coruorum ad Podag-

ram & Alphos commendatur.

2. *Cerebrum* commendatur itidem ad Epilepsiam.

3. *Pinguedo ac Sanguis* capillos reddit nigros, id quod & de ouis affirmant.

4. *Stercus* Infantum tussim, doloremque dentium sedare aiunt (de collo suspensum.

5. *Oua* sunt, qui in dysenteria exhibent. N. i. ij.

Gabelchover.

L II. *Coturnix.*

Орѣзъ, VVachtel.

N. *Comesta Coturnix*, noxia esse creditur, spasmobnoxiis.

OFFICIN. NAT.

1. *Pinguedo & 2. Excrementa.*

Vires.

1. *Pinguedo* oculis prodest maculas abstergendo.

2. *Excrementa* Coturnicum helleboro velcentium, (quod ipsis, ut quidam scribunt, in alimentum cedit,) singulari proprietate quadam conferre Epilepsii quidam volunt.

L III. *Cuculus.*

Кѣкѣзъ, Gucker, Guckang, Kuckug.

OFFICIN. NAT.

1. *Cuculus ipse.* 2. *Fimus.*

Vires.

1. *Cuculus* vltus commendatur ad calculum, ventriculi dolorem & humiditatem. *Rondel.*

Datur & vtiliter febricantibus patoroxymini tempore, medetur Epilepticis, &c.

2. *Fimus* morsum canis rabidi curat, (potus.

L IV.

LIV. *Ficedula.*

Συμφλας, Ficedula, à Ficum esu sic dicta Germ. Schneepfe, VVustling.

Vires. In cibo visum acutere dicitur.

L V. *Gallus, Gallina.*

Est { Mas, ἀλέκτωρ, Gallus, Han.
Fœmina, ἀλεκτορίς, Gallina,
Henne, Hun.

N. *Gallus Castratus, Capo dici solet, seu Capus.*

OFFICIN. NAT.

1. *Gallina (seu Gallus) integra.* 2. *Cerebrū.* 3. *Tunica Ventriculi.* 4. *Testiculi.* 5. *Fel.* 6. *Pinguedo.* 7. *Guttur.* 8. *Stercus.* 9. *Oua.* *Vires.*

1. *Gallina* (dissecta (præferunt nigram (sanguine adhuc calente imponitur capiti in phrenitide, Cephalalgia, &c. Morfib. itidem venenatorum animalium simili ratione mederi aiunt: anthracib. imposita, venenū elicit, nec pretereundum, quod sanguinis eruptionē in vulnerib. recentib. sistat.

1. *Viva Gallina* (Gallus) circa auum deplumata ē bubonib. venenum extrahit, (imposita.

PRÆPAR.

Gelus, decoctum Gelatinum Gallinae (veteris. (Fit ex carne Gallinae in frusta concisæ, additisque pedib. vituli, veruecis, aut carne bouina per se in diplomate horas aliquot. (sex. sept. (vase clauso cocta & expressa.

N. *Ad liposunt Aromata & Δ cordiales, prout liber.*

Vires. Insigne est nutritivum & corroborativum.

2. *Contusum*, fit itidem ex carne Gallinacea, quæ coquitur, donec caro ab ossib. decidat: hinc contunditur vna cum ossib. fitque expressio cū vino

miscenda, & pro libito aromatizanda.

N. *Gallarum caro melior est quam Gallorum, nisi sint castrati, nigrarū vero quæ non pepererunt, melior est & lenior.*

3. *Ius galli veteris*: Gallus antiquus (annor. 2. 3. 4.) fatigetur imprimè, donec lassitudine cadat: hinc trucidetur, deplumetur, exenteretur, farciaturque medicamentis idoneis, coquatūque in aliquot mensuris aquæ, donec caro ab ossib. ferè decidat: Hinc coletur.

Vires. Ius illud per se vim habet molliendi, & ob nitrosas partes, quibus decrepitum illud animal præditum est, quæque fatigue illa exaltata sunt, virtute pollet incidendi, abstergendi, alui cieiendi, idque multo magis, si in eo Medicamenta similium facultatum incoquantur. Hinc celeberrimum est in dolore colico (coctum cum purgantib. & discutientib.) In tussi tartarōque pulmonum (cum bechicis elixum,) &c.

2. *Cerebrum* vim habet incrassandi, fluxūque compescendi.

E. gr.

Fluxum alui, (in Vro sumptum,) gingiuis ad dentitionem à mulierib. illinitur.

3. *Tunica interior ventriculi* extracta, siccata, (ad Solem,) & puluerifata, singularem vim habet tūm astringendi & corroborandi ventriculum, adeoque vomitum, & fluxum alui compescendi, tūm & calculum comminuendi.

4. *Testiculi* deperditas in morbis vires mirificè restituere dicuntur, semen prolificum suppeditant, & Venereas vires roborant, (recenter usurpati) febribus itidem medentur (assumpti).

5. *Fel maculas cutis aufert, (illitum:) oculis conuenit.*

6. *Pinguedo Gallinarum & Caponum calefac. humect. emoll. lenit, me-*

diæque interanferinam & suillam existit, harumque acrimoniæ obtundit, conuenit labiorum rimis, aurium dolorib. oculorum pustulis.

7. *Cuttur Galli* vstum & non censumptum, sed tostum & exiccatum, sub noctem ante canam exhibitum, proprietate sanat mictionem inuoluntariam nocturnam. *Solenand. f. 4. conf. 11.*

8. *Siercus* omnia eadem præstare aptum est, quæ columbinum, sed inefficacius, priuatim tamen colico & vterino dolori conuenit. Valet itidem maximè ad Icterus, Calculum & Vrinæ suppressionem.

N. *Præstantius habetur id, quod in stercore album est.*

Dosis ʒß. manè ac vespèri ☿ ♀ continuis 4. vel 5. exhibitum. *Quercet Pharm. Rest. c. 21.*

Extrinfecus exiccat achores capitis, saliamque scabiem manantem (cinis inspersus).

Luteum stercoris consolidat Vesicæ, exulcerationem, assatum in butyrorecenti, vel oleo olinarum, atque coniectum in frigidam, ut sordes secedant, & liquor olei supernatet in ductum penis injiciendus. *Harim.*

9. *Oua Medicinæ* exhibent testas, membranulas, ovi albumen, vitellumque.

Testa vim habent Lithontripticam, tartareamque mucilaginem incidendi.

Membranula vim habent diureticam intrinfecus & extrinfecus adhibita. (præputioque imponuntur infantum.

Albumen vim habet refrigerandi, astringendi, agglutinandi.

Vsufque crebri est in oculor. ru-

bedine, in conglutinatione vulnerum (cū bolo commun.) in fracturis, &c. Inferuit & anacollematis.

N. *Hippocrates exhibet febrientibus albumina N. 3. aut 4. ad refrigerandum & egerendum.*

Vitellum Ovi vim habet anodynæ maturandi, digerendi, laxandi, proinde vsu creberrimus Clysterib. immisceri, quin & cum salis tantillo mixtum infantum umbilico (in testa inglandis) imponi solet ad ciendam aluum.

PRÆPAR.

Paratur inde Oleum quod crebri vsus est in consolidatione vulnerum, rimar. in maturatione tumorum, &c. *Videatur Dispens. Aug. & Norimb.*

N. *Fit inde potus puerperis nostratibus vsitatissimus, vulgo Seiff dictus.*

℞. Vitel. oui N. 2. vel 3. Aquæ. Mens. 1. Vini M. 1. (plus minus) coquantur optimè pro potu.

LVI. Grus.

1. Grus, ein Kran, Kranich.

Vipio, i.e. pullus Gruum.

OFFICIN. NAT.

1. *Grus integer*. 2. *pinguedo*. 3. *Fel*. 4. *Caput, Oculi, Ventriculus*. 5. *Medulla tibiae*.

Vires.

1. *Auis hæc* quia nervosa est, nervosis ac membranosis partib. peculiariter conuenire statuitur.

Hinc Vsus ejus commendatur in dolorib. colicis.

2. *Pinguedo* surditati auxilio est, (auribus instillata,) Lienis duritiem, aliosque tumores renitentes emollit (cum + sc. litico subacta) rigori ceruicis velocissimè succurrit.

N. *Eiusdem natura esse dicitur cu-*

ius anserina pinguedo.

3. *Fel. oculis prodest.*

4. *Caput. Oculi, Ventriculus pulueris-
fata fistulis, cancris, & varicosis vlcereb.*

insperguntur.

5. *Medulla tibiae inferuit vnguento
Ophthalmico inde parando.*

LVII. *Hirundo.*

Χελιδών, χελιδών
Schvvalb, Schvvalbin

{ Domestica
{ *Haus-schvvalb*
{ Sylvestris (*Riparia, VVasser-schvvalb.*
Muraria, Spirschvvalb.

{ maior cum macula rubra sub gutture,
{ minor sine illa macula.

Domesticae in Aedib. nidificant.
Ripariae in ripis aquarum inhabi-
tant, vnde & aquatica dicuntur.
Murariae nidos suos muris templor.
seu parietib. aut rupib. appendunt.

intrinsecus impositus :) oculorum rube-
dini medetur: Ictui Viperino conuenit,
(*impositus.*

6. *Stercus* calfacit impense, discu-
tit, acre est.

Vsus praecipui in morsib. canis ra-
bidi, (*intrinsecus & extrinsecus,*) in do-
lorib. colicis & nephriticis, (*propina-
tum;*) aluum irritat, (*subditum.*

N. Praeualent Ripariae.

OFFICIN. NAT.

1. *Integra.* 2. *Cor.* 3. *Sanguis.* 4. *La-
pilli.* 5. *Nidus.* 6. *Stercus.*

Vires.

1. *Integra* Epilepsiae specificè subue-
niunt, oculorum hebetudini, lippitu-
dini, (*cinis cum melle illitus.*) Anginae
ac Vuulae inflammatae medentur, (*co-
mesta vel assumptus earum cinis.*

2. *Cor.* Epilepsiae itidem conferre,
memoriamque roborare aiunt: alij
contra quartanam deuorant.

3. *Sanguinem* peculiariter oculis con-
ferre volunt, praefereunt a. sub ala dextra
extractum.

4. *Lapillus* in pullor. nonnullorum
ventriculo, (rarò licet) inuenitur. Che-
lidonius dictus, grani lentis vel pisi
magnitudine. Hunc Epilepsiae puero-
rum conuenire volunt, (*brachio alliga-
tum vel collo suspensum.*

N. Ferunt crescente ☾ hunc potissi-
mum inueniri, atque in pullo primoge-
nito. Alij mense Augusto circiter pleni-
lunium eximunt.

5. *Nidus* auxilio anginae est (ex-

PRÆPARATA.

Aqua hirundinum fit vsitatiùs ex
Ripariis, v. *Dispens. Aug.*

LVIII. *Milvus, Miluius.*

*Итйос, VVey, VVeihe, VVurue, Küt-
telwueyh, Hünnerdieb.*

Animal est è genere Accipitrum acu-
ti visus, articularib. morbis obnoxius.

niger, robustus, hic vsi-
tator
Est { Maior } rufus propemodum, re-
{ Minor, rubeus, } galis dictus.
vorher VVeyh.

OFFICIN. NAT.

1. *Milvus incineratus.* 2. *Caput.* 3.
Epar. 4. *Sanguis.* 5. *Fel.* 6. *Stercus.* 7. *Pin-
guedo.*

Vires.

1. *Milvus incineratus* Podagrae,
Epilepsiaeque subuenire dicitur, (*ex-
hibitus.*

Dosis

Dosis ὁβ. ad θj.

LXI. Olor.

2. Idem, de *Capiæ* affirmant, ac *E-pate* incineratis.

3. *Epar* insuper oculorum Medicamentis adhibetur.

4. *Sanguis* podagricos iuuat, (cum *Vrtica mixtus & impositus*.)

5. *Fel Ocularis* additur.

6. *Stercus*, articulis cum successu imponitur.

7. *Pinguedo*, articulorum doloribus illinitur.

P R Æ P A R.

Sunt qui *Miluum* viuum in *F. Eq.*
40. & macerandum sepeliunt, & ex vermibus, qui ex eo procreantur, vnguentum ad dolores podagricos conficiunt. *Aldrouand.*

L I X. Motacilla.

Passer aquaticus Bach- { *alba κολλίπος*
steltze, Quecksteltze. { *flaua minor.*

Auis est circa fluentes præcipuè degens, cauda tremula.

O F F I C I N.

Ipsamet integra auis: Cuius vis mira prædicatur in atterendo calculo, (*pulvis potus*.)

L X. Noctua.

Ἡ νύξ, *Nacht Eule, Stein Eule, Kaurz.*

O F F I C I N. N A T.

1. *Caro.* 2. *Fel.* 3. *Pinguedo.*

Vires.

1. *Caro* curat Paralyticos, (*Plinio,*)
Melancholicos, & sim. (*Rabbi Moys.*)
Apostema Anginæ mirabiliter aperit & rumpit, (*cinis noctuæ integra, nec deplumata in guttur immixta.*)

2. *Fel.* ad maculas oculorum valet.

3. *Pinguedo*, aciem oculorum acuit.

Κύνος, *Cygnus, Schvvan.*

Auis est ad genus anserinum forma & victu, ideòque & facultatibus accedens.

O F F I C I N. N A T.

1. *Pulli.* 2. *Adeps.* 3. *Pellis.*

Vires.

1. *Pulli Cygnorum* in oleo cocti, addita medulla ceruina, podagricis profunt.

2. *Adeps*, Emol. lenit, attente adeòque utilis est hæmorrhoid. vuluar. duritie; oculos purgat, cum vino lentigines cutis tollit.

3. *Pellis*, plumis tenerrimis obrita colicos iuuat, & stomachi vitio laborantes.

L X I I. Palumbus.

Φάψ, *πάπα*, *Palumbus*, a, *Holtz-Daube.*

Conuenit cum columba, exustaque plumæ Ictericos reficere, calculosis, urinæque difficultatibus subuenire dicuntur.

L X I I I. Parus.

Carbonarius major,
Kohlmeise, Spiegelmeise.

Caudatus, monticola,

Schvartzmeise, Bergmeise.

Cæruleus montanus Meelmeise.

Fuscus, Palustris Cinereus
Kohlmeise, Aschmeise.

Ater Caninus, Carbonarius minor
Hundsmeise.

Cristatus, Strauszmeise,
Kotelmeise.

Ex his præfertur reliquis, i. efficax-
que

que prædicatur aduersus renum calculos & colicos cruciatus, (*in cibo vel cinere exhibitus.*)

LXIV. Passer.

Passer { vulgaris.
Sperling.
Troglotites.

Zaunschlifflein, Thurn Kœnig, Schneekœnig, Zaunkœnig, Nesselkœnig, Winterkœnig, Mauszkœnig.

N. Sunt qui à Regulo distinguant, eo-que paulo maiorem esse velint, pennisque illis aureis, quas Regulus in capite alit Passerem hunc destitui: Verum cum utriusque vires conueniant, alter alterius vices subire non nequit.

Vires. Passer troglotites maximopere commendatur ad calculum atterendum & expellendum, siue integer euulsis pennis sale conditus crude deuoretur, siue incineratus assumatur.

Passer vulgaris, quia auis salacissima est, commendatur ad venerem,) comestus præcipue cerebella.

Stercoris grana aliquot exhibentur infantulis ad ciendam aluum.

LXV. Pauo.

Tauis, Pauus, Auis medica, Pfau, Pagelun.

Auis est omnium reliquarum formosissima, viuacissima, (30. annos vivere potest,) vnde & Balsamica vi vigorosa adeo, vt caroeius sine corruptione per se diu conseruari queat.

OFFICIN. NAT.

1. Integer. 2. Adeps. 3. Fel. 4. Stercus. 5. Penna. 6. Oua.

Vires.

1. Ius pauonis pleuricis specificè

fertur prodesse, præcipuè si sit pingue.

2. Adeps, (cum succo rutæ & melle, colicos affectus optimè sanat.

3. Fel. oculorum hebetudini, fluxionibus, asperis item superciliis medetur.

4. Stercus proprietate Vertiginem & Epilepsiam sanat, (*in dies multos exhibitum*: (nimirum exiccatum & puluerisatum (3j.) maceratur per noctem in vino: Hinc traiectum per linteum, exhibetur continuando à nouilunio vsque ad plenilunium aut amplius, si opus sit. Crato miscet cum Saccharo & exhibet.

5. Penna, adhibentur in suffitu, aduersus vteri ascensum, Querc. in Ph. Rest.

6. Oua. exhibentur ad curandam arthritidem vagam dictam.

LXVI. Perdix.

Περδις, Perdina, Rebhun, Feldhun.

Auis est salacissima, viuacissima, (ad annos 16.) vefcens gemmis Coryli & betulæ, pramine & fegete virente.

OFFICIN. NAT.

1. Caro. 2. Medulla. 3. Sanguis. 4. Ie. cur. 5. Fel. 6. Penna.

1. Caro comesta semen atque lac auget, Venerem excitat.

2. Medulla ut & Cerebrum propinatum, Ictericos iuuare dicitur.

3. Fel ad affectus oculorum præfertur aliis.

4. Sanguis oculis cruore suffusis & recentibus eorum vulneribus illinitur.

5. Iecur. siccatum ad ignem & puluerisatum, morbo regio resistit, singularisque fertur antidotus contra febrim, si aliquoties in aqua millefolij assumatur.

Y Y y

assumatur. *Crato.*

6. *Penne* inferuiunt suffocationi vterinæ (*suffitus naribus admodum*) dolorib. colicis, aliisque mitigandis, discutiendis, (*fomentationis formula adhibita*.) & hinc cum mentha ac abrotano in forma facculi infantib. familiare Remedium existunt, ad tormina ventris compescenda.

LXVII. *Pica.*

Kissa, Aglaster, Egester oder Atzel.

Vires. Auis hæc maximè commendatur ad oculorum obscuritatem, ruborem, dolorem (*comesta vel incinerata*, oculisque indita, vel quocunque modo apposita.

Conuenit & Maniacis, Epilepticis, Melancholicis, (*cinis exhibitus*.)

PRÆPARATA.

Aqua Picae, Antepileptica. v. l. 2.

LXVIII. *Struthio.*

Struthiocamelus, Strausz.

Auis est maxima, exotica, facultate chylica celebris.

N. Duos videre mihi contigit *Lontini Anglia*, quibus facile fuit, obiectam *Chirothecam coriaceam* deglutire.

OFFICIN. NAT.

1. *Tunica Ventriculi.* 2. *Adeps.*

Vires.

1. *Tunica interior Ventriculi* ventriculum corroborat, calculosque dissoluit mirè.

2. *Adeps.* neruosis partib. conuenit, duritiem Lienis mollit, dolores Nephriticos mitigat, (*innectus*.)

LXIX. *Turtur.*

Τρῦζον, Turtel Danb.

OFFICIN. NAT.

1. *Integer Turtur.* 2. *Adeps.*

Vires.

1. *Turtur* virib. cum columba conuenit, peculiariter tamen commendatur in dysenteria ac præcipuè in sistendo mensium profluuiio, sine cinis combusto turturis, sine exinde extractum exhibeatur, (*Dosis gr. 4. 6.*) sine turtur deplumatus & exenteratus insuta in ventre *Mastiche*, ($\frac{3}{4}$ aceto rosaceo, inter assandum asperso (*butyri loco*), affetur, postmodumque in olla clausa exiccetur, atque in puluerem conuertatur, & cochl. j. singulis mane exhibeatur.

2. *Pinguedo* inter assandum collecta illinitur. Renib. ventri. pectori, inguinibus, &c. *Vide Forest. lib. 28. obseru. 10*

N. Sunt & podagricis, qui sibi persuadent paroxysmos arceri, podagramque præcaueri, si in cubiculo turtures alant.

LXX. *Vpupa.*

Έρως, VVidehopff.

Auis est melancholica, spurcissima, victitans vermiculis in stercore reperitis, Erucis, Scarabæis, &c.

OFFICIN. NAT.

1. *Caro.* 2. *Penna.*

Vires.

1. *Caro* eiusque decoctum proprietate sua colicos iuuat, (*assumpta*) *Anicen. Fen. 16. tr. 4. c. 11.*

2. *Penna*, dolores capitis demulcere dicuntur, (*imposita*.)

LXXI. *Vultur.*

Γύψ, Geyer.

Auis

Avis est pollens facultatib: animalib.
ac præcipuè odoratu.

OFFICIN. NAT.

1. Caro. 2. Pinguedo. 3. Cerebrum. 4. Fel. 5. Penna. 6. Fimus.

Vires.

1. Caro convenire iudicatur affectib: capitis, Epilepsiæ, Hemicranix, & simil. Decoctum cutis vitia sanare perhibetur.

2. Pinguendo, conuenit nervis.

3. Cerebrum subuenit capitis imbecillitati, (illitum vel naribus inditum).

4. Fel, Epilepsiam arcere dicitur (assumptum cum vino).

5. Penna, de pennis nugantur, si pedibus subdantur, quod partum potenter promoueant.

6. Fimus, nidore partum excutit.

CLASSIS III.

DE PISCIBVS.

LXXII. Anguilla.

Ἐχιδνα, Aal.

OFFICIN. NAT.

1. Pinguedo. 2. Caput. 3. Sanguis.

1. Pinguedo vulneraria est, capillos generat, (illita in alopecia:) auditum restituit, (instillata auri;) hæmorrhoides mitigat.

2. Caput anguillæ Verrucis cutis mederi aiunt, sc. si caput sanguinolentum adhuc, quo Verrucæ tactæ sint, terra cooperiatur, vt putrescat.

3. Sanguis adhuc tepidus colicos domare dolores dicitur, cum Vino assumptus.

N. Sunt, qui dicunt Vinum, in quo Anguilla suffocata fuerint, abstemios reddere, (bibitum).

LXXIII. Barbo.

Τριγλῆ, Barbo, Barbe, Barine.

Piscis est culinis satis laudabilis.

Officinis a. in vsu n. est, Oua tamen à ruricolis nonnullis assumuntur, ad ciendum vomitum & alium, quod sat violenter perficiunt.

LXXIV. Blatta Bizantia.

Ὠύζ, Vnguis odoratus.

Testa seu tegumentum est Conchylis, odore castoreum æmulans.

N. 1. Conchylum (Conchyla Indica) est species Conchar. oblongarum, que an lucubus nardiferis nascens, nardis viuunt, vnde & testa odorẽ castorei æmulum spirat.

N. 2. Sunt qui Conchylum & purpuram seu buccinum inter se confundunt, sed malè: Illud enim est ex genere conchar. oblongar. hoc ex genere rotundarum.

Vires. Vnguis odoratus internè laxat aluum, splenem molliat, vitiososque humores discutit.

Externè excitat suffitu fœminas strangulatu vteri oppressas, comitialesque. In reliquis idẽ præstare poterit, quod aliæ concharũ testæ, Vide Concha.

N. Blatta Dioscoridis sunt è genere Vermium, nobisque incognita.

LXXV. Cancer.

Καρκίνος, Καμάρδος Astacus, Krebs.

OFFICIN. NAT.

1. Cancer integer. i. e. substantia edulis.

lis. 2. Oculi. 3. Putamen.

Vires.

1. Refrigerant Cancri, humectant, dolorem sedant, ferocientes spiritus figunt.

Hinc Vfus præcipui in Aëstu, ac dolore Capitis & Renum, (confusi ac cataplasmati,) in Angina, (fit gargariſmus ex succo cancerorum, imò & internè succus exhiberi poterit.) In Atrophia (exhibetur internè succus cum ∇ , vel succo Chelidonia, Externè fieri potest Emplastr. ex canceris tritis, Epate Vitulino, atque Ol. Olinar. laurinoque. Tela ac Spicula è corporibus extrahunt, triti & impositi. Valent & in igne persico ac ambustis.

2. Oculi Cancri (lapides Cancri) refrigerant, siccant, abstergunt, discutunt, calculum atterunt, tartarum & sanguinem coagulum resoluunt.

Hinc Vfus magni in Nephritide, Pleuritide, Asthmate, dolore Colico, &c. siue crudi, critique assumantur, siue vsti & præparati, inferuiunt itidem dentib. abstergendis.

3. Putamen (testa) easdem cum oculis dictis vires obtinet Insuper scabiem puerorum ex falsis humorib. sanat, (oleo rosaceo permixtum & illitum, (februm intermittentium paroxysmos atcet.

N. Præstat putamen nouellum tenuius, quo induuntur, postquam crassius deposuerint annuatim.

PRÆPAR.

1. Cinis cancerorum (i.e. Cancri combustis,) exiccatorius est, proprietate pollet aduersus morbum canis rabidi, (assumptus cum radic. Gentian.) Rimas pedum ac sedis verruculas & carcinomata cum melle lenit. Sunt & qui caneros combustos propinquant in dysenteria.

N. Galenus hoc Medicamenti genus, quod ab Aëschione Empirico didicisse confitetur, maximopere ad morsum rabidi canis commendat, Aëschionemque caneros viros in patella area vssisse ait, donec in lauorem facile redigi poterant, idque per ortum Canis, Ole transseunte in Ω .

Dosis Cochlear partium ad \mathcal{C} 40. continuatum.

2. Oculi cancri præparati F. l. c. lauiando, cum ∇ , v gr. fœniculi.

3. Mag. oculor. \mathcal{O} v. l. 2.

4. ∇ cancor. fit è cancris \mathcal{M} vel \mathcal{F} e destillatis.

Vires. Vrinampellit, calculum atterit, sitim extinguit.

N. Quercetanus macerat caneros cum ∇ semperuiui maioris per \mathcal{C} m, hinc \mathcal{J} at, ter cohobando, adhibetque inflammationibus, combustis, carcinomatibus, quibus maxime prodesse ait, inprimis si sale ex remanentia elixiuato imbuatur. Pharm. Rest. c. 7.

5. Oleum seu Liquor Ocul. \mathcal{O} fit l. cum. per deliq.

N. Aliter.

℞. Pulu. oc. \mathcal{O} . \mathcal{J} . v. \mathcal{O} . \mathcal{F} . p. d. \mathcal{J} v. l. dig. in F. Eq. (15.) hinc coagula & extrahe \mathcal{V} . Tandem abstrahe \mathcal{V} & remanet \mathcal{O} .

Dosis g. 4. ad 6. Hartm. in pract.

LXXXVI. Carpio vel Carpo.

Κάριον \mathcal{C} , Carpus, Carpa, Karp, Karpff.

Piscis est notus, limo & mucro viuens.

OFFICIN. NAT.

1. Fel. 2. Axungia. 3. Lapis triangelaris. 4. Lapilli oblongi.

Vires.

1. Fel. oculor. heberudini & nubeculæ

nubecula subuenit.

2. *Axungia* neruorum affectibus calidis auxilio est.

3. *Lapillus Carpionis* (triangularis in capite repertus, *Karpffenstein*,) colicis dolorib. calculosis, comitialibusque conferre statuitur.

4. *Lapilli duo* supra oculos existentes, itidem ad Epilepsiam commendantur.

LXXVII. *Cetus & Manati.*

Cete, VVallfisch.

Cete nomen generaliter pisces vastos viuiparos denotat; specialiter tamen pro maxima eorundem specie sumitur, quæ ob vastam suam magnitudinem ac conformationem quadrupes æmulatur.

OFFICIN. NAT.

Axungia quæ medetur scabiei, (illita.

N. Ex hoc animalis sunt qui sperma Ceti officinarum desumi volunt, sed male, v.l. 3. c. 31.

Alij Ambram ei acceptam referunt, sed iidem falso

Manati.

Cetorum generibus annumeratur Piscis *Manati* dictus, à pedibus binis anterioribus quos solum refert, nimirum hos manus Hispani vocant, vnde & piscem manatum, ac si diceret manibus præditum, vocauerunt. Belgæ ob similitudinem capitis, quo Vacam mentitur, Vaccam marinam (*Seekuh*) appellant. Vid. Clus. Aldrouand. Monard. Gomar.

OFFICIN.

Lapis *Manati* seu de Manati, vulgo

Lapis *manatin* est lapis seu os crustaceum ex capite eius exemptum, id-

que variforme, nonnunquam enim dentes refert, vnde & nonnullis *Seekuh, Zahn*, i.e. dens Vaccæ marinæ audit, aliquando ossicula aurium inueniuntur, adeoque ossa auditus dicuntur.

PRÆPAR.

1. Præparat. fit ex calcinato s. cremato.

N. Præstat irrorare aqua aliqua conueniente v. g. *Fœniculi &c.*

Vires. Summe commendatur ad calculos renum & vesicæ comminuos, dolores nephriticos ac colicos sedandos.

Dosis ʒj. & ultra.

N. Sunt qui ad ʒj. ascendunt.

2. Magist. Fieri potest soluendo cum spiritu ☉ vel ☿ i, ac præcipitando cum ♀.

LXXVIII. *Concha.*

Muscheln.

Est genus piscium capite destitutum, testis (quas eodem nomine Conchas vocant,) circum vallatum, siue duplex testa illa sit & complicatilis, siue simplex.

Ex harum genere sunt & Margaritifera, quas vide infra & l. 3. c. 7.

Varias sub se species complectitur, secundum figuram coloremque ut plurimum nomina nactas, vel & peculiari nomine insignitas.

Sic sunt:

Conchæ longæ Rhomboides, squammosæ, striatæ, echinatæ corallinæ, leues, &c. Huc ostrea, mater perlar. blatta bizantia, Chamæ generum varior, &c. Umbilicus marinus, dentaliū, antaliū, purpura, conchylium.

N. 1. *Crescit Concha ac decrescit cum*

Y Y y 3 *cremento*

cremento & decremento Luna.

N. 2. Inter aquatilia nullum animal esse perhibetur, quod maiori desiderio teneatur, vescendi carne humana quam hoc ipsum.

OFFICIN. NAT.

1. Testæ. 2. Caro. 3. Margaritæ, de quibus l. 3.

Vires.

1. Testæ conchar. vim habent exiccandi, sudorem mouendi, abstergendi, &c.

Hinc Vfus earum internus præcipuè est in febrib. quib. interueniente sudore medentur.

Externè conueniunt in dentifriciis absterforiis, in mariscis & condylomatibus ani reprimendis (calx applicata.

PRÆPARATA.

Adhibentur autem conchæ, tùm puluerisatæ solummodo, tùm calcinatæ & puluerisatæ, vel & simul lege comuni, cum ∇ card. bened. & sim. læuigando præparatæ.

N. Nostratibus hoc nomen sibi communiter vendicat, genus conchar. oblongum, quod hisce in locis vulgaris reliquis inuenitur.

Ex horum testis fit famosum illud Antifebrile Crollianum.

Hoc modo:

Testis dictis affunde $+$, sterpernoctem, tunc extrahit mucorem, quo abrafo, calcina testas ad albedinem vsque, pulueremque serua.

Vires Ciet sudorem sat largiter, adeoque instante paroxysmo (præcipuè tertiano,) exhibitus febres soluit, maxime si vice secunda vel tertia iteretur.

Dosis \mathfrak{ss} . ad \mathfrak{zj} .

N. Crollius exhibet in haustu Cerevisiæ calida cum tantillo butyri.

Caro concharum, id est, sub-

stantia edulis, culinaris potissimum est, & in cibo quartanis conuenire dicitur.

LXXIX. Dentalium & Entalium.

Dentalium est conchula parua, oblonga, exterius asperula, intus leuissima, tubuli modo concava, alteraque parte rimam habens canini dentis instar acuminatam, vnde & dentalium nominatur.

N. Non piscis, sed vermis oblongus, ac tenuis dentalium incola est; adnascitur saxi marinis, conchisue vetustis.

Entalium itidem testaceum quoddam est marinum, instar parui cornu longiusculum, rectum & cauum, foris striatum, intus læue, rarò longitudinem digiti superans.

N. Videtur esse Dactylus Plinij.

Vires. Virumque etsi in Medicina hætenus parum, & non nisi in unguento Citrino vsitatum sit, attamen cum aliis testar. generib. ad similes affectus adhiberi posse verisimile est.

LXXX. Halec.

MAVIS, Halecus, Harengus, Hering.

Piscis est Marinus Oceano Baltico, aliisque Germaniæ Oceanis familiaris.

OFFICIN. NAT.

1. Vesicula. (Halecis anima dicta,) 2. Ipsum Halec & 3. Muria.

Vires.

1. Anima dicta N. IX. exhibitæ vri nam ciere dicuntur.

2. Integrum Halec salitum imponitur plantis pedum ad humores à capi-

re deriuandos, æstumque febrilem domandum. Cinis exhibetur ad calculum atterendum, (sit ut cancerorum.

3. *Muria*, (Garum) est brodium, quo Halec vel alius piscis fuerit conditum. Inferuit Clysterib. in coxendicum dolore & Hydroke, mundificat vlcera foetida, Gangrænam cohibet, strumas dissipat, ad anginas valet, (cum melle illitus.

LXXXI. *Huso Ichthyocolla.*

Ex ossis, *Hausen*.

Genus piscis est è maximis (longit. 24. pedum pondere nonnunquam ad lb. 400.) Cartilagineum, ossib. expers, (exceptis quæ in capite sunt, absque squammis, &c.

Familiaris piscis est Danubio, nimium ex Mari in Danubium desiderio aquar. dulcium ascendit.

OFFICIN.

Exhibet Officinis *Ichthyocollam* (Arab. *Alkanna Hausblasen*), quæ glutinis genus est, colore album, ex illius corio, intestinis, ventriculo, pinnis & caudâ confectum.

Idque hoc modo:

Partes dictæ in frustula tenuissima sectæ macerantur, in ∇ calidæ q. s. hinc coquuntur lento Δ e ad consistentiam pultis, malaxanturque antequâ refriguerint in massam.

Vires. Siccat, explet, quadantenus mollit.

Hinc *Vfuscius* est in Emplastris glutinantibus.

N. Adhibetur & ad gelanda iura. (Galrey, machen,) ex eisdem addito Saccharo cand. excoquitur etiam translucentum & flavum glutinum genus, (Fischleim & Mundleim appellatum.)

quod in ore liquefactum ad chartas glutinandas adhibetur.

LXXXII. *Lucius.*

$\Lambda\delta\beta\alpha\zeta$, aliis $\lambda\upsilon\sigma$, *Lupus*, *Hecht*.

N. Sunt qui *Lucium* ac *Lupum* confundant, quod et si nominetenus cõcedi possit, cū utrūque piscis sit rapax ut *Lupus* terrestris, attamen re ipsa distinguuntur.

Lupus siquidem veterum, marinus piscis est, figuraque à *Lucio* aliena.

OFFICIN. NAT.

1. *Fel*. 2. *Cor*. 3. *Mandibula*. 4. *Officulum cruciforme*. 5. *Axungia*. 6. *Oua Vires*.

1. *Fel*, Febrem arcere volunt, (si assumantur N. 3.

Extrinfecus inferuit oculorum maculis, hebetudini, aliisque eorum affectibus.

2. *Cor*, aduersus Febrium paroxysmos deuoratur.

N. Sunt qui *Cor* vino *Lucio* exemptum deuorare, luciumque corde orbum denuo influentem ∇ m conicere iubent.

3. *Mandibula*. exiccat, abstergit. Hinc datur in pleuritide seu specificum; confert itidem ut & reliqua capitis officula in calculo, fluore albo mulierum partuque difficili.

Extrinfecus sistit, cinis) synouiam, vulnera inueterata mundificat, hæmorrhoides exiccat.

4. *Officulum cruciforme* ex capite *Lucij*, commendatur quibusdam ad Epilepsiam assumptum.

N. *Periapton* singulare quibusdam habetur aduersus incantamenta.

5. *Axungia* vulgare Medicamentum est, illiniturque plantis pedum & pectusculis

pectusculis infantulorum, ad reuellen-
dos catarrhos & demulcendam tussim.

6. *Oua*, vomitum ac aluum ciere apta sunt, vnde & huius gratia medicamenti loco à plebeis exhibentur.

P R Æ P A R.

▽ *fellis* destillata oculis subuenit.

LXXXIII. *Mater Perlarum.*


Macra Perlarum seu Margaritarum
Perlen Mutter.

Species est Concharum, à Margari-
tis nomen ducentium, quæ inibi fre-
quentius, quam in reliquis inue-
niuntur.

Vires. Præter vires concharum communes (vide supra) sunt qui vim cordialem huic attribunt, verum quo successu, videant ipsimet.

Alij Antifebrile ex eadem conficiunt, ad modum, quem supra ex conchis oblongis dedimus.

LXXXIV. *Mustela.*

Zoñ, , Gobius fluviatilis, Mustela
fluu. Gesner. Aalraup, Aalrup, Trusche,
Duapp.

OFFICIN.

1. *Epar.* 2. *Ventriculus.* 3. *Spina.*

Vires.

1. *Hepar* in vitro suspensum calori-
que expositum, in liquorem liquefcit
flauum, admodum vtilem oculorum
hebetudini ac nubeculis.

2. *Ventriculus* commendatur summè ad affectus vrerinos, præcipuè autem fertur secundinas pellere, colicosque dolores abigere, (potus.

3. *Spina* pulverifata caducum expugnare fertur.

LXXXV. *Ostrea.*

Ostrea, Oster Muscheln.

Sunt conchæ marinæ, ex genere rotundarum.

Vires. Ostrea pestiferos bubones loco transferunt, & virus omne ad se trahunt: Sunt autem agglutinanda brachij parti, qua axillaris decurrit, videlicet si bubo in alijs sit, sin vero inguen obfederit, lineamentis femoris quæ vena cruris describit. *Hollerius.*

N. Testa concharum vicaria esse possunt.

LXXXVI. *Perca.*

Percus, perca, *Bersich*.

Perca fluuiat. (ad differentiam Percæ
marinæ, quæ piscis ab hoc differens est.

OFFICIN. NAT.

Lapides in capite reperti, iuxta spinæ dorsii initium: Hi virib. conveniunt cum reliquis lapidib. testaceis, adhibenturque in calculo atterendo, renib. abstergendis.

Extrinfecus in dentificiis, vulnerib.
exiccandis.

LXXVII. *Rana aquatica.*

Bάσις 2ος, { aquatica, hac usualis.
Rana Frosch { terrestris
 { amphibia.

Præfertur ex aquaticis, quæ in flu-
uiis puris ac fontib. reperitur, eaque
viridis.

Rubeta nimirum, & quæ in lacub.
habitat, damnatur ceu pernitiōsa.

Terrestres itidē cedit aquaticis, imo
quæ maculatæ ex his sunt, venenatæ
habentur.

N. De *Ranunculo viridi*, vide

Class. I.

Class. I.

OFFICIN. NAT.

1. *Ipsa Rana* 2. *Cor*. 3. *Epar*. 4. *Fel*. 5. *Pinguedo*. 6. *Sperma Ranarum*.

Vires.

1. *Dioscoridi Rana ipsa* contra omnium serpentium venena pro Antidoto sunt, si ex sale & oleo, vel butyro edantur, iusque earum itidem forbeatur. Valent & aduersus inueteratos tendinum rigores.

Inducit etiam vini fastidium, si vinum in quo viua rana viridis suffocata est, propinetur: Viua Anthraci pestilenti imposita, donec moriatur, venenum elicit. Viua integra alligatur ad causonum æstus: articulor. & iuncturar. dolores mitigat, ignesque sacros restinguit, (vina scil. vel contusa imposita.) Odonalgiam sedat, cocta & in gargarismo adhibita.

N. Si ventri torminoso adhibeatur, in ipsam vitium transire confestim fertur.

2. *Cor Ranarum* (maximè fluuiatili-um) febricitantium Spinæ alligatum, febriles algores minuit. Sunt qui cordis regioni adinoueant ad mitigandos causonum æstus & incendia. Mizald.

3. *Epar* exiccatum & puluerisatum in febrim quartanar. (& aliar.) ac-cessione cum successu assumi, aiunt. Crato exhibet in ∇ millefolij.

N. *Epata ranar. viridum* in patulibus degentium, ceu peculiare specficum ad Epilepsiam commendant.

Exhibere iubent sub coniunctione Luminarium (in \odot existente. Petrus Nosolog.

4. *Fel*, peculiariter oculis conuenit, quartanamque curare dicitur incineratum & ad $\mathfrak{z}\beta$. exhibitum.

5. *Pinguedo* aurib. indita dolorib. medetur.

6. *Sperma ranarum*, (sperniola) *Froschleich*, refrigerat, constipat, incre-
fat, dolores mitigat, manuum scabiem curat, (si mense Martio in eo lauentur;) paronichia & herpes interficit, erisy-
pelati & ambustis, aliisque inflamma-
tionib. succurrit, (impositum.) Faciei ru-
borem curat, fluxui mensium & hæmor-
rhoidū medetur (vulvæ vel ano inditū.

N. *Linteum hoc spermate aliquoties madefactum & exiccatum pro usu ser-
uant. Alij idem sperma in fictili re-
condunt in terram, loco scil. aprico, quo
in ∇ cum tempore conuertitur.*

PRÆPAR.

1. Cinis inspersus sanguinem pro-
fluentem, (e. gr. vulnere, nariumque) sif-
tit. Vteri hæmorrhagias suffitu reprimi-
t, alopeciis ex liquida pice illinitur,
Internè gonorrhæam cohibet (as-
sumptus $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$).

2. *Aqua stillatitia è Ranis*.
Fit è Ranis viuis sub finem Mar-
tij, vel initio Aprilis captis, per \mathfrak{X} .

3. ∇ . stillat, ex spermate.
Fit per \mathfrak{X} , è spermate collecto
Martio.

N. Sal addere solent.

Vires. Ex precedentibus patent, præ-
ter quas Vesica ab humorū acrimonia
exulcerata egregia medela est. Facit &
ad repellendum & sistendum sanguinis
profluuiū & faciei ruborem, impetigines
curat, erysipelati ac gangranis succurrit.

4. *Oleum*.
Fit coquendoranas cum \odot o commu-
ni vel Rosæ.

5. *Pulvis sperniolæ compositus*.
Vide libr. 2. in Pulueribus

N. 1. Vbi rana, spermaque earundem
aut limaces, lumbrici, cancri, & sentiētia
animata veniunt & anda, includenda
esse linteolo mundo & in medio cucurb.

Z Z z z suspendenda,

suspendenda, ut velut per vapores stillent, alias aqua putoris erunt participes. In linteis autem remanebit pulvis animalium istorum opt. preparatus, cui maioris correctionis ergo *¶* guttulas aliquot instillabis & rursus exiccabis, vel cum eodem *¶* tincturam elicies.

N. 2. Fabricius de Gangr. pulv. dilaudat ad Ulcera maligna & inflammationes omnes compescendas.

LXXXVIII. Sepia.

Σηπία, Black fish. Black küttel.

OFFICIN. NAT.

1. Os Sepia. 2. Humor ater. 3. Oua. Vires.

1. Os Sepia, *σηπία*, exiccat, abstergit, (pulverisatum vel incineratum,) maculis, nævis, scabiei humidæ medetur oculis conuenit, (cum melle cinis induritus,) gingiuis tumidis subuenit, (in densificius) asthmaticis auxilio est, (assumptus.) Gonorrhæa sistit, calculos pellit, vrinas mouet (pulvis assumptus. *℞j. Dosi.*

2. Humor ater (Ointe) intra vesiculam in corpore repertus, aluum mouere dicitur, assumptus.

3. Oua renes & vterus abstergunt. menses & vrinam cient.

LXXXIX. Sturio.

Ακτίπτερος, Γαλαζίας, Gal. Aquipenfer, Stora, ein Stær, Stür, Stürlein.

Piscis est dorso ac ventre echinatus, dulcesque salsasque aquas colens, magnitudinis procera.

Vires. Ossa Sturionis, dicti piscis commendantur in Arthritide vaga, (exhibita) Forest. lib. 20. observ. 12. in Epistola D. D. de Brahe.

Vt & in Colicis doloribus discutendis.

XC. Testudo.

Χελὼν ἀλιμναῖα, Schildkröte.

Animal est ἀμφίβιον: è genere Testaceorum, scutum testaceum in dorso gerens.

OFFICIN. NAT.

1. Crura. 2. Sanguis. 3. Fel.

Vires.

1. Crura pro Periapto antipodagrico experientissimo adhibentur.

Videlicet:

Accipiatur Testudo masculina (cognoscitur inter cætera ex caudæ discrimine, & leni sub interiore testa incisura, ubi Luna maximè fuerit diminuta, priusquam cum Sole coniungatur, amputentur viuæ crura omnia, ea confuta in sacculos ex pelle hœdina angustos alligentur membris patientibus, ita ut dextrum crus testudinis dextro cruri ægrotantis respondeat, sinistrum sinistro. Item anterius crus dextrum brachio dextro applicetur, sinistrum sinistro. Solenand. sect. 1. consil. medic. 20. Schenckius in observ. Idem refert Bapt. Porta ex Rhasi & Constantino, libr. 4. Phytogn. cap. 4.

2. Sanguis Testudinis marinæ & terrestris, in remediis internis pro antidoto datur ad *℥ij*.

Sanguis Testudinis terrestris ad Hæcticam imperatur (recens & crudus ad *℥j*.) exiccatus ad Epilepsiam commendatur.

3. Fel, Oculis confert.

XCI. Thymallus.

Θάλασς, Aschia, Asche.

OFFICIN.

OFFICIN. NAT.

Axungia.

Vires, Oculorum maculas, vnguesque abstergit, Sole liquata & melle permixta, maculas cutis tollit, foveas post variolas relictas explet, (*illita*.

XCII. *Tinea.*

Σύντριψ, Tencha, *Schleye*.

Piscis est mucosus, excrementitius, amans aquas palustres, cænosas, lutosas, viuens cæno, generatur, tum ex trahere, tum sponte. Familiaritate lucio coniuncta est.

OFFICIN. NAT.

1. *Integer piscis.* 2. *Fel.* 3. *Lapillus.*
Vires.

1. *Integer piscis* dissectus imponitur pulsib. manuum pedumque plantis, ad mitigandum æstum febrilem, vel & ad diuertendum venenum pestilentielle. Simili etiam modo adhi-

beri solet in dolore capitis ac articular. Viuæ tinea (*vna post alteram*) vmbilico ac epati impositæ, donec moriantur. Icterus curare dicuntur, luteum nimirum contrahunt colorem. Incineratam tinea, (*præcipuè tegumentum*) in fluore albo mulierum exhiberi vidi cum successu

2. *Fel*, commendatur ad aurium affectus.

3. In Capite gerit *Lapidum* vt Carpio, qui ad similes affectus exhiberi poterit, quod dictus Carponis lapis.

XCIII. *Trutta.*

Χούτσουρος, Aurata, Variolus, Variola, Trutta, Fohre, Forelle.

Piscis est culiniscreberrimus & laudabilis.

OFFICIN. NAT.

Pinguedo. Hæc illinitur vtiliter mariscis & ani fissuris.

CLASSIS IV.

DE INSECTIS.

XCIV. *Apes.*

Μέλιτα, Apis, } Domestica huius
Immen, *Bienen*, } loci.
Syluestris fera,
Hummel.

Apis insectum est mellificans, viuens, tum florum melligine, tum melle ex illa melligine confecto.

OFFICIN. NAT.

1. *Apis* 2. *Mel*. 3. *Cera*. 4. *Propolis*.

1. *Apes* sicca & contrita inunctis alopecij capillum restitunt.

II. *Mel*, eligendum est flauum pellucidum, odore ac sapore iucundum, consistentia, neque crassum, ac concretum, neque dilutum nimis, omni ex parte vnitum seu continuum. Flauo succedit album, quod itidem, modo reliqua bonitatis signa ne defuerint, non contemnendum. Vitetur autem in mellis electione fauus araneorum texturis refertus. Omnib. porro præfertur Mel Virgineum dictum, id est, quod nouellæ apes conficiunt, colore ex flauo albicans.

ZZZZ 2 Vires

Vires. *Mel calidum ac siccum statuitur gr. 2. (albicans tamen minus calidum censetur. nutrit, abstergit, aperit, pulmonib. conuenit, urinam ciet; rursi medetur, putredini resistit.*

Extrinsecus oculorum caliginem discutit, aliisque eorum affectib. succurrit.

Cautio.

1. Mel quia facilè bilefcit, Epatici-
lidioribusque corporib. non adco pro-
ficuum est.

2. Mel crudum aluum inflat, tussim
laceffit; fastidium creat.

N. *Mel Galeno succus est roris cœ-
lestis, ab Apibus collectus. Paracelsus re-
sinosum quid terra est, in vegetabile ge-
nus virtute plantarum ac influentiarum
cœlestium transplantatum, & hinc ab
apibus collectum atque ulterius digestum.
Vide Paracels. de Naturalibus.*

*Hinc variat quoque 1. pro varietate
plantarum, quaratione optimum cense-
tur apum in rosetis, vel liliatis, &c. de-
gentium 2. diuersum quoque Mel existit
pro diuersitate influentiarum. Sic Mel
præstantissimum habetur, quod anno se-
reno ac salubri Vere ac Æstate con-
fectum. Quercetano dicitur Ros vel
Manna cœlestis, atque inde sua aceta
Philosophica præparat.*

P R Æ P A R.

I. *Mel depuratum.*

R. Mellis, q. v. affunde ∇ portionem,
(æqualem vel duplam, triplamue, si
valdè impurum fuerit, vel si alienæ rei
expers sit, sine additione,) coque &
despuma fochleari pertuso.

N. 1. *Quod si hac ratione non satis de-
puratum foret, clarificari poterit cum al-
buminibus onorum singulis ad singulas
libras adhibitis, v. l. i. c. 14.*

N. 2. *Conrad. Kunrath dictam mel-
lis depurationem improbat, quippe quâ*

*potiores ac meliores spiritus, quibus ma-
ximè imprægnatum est, in auram eua-
nescant. Itaque hanc substituit.*

R. Mel Virgineum nondum Δi com-
missum vna cum fauis, inde Manicæ
Hippocraticæ, suspendeque in loco te-
pido Solis, vel in hipocauſto vaporib.
aqueis, (vt Balnearum balnea calfieri
solent,) calfacto vt perfluat Mel.

II. *Mel destillatum.*

Vnde:

1. ∇ Mellis, Spiritus atque Oleum.

R. Mellis lb. i. adde Θ, vel filicum
mundor. contusor, arenæue ℥iij. ℥vi.
(aliq. etiam addunt segmenta Ligni
Iuniperini,) destilla per Θm gradatim,
& exit ∇ alba, dein flaua, cum 〇〇, vt
& Spiritus, quæ aliquoties rectificen-
tur.

Alij eliciunt primo ∇m in cucur-
bita ex Mj. Remanenti in cucurbita
melli addunt 〇m, vel filices calcina-
tos contusos, 〇antque per Θm ∇m
flauam cum 〇〇. Hæc digerunt ali-
quoties, & ∇ aliquot (36.) dein
〇ant, tandem 〇〇 supernatans ab ∇
separant. Sennert. *Quercete Med. destil-
lat.*

Alij.

R. Mel cum cera & fauo, ponunt in
fimum ad putrefactionem per Θm,
fimumque sæpius (dieb. ternis) mutant:
Hinc 〇ant. 1. Exit ∇ alba (faciei ab-
sterfioni dicata. 2. flaua, Osvald.

N. 1. ∇m hanc flauam esse men-
struum Franc. Anton, sunt qui putent,
sed male.

N. Adduntur 〇e, vel filices, vel vi-
trum, vt feruescentia, ad quam Mel ma-
ximè procline est, præcaueatur, id quod
aliq. meditantur sacculos paruos 〇 re-
feros imponendo.

N. 3. *Sunt qui ∇m primo elicitam
super*

super novum Mel fundunt & redificant.

Vires. Viraque ∇ alba scil. & flava, suffusiones & albugines oculorum sanat, capillis producendis confert. Inferuit Tinctura Corallorum extrahenda.

Intrinscus reserat obstructions, pellit urinam, atterit calculum.

Oleum quod instar ∇ vite ardet, vires habet admirandas, præsertim si per ζ aliquot circuletur cum ∇ . Et enim separato iterum illo ∇ , remanet \odot dulce & gratissimi saporis, vulneribus sclopetariis & phagedenicis ulceribus plurimum conducens. Singulare quoque est ad podagricos dolores sedandos. Dissecuit maculas faciei cum \odot o Camphora.

2. Oleum Mellis compositum.

R. Mell. lb. ij. \oplus i calcinati, lb. i. ∇ rectif. lb. β ∇ lb. i. destilla per \odot m, primo extillat phlegma, dein ∇ virge \times . 20.

Vires. Lenit dolores podagricos, si locus affectus eo illinatur.

3. Acetum mellis.

R. Mellis opt. p. i. ∇ fluu. p. vi i i. coque ad medietatem, postea suspende in eodem semen Erucæ in petia, atque repone in loco calido vel Sole, donec deferbuerint. Fit paulatim + acerrimum, quod § etur.

Vires. Præter alios ∇ sus soluit & scilices, reliquosque lapides, etiam sine ulla precedente calcinatione, Hartman. in Croll, Senn. Inst.

4. Tinctura mellis.

Tincturam mellis *Beguinus* extrahit ex melle crudo cum arenis impastato, eamque exhibet Phthisicis pro nutrimento.

5. Qu. Essentia mellis.

1. R. Mel cum fauis, q. v. (lb. xv. elice

∇ per ME , qua prolecta relinquatur adhuc remanens materia in ME feruenti, ζ ∇ (5).

Dein 2. affunde ∇ atque extrahe f. a. tincturam, eamque decantatam purifica optimè per digestionem ac subsidentiam. Tandem destilla Tincturam per ME ad siccitatem, destillatum dicitur Elementum aëris, Essentia illa remanens, Ignis.

3. Ex fecib. incineratis (prolecto prius \odot o per descensum \odot muè, si ita visum fuerit,) extrahe Sal cum ∇ commun. more solito, idque purifica optimè, (dicitur Elem. Terræ.

4. Coniunge iam omnia atque destilla ex E lib. per ∇ toties cohobando, donec omnia volatilia sint, ac \times transcenderint.

Sic habes Qu. E. Mellis.

Vires. Instar Panaceæ esse poterit. Dosis gr. iij. i. v. v. &c. Med. destil.

6. Elixyr Mellis.

Clystus.

R. Mel per Manicam H i. f. depuratum. Elice ∇ m, \odot o ac \ominus : Sal elicatum potato per vices aquâ suâ, dein \odot o donec omnia imbibuerit & coagulum inde factum fuerit.

Vires. Easdem vires cum Qu. Ess. mellis possidet, Med. destil.

7. Sunt & varia Officinalia vsualia, quæ mel tûm basin agnoscunt, vt Hydromeliton genera, tûm asservationis medium, vt Syrupi quamplurimi, &c.

III. Cera, $\kappa\alpha\pi\omega\varsigma$ Arabic. Hamaha *Wachs*. Medium quodammodo tenet calfacientium, refrigerantium, humectantium & desiccantium, ita tamen, vt ad caliditatem inclinaret, partium quantatenus est crassum & emplastica-rum, ideoque digerit, maturat, &c.

N. Adeo vsitata Officinis est, vt vix

Z Z z z 3 Emplastrum

Emplastrum reperias, cuius non exhibeat consentiam.

PRÆPARATA.

Oleum Cera. v.l. 2.c.70.

Vires. Diureticum est, daturque intrinsecus, gut, dosiij. v. v.

1. *Oleum cera boni odoris & coloris.*

Fit, si rectificetur super recentes cereæ particulas Δ cinerum. Ex eo fit

2. *Balsamus Vulnerarius.*

Per macerationem menstrualem florum hyperic. & rad. consolid. maior.

3. *Magisterium cera.*

Fit ex eâ solutâ in V, filtrataque, ut remaneat in chartâ instar butyri, quod edulcatum atque ad 3. j. propinatum valet eximie ad Dysenteriam.

IV. *Propolis*, Πρόπολις, σμύλνιον, Dioscor. Cera Virginea, Borstosz, Stop. VVachs, Bienhartz, rudis est, & cerosa, crassaque materia seu gluten in alueorum forib. repertum.

Eligenda flaua, odorata, Styracem vel galbanum referens, in vehementi ariditate mellis, & Mastichis in modum ductili.

Vires. Calf. 2. aut princip. 3. leniter abstergit, attrahit, aculeos & omnia infixa corporis extrahit, dura concoquit, dolores demulcet, ulcera desperata cicatrice obducit. In veteri tussi suffitu inuat.

XCV. *Araneus.*

Αράχνης, Αράχνη, Spin.

Insectum est venenatum, puncturis suis nocuum. Variorum est generum promiscuè vsualium.

Est e. Araneus maior coloris scil. varij, vel minor coloris nigri, &c. Distinguitur sexu, coitque. Vere ac initio Æstatis, & aliquando Autumno & initio Hyemis, ynde & eo temporis pun-

cto magis noxius habetur. Viuit muscis quibus capiendis retia sua pandit.

OFFICIN. NAT.

1. *Aranei.* 2. *Tela Araneor.* (*Aranea dicta.*

Vires.

1. *Araneus* febriles paroxysmos accere dicitur, (*pulsib. metacarpj, temporibusue impositus,*) peculiariter tamen ad quartanam commendatur, (*putamine auellanae inclusus, colloque suspensus vel lacerto appensus.*

2. *Tela*, constringit, conglutinat, ideoque vulneraria est, sanguinem cohibens, inflammationem præcauens. Ad arcendos febriles motus non solum externè, sed (& satis audacter) internè à nonnullis adhibetur.

PRÆPARATA.

Oleum araneorum simplex & compositum fieri potest ex infusione, ut oleum scorpionum.

Vires. Ingressitur Emplastrum febrile.

XCVI. *Asell.*

Όυσκο, Gal. Όροι, Dioscor. Τίλοι, Plin. Procelliones millepedæ, multipedes, Eselgen, Schaffelein.

Nascuntur in locis humidis, cellis, & simil. sub lapidib. vasisque ∇ repletis, ad tactum sese contrahunt ac rotundant.

Vires. Tenuium partium sunt, digerunt, extenuant, abstergunt, aperiunt. Hinc utilitatis peculiaris sunt in mucilagine tartarea resoluenda, calculoque ad mucilaginem reducendo, in obstructionib. viscerum aperiendis, adeoque in morbo regio, in dolore nephritico, difficultate urinae, in colica, appetituque ob vetriculâ mucilagonè imminuto, in Asthmate, &c.

Extrinsecus.

Extrinfecus commendatur pulvis ad affectus oculorum, ad aurium dolores & anginam (cum melle illitus).

Virus impositus phagedanam perimit.

Dosis à ℥j. ad ℥j. in pulvere cum vino vel ∇ aliqua nephritica.

PRÆPAR.

Alij lauant in vino ac exiccant, iterumque lauant ac siccant, hinc pulverisat ac imbibunt in *℞* *℥*.

Dosis gut. iv. v. vi. exhibent,

Alij contundunt cum vino, colant & exhibent. Nonnulli macerant solum in Vino, colantque.

N. 1. Non facile ℥j. transcendendo, nec usum continuo, nimia quippe resoluendi vi incommoda non parva inferre possunt.

N. 2. Ut locus natalis saxosus indicat, ad calculum asellos facere: Ita indicante aptitudine & propensione sese contrahendi, ad convulsiones forsitan non essent inutiles.

XCVII. Bombyx.

Bombyx { Domesticus, huius loci.
Sylvestris.

Бомбѣвъ, Бомбѣвъ ∇, Vermis lanificus, Albert. Magn. Seidenwurm.

Vermis est texturam sericeam tensens, oriturque tum sponte, tum ex ouis.

N. Miram subit metamorphosin. Ex ouis pusillis producit animalculum Eruca non absimile. Eruca hæc mororum Ulmi educata foliis augefcit indies, donec tumiditate resplendeat: hinc indita Theca, textura se cingit sericea, usque dum moriatur. Postmodum renuiscit, papilionis instar pennas producens, coituque interueniente triduo. (à quo

masculus statim moritur,) eua parit semina, quam plurima, ac desoit.

OFFICIN. NAT.

1. Bombyces integri. 2. Sericum. i.e. textura bombycia. 3. Folliculi sericei.

Vires.

1. Bombyces exiccati & pulverisati insperguntur vertici capitis, ad arcendam vertiginem & convulsionem.

2. Bombycia textura, est soliditate & frigiditate temperata. (al. cal. 1) sicca 1. cor roborat, spiritus vitales, animales & naturales reficit.

PRÆPAR.

Vritur quandoque, quo sciccior reddita læuiget, quandoque decoctis admiscetur. Verum præstat crudam & solummodo incisam adhibere.

Sunt & vsualia, quorum compositio nem subit: vt Confect. Alkerm. Diamosch. &c.

N. Infertur & in usum Medicum Sericum filum Kermesinum, i.e. Cocco seu granis Kermesinctum, adhibeturque sanguini sistendo, vuln. usque obligandis. exiccandis. consuenit. Quin & à Plebeis ad Erysipelas adhibetur (circūligatum.

3. Folliculi sericei, (Bombycea, Seidenbalglein.) iisdem virib. cum textura præditi sunt.

N. Caveatur à folliculis ahi ssturtio fœdatis, vel in quibus adhuc Nocyda lus latitat mortuus, & vermibus exesus.

Bombyx Sylvestris, est genus quoddam Erucarum Viridum, simili metamorphosi, vt de Bombyce domestico dixi, mutabilium.

N. Huius generis videre mihi contigit apud Celsissimum Principem Philippum Hassie Landgrauum doctrina multifaria, linguis exoticis, vt & Hebræo, Astronomicisq. observationibus propriis celeberrimum,

leberrium, qui papilionem variegatum lepidum visu ex *Eruca viridi* in capsula productum monstravit.

XCVIII. *Cantharides.*

OFFICIN.

Cantharis Goldwurm. Icin. { Musca Hispanica, huius loci.
Formicaria latior, Goldtkäfer Meischaffen.
prolixior } Cornuta gehärbreuior } te Goldtkäfer.
Amethystina violacea Beilbraung.
Miniata, Friesenwurmle.
Viridis } longiuscula.
 } aurum lucens.
Nigricans, Schvartzkäfer.
Castanei coloris.
Rotunda, Osterkalblein.

Dicitur *Katyapis*, i.e. parvus Scarabaeolus, *Spanische Mücke* oder *Fliege*, Goldwurmlein.

Producuntur ex genere quodam Vermiculorum Erucis non absimilium, qui nascuntur ex humore, foliis fraxini, populi, ligustri, triticique inhaerente.

Præstantiores censentur, quæ in frumento seu pratis inveniuntur, versicolores, & quæ luteas in aliis transuersas lineas habent, corpore oblongo, crassæ, recentes.

Perimuntur aceti acerrimi vapore, qui dum feruet, exhalat. Hinc siccantur & seruantur per biennium.

Vires. Calide sunt & sicca sat validdæ, aëq; corrosivæ seu vesicatoria, diuretica, emmenagoga. Hinc usus creberrimi in vesicatoriis. Internus earum usus rarissimus est, quippe inter venena vulgo recensentur: Vesica nimirum Urinaria adeo infensa sunt, ut vel extrinsecus cuti alligata eam exulcerent. Sunt ni-

hilominus audaculi, qui diureticis eas admiscunt. Sunt & improba scorta, que fatum tenellum iis perimunt & exturbant.

N. 1. Recentiores alas, pedes & capita refecant, solo corpore servato.

N. 2. Galenus alas & pedes exhibet pro antidoto veneni proprii.

N. 3. Oleum Cantharidum & Cantharellorum elicitor per V, prodestque ad calculum.

XCIX. *Cicada.*

Τέτλις, Heuschrecke.

Insectum est Gryllis simile, valde stridulum, rore viuens.

N. Vnum hoc animal, ex iis quæ viuunt, est sine ore. Pro eo enim quiddam aculearum habet, & hoc in pectore, quo rorem lambit. In Italia vulgaris notitia est, nostratibus incognita.

OFFICIN. NAT.

Cicada siccata.

Vires. Vimur cicadis siccis ad colicos affectus (cum parib. numero piperis granis scil. iij. v. vij.

Alij assas edendas iis offerunt quibus affecta vesica est. Cinis insigniter calculum conterit.

C. *Cicindela.*

Λαμπυρίς, Plin. Λαμπυρίς πυλαυρίς, Arist. Lampyris alata, Aldrouand. Cantharis noctiluca, Nitedula, Noctiluca, Iohannis Flieg.

Insectum est pennatum, in tenebris ignis modo lucens.

Officinis ignotum est, nisi quod Cardanus vim anodynâ ei tribuere videatur, lib. 9. subtilit. alij in calculo commendant.

N. Roder.

N. Roder. castrensis. l. 4. meteor. microc. c. 16. Cicindella, inquit, abscissis capitibus & aliis, ad solem exponuntur feruentiss. donec pulverisari possint. Pulvis cum aqua dissolutioni Tragac. Trochiscetur, addendo antillo olei amygd. Trochisci exicca iterum pulveriscentur, rursusque denuo formentur, idque quater. Valet in calculo (inunctionibus admiscet.

Dof. ʒ. ij.

CI. Cimex.

Cimices { Lectuarij, huius loci.
 { Hortenses, f. Sylvestres.
 Κορρες, κλινικίς, Diosc. Cimices,
 Mathiol. Vvantzen, Vvantzause, Bett-
 vwanteln.

Vermiculi sunt latiusculi compressi, rubentes, foetore abominabiles, morfib. quib. sanguinem nobis exugunt, admodum molesti.

Vires. Utuntur recentiores quidam ad ciendam vrinam viuis in penis organum immisiss, (Dioscorid. mortuos & tritos imponit,) ad foetum & secundinam expellendam tritos (N. 3.) & cum successu exhibitos vidi. Septenos cauis fabarum inclusos ante febrium accessiones deuoratos, quartanis auxilio esse Author est Dioscor. Vuluarum exanimaciones olfactu abigit.

N. Sylvestres qui ex herbis victum habent, lectuariis maiores, colore viridi aqua ac illi foetidi, officinis adhuc incogniti sunt.

CII. Eruca.

Καλὸν, Dioscor. Bruchus, Eruca vulgaris, Aldrou. Raupe.

Insectum est vulgaris notitiae, origi-

nem trahens, vel ex stirpium excrementis, vel ex ouis papilionis. Species totidem ferè sunt, quot plantarum.

N. Similem Metamorphosin subit quam Bombyx, tandemque in Papilionem degenerat.

CIII. Formica.

Μύρμηξ, { Minor { rubeus.
 Formica { Maior, Equina Rosz A-
 Ameysz { meysz.

Insectum est mira providentia dotatum, qua penu in annum sufficiens aestiuis pleniluniis (nouiluniis equiescit,) sedulo colligit, collemum si opus sit, siccatur, siccata semina, ne regerminet, arroti, adeoque durationi adaptata recondit. Congressæ Hyberno tempore vermiculos pariunt, subinde in Oua & hinc verno tempore, in formicas mutari aptos. Senium alatas facit, sed breui superstites.

Præstantiores habentur, quæ sub arborib. resiniferis habitant, acidumque olent, Collectio præfertur (de crescente vel Nouilunio.

OFFIN. NAT.

1 Formica. 2. Oua. 3. Aceruus.

Vires.

1 Formicæ calfac. & siccant. venerè proritant. Odor acidus mire spiritus vitales reficit. Formicæ maiores (Heiculanæ (pforam, lepram & lentiginem sanare dicuntur, (adiecto sale exiguo trita & illita.

2. Oua ad aurium grauitatem faciunt, malas hirsutas pueris infricata corrigunt.

3. Accruus, (Myrmecium) calf. & siccatur, neruofum genus roborat. Hinc vsus celebris in paralyfi, arthritide, hystericijs affectib. cachexia & si-

AAAA

mil.

mil. (lotione adhibetur.

PRÆPARATA.

1. Oleum ex infusione formicarū (præstant alarā) in \mathfrak{z} . com. \mathfrak{z} 40.

Vires. Valet ad coitum.

2. ∇ stillat. Magnanimitatis dicta, v.l. 2. c. 37.

3. Liquor fitin clybano ad modum quo liquor lumbricorum.

Vires. Insigne est Ophthalmicum suffusionis oculor. auxilium.

CIV. Gryllus.

$\Gamma\epsilon\upsilon\lambda\lambda\omicron\varsigma$ Domesticus.

Acheta { Agrestis, aruenfis.

Insectum est alatum è genere locustar. cicadis simile, focorum terrarum iùè aridar. incola, stridulo suo cantu sedulum. Heimichen, Heimling.

Vires. Commendatur ad diuresin, (cinis exhibitis) ad visus imbecillitatem, (succus expressus instillatus) tonsillas lenit, (affricatus.

CV. Hirudo.

B ϵ η ν ς, Sanguisuga	{	Maior equina.	
		subfusca.	
		subviridis.	
		nigra.	
		{	variegata.

Insectum est palustre, instar Lumbrici oblongum, generatur ex putredine Germ. Saug Igel.

Maioribus præferuntur minores, utpote quæ minus nociuæ, & ex his, quæ lineis in dorso distinctæ. Maiores novem equum sugendo interimere valent, vnde equinæ dictæ.

Vfus. Sanguinis exuccioni inferuiunt, adeoque cum cucurbitulis conueniunt.

N. Antequam applicentur, seruanda sunt, in ∇ pura, ut probè purgentur, hinc loco applicationis sale nitri fricato, sanguineque vel argilla innuncto applicanda. Cum amoueri vis, insperge parum salis, aut cineris, aut lini combusti.

CVI. Lacertus.

$\Sigma\alpha\upsilon\pi\varsigma, \sigma\alpha\upsilon\pi\alpha$, Lacertus, Lacerta, Egochs, Ader, Ichkechs, Moll.

Insectum est quoad figuram notum, colore varians, bufonib. ac araneis inimicum.

N. Lacertus si dissectus fuerit, pars utraque mouetur aliquandiu, & si concurrerint, coalescunt rursus. Sunt qui oculos, si effossi sint, renasci aiunt, id quod & de cauda si amputetur, Plinius affirmat. Degunt in cauernis terra, rudibus murorū, aliisque locis asperis, vescuntur Cicadis, Cochleis, Gryllis, Apibus.

Lacer-	{	Terrestris, de quo hic & minus Venenatus.
		Aquatilis, qui venenosus habetur, & rarioris usus.

N. Commendatur præ reliquis genus lacerti viride & magnum, verum cū in hisce regionibus minus vsitatum id sit, lacertum commune hic describimus.

Vires. Elicit è corporib. spicula, vitra, &c. (sectus, vel cum Θ tusus & impositus, in primis v. caput,) capillos renasci facit, (cum adipe illita caro, vel cinis applicatus.) Ictui scorpionū succurrit. Commendatur itidem ad hereniam infantum, (si decocto lacerti lauentur,) ad facilem euulsionem dentium, pulvis aquatici lac. affricatus.

N. Sunt qui aiunt Lacerti exiccati puluerem gingiuis illitum facere ut sine difficultate, sine dolore, atque sine instrumento dentes extrahi queant.

PRÆPARATA.

PRÆPARATA.

Oleum infusum.

Fit ex infusione Lacertorum viuorum
N.vij.in Ol.commun.tb.i.ß.

Vires. Commendatur ad faciei rube-
dinem emendandam (illitum).

CVII. *Locusta.*

Αυγls, Dioscorid. Κάριον, κάριον,
Herwischreck.

Insectum est ex pernicië quàm in-
fert, (herbas sc. & segetes mordendo,
terramque tactu & salua adurendo,) nulli fermè regioni incognitum. Ge-
nerantur Æstate incunte ex fœtura an-
ni superioris, fauo non absumili, scil.
exin oriuntur vermiculi, speciem oui
gerentes, inclusi prætenui terra ceu
membranula, qua disiecta emergunt
locustæ & euolant.

Sunt porro variæ, videlicet: Sunt
magnæ, parvæ & minimæ, (pennis
carentes, sunt virides, flauæ, nigrican-
tes, varizue, &c.

Vires. Odoris suffit in urina difficul-
tates iuuant, præsertim quæ fœminas
malè habent. Dioscorid. Sunt qui
appensas collo quartanam sanare
aiunt.

CVIII. *Lumbrici terreni.*

Ἰνο έρπετα, Dioscor. Vermes terreni,
Melloes, Paracelsò, Kegenwurm, Er-
dwurm, Pyren.

Insectum est vulgaris noticiæ ex
terra, tum generatum, tum sustenta-
tum.

Præstant reliquis ij, quorum col-
lum rubris annulis ceu cingulis cingi-
tur.

Vires. Sunt insignitur diuretici,

diaphoretici, anodynî, discutium, emol-
liunt, obstructions referant, lac augment,
vulnera, nervosque præcisos glutinant.

Vfus præcipui sunt in apoplexia, späs-
mo (ex signatura) aliisque affectibus
nervor. ac muscutor. in Ictero, (viroque)
hydropes, vermiculatione infantum, do-
lore colico. Inprimis autem specificè
præsunt in arthritide illa scorbutica,
quam vagam appellant, (die lauffende
Gicht, die Bahren,) Adhiberi possunt
intus & extus.

Intus exhibentur vel toti conquassati,
recenterque v.g. cum vino traiectione per
linteum, vel siccati & pulverisati.

Extus applicantur vini & mortui,
Vini impositi, donec moriantur, præsunt
panaritis, mortui in cataplasmatibus ferè
adhibentur. Odontalgia conuenire di-
citur cinis, (cavitati dentium inditus.)
Podagricos dolores leniunt (pulvis cum
farina calide impositus).

PRÆPARATA.

1. *Aqua, fit in M.*

Hydropicis maximè proficua est.

2. *Oleum coctum, vide*

Dispens.

N. Ex \odot hoc \mathcal{G} atur cum ∇ ra-
phani, Ol. quod urinam & sudores po-
tenter pellit.

3. *Liquor, fit in clibano.*

Nimirum:

Lumbrici loti & per stupam pur-
gati, induntur vitro angustî orificij.
Hinc obturatur vitrum, massaque pa-
nis inclusum committitur, (vt & reli-
qua massa) clibano, donec cum panib.
eximatur. Post liquor filtratur & serua-
tur pro vsu interno & externo.

Dosis à \mathcal{Z} ij. ad \mathcal{Z} ß.

4. *Pulvis, fit ex lumbricis in furno
exiccatis.*

Dosis \mathcal{D} j. ad \mathcal{D} ß.

CXI. *Lumbrici intestinorum.*

Ελμινθες, σπυγγαλα, Lumbrici s. Vermes intestinorū, Würm, Spul.würm.

Generantur ex cruditate intestinorū.

Vires. Sunt qui pulverisatos exhibent ad lumbricos expellendos.

CX. *Musca.*

Μύα, Arist. Δάτλη, Fliege.

Muscarū genera varia quidem sunt, vsuale tamen solum vulgare est.

OFFICIN. NAT.

Musca seu potius capita earum.

Vires. Alopeciis subueniunt.

PRÆPARAT.

I. ∇ Stillatitia, fit per se, vel cum melle.

Vires. Præterquam quod capillorum prouentum promouet, prædicatur quoque ad oculorum affectus, (instillata.

CXI. *Pediculus*

Φηψ, Σάπραξ, Pedunculus, Lausz.

Variarum itidem est specierum. E quib. huius loci humanus ille vulgaris pediculus.

Vires. Denorantur à rusticis contra Icterus, simili modo adhibiti ad Atrophiam nonnullis probantur. Vnam ci-ent foramini penis impositi, quippe proritant expultricem ad mingendum.

CXII. *Ricinus.*

Κάπρον, κυνναρίσις, Reduuius, Holtzbock, Hundskstob. Hundskwürm.

Animalculum est limidum & fœdum, bobus, suibus, capris, ouibus, atque canib. infestissimum.

Vires. Ricini canini sanguis Plinio

teste psilothrum est, ignes sacros restinguit admirandus quoque est ad imperigines contumaces & feras, ac curatu difficiles, (illius.) Amat. Lusitan. cur. 20. cent. 7.

CXIII. *Salamandra.*

Σαλαμάνδρα, μολχ, Molch, Moll, Olm.

Animal est quadrupes ex lacertorū genere, nigrum, luteis maculis respersum, incola locorum frigidorum & humidorum, fonticulorumque limpidorum admodū amans, adeoque nonnullis in terrestrem & aquaticam distribuitur.

N. Venenatum est animal, una cum morsu lacteam spumam virulentam conferens.

Vires. Salamandra erodit, exulcerat, incinerata medetur felicissimè scrophulis exulceratis (cinis inspersus.

N. Caveat à fumo venenato.

CXIV. *Scarabeus.*

Cornutus Schræter, hic vsualis Pilularius Kozzkafer, etiā hic Medicinali.

Vinctuosus, cantarellus, Kad-den, Schmalzkafer, Menwürm, nec hic in idoneus.

Ruti- { maior, Meßkafer, Creutzkafer. minus { nor Brachkaferlein.

Bufonius viridis Rottenkafer, hic venenatus.

Pistrinarius, Meelkafer.

Cadaverum, Aaszkaferlein.

Scarabeus cornutus, (bicornis, Lucanus, ceruus, ceruus volans, Scarabelaphus Cardan. Græc. Κόραξ,) Cignitur partim ex lignis aridis, maximè quercus

quercus aut roboris, partim ex coitu.
Reperitur Maio & Æstate in sylvis.

OFFICIN. NAT.

Ipsi Scarabai, & cornua.

Vires. Scarabai commendantur ad dolores & contracturas nervorum (ex signatura, qua tacti immobiles & contracti redduntur) ad febrem quartanam (amuleti loco impositi).

Cornua suspensa de collo infantum urinam cohibere dicuntur.

PRÆPARAT.

Ol. ex infusione Scarabai.

Vires. Dolorem aurium discutit, (instillatum).

Scarabæus pilularius, (pilularis, Solaris, stercoreum, Κοσκία, Hippoc. Pferdrkefer, Mistkefer,) nomen id habet, quod è fimo (maximè equino) ingentes pilas pedib. volutet, in quibus paruos vermiculos fœturæ semina recondere dicitur.

Vires. Commendatur maximopere in procidentia oculi & avi, (pulvis aspersus,) in hæmorrhoidib. cæcis dolorificis leniendis, (decoctus scilicet in oleo lini ad consumptionem animalculi, & calidè impositus cum bombace.

N. Pulveris conficiendi modus optimus est.

Mortificati in vitro clauso ad Solem benè exiccantur, & F. pulvis. Hartm. in pract.

Scarabæus vinctuosus (quod manib. impositus, pingui subflavoque liquore inficiat. Maio & Iunio iuxta. vias & passim in sylvis obrepit.

Vires. Canthartidum naturam imitatur, urinam pellit & sanguinem, canis rabidi morsum egregiè expugnat, varos dictos, i.e. Arthritidem vagam, Authore VViero, curat, (exhibitus pulvis vel conditura.

Extrinsicus expetitur à quibusdam eius liquor ad vulnera. Additur & Emplastris in bubone & carbunculo pestilentiali (ex signatura desumpto indicio) permiscetur & antidotis, fitque inde Oleum ex infus. anim. viuum. in ol. comm. quod loco olei scorpionum nonnulli adhibent.

CXV. Scincus.

Σκίνκος, Stincus Marinus, Officinis.

Animal est aquaticum, squamis luteis vestitum, cæsia à capite ad caudam decurrente linea insignitum, herbis odoriferis victitans.

OFFICIN. NAT.

1. Integri exiccati. 2. (rarò) pinguedo.

Vires. Alexipharmacus est Scincus, Veneremque accendit.

Pinguedo, simili virtute pollet.

Dosis ʒ. j. Matthioli commendat, Rostrum & pedes, eosque cum vino propinat, hinc & carnes laterum commendat.

PRÆPAR.

Ingreditur antidota & præcipuè Theriacam Andr. & Antidorum Matthioli.

CXVI. Scorpio.

Σκόρπιος Scorpium Scorpion.

Animal est forma cancris æmulans, iis tamen minus.

Vires. Urinam cient, calculo renum aut vesica impeditam, (vini incinerati & exhibiti.

Ichibus propriis subueniunt, (viti & impositi.

PRÆPARAT.

1. Oleum Scorpion. simplex, ex infusione Scorpion. in Ol. Amygdal.

AAAAa 3 amar.

amar. vid. August.

N. Sunt qui propinant in colicis & calculosis doloribus.

2. Ol. Scorpion. compof. Mef. quod recipit infuper Aristoloch, Gentian. Cyper. & rad. capp. vid. August.

Vires. vstratiffimum est in Renum doloribus, urinaque obftructa (illinitur dorfo vel pubi,) medetur ictibus venenatorum animalium, febrim paroxysmos arcet, (pulfibz vel dorfo inunctum,) aurium dolores mulcet.

3. Ol. Scorpionum magnum, Matthiol. vid. August.

Vires. Maiorum est virium quam pracedentia, ufusque eximij in morbis contagiosis praefervandis & curandis, in venenatis morfibz & fimil. (inunctum cordi, arteriisq; temporum, manuum, pedum,) dolores demulcet colicos & uteri, &c.

4. Ol. scorpionum sanguineum.

R. Sem. hyperic. ℥.vi. infunde in vino maluat. per ♂ (3.) tum adde Terebinth. venet. ℥.iij. Ol. centum anor. (i.e. vetustiff) ℥.vi. Croci opt. ℥j. Flor. hyperic. M. iv.

Omnia tumulentur in arena in boccia bene claufa per triduum : deinde

liquor in aliam bocciam fortiter exprimatur, liquor per inclinationem decantetur, ufque ad apparitionem olei. Oleo apparente vas eleuabis, in eo videbis ol. rubrum sanguinis instar. In hoc oleo reponantur pro vnaquaque libra fcorpiones N. L. in M. eousque relinquuntur, donec fiat perfecta fermentatio. Hinc per pannum exprimantur, omnia, oleumque referuandum.

Vires. Summè nephriticos dolores lenit. extrinfecus applicatum.

N. Hoc est illud oleum nephrit. sanguineum magni Ducis, quod Pona describit, sed dosin non addit.

Ex communic. Dn. D. Iob. Kieferi.

CXVII. Tere do.

Tepidov, Holtzvurm.

OFFICIN. NAT.

Caries seu farina Tere dinum.

Vires. Exiccat, unde ulceribus humidis & fluidis feliciter infpergitur, & hoc eodem titulo mulierculis nostratibus admodum familiaris est in excoriationibus Infantum exiccandis.

Et hæc sunt quæ de Animalibus Medicamentosis adducere compendij lex permisit, adeoque Pharmacopœiam nostram Medicochymicam diuino auxilio ad finem perduximus : Huic fit Laus, Honor, & Gloria, in sempiterna Secula Seculorum : Amen.

INDEX RERVM

In quo Numerus prior Librum, posterior Paginam denotat.



Bies	4. 444	Salutiferum	4. 458
Abiga	4. 480	Acorus verus	4. 449
Abrotanum	4. 445	Officinarum	ibid.
femina	4. 447	Adulterinus	ibid. falsa
Abſynthium	4. 446	Paluſtris	ibid.
Marinum	4. 493	Acorum legitimum	ibid.
Ponticum	4. 447	Actio variat vires medicamentorum	
Acacia vera	ibid.	1. 72	
Germanorum	ibid.	Adeps	1. 2
Acanthus Arabum	ibid.	Adiantum	4. 450
Vulgaris	4. 469	foliis coriandi	ibid.
Acanthum	4. 475	aureum	ibid.
Acetofa	4. 448	candidum, album	4. 569
Acetofella	ibid.	nigrum	4. 450
Acheta v. Gryllus		rubrum, v. Trichomanes	
Achillea	4. 535	Lugdunenſe	ibid.
Acerum 1. 2.	4. 599	Æluropus	4. 514
Acet. deſtillata	4. 600	Aes i.e. cuprum	3. 329
Acetorum hiſtoria	2. 110	Adiantum cand.	4. 569
Acetum Agreſtinum	ibid.	Ætas creſcentium	1. 72
Alexicacum	2. 111	Ærugo	3. 330
Bezoardicum	ibid.	Ætites (lapis)	3. 296
Confortans	ibid.	Agallochum	4. 450
Prophylacticum	ibid.	Agaricus com.	4. 687
Rutaceum comp.	ibid.	Agens mutat vires	1. 73
Philophicum Querc.	2. 179	Ageratum	4. 451
Acipenſer v. Sturio		Agnus	5. 673
Accipiter	5. 713	Agnus caſtus	4. 451
Aceti hiſtoria	2. 110	Agreſta v. Omphacium	
Acidum ☿ i	4. 628	Agrimonia	ibid.
Acini	1. 2	Sylueſtris	4. 457
Aconitum monococcon (ſalutiferum)		Alinga	4. 480
4. 547		Alabaſtri	1. 2
Pardalianches	4. 547. 453	Alabaſtrites	3. 296
		Alauda	

INDEX R E R V M

Alauda	5. 713	Anas	5. 713
Alberas, v. Staphisagria		Androsaces	4. 494
Alcedo	5. 713	Androsenum minus	4. 516
Alces	5. 674	Anethum	4. 456
Alchimilla	4. 452	Angelica	ibid.
Alcohol	1. 5	Angelicus pulvis.	3. 300
Alfmat	4. 460. 532	Angelicae pilulae	2. 218
Alkanna i.e. Ichthiocola		Anguilla	5. 723
Alkekengi	4. 452	Anguria	4. 486
Alleloja	4. 448	Anisum	4. 457
Allium	4. 452	Animalia integra officinalia	2. 102
alpinum, anguinum, montanum		Anime Gummi	4. 602
v. victorialis		Anonis	4. 544
Aloë	4. 662	Anser	5. 714
Alnus nigra v. frangula		Anserina	4. 457
Alfine	4. 453	Anthemis	4. 480
Altahut. v. Ammoniacum Gummi		Anthora	4. 458
Althæa	4. 453	Anthrax	3. 294
Alum. vs. v. Symphytum		Antithora	4. 458
Aluminis historia	3. 409	Antidotus <i>Στοιχειωτος</i>	5. 386
Alumen scaiolæ v. Lapis specularis		Isochrysos	3. 385
plumosum	3. 296	Lysipyretos	ibid.
Saturni	3. 393	Panæretos	3. 374
Alyssa	4. 460	Panchrestos	3. 285
Amalgama	1. 5	Pantagogos	3. 383
Amalgamatio auri	3. 313	Polychrestos	3. 375
Amaracus	4. 528. 530	Soterios	3. 386
Amaranthus	4. 453	Zoiphilos	3. 384
luteus v. stœch. citrina	3. 584	Antirrhinum	4. 458
Ambra grysea	3. 436	Antimonij historia	3. 361
Ambubeia	4. 483	Acetum	3. 372
Amianthus lapis	3. 296	Arcanum Basil.	3. 376
Ammi verum, Amios	4. 454	Balsamus	ibid.
Ammiofelinum	ibid.	Butyrum	3. 368
Ammoniacum gummi	4. 601	Ceresa	ibid.
Ammoniaci falis historia	3. 411	Diaphoretica	3. 356
Amomum	4. 454	Flores	3. 369. & seqq.
Amygdala	ibid.	Flores correcti	3. 371
Anacardium	4. 455	fixi	3. 370
Anacolle mata	2. 144	♀fati	3. 367
Anegusa Alcibiadion	4. 470	Manna seu Tinctura	3. 381
Anagallis terrestris 4. aquat.	4. 455	Magisterium	3. 375
Analogia rerum	1. 18	Mercurius	3. 389
		Oleum	

INDEX R E R V M

Oleum	3. 373	Cephalica vel Epileptica	ibid.
ex vitro Bas.	3. 374	è ceruorum typhis	5. 686
Præcipitat.	3. 369	Communitatis ophthalmica	2.
Reguli	3. 367 & seq.		120
Rubcum	3. 369	Cordialis Hercul. Saxon.	calid.
Sal	3. 388		2. 121
Spiritus	3. 377	frigida	2. 121
Succinum	3. 367	Cordialis restaurans	2. ibid.
Sulphura	3. 378 & seq.	Cosmetica	122
Syrupus	3. 388	Cosmetica pretiosa	ibid.
Tincturæ	3. 380 & seqq.	Cosmetica s. myrrhata	ibid.
Vinum Hippocratic.	3. 388.	Damascena odorifera	ibid.
Vitru	3. 362	Anti-dysenterica	2. 123
Vitru correcta	3. 364	Diuina	5. 699
Autophylli	4. 476	Diuretica è nucleis	2. 122
Aperine	4. 500.	Diuretica S. Closs.	2. 123
Aper	5. 675	Epileptica	5. 701
Aper	5. 731	Febrifuga	2. 123
Apialtrum	4. 531	Fortis	3. 408
Apij radix	4. 475	ad Gutturis affectus	2. 124
Aphroselenites	3. 305	Antihectica	ibid.
Apium	4. 458	Hysterica Croll.	2. 124
hortense Selinum	4. 55	Martini	2. 125
montanum	4.	Imperialis correcta	ibid.
Apophlegmatismus	1. 5	Lauendulæ comp.	2. 125
Aqua quâdantenus facit ad generatio-		Magnanimitatis	2. 126
nem	1. 33	Marasitæ	3. 391
Aquæ nativæ	2. 84. 3. 275	Martis	3. 328
Aquæ destillatæ	2. 112 seq.	Minerales	3. 276
Aqua Anhaltina	4. 116	Nephritica	2. 126
Antipodagrica	2. 133	Ophthalmica	2. 132
Aperitiua	117	Pectoralis	2. 127 & 128
Apoplecticæ	2. ibid.	Perlaram	2. 133
Asthmatica	118	Philosophor.	2. 127
ad Atrophiam	5. 708	Picarum composita	2. 128
Aurea	5. 700	Regia	3. 408
Benedicta	3. 387	Saluæ compos.	2. 128
Bezoardica	2. 118	Saphirea ad oculos	2. 132
Carbunculi	ibid.	Antiscorbutica	2. 128
Carminatiua	2. 119.	Splenetica	2. 129
ad desiccandos catharos	ibid.	Antispasmodica	ibid.
Cautistica	2. 133. 3. 488	Stimmi Area	3. 377
Cephalica aromatica	2. 120	ad suffusionem	2. 132
		BBBbb	Temperata

INDEX RERVM.

Temperata Basil.	2. 178	Arterica	4. 489
Theriacalis	2. 130	Arthriticum Gesneri	4. 557
Contra Terrorem	2. 129	Arum	4. 460
De tribus	2. 130	Afa (Alfa) foetida	4. 603
Tristantis	ibid.	dulcis v. Benzoin.	
Vitæ mulierum	2. 130	Afarum	4. 638
Vitæ mulier. camphor.	2. 131	Asclepias v. Vincetoxicum.	
Viridis	2. 133	Atcyron.	4. 516
Vitæ ♀ fata	2. 371	Aschil. piscis v. Thymallus.	
Virtutum	2. 131	Aselli	5. 734
Vomitina Æsculapij	ibid.	Asinus	5. 675
Plateri	ibid.	Asphaltos	3. 440
Aquarius	1. 27	Aspalathus	4. 563
Aquileia	4. 459	Asparagus	4. 461
alba	3. 351	Asperula	4. 500.
cælestis	3. 357	Asplenium, nium v. Scolopendrium.	
Aquilegia	4. 459	Astacus v. Cancer.	
Aquipenfer v. Sturio.		Aster articus	4. 501
Araneus, a	5. 734	Astragalus	5. 380
Arangia, Arantia, Arantia mala	4. 462	Astrum ☿ij	3. 356
Arcanum Chamæactes	4. 642	Astrutium Astrantia	4. 517
Corallinum	3. 350	Ætas medicamentorum	1. 72
Duplicatum	3. 406	Ætites	3. 296
Perlarum	3. 294	Athanasia v. Tanacerum.	
Arbor foetida v. Frangula.		Attriplex	4. 461
Arcium	4. 464	Attractylis	4. 475
Ardea	5. 714	Atturtilon v. Sefeli Cretic.	
Argentaria	4. 457	Auellana	4. 489
Argenti historia	3. 373	Auena	4. 462
Aries v. Ovis.		Auis medica	5. 721
Arilli	1. 2	Aurata v. Truta.	
Aristolochia	4. 459	Aureum malum	4. 462
rotunda	4. 507	Auricula muris	4. 463
Armenus lapis	3. 297	Auripigmentum	3. 428
Armoniacum v. Ammoniacum.		Auri historia	3. 310
Armoracia	4. 459 562	Aurum diaphoreticum	3. 312. 316
Arnabi veterum v. Zedoaria.		portabile	3. 313
Aromata officinalia	2. 87	Sclopetans	3. 311
Arnica	4. 460	Spiritualisatum	3. 313
Arsenici historia	3. 426	Vitæ	3. 346
Artemisia	4. 460 530	Axungia Solis	3. 273
tenuifolia v. Tanacerum.		Lunæ	ibid.
Arthanita	4. 494	Aizoon v. Sedum.	

Azoth.

INDEX R E R V M

Azoth, Azock	3. 340	Vulnerarius	2. 272
B.		Vterinus	2. 361
Baccharis Germanica	4. 465	Baptifecula	4. 494
Baculi pro fornace	2. 259	Barba caprina v. Vlmaria.	
fumales	2. 300	Barbo	5. 723
pectorales	2. 258	Bardana	4. 464
Balanus myrepfica	4. 463	Basilicum	4. 465
Balaustia	4. 511	Bafium ♂ & ♀	3. 382
Balsamum (herba)	4. 464	Batrachus v. Rana aquatica.	
Balsamina	4. 535	Batrachites	5. 679
Balsamita	4. 532	Bdellium	4. 605
minor	4. 451	Becabunga	4. 455
Balsami æquiuoca	1. 6	Bechium v. Tussilago.	
Balsamorum natiuorum series	2. 100	Belemnites lapis v. lyncis lap.	
inunctoriorum series	2. 259	Belleregi v. Myrobalani.	
odoriferorum series	2. 134	Bellis	4. 465
stillatitorum series	2. 136	Bellon.	4. 504
	2. 136	Behenalbum & rubrum	4. 465
Balsamorum corpus	2. 135	Ben. Paruum	4. 463
Apoplecticus	ibid.	Beneran. v. Verbena.	
Balsaminæ	2. 260	Benzoin, Belzoinum, Beniuium	4. 606
Bezoarticus	2. 135	Berberis	4. 466
Hispaniæ	2. 261	Berula	4. 455
Hyperici	ibid.	Bestia magna	5. 674
Indic. Peruu.	4. 604	Beta	4. 466
Mirabilis	2. 262	Betonica	4. 467
Mneme cephalicus	2. 139	atilis coronaria	4. 476
Neruinus	2. 138	Betula	4. 467
Anti-Paraliticus	ibid.	Lap. Bezoar occidentalis	5. 683
Anti-Podagricus	5. 699	orientalis	5. 682
Reguli	3. 383	Bezoardicum animale	5. 708
Salis gemmæ	3. 403	Bezoardica mineralia simplicia &	
hi	2. 263	composita 3. 351. 352. & seqq.	
iris	3. 433	Bibinella, Bimpinella	4. 551
Terrarum	3. 272	Bicornis v. Scarabæus.	
Tolutanus	4. 60	Biolychnium	5. 896
♀	3. 331	Bisulua	4. 453
Saponis	2. 242	Bismuthum	3. 390
Simplex	2. 15	Bistorta	4. 468
Venus. Ægyptiacus de Mecha.		Bitumen	3. 436
Syriac.	4. 603	Platta Bizantia	5. 723
Vitæ	2. 136	Bolus terra eiusque historia	3. 274

INDEX RERVM.

Boli(medicamenta)	2. 140	Calor	1. 13
Bola nidis, i.e. Myrrha.		Caloris gradus	1. 41
Bombax	4. 468	Caltha	4. 472
Boona	4. 503	Calix	1. 2
Borraz(Sal.)	3. 404	Calx viua	3. 305
Borax, i.e. Bufonites	5. 678	Cammarus v. Cancer.	
Borrago	4. 468	Camphora	4. 607
Bos	5. 676	Camphoræ ol. calcarum	4. 516
Botritis	3. 392	Canapus	4. 473
Branca leonis	4. 452	Cancanum	4. 609
Branca Vrsina	4. 469	Cancer signum cæleste	1. 26
Brassica	ibid.	Cancri herba	4. 514
Brassica marina v. Soldanella.		Cancer animal	5. 723
Bruchus	5. 737	Candelæ females	2. 259
Brunella	4. 558	Candela regis v. Verbascum.	
Bruscus, vm	4. 568	Canicularis herba	4. 514
Bryonia	4. 638	Canis	5. 679
Bubalus	5. 678	Canna fistula v. cassia.	
Buccinum i.e. Purpura.		Cannabis	4. 472
Bufo	ibid.	Cannabina aquatica	4. 502
Buglossa	4. 470	Cantharis noctiluca	5. 340
vrbara	4. 468	Cantharides	5. 736
Bugula	4. 487	Cantharus v. Scarabæus.	
Bunias	4. 532	Caper, capra	5. 680. & seq.
Bursa pastoris	4. 470	alpina	5. 681
Butyrum Antimonij	3. 351	Capillamenta	1. 2
Butyrum viride v. Vng. viride.		Capreoli	ibid.
Buxus.	4. 471	Capreolus animal	5. 683
C.		Capricerua	5. 682 683
Cachymia	3. 396	Capricornus sign. cælest.	1. 27
Cadmia	3. 392	Caprifolium	4. 473
Cæcula cæcilia	5. 709	Capnos	4. 507
Cafur v. Camphora	3. 348	Capnites	2. 458
Calendula	4. 472	Capillus ♀.	4. 579
Calafur	4. 476	Capparis	4. 473
Calamintha	4. 540 471	Caput monachi v. Taraxacum.	
Calamitis	3. 458	Caput mortuum	1. 6
Calamus aromaticus	4. 471. 449	Carabe	3. 447
Calcatrippa	2. 472	Caranna	4. 609
Chalcitis	3. 455	Carbo Petræ	3. 441
Calces & Calcinationes quomodo		Carbon humanum	5. 694
2. 141		Carbunc. historia vel rubini	1. 16
Calculus humanus	3. 298	Cardamomum ;	4. 474
		Cardel	

INDEX RERVM.

Cardel v. Sinapi.		Cataputia minor	4. 640
Cardopatium	4. 475	maior v. Ricinus.	
Cardiaca	4. 474	Catechu	3. 442
Carduus benedictus	ibid.	Cattaria	4. 540
fullonum	4. 498	Catus	5. 685
Lacteus, Leucographus, Diod.		Catus Zibetinus	ibid.
	4. 475	Caulis	4. 469
Matix Marianus	ibid.	Cauterium	r. 6. 2. 130
Veneris	4. 498	Cementatio auri	3. 310
Panis seu pacis	4. 475	Centaurium	4. 477
Carlina	ibid.	maius	4. 563
Carneolus	3. 284	Centumcapita	4. 501
Carnosarum partium offic. series 2.		Centummorbia	4. 542
187		Centumnodia	4. 555
Caro	1. 2	Cepæ	4. 478
Caros	4. 474	Cera	5. 722
Carota	4. 548	Cerata	4. 478
Carotides	4. 545	Cerata, Cerota	2. 167
Carpetium	4. 590. (Valeriana)	Cerata, Ceratonia v. Siliqua.	
Carpio, Carpus, Carpa	5. 724	Cerates v. Unicornu fossile.	
Carpobalsamum	4. 464	Cerebrum	5. 700
Carthamus	4. 639	Cerefolium	4. 475
Carub. Carnub. v. Siliqua.		Ceremen	5. 631
Carum, Carui, Careum	4. 476	Cerussa	3. 335
Caryophyllata	4. 477	⚔ij	3. 368
Caryophylli Aromatici	4. 476	Ceruus, Cerua	5. 685
Caryophyllus hortensis	ibid.	Cerui spina v. Spina infectoria.	
Cassamum verum Cord.	4. 464	Ceruus volans v. Scarabæus.	
Cassia folium	4. 528	Ceterach. v. Scolopendrium.	
Cassia arom. v. Cinam.		Cetus, te	5. 725
Cassia fistula nigra	4. 639	Camomilla, Chamomilla	4. 480
Cassiytha, Cassuta	4. 494	Chalcitis	3. 390
Castanea	4. 477	Chalta alpina	4. 460
Castor, Castorium	5. 684	Chalybis præparatio	3. 377
Castrangula	4. 576	Chamæcissus	4. 512
Cataplasmatum historia	2. 142	Chamæcyparissus	4. 0542
Cataplasma contracuorem	2. 143	Chamædrys	4. 479
Antifebrile	2. 144	assurgens v. Teucrium.	
Laxatium	2. 143	Chamæpitys	4. 480
de nido hirundinis	ibid.	Chamæleon	4. 475
Resolutium	2. 142	Chamelæa	4. 655
Rubificans	3. 143	Cærophylum	4. 479
Vesicatorium	ibid.	Chelidonium maius	4. 481
		BBBbb ;	minus

INDEX RERVM.

minus	ibid.	Collyria	1.6. 2.701
Chelones lap.	5.296	Collyrium Bruni	1. 132
Chelopa v. Ialapa.		Viride	2. 133
Chermes	4.481	Colocynthis	4.641
Chetri	4.48	Colophonia	4. 610
China, Chinna	ibid.	Colorum Differentiæ	1.71
Chrysanthemum	4.472. 4.60	Colubrina	4.491
Chrysolithos	3.281	Columba	5.715
Chrystalli ex aceto	4.600	Coma aurea v. Stœchas citr.	
Cicada	3.735	Concentus Hippocratis	3.269
Cicendula	ibid.	Condit. histor.	2. 145
Cicer	4.483	Concha	5.725
Ciconia	5.715	Conchilium differt à Purpura	5.280
Cichorium, cicorea	4. 483	Confectionum histor.	2. 148
Cicuta, cicutaria	4. 484	Confectio moschardina	ibid.
Cimex	5.737	Consolida maior v. symphytum.	
Cinamomum	4.484	media	4.487
Cinis clauellatus	4.644	minor, minima	4.558
Cinnabaris historia	3.359	Regalis	4.472
Officinatum	3.350	rubra v. Tormentilla.	
⚡	3.372	Saracenia v. Virga aurea.	
Circæa	4. 454	Conseruarum histor.	2. 149
Cirsium Italiæ	4.470	Contrayerua	4.487
Citrago	4.531	Copal.	4.610
Citrus	4.485	Corallina	4.488
Citrullus	4.486	Coralliorum historia	3. 285. & seq.
Claretum	1.6	solutio	3.286
Claretum Gale laxatium	2.197	Corpus principium Essentiale	1.17
Clematis Indica	4.486	Coriandrum	4.488
daphnoides v. vinca.		Cornelus v. Carneolus.	
Climia, Chlimia	3.392	Cornix, Coruus	5.716
Clyffus	3.440	Cornus	4.488
Clysterium historia	2.144	Cornuum officinalium series	2.103
Cnicus	4.475	Corona terræ	4.512
Coagulorum histor.	2. 110	Corylus	4.489
Cobaltum	3.390	Corticum officinal. series	2.88
Coccum gnidium	4.655	Costus amarus dulcis comagenius	
Coccum infectorium	4.481		4.490
Cochlea	5.688	hortorum	4.532
Cochlecaria	4.486	minor	4.451
Colligendorum natiuorum mod. 1.58		niger	ibid.
Colchicum alb. v. Hermodactylus.		Coton	4.468
Collymus lap.	3.345	Coturnix	5.716
			Cotyledon

INDEX RERVM.

Cotyledon	4. 503	Cyanus	ibid.
Cornu historia	5. 699	Cyclamen, Cyclaminus	ibid.
Calcinat.	} 700 & seqq.	Cydonia malus	4. 496
Extractum		Cygnus	5. 720
Magister.		Cyma	1. 3
Sal.		Cyminum	4. 493
Crassula	4. 503	Cynoglossum	4. 495
Creario quid	1. 13	Cynorrhodos, Cynosbatos.	495. 496
Cremor Crystalli	3. 300	Cyparissus	4. 493
Saturni	3. 336	Cyperus	4. 496
Silicis	3. 305	Babylonic.	4. 506
Talci	3. 307	Indicus	4. 493
Crepitus Lupi	4. 634	Cyprinus v. Carpio.	
Crespinus	4. 466	Cysteolithos v. Lap. spongiae	
Cressa	4. 539	Cytinus	4. 510
Creta	3. 274		
Crocus	1. 7. 4. 490	D.	
♂	3. 323. & seq.		
metallorum	3. 364	Dactyliscum	4. 545
♀	3. 330	Dactyli	ibid.
S. Crucis herba	4. 266	Indici v. Tamarindi.	
Crustaceorum offic. series	2. 104	Dact. idæus v. Lapis lycnis.	
Crystallū minerale saccharatū	3. 410	Damasonium	4. 460
Crystalli lapid. historia	3. 299	Daphnoides v. mezereum.	
Crystalli purgantes	3. 302	Daucus, Daucum, Daucium	4. 497
Cubebæ	5. 491	creticus	4. 534
Cucumis, er.	4. 486. 531	crenensis verus	4. 496
asininus, agrestis v. Elaterium.		Officin. vulgaris	4. 548
Cuculus	5. 716	Decoctorum historia	2. 150
Cucuphæ	2. 239	Decoctum alterans	2. 151
Cucurbita	4. 492	Decoctum Antimoniale	2. 152
Cucumis	ibid.	Decoctum Epaticum, Epatis vituli.	
Cuminum	4. 493	ibid.	
nigrum	4. 542	hystericum, maiale, purgans 2.	
pratense	4. 476	152. & 153	
Æthiopicum	4. 454	Laxativum	2. 268
Cunilulus	5. 988	Splenis bouis	2. 153
Cupila bubula Plinii	4. 545	Delphinium	4. 472
Cupressus (arbor)	4. 493	Dens Caballinus	4. 515
Cupressus (herba)	ibid.	Dens Leonis v. Taraxac.	
Cupri historia	3. 330	Dentalium	5. 726
Curcuma	4. 493	Dentifricia	2. 193
Cuscuta	4. 494	Diaclysmata	ibid.
		Diaclysmata	

INDEX RERVM.

Diaclyfma ad gingiuas	2. 194	Antimonial.	2. 161
ad faucium inflammationē. ibid.		Diafarum	ibid.
apophlegmatizans	193	Camphoratum	2. 156
odontalgicum	2. 194	Calybeatum.	2. 158
refrigerans	ibid.	Corroborans	ibid.
Diacrydium, Diagrydium	4. 669	Cordiale	ibid.
Diamarenatum	4. 479	De Croco	2. 159
Diapensia v. Sanicula	572	Diaphoreticum	ibid.
Diaphoreticum in peracutis	2. 574	Hystericum	ibid.
Dictamnus alb.	4. 506	Nucum	2. 160
Creticus	4. 498	Oruietanum	2. 159
Diphryges	3. 393	Contra Phthifin	2. 160
Dipfacus	4. 498	Regum	ibid.
Herb. Doria v. Consol. Sarracenica		Podagricum	ibid.
Doronicum	4. 498	Scorbuticum	ibid.
Austriacum	ibid.	Purgans	2. 161
Doses medicamentorum	1. 69	de Tamarindis	ibid.
Draco mitigatus, i. e. ♂ dulcis.		Elemi v. Gummi	4. 610
Syluestris	4. 559	Elenium v. Enula.	
Dracunculus maior	4. 468	Eleofacharum	1. 7
Pratenf.	4. 559	Eleofelinum	4. 458
Dropaces	2. 174	Elephas, Elephantis	5. 689
Dryopetis	5. 706	Elixyrium hiftor.	2. 162
Dudaïm	4. 539	Elîx, alliatum	ibid.
E.		antepilepr.	2. 163
Ebenus	4. 499	Camphoræ	2. 162
Ebulus	4. 641	Citri	ibid.
Ebur v. Elephas.		Cryftalli	3. 300
Ebur foſſile v. Unicornu foſſile.		Epilepticum	2. 163
Echinus	1. 3	Iuniper	4. 521
Echinus animal v. Erinaceus.		Lazuli	3. 302
Echium	4. 470	Ludi	3. 299
Eclegmatum hiftor.	2. 153	Mumiæ	5. 717
Elaphobofcum	4. 548	Nephriticum	2. 164
Elaphofelinum	4. 550	Peſtilentiale	2. 163
Elatetium	4. 663	Proprietat.	2. 164
Elatine	4. 512	Syncopticum	ibid.
Eleagnon	4. 451	Vterinum	2. 165
Electuariorum hiftor.	2. 154	Vitæ Querc. maius	2. 165
Electuarium Pſeudo-acori	2. 156	minus	2. 166
Alexipharmacum	ibid.	Elleborus alb. 650. & niger.	4. 642
de Ciconia	2. 157	Elminthes v. Lumbric. terreſtr.	
de Allio	ibid.	Embrocha	1. 7
		Empetrum	

INDEX RERVM.

Empetrum	4. 514	569	Etno (herba)	4. 501
Emplastrorum histor.	2. 167		Eruca (animal)	ibid.
Antipodagricum	3. 664		Eryngium	4. 501
Arthriticum	2. 168		Erysimum	ibid.
Cephalicum	ibid.		Esula	4. 651
Diaphoreticum	2. 169		Essentia	1. 8
Febrifugum	ibid.		Essentia seu Elix. Crystalli	3. 300
ad Fontinellas	ibid.		Ambrae	3. 436
Gummatum	ibid.		Corallorum	3. 289
ad Herniam	2. 170.		Gemmarum	3. 381
Magneticum	ibid.		L. Lazuli	3. 303
Mundificatium	ibid.		Perlarum	3. 294
Oppoldeldoch	ibid & 171		Saphiri	3. 284
Saturninum	ibid.		△ ris	3. 424. 435
ad Scyrrhos	ibid.		Theriace	2. 192
Splenetic.	ibid.		Eufragia, Euphrasia, fia	4. 592
Sticticum	ibid.		Eupatorium	4. 502. 401
Diaulphur.	2. 173		Euphorbium	4. 664
Stomachicū de Tacamah	ibid.		Exossis (piscis)	5. 329
ad Tophos & gum. ♀ a	2. 174.		Experientia indicat vires med.	1. 86
Vesicatorium	ibid.		Extractorum histor.	2. 178 & seqq.
Emulsionum histor.	ibid.		Extracta Aromatum	2. 182.
Emulsio nephrocatactica	2. 175.		Carnis	2. 183
ad crimoniam	} ibid.		Cornuum	2. 183
expulsiua			Fellis	ibid.
refrigerans			Florum	2. 180
Endiuia	4. 499		Fructuum	2. 181
Ens Balsami	4. 433		Gemmarum]	3. 180
Entalium v. Dentalium			Gummatum	2. 182
Enula	4. 513		Herbarum	2. 180
Epatica, alba, aurea, nobilis	4. 500		Lignorum & Cortic.	2. 181
stellata, stellaria	ibid.		Ossium	2. 183
Ephemerum	4. 525		Radicum	2. 181
Epithematum histor.	2. 177		Resinarum	2. 182
Epithema Cordiale	ibid.		Seminum	2. 181
Epaticum	ibid.		Stercorum	2. 183
Febrile	2. 178		Hinc	
Epithymum	4. 651		Agallochi	4. 450
Equus, Equa	5. 689		Benedictum	2. 190
Equicervus	5. 684		Bezoarticum Querc.	2. 184
Equisetum, cauda equina	4. 500		Catholica	2. 190. & 191
Erinaceus	5. 690		Chalybeatum	2. 184
Erthina	2. 176		CCCC	Efulæ

INDEX RERVM.

Esulæ	1. 552	Fistici	4. 553
Fellis huntari	5. 209	Flos amoris	4. 453
Hystericum	2. 185	Frumenti	4. 494
Liquida	2. 188	Régius	4. 472
Marcasitæ	3. 392	Trinitatis v. Iacea.	
Marricale	2. 185	Flores Chymicorum	2. 193
Mechoac.	4. 655	Officinales	2. 88
Nasale	2. 176	Flores enzoin	4. 604
Opij	4. 618	Corallorum	3. 292
Panchymagoga 2. 191 & 192 seq.		Perlarum	3. 295
Pestilentielle	2. 185	Iouis	3. 340
Pulmonum	2. 186	Martis	3. 328
Puluerisand.	2. 183	♀ ij	3. 348
Purgantia	2. 190	Sais	3. 407
Satyrij	2. 186	Solis	3. 318
Succini	3. 438	Sulphuris	3. 429. seqq.
Theriaca	2. 186	Veneris	3. 331 333
Viscosa	ibid.	Fœniculum	4. 504
Vterinum	2. 189	Porcinum	4. 551
Ⓒ li	3. 424	Fœnugræcum	4. 505
Faba F.	4. 502	Fœnum Chamælorum v. Scænanthm.	
Faba in versa, Fabaria	4. 503	Folia seu herbæ officinal.	2. 90
Suilla	4. 515	Folium Indum v. Malabathr.	4. 528
Facultates ad crescent. requisitæ	181.	Folliculus	1. 3
Farfara, Farfatella v. Tussilago.		Formæ principium - extinguitur mor-	
Farina	2. 192	te violenta non perit	5. 1. 2
Farrago	4. 577	Formica	5. 341
Febrituga	4. 478	Formulæ menicamentorum	1. 68
Antefebriale Crollij	5. 328	Fornacum histor.	1. 44
Fecularum histor.	2. 192	Fraga	4. 505
Felis	5. 280	Fragaria	ibid.
Fel terræ	4. 479	Fragula	ibid.
Fella officinalia	2. 106	Fragula	4. 652
Ferri histor.	3. 323	Fraxinella	ibid.
Fiber	5. 279	Fraxinus	ibid.
Fibræ	ibid.	Fructus officinales	2. 93
Ficaria, Ferraria	4. 481 576	Frutex	1. 3
Ficedula	5. 717	Fuga Dæmonum	4. 516
Ficus	4. 503	Fulgo	4. 611
Figura rei quid?	1. 72	Fumaria	4. 509
Filipendula	4. 504	Fumaria bulbosa	4. 507
Filix	ibid.	Fumus terræ	4. 506
Filicula capillaris v. Trichomanes.		Fungi officinales	2. 94

INDEX R E R V M

G

Gagates	3. 441
Galanga	4. 507
Galbanum	4. 611
Galega	4. 508
Galeopsis	4. 598
Galerita	5. 720
Gallium	4. 508
Gallitricum	4. 515
Gallus, Gallina	5. 717
Galiophis v. vertica mortua	4. 598
Gale d.	1. 8. 700
Gattaria herba	4. 540
Garganum histor.	2. 193
G. leminum	4. 517
Gemmarum histor. & præp. videlicet	
Sal. Magist. Liq. & Tinct.	3. 381
Gemini	1. 25
Generatio quid.	1. 13
Generatio analogica	1. 14
Geniculum	1. 3
Genista	4. 508
Gentiana	4. 509
Geranium	ibid.
Ghitta Iemou	4. 665
Gialappa v. Ialappa.	
Gingiber v. Zingiber.	
Gingidium	4. 479
Gladiolus cæruleus	4. 518
Luteus	4. 448
Glycyrrhiza	4. 510
Glans Vnguenraria	4. 463
Gobius	5. 728
Gossypium	4. 468
Gramen	4. 510
Granatus (lapis)	3. 281
Granata malus	4. 510
Granum & coccus baphica. Gr.	
Tinct.	4. 481
Granum Ben.	4. 463
Regium v. Cataputia.	
Grana Paradyfi v. Cardamomum.	
Tiglia, Tilli, v. Ricinus Amer.	

Gratia Dei	4. 509. 653
Gratiola	ibid.
Grossularia	4. 564
Grus	5. 718
Gryllus	5. 738
Guaiacum, Guaiacan	4. 511
Gummi-resinæ officinales	2. 101
Gummata officinalia	ibid.
Gutta Gamandra, v. Ghitta Iemou.	
Gummi, Gotra de Peru, v. Ghitta Iemou.	
Gummi Ammoniacum	4. 602
Animæ	4. 603
Arabic.	ibid.
Iouiale	339
H.	
Hæmatites lapis	3. 301
Hager, Hagiur lapis	3. 296
Halcyon v. Alcedo	
Halec	5. 726
Halicacabus v. Alkekengi	4. 452
Handel, Handhal v. Colocynthis.	
Harengus	5. 726
Hast v. Thymus.	
Hedera arborea	4. 513
terrestris	4. 512
Helenium	4. 513
Helenium comagen	4. 489
Helleborus v. Elleborus.	
Helleborastrum v. Elleb. niger.	
Helleborine v. ibidem.	
Helxine	4. 547
Hepatica saxatilis	4. 524
Hepaticum trifolium	4. 500
Vide & Epaticam.	
Heptaphyllon v. Tormentilla.	
Heraclea v. Sideritis	
Herbæ officinales	2. 90
Herba benedicta	4. 477
Cancri	4. 470. 514
Caniculatis	4. 515
S. Crucis	4. 541
Equinalis	4. 500
CCCCc 2	Iulia

INDEX R E R V M.

Iulia	4. 451	Ibiscus	4. 453
Kunigundis	4. 502	Ichthiocolla	5. 727
Muralis	4. 547	Ignis f. vita, Principium essentiale	
Paralyfis	4. 557	1. 16	
Pedicularis v. Staphisagria.		Ilex coccifera	4. 481
Perforata	4. 516	Imperatoria	4. 517
Regia	4. 460	Iasminum Iesminum, Iosminum	
Ruberti	4. 509	ibid.	
Trinitatis v. Iacea.		Illecebra	4. 590
Turca Lob.	4. 514	Influentia stellarum	1. 21. 22. seq.
Hercules Bouij	3. 346	Infusionum historia	2. 196
Hermoda&tylus	4. 653	Infusio cholephlehmagoga	ibid.
Herniaria	4. 514	Inguinalis	4. 501
Hieracium	4. 483. 586	Iniectiones penis oë	2. 140
Hinnulus v. Ceruus.		Instrumenta pharmacoptica	1. 42
Hippacen	5. 690	Intybus	ibid.
Hippolitus	ibid.	Satiua	ibid.
Hippofelinum	4. 523	Agrest.	ibid.
Hippuris	4. 500	Iouis barba v. Sedum.	577
Hircus v. Capra		Iringus	4. 501
Hirudo	5. 738	Irio	ibid.
Hirundo	5. 719	Iris (gemma)	3. 298
Hirundinaria	4. 481. 542	Iris cærulea Germ.	4. 518
Hispidula	4. 514	Illyrica, Florent.	ibid.
Hædus	5. 681	Palustris	4. 449
Hæmonitis v. Scolopendr.		Iscopus humida	5. 702
Homo	5. 690	Iua arthetica	4. 480
Hordeum	4. 514	Iuba	1. 3
Horminum	4. 515	Iuglans	4. 519
Hyacinthus	3. 282	Iuiubæ	ibid.
Hydrargyros	3. 341	Iuleborum histor.	2. 198
Hydropiper	4. 549	Iulus	1. 3
Hyoscyamus	4. 515	Iuncus odoratus v. Schœnanthum	
Peruvianus	4. 541	4. 576	
Hypericum	4. 516	Iuniperus	4. 520
Hypocistes	4. 612	Iupiter planeta	1. 23
Hyssopus	4. 516	Iupiter i.e Stannum	3. 338
Agrestis v. Thymbra	574	Diaphoreticus	3. 339
Huso (piscis)	5. 727	Iusquiamus	4. 415
I.		K.	
Iabona	4. 529	Kermes	4. 482
Iacea 4. nigra	4. 517. 584	Keyri	ibid.
Ialapa, pium	4. 654	Kici v. Ricinus.	
		Herb.	

INDEX R E R V M

Herb. S. Kunigundis	4. 950	Lazuli	3. 3
L.		Lyncis	3. 303
Labdanum v. Ladanum.		Lyncurius Veterum	3. 302
Labrum Veneris	4. 948	Magnes arsenicalis	2. 199
Lac eiusque serum	2. 105	Medicamentosi.	2. 200.
Lac amygdalarum	ibid.	Mirabilis	2. 200
Saturni	3. 334	Nephriticus	3. 282
Sulphuris	3. 431	Ossifragus	3. 303
Virginis	2. 133	Prasinus i.e. Smaragd.	3. 84
Lacca	4. 613	Prunellæ	3. 405
Lacertus	5. 738	Rubeus	2. 200
Lacryma	1. 3.	Sabulosus i.e. Ossifragus.	
Lactuca	4. 521	Salutis	2. 200
Ladanum	4. 613	Specularis	3. 304
Lagena Lupi	4. 460	Spongix	3. 305
Lagopus	4. 522	Syriacus v. Iudæus.	
Lamium labeo v. vrtica mortua.		Vegetabilis	2. 199
Lampyrus alata	5. 736	Lappa	4. 464
Lanaria v. Verbascum.		Larix	4. 522
Lanugo	1. 3	Lafer medicum v. Asfa fœtida.	
Lanugo perlata	3. 349	Lascepitium German.	4. 517 & 523
Lapathum	4. 522. & 448 583	Lathyrus v. Cataputia.	
Hortenſe v. Spinachia.	161	Lauendula v. Spica	4. 581
Lapides natiui	2. 85	Laudanum facile	2. 159
Lapides officinales	2. 104. 120	Pale	2. 193. 3. 340. 350
minus precioſi	3. 296	opiatum v. in opio	4. 619
Lapides medicamentales præparati		Lauer	4. 425
2. 199		Odoratum	4. 539
Lapis corroſiuus	ibid.	Laurus	4. 522
Salutis	200	Laureola v. Mezereum.	
Magnes arsenicalis	199	Laxatiuum minerale	3. 352
Mirabilis	2. 200	Ledum v. Ladanum.	
Lapidum hiſtor.	3. 278	Lens paluſtris, Lenticula	4. 523
Lapid. aquilæ	3. 296	Lentiscus	ibid.
Armenus	3. 297	Leo ſignum cœleſte	1. 26
Cærulæus, Cyanos i. e. L. Laz.		Lepus	5. 701
Calaminaris	3. 298	Leucanthemum	4. 480
Calcarius	3. 297	Leucoium	4. 82
Corroſiuus	4. 649	Leuiſticum	4. 523
Foſſilis i.e. Specularis.		Libanotis	4. 566
Heracleus, Herculeus v. magn.		Libra ſignum cœleſte	1. 27
Ignis Baſil.	3. 386	Libyſticum	4. 523
Iudaicus	3. 201	Lienaria v. Vrtica mortua	4. 598

INDEX RERVM.

Lichen petræus, saxatilis	4	524	Locus afferuandorum medicamen-	
Lichenes equeorum	5.	688	torum	1. 61
Ligna officinalia	2.	94	generandorum medic.	1. 32
Lignum Aloes	4.	450	Pharmacopoëticus	1. 46
Colubrinum serpentarium			Locus variat vires	1. 74
4. 48			Lotus vrbana	4. 530
Guaiacum, Sanctum	4.	511	Hortensis	4. 521
Indicum		ibid.	Lozongæ	1. 9
Nephriticum	4.	540	Lucanus v. Scarabæus	5. 727
Santalum	4.	573	Lucius	5. 727
Ligusticum	4.	523-579	Ludus, i. e. calculus humanus.	
Ligustrum	4.	524	Ludi oleum	5. 695
Lilium	4.	525	Lulula	4. 448
Conuallium		ibid.	Lumbrici terreni	5. 738
Paracelsi	3.	384	Intestinorum	5. 739
inter Spinas	4.	473	Lumen Naturæ	1. 15
Limax v. Cochlea	5.	688	Luna, i. e. Argentum.	1. 22
Limnesium Centaurites v. Gratio.			Luna planeta	1. 22
Limonia mala	4.	526	Luna potabilis	3. 322
Limonium v. pyrola.			Lupinus	4. 502
Linaria	4.	526	Lupus chymicis est ♂	3. 460
Linctus	2.	153	Lupus animal	5. 702
Lingua canina	4.	944	Lupus pifeis v. Lucius	
Ceruina v. Scolopendrium			Lupulus	4. 528
		575	Luteum	4. 508
Linimentorum histor.	2.	259	Lux Essentialis	1. 17
Linimentum de amiantho.	2.	263	Libisticum	4. 523
Saturni		ibid.	Lychnis	4. 494
dentifricium	2.	264	Lycium	4. 614
rrhinum	2.	255	Lycopodium	4. 538
Linum	4.	526	Lycopus	4. 473
Liquidambra	4.	614	Lynx	5. 703
Liquiritia	4.	510		
Liquores	2.	201	M.	
Lithontripicus		201	Macra perlarum	5. 727
ad Vlcera		ibid.	Macrocosmi nutritio	1. 13
Lithargyrium	3.	393	Macer veterum	4. 536
Lithospermum	4.	534	Magisteriorum histor.	2. 202
Lohoch	2.	153	Magisterium Aluminis	3. 410
Lohoch de Cassia pro clyst.	1.	154	Boli	3. 273
Lohoch passulatum		ibid.	Chalybis	3. 324
Loculamenta	1.	4	Corallorum	3. 288
Locusta	5.	729	Butyraceum	ibid.
			Crystalli	3. 300
			Plumaceum	

INDEX R E R V M.

Plumaceum	ibid.	Cælestis Quercetani	2. 134
Gemmarum	3. 281	♂.	3. 327
Granati	ibid.	♀ij,i.e.♀ dulcis solaris	3. 350
Iouis	3. 338	⚲	3. 336
Lap. armen.	3. 297	⊙	3. 318
Calaminaris	3. 298	♀	3. 350
Iudaici	3. 301	Marathrum	4. 504
Lazuli	3. 302	Marcasita	3. 390
Lithargyrij	3. 393	Marga	3. 176
Martis	3. 328	Margaritarum histor.	3. 293
Marcasitæ	3. 391	Marmelata quid?	2. 196
Perlarum	3. 294	Marmor	3. 303
Saturni	3. 334	Mars i.e. Ferrum	
Solis Basil.	3. 319	Mars Planeta	1. 24
Succini	3. 438	Marum	4. 530
Talci	3. 307	Marrubium	4. 529. 474
Terrarum	3. 273	Masticatoria	2. 203
Terræ sigillatæ	3. 274	Mastiche	4. 615
♀ri	4. 231	Mater herbarum	4. 460
⊕ i	3. 425	Perlarum	5. 728
Vrinæ	5. 693	Materia Natiu.	1. 29
Magistrantia	4. 417	Materia medicatorum	1. 45
Magnes	3. 303	Matricaria	4. 530
Arsenicalis	2. 200	Matrisylua	4. 530. 473
Magnesia ⚲ i.i.e. ♂	3. 377	Mechoacanna	4. 654
Maiorana	4. 527	Myra v.	4alapa.
Mala	4. 128	Meconium v. Opium.	
Aurantia	3. 23	Medelufium v. Vlmaria	
Citria,medica , Assyria	4. 485	Medulla	1. 4
Cotona	4. 497	Medulla Solis	3. 273
Punica	4. 511	Medulla Officinalis	2. 106
Perfica	4. 549	Mel	5. 732
Malabathrum	4. 528	Arundinaceum cannæ v. Sacch.	
Malaguetta	4. 474	Melanthium	4. 542
Maliconum	4. 78	Melasperrum	ibid.
Malua	4. 28	Meles v. Taxus	
Arborea , hortulana, maj. rosea		Melloes Larac.v.Lumbric.terr.	
4. 529		Melochites lapis	3. 295
Palustris	4. 453	Melilotus	4. 530
Maluauiscus	ibid.	Mella officinalia	2. 248. 239
Manati	5. 725	Melissa, melissophilium	4. 474. 532
Mandragora	4. 529	Melo	4. 531
Manna	4. 666	Membranosæ partes officinales	2. 110
		Men.	

INDEX RERVM.

Men. Siracost. v. Manna.		Milvus	5. 719
Menstrua	2. 178	Milzadella v. vrticā mortua	4. 598
Menstruum vniuersal.	180	Minera	1. 4
Mentha	4. 432	Mineralium historia	3. 269
Corymbifera	ibid.	Materia	1. 15
Felina non odorifera	4. 532. 540	Minæa Galeni v. Anime.	
Saracenica corymb. maj. Græc.	532	Minium	3. 336
Romana S. Mariæ	ibid.	Dioscoridis	3. 296
Satiua	4. 471	Misy	3. 390
Mercurialis	4. 533	Modus ad aptand. ad asseruat. medio.	1. 63
Mercurius Planeta	1. 24		1. 66
Mercurij histor.	3. 340	Modus vtendi	
Mercurius dulcis	3. 344	Molga v. Salamandra	
Mercurius præcipitatus	3. 342 seqq.	Molybdæna	3. 394
sublimatus	3. 347	Momordica	4. 535
Mercurius Iouis	3. 355	Moretus	2. 198
hi	3. 337. 355	Morochtus	3. 304
Ois	3. 345	Morus nigra, celsa	4. 535
Vitæ	3. 351	Morfelli	2. 204
Mercurij Liquor	3. 355	de Citro	2. 204
Sal	3. 358	Pectorales	205
Spiritus f. olea	3. 356	de Diagydio	ibid.
✠	3. 357	de Mechoaca	205
Tincturæ	ibid.	Morfus Gallinæ	4. 453
Mespilus	4. 533	Diaboli v. Succisa.	
Metalla	2. 86	Mofchata	4. 536
Matallorum historia	3. 309	Mofchius, Mofchi capreolus	5. 703
Rex	3. 310	Mofchocarion. Mofchocarydiō	4. 536
Semen	ibid.	Motacilla	5. 720
Metallica Excrementa	2. 87	Muria	4. 329
Meteora vnde	1. 114	Mucharum rosar.	4. 566
Metopium v. Ammoniac. vel. Galb.		Mus	5. 704
Metrenchyta	2. 145	alpinus	ibid.
Meum	4. 534	maior	705
Mezereum	4. 655	Terrenus v. Talpa.	
Milium	4. 534	Multipedes	5. 734
Solis	ibid.	Mulus	5. 704
Millefolium	4. 535	Momia	5. 717
Millegrana	4. 514	Mundi regna tria.	3. 269
Milleguetra	4. 474.	H. Muralis	4. 548
Millemorb.	4. 576	Musca	5. 741
Millepedæ	5. 735	Hispanica	ibid.
Melopepo	4. 528	Muscata	4. 537
		, Mufcus.	

INDEX R E R V M.

Muscus	1. 4	Nigella N. Romana odora	4. 542
Muscus arboreus	4. 537	Nitedula	5. 637
Capillaris	4. 450	Nitri histor.	3. 404
Marinus	ibid.	Nitrum Corallatum	3. 406
Pulmonar.	4. 559	Crytallifatum	3. 405
Saxarilis	4. 524	Fixum	ibid.
errestris	4. 538	Perlaturum	3. 406
Mustela	5. 728	Saturnifatum	3. 406
Myrica v. Tamariscus.		Vitriolatum	336
Myrmecium v. Formica.		Nitri Tinctura	3. 409
Myrobalani	4. 656	Nix Diaphoretica	3. 378
Myrrha	4. 616	Noctiluca	ibid.
Trogloditica v. Benzoin.		Noctua	5. 720
Myrtus	4. 538	Nodulus	2. 199
Myrthacantha	4. 568	Nodosa fœtida	576
Myrrillus	4. 538	Nomen indicat vires	1. 74
Myxæ, Myxaria v. Sebesten.	576	Nox & dies Orphei	1. 13
N.		Nux aromatica	4. 536
Napus	4. 539	Iuglans	4. 519
Napellus Moysis	4. 458	Myristica feu Vnguentaria	537
Naphtha	3. 440	Regia	4. 519
Nardus Chalta	4. 460	Nucista	4. 536
Nardus v. Spic. Spic. Celtica, Indica.		Nummularia	4. 542
Nasalia	2. 217	Nutritio	1. 13. 15
Nasaphthum v. Thymiama.		Nutrimētum	1. 29
Nasturtium aquaticum	4. 539	Nymphæa	4. 43
Hortense	4. 540	O.	
Natiua repræsentantia partes homi-		Obiectum nat. vix plane exuit	1. 73
nis	1. 19	Ochra	3. 275
Humores in hom. animalia		Ocymum	4. 465
bruta	ibid.	Ocymastrum	4. 576
Morbos	ibid.	Odorum differentia	1. 71
Natiua sunt 3. vel Macrocosm.		Oenanthe	4. 504
Vegetab.		Oesypus	704
Animal.	2. 83	Officina	2. 83
Natura internum efficiens	1. 17	Olea, Oleaster.	4. 543
Nenufar	4. 543	Olea cocta	2. 210
Nepeta	4. 540	destillata officinalia	2. 206
Montana	4. 471	Expressa officinalia	2. 209
Nephriticus lapis	284	Infusa officinalia	2. 210
Nerantiama	461	Febrifugum	2. 211
Nicotiana	4. 541	Hyperici	2. 211. 212. 213
		Antipestulentiale	2. 214
		DDD dd	Purgari

INDEX RERVM.

Purgans	2. 215	Ononis	4. 544
Terræ strig.	3. 275	Onyx i.e. Alabastrites	3. 296
natiua officinalia	2. 100	Onyx i.e. blatta byzantia.	
Oleum Benzoin	4. 606	Ophioscoridon v. Victorialis	
♂ij.	3. 374. 375. & seqq.	Ophites Lap.	3. 302
Camphoræ	4. 608	Ophthalmica Cordi	4. 503
Cerebri	5. 700	Opiatum	1. 10
Corallorum	3. 292	Opium	4. 617
Crystalli i.e. Liquor	3. 300	Opobalsamum v. Balsamum verum.	
Gemmarum	3. 280	Opopanax	4. 622. 667
Heracleinum	4. 510	Orchis v. Satyrium	4. 575
Iouis	3. 339	Oreoselinum	4. 550
Lap. Iudaici	3. 302	Origanum	4. 545
Lazuli	ibid.	Orminum	4. 515
Ludi	3. 299	Oruala	ibid
Lithargyij	3. 393	Ossa officinalia	2. 103
Myrrhæ	4. 617	Ostiocolla	3. 304
Marcastitæ	3. 391	Ostracitis	3. 392
Mastich.	4. 615	Ostrea	5. 728
Lupinum	5. 703	Ostrites v. Ostiocolla	
Mumiatum	5. 696	Osyris	4. 526
Ouorum	5. 718	Ouis	5. 705
Omphacium	4. 664	Ostrutium, Ostricium	4. 517
♂	3. 326	Oua	5. 718
Hj	3. 335	Oxalis	4. 448
Philosophorum	4. 544	Oxyacantha	4. 466
Salis	3. 299	Oxylapathum	4. 522
Sanguinis	5. 692	Oxyrrhodynon	1. 10
Saphiri	3. 283	Oxys, Oxytriphyllon	4. 448
Silicis	3. 305	Oxyfaccharum vomitium	2. 255
Sulphuris	3. 432. 434	P.	
Talci	3. 306	Palma, palm. maior	4. 545
♀ri	4. 530	Syluestris v. Tamarindi	
Templinum	4. 553	Palimpissa v. Pix	4. 619
Terræ	3. 440	Paludapium	4. 458
è Vipetis	5. 710	Palumbus	5. 720
⊕ li ♀ris	3. 331	Palus sanctus	4. 511
*j	3. 414	Panacæa ♂ij.	3. 350
virid. æris	3. 333	Nitri	3. 406
⊕ li	3. 421. seqq.	is ♂ij	3. 380
Olor	5. 720	Pancratium v. Scylla.	
Onitis	4. 545	Pandaleum	1. 10
Omphacium	4. 617	Panis porcinus	4. 494
		Papauer	

INDEX R E R V M.

Papauer Satiu.	4. 545	Montanum	4. 550
Papauer erratic.	4. 546	Petum	4. 541
Herba Pappa v. Senecio.		Peucedanum	4. 551
H. Paralyfis	4. 557	Pharmacopœia	ibid.
H. Paris	4. 547	Phaseolus	4. 502
Parietaria	ibid.	Phlegma	1. 10
Parix, Parus	5. 720	Phu v. Valeriana	4. 590
Paronychia	4. 569	Phyllirea	4. 524. 587
Partes carnosæ officinales	2. 102	Phyllitis v. Scolopendria.	
Membranosæ offic.	2. 103	Phyllon arrhenogonon	4. 533
Parthenium	4. 480. 484	Phytologia	4. 443
Passer, passer troglotites	5. 722	Pica	5. 722
Aquaticus v. Motacilla	ibid.	Pilosella	4. 463
Passulæ, Passulæ Corinthiacæ v. Vitis		Montana hispidula	4. 514
4. 595.		Pilularum historia	2. 215
Pastinaca sativa	4. 548	Pilulæ alterantes offic.	2. 217
sylyestris, erratica	ibid.	Purgantes offic.	2. 216
Pauo, Paus	5. 721	Angelicæ Francof.	2. 218
Pediculus	5. 739	de Ammoniac	ibid.
Pentaphyllon	4. 561	Arthriticæ	ibid.
Pepo	4. 492. 533	♂ iales	ibid.
Pera pastoris	4. 470	Benedictæ	ibid.
Perca	5. 728	Cholagogæ de Centaur.	2. 219
Perdicium	4. 547	Diaphoreticæ	2. 217
Perdis	5. 721	Diureticæ	ibid.
Perfoliata	4. 548	Antiepilepticæ	ibid.
H. Perforata	4. 511	de Esula	2. 219
Perianna, Periapton	1. 10	de Euphorbio	2. 219
Periclymeuum, Perfoliatum	4. 473	Febriles	2. 217. 219
Perlæ v. Margaritæ.		Gummosæ	2. 220
Persea malus.	4. 549	Hydropicæ Bontij	ibid.
Periscaria	ibid	Hystericæ	2. 268
Personata	4. 464	Iliacæ	2. 221
Pes Cari	4. 514	de Ladana	ibid.
Leonis.	4. 452. 538	Marocostinæ	ibid.
Lepotinus	4. 511	Matricales	2. 222
Lupi	4. 538	Narcoticæ Plater.	2. 217
Pessuria, Pessi	2. 247	Panchymagogæ	ibid.
Petalites	4. 550	Pestilentialia	2. 222
Petroleum	3. 440	Antipodagricæ	ibid.
Petroselinum, Petr. Vulgare Hortense		Polychrestæ	2. 223
4. 550		de Sagapeno	ibid.
Macedonicum	4. 551	de Styrace	2. 218

INDEX R E R V M.

de Succino Crat.	2. 223	Populus	ibid.
Fezæ	2. 223. 224.	Porcelliones	5. 733
ad Tuffim	2. 218	Porcus v. Sus	
Pimpinella	4. 551	Porrum, Porr. commun, &c.	4. 556
Italica, Sangultaria v. Sanguifaba	572	Portulaca, Porcellana	4. 557. 592
Romana v. Sefeli Cretic.		Potentilla	4. 556
Pinafter	4. 552	Potiones	2. 225
Pinus, Pineæ	ibid.	Potio purgans	ibid.
Pinguedines officinal.	2. 107	Iudorifera	2. 22. 225
Piper	4. 553	vulneraria	2. 226
Pisces, sign. cœlest.	1. 28	Præparationum modi & nomina	1. 34
Pissasphaltum	4. 619	Præparata officinalia in specie	2. 228
Pisselæon	4. 520	Præparat. Bolus	3. 275
Pistacia, Phistacea	4. 553	Corall.	3. 287
Pistolochia	4. 507	Crystallus	3. 300
Pix	4. 519	Geminæ	3. 277
Pix græca v. Colophonina.		Hæmatites	3. 301
Placitis	3. 392	Lap. armenus	3. 298
I lanetarum fortitudines	1. 53	Iudaicus	3. 301
Influentia	1. 22	Lazuli	3. 302
Planta	1. 4. 4. 444	Osticocola	3. 303
Planta leonis	4. 452	Perlæ	3. 293
Plantago	4. 554	Rubinus	3. 283
alpina	4. 460	Saphirus	ibid.
Plumbago	3. 394	Sardus	3. 284
Plumbi historia	3. 333	Succinum	3. 438
Æius	3. 338	Terra sigillata	3. 273
Sal.	3. 334	<i>Plura vide libr. 2. cap. 76.</i>	
Olea	3. 337	Primula veris	4. 557
Plumbum vstum	3. 333	Principia rerum essentialia	1. 15
Pœonia	4. 554	artificialia s. chymica	1. 39
Polygonum	4. 555	cognitionis	1. 15
Minus	4. 514	Productiones natuæ	1. 13
Polygonatum	4. 555	earum causa interna	1. 17
Polypodium	4. 656	externa	1. 18
Polium	4. 493	Propolis	5. 734
Polytrichum aureum	4. 450	Proprietates faciunt ad cresc.	1. 34
Vulgo v. Trichmanes		Prunus, pruna	4. 558
Poma ambra	2. 226	Prunus sylvestr.	4. 448
Pomum mirabile hierosolymit.	4. 535	Pruneola	4. 558
Pompholyx	3. 394	Prunella	ibid.
Pomus	4. 556	Prunella cærulea	4. 487
		Psiadium	4. 452
		Psidium	

INDEX R E R V M

Psidium	4. 522	Tactiles	ibid.
Psyllium	4. 657	Faciunt ad præparanda med.	
Præmna	4. 559	I. 40	
Pulegium	ibid.	Elementales	ibid.
Pulicaria	4. 549	Qualitatum primarum inuestigatio	
Pulmonaria	4. 559. 560	I. 78	
Pulpa	I. 4	secundarum inuestigatio	
Pulueres alterantes officinal.	2. 228	I. 80	
Purgantes officinal.	2. 230	occultat. inuestig.	I. 81
Pulis Alexiterius	2. 231	Quercus	4. 561
Angelicus, Algeroth	3. 351	Quercula calamandrina	7. 479
Arthriticus Parac.	2. 236	Quabebe	4. 491
Bezoarticus	2. 231	Quinquefolium	4. 561
Cachecticus Querc.	ibid.	R.	
Cathæreticus pro ossibus	2. 232	Radices officinales	2. 95
Cholagogus	2. 236	Radicula magna	4. 562
Corallor. Platus	3. 287	Alexipharmaca yerua	4. 486
Cornachini	2. 236	Radix Bezoardica	ibid.
de Cypero odoriferus	2. 232	China	4. 482
ad defluxiones	ibid.	Caua	4. 507
Dentifricius	ibid.	Rosea	4. 563
Dysentericus Croll.	ibid.	Rana	5. 728
Anti-Epilepticus	ibid.	Ranunculus viridis	5. 706
Febrilis	2. 233	Raphanus	4. 562
Mel-nagogus	2. 236	Marinus, Rusticanus	ibid.
Panchymagogus	ibid.	Sylvestris	4. 459
Passauanticus	2. 237	Rapistrum	ibid.
Phlegmagogus Querc.	ibid.	Rapum	4. 539. 563
Sperniolæ	2. 234	Raxach v. Ammoniac. Gumm.	
Sternutatorius	2. 237	Rapunculus hortens. v. Sisarum.	
Stomachicus	2. 235	Raued. v. Rhabarbar.	
Trithemij	ibid.	Reduuius v. Ricinus.	
Pumex	3. 304	H. Regia	4. 409
Punica mala	4. 519	Regina prati	4. 596
Purpurea	5. 725	Regulus	3. 367. & seqq.
Pyrethrum	4. 560	Regulus aquis	5. 722
Pseudopyrethrum	4. 549	Remena, Reem, i.e. Alces	
Pyrites v. Silex.		Resinæ officinales	2. 100
Pyrola	4. 560	Resina Laricea	4. 620
Pyrus	4. 561	Terebinthi	ibid.
Q.		Res macrocosmicæ	3. 270
Qualitates primæ sūt productiue	1. 18	Res secundariæ	I. 18
Sensiles	2. 71	Resa bouis	4. 544
		DDDDd	3 Rha

INDEX RERVM.

Rha	4. 564	S.	
Rhaponticum	4. 563	Sabina	4. 569
Rhabarb.	4. 657	Saccharum	4. 622
Rhamnus	4. 659	Saccharum Aluminis	3. 410
Rhinoceros	5. 706	Saccharum Saturni	3. 334
Rhodium lignum	4. 563	Sacculi	2. 238
Rhodia radix	ibid.	Sacculus Stomachalis	ibid.
Rhus	4. 564	Cordialis	ibid.
Rheum	ibid.	Nephriticus	ibid.
Rhæa	ibid.	Sagapenum	4. 624
Rhinoceros	5. 706	Sagittarius	1. 27
Ribes, Ribesium	4. 564	Salamandra	5. 294
Ricinus	5. 658	Salia officinalia	2. 86
Rutigallum	3. 426	Aurificalia	2. 236
Rob. simplicia officinal.	2. 248	Salium histioria	3. 239. 395
Composita	2. 250	Sal Alcali	2. 240
Rotella	4. 566	Alembrot.	2. 241
Ros	3. 277	Ammoniaci	3. 411
Oli	3. 416	Anatron	2. 241
Rosa	4. 565	Borax	ibid.
Rosa canina	4. 495	Cachecticum	3. 407
Rosmarinus	4. 566	Commune	3. 397
Ros solis	ibid.	Corallorum	3. 287
Rotula	2. 205	Crystall.	3. 259
infantiles laxat.	ibid.	Fossile s. Gemmae	3. 403
pectorales	ibid.	Iouis	3. 338
H. Ruberti	4. 509	Indum	8c. 403
Rubia tinct.	4. 567	Lithargyrii	3. 393
Rubinus	3. 282	Ludi	3. 298
Rubinus ♂ j ♀ alis	3. 383	Lunæ	3. 321
Arsenici Diaphor.	3. 427	Martis	3. 328
Sulphuris.	3. 433	Nitri Petræ	3. 404
Rubrica	3. 275	Sal Perlalum	3. 293
Rubus vulgaris.	4. 567	Philosophorum.	2. 236
Idæus	ibid.	Sacerdotale	ibid.
Rucula marina.	4. 501	Saccharinum.	3. 327
Rumex	4. 448	Saturni.	3. 336. & seq.
Acutus	4. 522	Sris	3. 435
Rupicapra	5. 681	Tri	4. 630
Ruscus, um	4. 568	Viperar.	5. 710
Ruta, ruta hortensis.	ibid.	Oli nitrat.	3. 415. 423
Capraria.	4. 508. 569	Solis	3. 317
Muraria.	ibid.	Sris	3. 331
		Salinæ	

INDEX R E R V M

Salinæ facultates faciunt ad genera-		Scabiosa	4. 576
tionem	1. 20	Scammonium	4. 668
ad præparationem	1. 42	Scarabæus, Scarabelaphus	5. 740
Saliuncula v. Spica Celtica		Scarabæolus parvus v. Catharis	5. 736
Salix	4. 569	Scariola Arabum	4. 499
Salix Amerina	4. 451	Scarlatum	4. 481
Salsa parilla	4. 574	Schinos v. Lenticus	
Saluara	4. 566	Scincus	5. 741
Saluia	4. 570	Scœnanthum	4. 576
Saluia vitæ	4. 569	Scorpio	5. 741
Sambucus	4. 570	Sclarea	4. 515
Humilis	4. 499	Scolopendria vulgaris	4. 577
Sampfuchus	4. 528	Verum	4. 576
Sanamunda	4. 477	Scordium	4. 577
Sana sancta	4. 541	Scorpius signum cœleste	1. 27
Sandaracha	3. 342	Scorzonera	4. 577
Sanguis officinales	2. 107	Scrofa v. Sus	
Sanguinaria v. Polygonum		Scrophularia	4. 576
Sanguis dracon.	4. 624	Scrophularia minor	4. 481
Sanguisorba	4. 572	Scylla	4. 576
Sanicula	ibid.	Sebesten	ibid.
Santalum	ibid.	Secale, Secle	4. 577
Santolina altera	4. 492	Sedum	ibid.
Santonicum	4. 573	Minus & minimū v. Vermicularis	
Minus	4. 493	Seli	4. 493
Sapo odoratus, Mofchatus	2. 242	Semen & quasi Semen	1. 29. 30
adimperigines	ibid.	Semen Cinæ, sanctum, zedoariæ fe-	
Saponaria	4. 573	mentina	4. 573
Saporum differentia	1. 71	Semina officinalia	2. 97
Sapphirus	3. 283	Semperuium v. Sedum	
Sarcocolla	4. 625	Minus v. Vermicularis	
Sardeus	3. 284	Senecium	4. 578
Sarsa parilla	4. 574	Senna	4. 659
Sassafras	ibid.	Sentis	4. 567
Satureia	ibid.	Sepia	5. 730
Saturni Balsam. & Liniment.	2. 264	Serapinum v. Sagapenum	
Saturnus planeta	1. 23	Seris	4. 483. 489
Satyrium	4. 575	Serpens	5. 706
Sauina	4. 569	Serpentaria	4. 542
Saxifraga	4. 575	Serpentaria fœmina & colubrina	
Lutea	4. 530		4. 468
Maior, minor	4. 551	Serpentinus lapis v. Ophites	
Rubra	4. 452. 504	Serpent. mas	4. 468
		Serpentinum	

INDEX RERVM.

Serpentinum v. Victorialis	4. 578. 93	Species officinales	2. 227
Serpillum	ibid.	Cephalicæ	2. 235
Serpillum hortense v. Thymus		Dicubear	ibid.
Serum lactis	4. 104	pro Cucupha	2. 238
Sesamum	4. 578	Specularis Lapis	3. 306
Seseli officinarum Italic.	4. 579	Sperma Ceti	3. 440
Creticum	4. 534	Spica Sp. Nardus German.	4. 581
M. filitoticum	4. 579	Spica Nard. Offic. Indica	Celtica
Seua officinalia	2. 108	4. 582	
Sexus variae vires	1. 72	Spina acida	4. 466
Sideritis, Sistrichis	4. 580	Spina infectoria, Cerui	4. 660
Sigillum Salomonis	4. 555	Hirci	4. 633
Signorum classes	1. 71	Spinacea	4. 583
Siler montanum	4. 579	Spiritus principium Essentiale.	1. 15
Silex	3. 305	Spiritus parandi modus	2. 243
Siligo Spica murica v. Triticum vel		Spiritus Antapoplecticus	2. 244
Secale		Aceti	4. 601
Siliqua	4. 580	Aluminis	3. 410
articulata	4. 486	Ammoniæ	3. 412. & 413
Silybum	4. 475	Aq. pluuiæ.	3. 277
Similitudo indicat vires	1. 75	Calcis	3. 297. 298
Sinapi	4. 580	Campanaris	3. 433
Agreste	4. 459	Corallorum	3. 292
Synapismus	1. 11. 2. 144	Lunaris	3. 322
Sion Crateuæ, maius	4. 539	Nephriticus	2. 245
Sisarum, Sifer	4. 548. 580	Nutri	3. 407
Sium aquaticum	4. 455	Perlatus	3. 295
Smaragdus	3. 284	Salis	3. 398
Smilax aspera	4. 574	Salis gemmæ	3. 403
Smyrnium	4. 456. 518. 523	Sulphuris	3. 412
Solan. Halicacab. vesicar.	4. 452	Minerales	2. 244
Hortense	4. 517	Terræ	3. 271. 272. 273. 274
Tetraphyllon	4. 547	Vegetabiles	2. 244
Solanum, Solatrum	4. 581	Vini	2. 196
Soldanella	4. 660	Vitrioli	3. 416. 4. 7. & seqq.
Sol i. e. aurum		Ⓔ i antepilepticus	3. 420
Sol planeta	1. 22	Spodium	3. 393
Solidago v. Symphytum		Spondylium	4. 469
Solsequium	4. 483	Spongia Cynosbati	4. 495
Sonorum differentia	1. 72	Spongites, Lapis Spongiæ	3. 305
Sorbus	4. 581	Squilla	4. 178
Sory	3. 390	Squinanthum	ibid.
Sparadrapus	1. 11	Stannum	3. 38
		Staphilinus	

INDEX RERVM.

Staphilinus	4. 548	Holagogus	2. 255
Staphisagria	4. 583	Imperatoris i. e. Rob. cydon.	
Stœchas, Stichas arab.	ibid.	Nicotianæ	2. 252
Citrina	ibid.	de Hispidula, de pede cari	
Stercora officinalia	2. 108	2. 253	
Stramen camelor.	4. 576	de Testudinib.	2. 253
Stratiotes millefolia	4. 535	Vomitivus	2. 254
Struthio	5. 722	Sysymbrium aquatic. Cardamine	
Strumaria	4. 465	4. 539	
Struthium	4. 517	T.	
strychnos v. Solanum		Tabacca	4. 541
Stumel v. Spica indica		Tabinaria	4. 526
Sturio	5. 730	Tacamahaca	4. 627
Stymma	1. 12	Talcum	3. 305
Styrax, Storaxe alamt.	4. 626	Talpa	5. 709
Styrax liquidus	ibid.	Tamalapatra	4. 528
Succi officinales	2. 99	Tamarindi	4. 661
modus fiendi	2. 245	Tamariscus	4. 585
Succinum	3. 437	Tanacetum	ibid.
Succisa	4. 584	Album	4. 559
Succolata	4. 625	Taphusius lapis	3. 296
Sudar. Sutter v. Saccharum		Tarentina	4. 538
Sulphurea officinalia	2. 87	Tarfa v. Tamariscus	
Sulphur eiusque histor.	3. 429	Tartarus	4. 627
Sulphura Antimonij	3. 378 & seqq.	Tartarum Philosophicum	3. 27
Sulphur Vitrioli	3. 422. seqq.	Taurum	4. 450
Sumach	4. 564	Taurus signum cœleste	1. 25
Suppositoria	2. 247	Taurus	5. 676
Sus	5. 708. 675	Taraxacum	4. 586
Sylphij lacryma i. e. Asa foetida		Taxus	5. 709
Symphytum	4. 584	Telephium v. Fabaria	
Medium	4. 487	Tempus asseruandorum medicam.	
Petraeum	4. 558. 596	1. 59. seqq.	
Syrus pulvis	4. 659	Colligendorum nativ.	1. 45
Syrupi	2. 248. & seqq.	& seqq.	
Syrupus f. Anisi	2. 251	variat vires	1. 74
Antiepilepticus	ibid.	obs. in producendis med.	
de Artemisia	ibid.	1. 21. seqq. 24	
Cardiacus	2. 252	Tenche v. Tinc	
Corallorum	3. 292	Terebinthina v. Resina	
de Erysimo	2. 352	Terebinthus indica	4. 553
Antihecticus	ibid.	Terdina v. Valeriana	4. 590
Helleboratus	2. 254	Teredo	5. 742

E E E c c

Terengibil,

INDEX RERUM.

Terengibil, Terniabin, Trugibin v.		Iouis	3. 340
Manna		Lithargyrij	3. 394
Terra facit ad generationem	1. 32	Lunæ	3. 355
Terræ officinales	2. 84	Martis	3. 328
Terrarum historia	3. 271	Nitri	3. 409
Terra argillacea sigillat.	3. 272	Perlarum	3. 294
Iapponica	3. 275	Salis	3. 402
Labacensis	3. 277	Sapphiri	3. 384
Melitea	3. 276	Saturni	3. 336
Merita	4. 493	Smaragdi	3. 284
Strigenfis	3. 276	Solis lauri	3. 321. seqq.
Testudo	5. 730	Vitriolis	3. 435
Tetrahit	4. 575	Talci	3. 307
Teucrium	4. 536	Veneris	3. 333
Tragi v. Veronica		Tithymalus	ibid.
Thanafi v. Tanacetum		Tobacum	4. 541
Therenabin v. Manna		Topasius	ibid.
Theriaca Benedicta	2. 188	Tordylium v. Sefeli Creticum	
Theriaca cælestis	2. 189	Tormentilla	4. 588
Theriaca de Mumia	5. 696	Torna bona	4. 541
Theriacæ Essentia	2. 192	Tragacantha	4. 633
Thimelæa	4. 656	Tragium primum	4. 306
Thirus	5. 709	Tragea fortis	2. 233
Thlaspi	4. 586	Grossa	ibid.
Thus	4. 632	Hepatica	234
Iudæorum, Thus, Cortex v.		Hysterica	ibid.
Thymiama		Antinephritic.	234
Thymallus	5. 730	Tragofelinum	4. 551
Thymbra	4. 574	Trichomanes	4. 588
Thymiama, ana 4. 601. v. & Ammo-		Trifolium	ibid.
niac.	587	Acetosum	4. 448
Thymus	ibid.	Aureum, Magnum nobile	
Tilia	ibid.		4. 500
Tinca	5. 731	Fragiferum	4. 505
Tineatia v. Stœchas citrina		Lentrinum	4. 525
Tinctura	1. 12	Odoratum	4. 530
Tincturæ vſitatiores	2. 255	Tripolis	3. 285
Tincturæ Aristoloch. rot.	2. 508	Trinitatis herb.	4. 500
Cathæretica	2. 256	Triflago, Tixago	4. 479
Corallor	3. 289. seqq.	Tincum	4. 589
Diaphoretica correct.		Trochifci	2. 256
2. 256		Alexiterij	2. 257
Gemmarum	3. 280	Pro fumo	2. 258

Moschardini

INDEX RERVM.

Mofchardini	ibid	Violaagrestis	517. 572
Prophylactici	ibid.	Lutea	4. 482
Trutapifcis	5. 731	Flammea	4. 517
Tubera Ceruina	4. 633	Purpurea, martia, nigra	4. 594
Tunica	4. 476	Tricolor, Trinitaus	4. 517
Turio	1. 5	Vipera	5. 709
Turpethum	4. 661	Viperaria v. Scorzonera	4. 575
Turtur	5. 722	Vipio v. Grus	
Tuffilago	4. 589	Vires secundum alphabetum	1. 63
Tutia	3. 393. 384	Virga aurea	4. 596
V.		Pastoris	4. 498
Vacca	5. 676	Virgo signum cœleste	1. 26
Vaccinia	4. 537	Viride æris	3. 330
Valeriana	4. 590	Viscum	1. 5
Variolus v. Truta		Visca officinalia	2. 94
Venus i.e. Cuprum	3. 330	Vita Essentialis est principium rerum	
Venus planeta	1. 24		1. 17
Veratrum nigr.	4. 647	Vitex	4. 451
Verbascum	4. 590	Vitis alba v. Bryonia	
Verb. odoratum	4. 557	Idæa	4. 538. 595
Verbena, fœmina v. Erysimon.		Vinifera	4. 595
Mas	4. 591	Vitraria	4. 547
Vermes terrestres v. Lumbrici		Vitrioli historia	3. 414
Vermiculus Dipfaci v. Dipfac.		Flores	3. 422
Vermicularis	4. 592	Magister.	3. 425
Vernix	4. 523	Olea	3. 420
Veronica	4. 592	Ros	3. 416
Veruex	5. 703	Sal	3. 415
Verres v. Sus		Spiritus	3. 416. seqq.
Verres fyluaticus 2. Apes		Sulphur	ibid.
Vesicatorium	2. 144	Terra	ibid.
Vetonica	4. 476	Tincturæ s. Essentiz	3. 425
Victorialis	4. 593	<i>Plura ex Do vide dicto capite.</i>	
Vinca peruinca	ibid.	Vitriolum ♂ is eiusque destillatio	
Vencetoxicum	ibid.		3. 329
Vina i.e. Succi liquidi	2. 245	Vitrum ♂ ij.	3. 302. seqq.
Vini historia	4. 33. & seq.	Vitrum ♀ ij C are	3. 347
Vin. medicata	2. 196	Vitulus	5. 711
Arthriticum	196	Vlmaria	4. 596
Cephalico-Spleneticum	ibid.	Vmbellæ	1. 5
Matriceale	197	Vmbilicus terræ	4. 495
Purgans	ibid.	Vuguenta officinalia	2. 259
Sanctum	ibid.	Vnguentū Anodynum podagr.	2. 263
		EE Eee 2	Butyraceum

INDEX R E R V M.

Butyraceum neruale	2. 264	Vrtica	4. 597
Cardiacum	i bid.	Mortua, lactea	4. 598
Cordiale	2. 265	Vinea	4. 534
Lithargyr.	3. 394	Cranij	5. 700
Magneticum	3. 303	Vsurpatio	1. 64
Narcoticum	2. 265	Vuæ, Vuæ Passæ v. Vitis.	4. 595
Ophthalmicum	i bid.	Vuaversa, Vulpina	4. 547
ad perniones	i bid.	Vrsi	4. 564
contra scabiem	i bid.	Vulpes	5. 712
Somniferum	2. 266	Vultur	5. 722
Splenicum	i bid.		X.
Sympatheticum	i bid.	Xylaloes	4. 450
Terebinthinæ	2. 267	Xanthium	4. 465
Potabile	i bid.	Xenechton	1. 10
Vngues & Vngulæ officinal.	2. 109	Xylon	4. 468
Vnguis odoratus	5. 721		Y.
Vngula caballina v. Tussilago		Yerua radix	4. 661
Vnicornis	5. 711		Z.
Volucrum maius	4. 473	Zaibar, Zibach	3. 340
Vnicornu solare	3. 301	Zarsa parilla	4. 574
Fossile	3. 308	Zeduaria, Zeduar, Zudar, Zurumbet,	
Voupa	5. 722	Zerumbet	4. 598
Vrceolaris	4. 547	Zibebæ i.e. Vuæ passæ	4. 595
Vrsus	5. 712	Zingiber, Zinzib	4. 599
Vrinæ officinal.	2. 108	Zizipha	4. 519
Vrinæ historia	5. 692	Zopissa v. Pix	i bid.

F I N I S.

Tractus Melallorum M. Rulandi 365
Aqua podag. Rulandi 134
Antifebrilis Rulandi 726
Falsus Carnachiani 236
Extract. Sp. Rulandi 652
Balsamus. Δ Rulandi 485
Empl. Δ Rulandi 173
Oleum F. Rulandi 512
 ∇ Rulandi 338
Spiritus Rulandi 338
Oleum Rulandi 89

Frankland Morton
Sum Ex Libris 1703



Handwritten notes in the left margin:
Korpus for Jan
des Paul de L...
n. 304 vol. 2
Apr 7^e Blat fol.
des for Jan 17^e
+ 2^e 7^e 17^e
Korpus for Jan
n. 422 vol. 1

10/2/23
20/2/23

20/2/23

